



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
235/D/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
235/D/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
235/D/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
235/0/1

235 (1)
D





Abz 397 8626

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
Philosophi, Medici,

*Et in Gymnasio Patauino Simplicium Medicamentorum
Professoris Ordinarij, atq; Horti Medici praefecti,*

DE MEDICINA METHODICA

LIBRI TREDECIM

In quibus medendi ARS METHODICA vocata olim maxime celebris, quæ
hac ætate non sine magno studiosorum medicinæ & dedecore, & damno plane de-
sijſe viſa eſt, denovo reſtituitur, atq; in medicorum commodum quadantenus
ad medicinam Dogmaticam conformatur.

Opus nouum, è quo Studioſi præter ſectæ Methodicæ placita à celeberrimis medicis tradita,
etiã praxim Methodicam exactiſſimam ad medendum nanciſcentur.

VM
AD SERENISS. FRANCISCVM MARIAM
DVCEM VRBINI



Patauij, Apud Franciscum Bolzettam. 1611.

Ex Typographia Laurentij Pasquati.

PROSPER ALPINI
MAROSTICENSIS
Philosophi, Medici


Et in Gymnasio Patavino Simplicium & Medicamentorum
Professoris Ordinarii, ac Horti & Medici praecepti.

DE MEDICINA METHODICA
LIBRI TREDECIMI

In quibus methodi, ARTIS METHODICA vocem olim maxime celesis, quae
hac ratione hinc magno, hinc totum in medicina & deinde plane de
suis et effectibus rebusque in medicorum communem quatuordecim
et medicum in dogmaticis continetur.

Optime notum est, quod studij praecepta, sicut Methodicae praecepta, a rebus
cumque praeceptis Methodicis, etiam quodammodo ad methodum hanc spectant.

AD SERENISS. FRANCISCAM MARIAM
DACEMVRBINI



Patavij, Apud Franciscum Bolducum, 1611.

Ex Typographia Laurentij Paganini.

SERENISSIMO
FRANCISCO
MARIAE II. FELTRIO

DE RVVERE DVCI VRBINI VI.

Prosper Alpinus. S. D.



CUM mille fortasse ab hinc annos (Serenissime Dux) ut non leui coniectura cōsequi possumus, ex tribus medicinæ sectis olim vereribus cognitis, Methodica vocata, posteaquam multis sæculis à viris doctissimis exulta in toto ferè orbe maxime floruerat, nunc omnino & obsoleuisse, & planè de fuisse visa sit, doliturum sanè, & quidem acerbius, medicinæ studiosis existimaui: Artē medendi Methodicam (quia breui methodo homines medicinam facere doceret) appellatam, ex medicorum memorijs prorsus sublata: in qua tot tantiq; philosophi, & medici eruditissimi, quorum summam in tradendis liberalibus artibus præstantiam, atq; claritatem antiquitas probe nouit, ad eam cognoscendam, stabiliendamq; plurimum in sudarunt. De qua etiam Thesalus quondam Methodicorum Princeps apud Neronem Principem tantopere gloriatus est. Quid an non præter hunc, atque Themisonē Laudiceū Syrium illius sectæ primum auctorem, Antipater quoque, Leonides Alexandrinus, Archigenes Apameus, Soranus, Ephesus, Iulianus, Cælius Aurelianus, atq; alij penè innumeri ab antiquitate plurimi æstimati hanc medendi methodum religiosius excoluerunt & mordicusq; tenuerunt? Quid amplius? Non ne Galenus ea ætate maxime in medicina celebris, forsitan quadam nobili emulatione commotus (quia eam medendi sectam, quo tempore ipse primum Romam venerat, in ea vrbe, atq; alibi in totius orbis terrarum locis supra alios medicos clarere animaduernerit, atq; ad maiorem quoque honorem, & gloriam euehendam suspicaretur)

cum medendo, tum scribendo varias disputationes contra ipsos apologeticas suscipere coactus est? Quas Methodicis non parum auctoritatis, atque splendoris attulisse, creditum est; nimirum quasi tantus medicus post unum Hippocratem Dogmaticorum omnium Princeps eo modo multam cohonestare, illorumque claritati aliquid maius honoris addere videretur. Huc accedit valetudinis curationem, quam Methodici prosecuti sunt, vel idem ipsum mederi à Dogmaticis secutum videri, vel pauculis quibusdam differentiis ab ipso solummodo distinctam, deprehendi: Tamen hæ duæ medicorum sectæ in modis medicæ præsidia indicandi, scoposque curatorios eliciendi ferè omnino inter se dissenserint. Huius quidem medicinæ celebritas, & tantorum medicorum, qui ipsam insecuti sunt, auctoritas me adeo in eius desiderium impulit, ut in ea cognoscenda plurimum laboris, atque studij impenderim; cuius eximia uoluptate captus in studiorum commodum de hac ipsa medicina tredecim libros maiori quam potui diligentia conscripsi: quorum tres priores ad proponenda Methodicorum placita, eaque disputanda perfeci. Reliquos vero ad morbos & adstrictos & laxos, & mixtos ex laxo & ex adstricto cognoscendos, atque curandos ad exitum perduxì. Quos sanè hortatu quorundam medicorum maxime illustrium in lucem, ut prodirent facile mihi persuaderi passus essem, nisi à Dogmaticis medicis (quibus vel etiam antiquitus hæc curandi ratio maxime inuisa fuisse uisa est) periculum meum me commouisset. In qua opinione hæsitans, eoque extiti, quo tu (DVX. SERENISSIME, Princepsque Clementissime, cui hanc meam medicinam denuo restitutam nuncupare, ac dedicare iam diu constitueram) mihi in mentem occurristi: ita enim ipsa commendatam satis ac probatam se esse intelliget, ubi iudicio tuo longe quidem acerrimo non iniucunda visa fuerit, ex quo mihi omnis timor continuo ex animo depulsus est. Si modo licuerit, ut meæ lucubrationes in tuo patrocinio quicquam sperare debeant, aut possint, cum unus tu sis ex maximis Italiæ principibus, cui amplissima, & prope diuina munera debentur. Quo pacto enim Methodica hæc medicina à me & tibi planè ignoto, & nullis seruitijs hoc præmerito profecta, in tuæ Celsitudinis clientelam peruenire se posse confidat? Veruntamen ego de tua humanitate clementissima, qua cunctos litterarum professores perbenigne complecteris, neque haud omnino desperans, mihi quoque qualiscumque sim ex te humanissimo Principe, litteratorum omnium huius sæculi patrono aduocationem non defuturam, teque etiam non minus me in albo tuorum Clientum describi passurum, non dubitavi. Qua spe animatus hosce

MEOS

meos cōmentarios āplisimo nomini tuo nuncupatos studiosis euul-
gandos, constitui. Etenim unum te principem Italia nouit, inter ma-
gnos Duces, qui **FELTRIAM DE RVVERE** familiam Serenissi-
mā Regijs profectō uirtutibus hac ætate perornas, nēpe maximo re-
rum vsu, incomparabili sapientia, prudentia, ceterisq; alijs animi
præclarioribus dotibus præditus, cultum præcipue religionis, unā
cum iustitia, charitateq; eximia sanctius excolis. Huc accedit, te Re-
ges maximos, qui non minus imperio quā reconditarum litterarū
studijs claruerunt, maxime æmulari voluisse. Quem nam ex huius
ætatis principibus te ipso magis rerum cognitione oblectari, atq; cla-
rere hoc nosti, um æuum compertum habet? Quo mirū non est, si Bi-
bliothecā à Serenissimo **FEDERICO** Urbini Duce foelicis recorda-
tionis, olim comparatam maxima tua liberalitate usque adeo & au-
xisti, & perfecisti, ut nulla sit hoc tempore cognita, quæ illi præferri
vel possit, uel debeat. Cuius profectō tu mira adlectus voluptate,
quicquid nancisceris otij, id totum legendis, recognoscendisq; eorū
scriptorum lucubrationibus assidue impendis. Vnde mirum itidem
non est, si bonarum artium studiosis plurimum faueas, eosq; non
minus & foueas, & protegas. Igitur hosce meos libros, quos tibi de-
uotissime, & me ipsum unā quoq; voueo ac dedico, ut benigno uul-
tu accipias, te etiam atq; etiam oro. Quod si feceris animum mihi ad
alios nostros in hoc genere studiorum labores euulgandos, inflam-
mabis. Vale Dux Serenissime, & me in numero tuorum clientum
descriptum esse, neutiquam dedigneris.

Patauij ex Horto Medicinali die xij. Februarij. Anni M. DC. XI.



Prosper

PROSPER ALPINVS

Lectori.



E CCE candide Lector tibi euulgatam Methodicam ne-
stram medicinam, quam ego in libris de praesagienda vi-
ta, & morte egrotantium decem abhinc annos in lucem
editis, pollicitus fueram. De qua libenter eam medici-
ne studiosis tantisper hic agere decreui, ut illa curandi
ratio quondam à medicis clarioribus peruestigata, quo-
damq; tempore ab antiquitate plurimum celebrata, quae
praesenti aetate, plane desierat, in studioforum medicinae
utilitatem, atq; commodum, ad memoriam hominum reuo-
cetur, ut pristinumq; honorem restituatur. Profecto
non potui non vehementer admirari, ex innumeris fere,
qui in medica arte varijs temporibus claruerunt, atq; multa in eadem arte innovare stu-
duerunt, neminem extitisse, qui hanc Methodicorum medendi rationem, iamdiu è me-
morijs hominum sublatam, renouare, & quadantenus in antiquam amplitudinem, atq;
vsum reuocare cogitaret. Hanc, inquam, Methodicam vocatam medicinam, cuius antiq-
ua res fuerunt viri medici olim celeberrimi, & quae tam longa temporum serie scilicet qua-
tuorcentum fere annorum spacio, ut postea suis locis demonstrabitur (capisse hanc me-
dendi sectam Marci Antonij, & Cleopatrae Reginae Aegypti temporibus; floruisseq; v-
que ad Galeni Pergameni aetatem, quam ipse Romae maxime aestimatum offendit, depre-
hensum est.) in toto fere terrarum orbe, eoq; magis in magna Italiae urbe Roma, quo
tempore Imperatores maximi in ea claruerunt, fuit praedicata. Et cui primos etiam in-
ter alias medicinae sectas honores antiquitas itidem tribuisse visa est. Sed quid am-
plius de istiusce sectae medicinae auctoritate, atq; celebritate dicemus? An non verum
est ipsam fuisse à medicis celeberrimis inuentam? Non minusq; etiam perpetuo medi-
cos praestitissimos, plurimiq; in doctrinis aestimatos, ipsam mordicus & tenuisse, & exer-
cuisse? Hoc certe negari non potest. Quandoquidem aperte constat, eos primum, qui o-
lim illa vti sunt, magna cum laude in aegritudinum curatione ipsam exercuisse, atq; eos
dem medicos in magno honore, magnaq; estimatione habitos fuisse. Quid de Themi-
sone Laodiceo Syrio primo istiusce sectae auctore dicemus? Nonne fuit Asclepiadis me-
dici Dogmatici, nuquam satis laudari, condiscipulus? Qui ab ipso occasionem nactus
na summum auctorem vocare solet. De quo Paulus Aegineta, Aetius, aliq; non pauci per
honorificam mentionem fecerunt. Galenusq; hieram Themisonis tanquam praclaram
medicamentum purgatorij compositionem meminit. Quid de Thesphalo Tralliano? Quem
ipsam medicinam à Themisone inuentam perfecisse, traditum est. Nonne (si Plinio cre-
dendum est) sub Neronis principatu illius auctoritas in medendi peritia cunctis quam ma-
xima apparuit? Quid de alijs illiusce medicinae praclaris sectatoribus, qui postea eam
in egrotis sanandis factitarunt? Hi fuerunt viri omnium opinione in disciplinarum
studijs Clarissimi. Huiusmodi fuisse constat, Heraclidem Tarentinum, proculum, Sora-
num Ephesium, Antipatrum, Iulianum, Attalum, atq; alios fere innumeros, quos breui-
tati studens lubens omitto. An non Galenus Heraclidem, Proculum, Soranum, Antipa-
trumq; magnis laudibus quandoque fuit prosecutus? Quid de Attalo quem Romae medi-
cinam

cinam honeste facere Galenus offendit, dicemus? Nonne ita ipsi (Galenus persuadente in Theagene Philosopho Cynico Romae pluris aestimato, laborante iecoris Phlegmone, non esse vitendum nudis laxantibus) respondit? Nisi multum tibi tribuerem, nihil horum tolerassem: Nam in quibus superiores medicos passi naufragia sunt, priusquam vera medicina inuenta à nostris esset, ea mihi veluti ignaro suades. ex quo in ea urbe Roma qualis eius fuerit auctoritas, conici potuit. Iulianum quoque Galenus plurimi fecisse tunc temporis visus est, cum praesertim aduersus illum scribendo doctissimam disputationem apologeticam ipsum non parum cohonestasse visus itidem fuerit. Quid de Celio Aureliano? Nonne ex ijs litterarum monumentis, quae de morbis acutis, atq; chronicis ab ipso traditis nobis superfuerunt, liquido constat, ipsum fuisse medicum grauisimum, magnisq; profecto laudibus concelebrandum. Quid de alijs qui hanc medicinam postea magna omnium cum laude tractarunt, à nobis dicendum erit? Hos quoque non parum sua praestantia honoris medicorum in choro addidisse. At de ijs posterius nos accuratorem sermonem habebimus. Quid amplius? non ne Galenum quoque de hac Themisonis atq; Thessali secta commentarium accuratissimum composuisse ex libro sexto simpliciū apparet? Quem de ipsa secta laborem scribendi haud suscepisset, si (vti aliquando facere solet) ea & inutilis, & damnosa fuisset ab ipso iudicata. Cur de ipsa scribendo, atq; disputando sepius contriuit? Huc accedit, ipsum quoque in libro de optima secta ad Thrasylulum medicinam Methodicam inter celebres medicinae sectas adnum rare minime erubuisse. Nonne etiam in libro tertio de locis affectis se in omnium sectarum scientia esse maxime eruditum, atq; illis, qui sectam quamlibet ab ipso discere cupiebant, nemini esse postponendum, non sine aliqua petulantia iactant? Adde ad maiorem istius sectae praestantiam cognoscendam, hanc sanè rationem agrotos curandi non ab ignobilibus & plebeis, at quinimo à Magnatibus, Principibus, Regibus, atque etiam non minus à maximis Imperatoribus Romanis fuisse perpetuo in magno honore, magnaq; existimatione habitam. Sed quid de ipsius utilitate eximia? Cum ipsa uia quam breuissima medicos doceat, quomodo recte morbis mederi y debeant. De quibus medicis Galenus aliquando scripsit: Propterea Methodicos illos olim Romae, quoniam medicinæ artem tradere se posse auditoribus vnicò semestri pollicerentur, plures discipulos habuisse. Ex ijs itaq; singulis quisque nostrum aperte intelliget, quanti haec Methodica medendi ratio apud antiquos fuerit aestimata, atq; non minus qualis, quantaq; fuerit eorum medicorum, qui illam insecuti fuerunt, auctoritas atq; praestantia. Cum uero isthac ipsam medendi rationem Methodicam olim vocatam multis iam praeiitis seculis omnino ex medicorum memoria decidisse, planeq; desisse animaduertim, nemineq; hactenus illius meminisse, multoq; minus ipsius usum restituere uoluisse, rem gratam me facturum medicinæ amatoribus duxi, si ipsius, mea opera, recordatio denuo reuocaretur, tantaq; medicinæ cognitio, atq; usus pristino honori restitueretur. De qua idcirco tredecim libros maiori qua potui diligentia composui, quibus ipsa tota rursus posset ab hominibus & cognosci, & in usum reuocari. In quo sanè opere atq; labore eo praesertim argumento versatus fui, vt medicinae studium quoad fieri posset, & augetur, & eiusdem itidem artis studiosi plurimum inuarentur, atq; ea quoque de causa ipsorum gratiam, beneuolentiamq; assequeretur. Accipe igitur Lector candidissime hosce meos libros artem medendi Methodicam appellatam complexos, eosq; equo animo legito, & cognosce, de ipsaq; tuum etiam iudicium benigne interponito. **V A L E.**

Cap. 25.

Cap. 7.

Cap. 2.

In pri.
Meth
med.
cap. I.

INDEX OMNIVM CAPITVM,

quæ in toto opere continentur.

LIBRI I.

- D**E varijs medicinæ sectis ac de Methodicæ origine atq; auctoritate. Cap. 1.
De medicis antiquis, qui in secta methodica claruerunt. Cap. 2.
Quanto tempore inter medicos Secta Methodica claruerit. Cap. 3.
Quid sit medicina Methodica, & quibus principijs fuerit constituta. Cap. 4.
Quamobrem Methodici constituerint, primum medicinæ dogma in adstricto & in fluido laxoue. Cap. 5.
Demonstratur primum dogma medicorum etiam auctoritate ac non minus quoq; Dogmaticorum siue rationalium vocatorum. Cap. 6.
Quomodo Methodici affectus communes adstrictos, & laxos vocatos morbos generales esse voluerint. Cap. 7.
Quid adstrictum & fluidum siue laxum fluxumve sit, & quot modis intelligatur. Cap. 8.
Quomodo adstrictum & laxum fluidumue cognoscatur. Cap. 9.
Cur adstrictum & laxum fluidumue Methodici in species non diuiserint. Cap. 11.
An ab adstricto atq; laxo fluidoue curatio indicetur. Cap. 12.
Quomodo Methodici voluerint tempora morborum curationem quoq; indicare. Cap. 13.
De communitatibus, quas Methodici in medicina chirurgica atq; in Prophylactica obseruarunt. Cap. 14.
De aliquibus quæ Methodicis obijciuntur, in communitatibus chirurgicis. Cap. 15.
Methodicis obijcitur, quod non fecerint medicinam ad particulares homines, sed ad hominem communem & genericum. Cap. 16.
De parte prophylactice, quam Methodici cognouerunt. Cap. 17.

LIBRI II.

- I**N quibus Methodici à Dogmaticis dissentiant. Cap. 1.
Primas qualitates morbos non facere, ac proinde ab ipsis ueram curationem non indicari ex Methodicorum placitis. Cap. 2.
Quamobrem Methodici in aliquibus morbis adstrictis aliquando frigidis medicamentis utantur. Cap. 3.
Humores in corporibus exuperantes, secundum Methodicos, non esse causas morborum quæ indicant curationem. Cap. 4.
Medicos Dogmaticos in multis morbis curandis, non differre à Methodicis. Cap. 5.
De dogmatibus, quæ à Methodicis in medendo non admittebantur, & primum, quod non sit necessaria cognitio corporis, læsarumq; partium naturæ ad indicandam curationem, neq; celi, anni temporis, ætatis, atq; studij itidem prænotio. Cap. 6.
Quod partes affectæ non indicent in morbis curationem. Cap. 7.
Cur adstringentia medicamenta, in principijs phlegmonum, quæ morbi sunt adstricti, à Methodicis admittantur. Cap. 8.
An in omnibus morbis adstrictis nuda laxantia conueniant, vel adstringentibus mixta esse debeant. Cap. 9.

De

De morborum generibus secundum Methodicos, & quales ad adstrictum & ad laxum, reducantur, & in quibus morbis locum habeat adstrictum & laxum. cap. 10.

De morbis adstrictis, atq; an febres omnes sint morbi adstricti. cap. 11.

De morbis laxis, & an omnes excretiones, quouis modo appareant, laxum morbum faciant, & quop. et excretiones, quæ sunt morbi laxi, ab alijs interstrictis dignoscantur. cap. 12.

De morbis mixtis ex adstricto & laxo, & an dentur, & si dantur quales sint. cap. 13.

L I B. I I I.

DE medicamentis laxantibus, scilicet adstrictos morbos tollentibus. cap. 1.

An genere laxantium medicamentorum Methodici comprehenderint medicamenta incidentia, detergentia, diaphoretica, atq; cathartica. cap. 2.

De præsidjs particularibus laxatorijs, & primo de ijs, quam in victus ratione observari debent. cap. 3.

De præsidjs laxatorijs, quæ ex varijs exercitiorum generibus depronuntur. cap. 4.

De deambulatione, cursu, saltu, venatione, ludo pilæ, pugna vmbatili, lucta, gestatione, unctione, de quæ frictione atq; vñu veneris. præsidjs laxatorijs. cap. 5.

De frictionibus laxatorijs, atq; de venereis. cap. 6.

De venarum & arteriarum sectione pro molenda sanguinis euacuatione, de crurum scarificatione, de cucurbitulis, atq; de hirudinibus. cap. 7.

De medicamentis laxatorijs, quæ humores è corporibus educendo, purgandoq; varijs modis id præstant. cap. 8.

De simplicibus medicamentis, quæ corpora laxare apta sunt. cap. 9.

De medicamentis vomitorijs. cap. 10.

De Errhinis, apophlegmatis, atq; bechicis. Cap. 11.

De medicamentis purgantibus per vesicam atque per uterum. cap. 12.

De præsidjs, quæ mouendo sudorem laxant. cap. 13.

De balneis laxatorijs ad morbos adstrictos tollendos. cap. 14.

De præsidjs Metasyntiticeis. cap. 15.

De præsidjs adstrictorijs in communi. cap. 16.

De Medicamentis adstrictorijs in particulari. cap. 17.

De medicamentis mixtam facultatem ex adstricto & laxo habentibus. cap. 18.

L I B. I V.

AGitur ex Methodicis de medicine parte prophylactica, & primo in quibus eam observant. cap. 1.

An possit constitui Methodus tuenda sanitatis ex Methodicorum dogmatis. cap. 2.

An homines præservari possint à venenis, & à moribus, ictibusq; Ferarum, venenosarum. cap. 3.

De ijs, quæ faciunt ad præsertionem à venenis. cap. 4.

De medicamentis, quæ præfens venenum, prodere creduntur, atq; de alijs quouis modo à venenis præservantibus. cap. 5.

De ijs, quæ præservant à reptilibus, serpentibus, atq; ab alijs omnibus bestijs venenatis. cap. 6.

De præsertione ab ijs affectibus, qui à prava victus ratione excitantur, atq; de huiusce artis prophylactica utilitate. cap. 7.

De causis, quibus hominum sanitas ruitur. cap. 8.

An causæ conseruantes in corporibus meatuum symmetriam, symmetriam quoq; partium similarium atq; organicarum conseruent. cap. 9.

Quod ad præsertendam sanitatem cognitio symmetrie naturalis meatuum sit necessaria, quantumq; hæc laxitatis vel adstrictionis habeat in varijs cum ætatibus, tum temperamentis, tum corporum habitibus, non esse negligendum. cap. x.

b An

An ex omnibus causis conseruatricibus, duæ tantum scilicet ciborum, potuumq; & aliarum continentia atq; corporum labores pro tuenda ualitudine sufficiant. cap. 11.
 Quomodo ex singulis causis conseruatricibus sanitas in corporibus custodiatur, & primo quomodo ex aere. cap. 12.
 Quomodo sanitas conseruari possit usu eorum, quæ intro assumuntur, usuque somni, ueneris atq; animæ passionum. cap. 13.
 De sanitate conseruanda ex retentione atq; excretionē excrementorum. cap. 14.
 De sanitate conseruanda ex corporis motu scilicet ab exercitiis. cap. 15.
 De sanitate in ijs corporibus conseruanda, quæ lassitudinibus laborant, & primum de methodo, qua lassitudines sanari queant. cap. 16.
 De particulari curatione ad lassitudines persanandas, atq; de medicamentis singulis ad eam curationem accommodatis. cap. 17.
 De pseudo lassitudine siccatoria vocata, scilicet de siccitate, squalore gracilitateq; corporum tollenda. cap. 18.
 De corporum obesitate corrigenda. cap. 19.
 Ad rigorem, horrorem, frigiditatemq; tollendam atq; de caliditate in corporibus corrigenda. cap. 20.

L I B. V.

DE febrium curatione ex Methodicorum placitis, & primum, quid sit febris & quot eius sint genera. cap. 1.
 De Febri generatione. cap. 2.
 De febrium Ephemerarum seu diarrhiarum curatione. cap. 3.
 De febribus putridis. cap. 4.
 De continuarum febrium cognitione. cap. 5.
 De continuarum febrium prognostico. cap. 6.
 De continentium febrium curatione. cap. 7.
 De continuarum febrium curatione. cap. 8.
 De febris pestilentis curatione. cap. 9.

L I B. V. I.

DE febrium intermittentium curatione, & primum de medicamentis ad tertianas. cap. 1.
 De febris tertianæ nothæ, seu non exquisitæ, curatione. cap. 2.
 De febris quartanæ curatione. cap. 3.
 De febris quotidianæ curatione. cap. 4.
 De hecticarum febrium curatione. cap. 5.
 De symptomatibus febrium, quæ in ipsis curationem expetunt, & primum de illorum curatione, quæ adstrictorum genere comprehenduntur, atq; de medicamentis ad capitis, stomachi, atq; ventris dolorem. cap. 6.
 De medicamentis, quæ faciunt ad somnum in febribus tollendum, ad rigorem & frigiditatem, ad tussim, ad cibi fastidium, bulimiam, appetitum caninum, atq; ad linguæ asperitatem. cap. 7.
 De medicamentis ad ictericū colorem, inquietudinem, nauseam, singulum, aluum, atq; urinam adstrictam. cap. 8.
 De medicamentis ad vigiliam, ad syncopem, atq; ad hæmorrhagiam sanguinis. cap. 9.
 De profluvio sanguinis, de sudore, de vomitu, ventrisq; fluxu, atq; de urina immoderatus profluente, cohibendis. cap. 10.

L I B. V. I. I.

DE phlegmonibus internis adstrictorum morborum genere comprehensis esse agendum; & primum partes corporis, quæ solent inflamari, in medium afferuntur. cap. 1.
 De

Quid phlegmone sit, & quibus differentiis interstinguatur, quomodoque generetur. c. 2.
 De phlegmonum cognitione in communi, & primum de phlogosis interne signis. c. 3.
 De medicamentis ad phlegmones internas, & primo de illarum, quæ phlogoses seu inflamina dicuntur, curatione. cap. 4.
 De phrenitidis curatione. cap. 5.
 De medicamentis ad alias phlegmones cerebri, sed præsertim ad eam, quam Aegyptij Demelnuor appellant. cap. 6.
 De medicamentis ad lethargicos. cap. 7.
 De medicamentis ad internas aurium phlegmonas. cap. 8.
 De uaræ & glandularum iuxta linguam positarum phlegmone. cap. 9.
 De medicamentis ad gutturis phlegmonem, quam anginam vocant. cap. 10.
 De medicamentis ad phlegmonem pleuræ membranæ costas subcingentis. cap. 11.
 De medicamentis ad pulmoniam peripneumoniam vocatam phlegmonem. cap. 12.
 De medicamentis ad phlegmonem septi transversæ. cap. 13.
 De medicamentis ad phlegmonem hepatis. cap. 14.
 De lienis phlegmone sananda. cap. 25.
 De phlegmone ventriculi sananda. cap. 16.
 De ilei intestini atq; coli phlegmone tollenda. cap. 17.
 De omento, mesenterio atq; pancrea phlegmone obfessis. cap. 18.
 De renum phlegmone sananda. cap. 19.
 De vesicæ phlegmone sananda. cap. 20.
 De saryriasi. cap. 21.
 De uteri phlegmone sananda. cap. 22.
 De tumoribus internis non phlegmonosis. cap. 23.
 De ventris tumore, quem hydropem appellant, per sanando. cap. 24.

L I B. V I I I.

DE phlegmonum atq; tumorum interiorum vomicis, siue abscessibus esse agendū
 & primum quid per abscessum vomicamue intelligatur, deq; ipsius causis. ca. 1.
 De partibus in quibus purulentia seu vomica fiunt. cap. 2.
 Quibus signis puris collectio vel vomica fieri deprehendatur. cap. 3.
 Quibus signis suppuratio siue puris collectio, quæ facta est, deprehenditur. cap. 4.
 De Vomiceis, quæ fiunt in capitis partibus, cognoscendis. cap. 5.
 De Vomiceis, quæ fiunt in thoracis partibus, & primo de vomica, quæ fit ex pleuritide, & pulmonia. cap. 6.
 De vomiceis quæ fiunt in ventris partibus, & primum de ea, quæ in stomacho, hepate, liene, mesenterio, pancrea, atq; omento excitatur. cap. 7.
 De vomiceis, quæ fiunt in intestinis. cap. 8.
 De vomiceis, quæ fiunt in renibus, in vesica atque in utero. cap. 9.
 De puris eruptione, & quibus signis cognoscatur pus affusum in varias partes corporis. cap. 10.
 De vomicarum prognostico, & primum de salutaribus, & mox de lethalibus vomiceis cognoscendis. cap. 11.
 De vomicarum curatione, & primo, quæ ex ipsis chirurgia, & quæ medicamentis tollantur. cap. 12.
 De medicamentis futurum abscessum, vomicamue cum prohibentibus, ne fiat, tum, ut citò probeq; fiat coadiuvantibus. cap. 13.
 De præsidij vomicarum eruptionem adiuuantibus. cap. 14.
 De puris eruptione per tussim, per vomitum, per aluum, per urinam, per sinum muliebrem, atq; per abscessum. cap. 15.
 De vomiceis, quæ sectione tolluntur, quomodoq; hoc fit faciendum. cap. 16.
 De sanandis viceribus ex vomiceis in varijs partibus corporis excitatis, & primo de ijs, quæ in aspera arteria, in pulmonibus, atq; in thorace fiunt. cap. 17.
 De sa-

De sanandis vlceribus ex vomica obortis in stomacho, in mesenterio, in iccore, atque in intestinis. cap. 18.

De sanandis vlceribus, quæ ex vomicis relinquuntur in renibus, vtericibus, vesica, atque in vtero. cap. 19.

L I B. I X.

DE phlegmonis & tumoribus externis esse agendum, & primo de ijs in communi agitur. cap. 1.

De phlegmonis, quæ externas corporis partes vexant, sanandis. cap. 2.

De parotide sananda, mammarum phlegmone, atque de in inguinibus facta. cap. 3.

De phlegmonis articulos vexantibus, præsertimque de arthritide, de podagra, atque coxendico dolore. cap. 4.

De medicamentis ad coxendicum dolorem. cap. 5.

De doloribus sermonem continuandum, & primum quid dolor sit, ipsiusque differentia, causa, atque curatio in communi. cap. 6.

De dolore capitis persanando. cap. 7.

De aurium dolore. cap. 8.

De dentium dolore. cap. 9.

De medicamentis ad stomachi, ventris, atque laterum dolorem. cap. 10.

De medicamentis ad colicum dolorem. cap. 11.

De dolore renum atque vesicæ. cap. 12.

De dolore vteri. cap. 13.

De articularum dolore. cap. 14.

De quodam dolore nocturno, qui repente pedum aut currum, aut coxendicum, aut alterius partis musculos inuadit. cap. 15.

L I B. X.

DE nonnullis morbis adstrictorum genere comprehensis cur in hoc libro sit agendum, & de quibus particulatim. cap. 1.

De medicamentis ad apoplexiam. cap. 2.

De paralyti curanda. cap. 3.

De vertigine scotomatica curanda. cap. 4.

De caro seu subet. cap. 5.

De catocæ & catalepsi. cap. 6.

De epilepsia, seu morbo comitiali. cap. 7.

De conuulsione. cap. 8.

De tremore curando. cap. 9.

De mania seu furore sanando. cap. 10.

De melancholia. cap. 11.

De tussi. cap. 12.

De asthmate. cap. 13.

De palpitatione seu tremore cordis. cap. 14.

De cibi fastidio, appetitu canino, atque siti tollenda. cap. 15.

De hepatis atque lienis obstructione & scirrholi. cap. 16.

De morbo regio ictero appellato. cap. 17.

De renum & vesicæ calculis. cap. 18.

De vteri strangulatu seu præfocatione. cap. 19.

L I B. X I.

IN quo agitur de euacuationibus, atque de purgationibus adstrictis restituendis. cap. 1.

De euacuatione, quæ per poros cutis insensibiliter fit, intercepta restituenda. cap. 2.

De sudore, qui sæpius fieri sponte in aliquibus corporibus consueuerat, restituendo. cap. 3.

De

De intercepta euacuatione capitis, quæ fit per nares, & de catarrho sæpe proveniente
 suppresso restituendo. cap. 4.
 De viceribus in quibusdam partibus corporis abortis, pro tuenda valetudine, conseruan-
 dis, deq; iisdem sublatis restituendis. cap. 5.
 De arthritide antiquata, quæ postea ex toto sublata est, pro tuenda valetudine renouanda. c. 6.
 De consueta hæmorrhagia, id est de sanguine, in quibusdam familiaris, salubriterque
 exeunte, suppresso restituendo. cap. 7.
 De hæmorrhoidibus suppressis restituendis. Cap. 8.
 De mensuris in mulieribus suppressis restituendis. cap. 9.
 De vrina suppressa restituenda. cap. 10.
 De vomitione intermissa restituenda. cap. 11.
 De aluo adstricta laxanda. cap. 12.
 De venere multo tempore intermissa, pro valetudinis conseruatione restituenda. cap. 13.

LIB. XII.

DE morbis laxis esse agendum, quotq; hi sint. cap. 1.
 De insensibili euacuatione, quæ in lethalem synopem deducit. cap. 2.
 De sudore vires exoluerente cohibendo. cap. III.
 De profluio sanguinis per nares supprimendo. cap. 4.
 De sanguine per vomitum immoderatus profluente cohibendo. cap. 5.
 De sanguine ex ore per sereatam & tussim reiecto cohibendo. cap. 6.
 De sanguinis furore, qui per aluum fit, supprimendo. cap. 7.
 De sanguinis profluio per vesicam exeunte cohibendo. cap. 8.
 De hæmorrhoidum profluio sistendo. cap. 9.
 De mensurorum profluio firmando. cap. 10.
 De vomitu cohibendo. cap. 11.
 De alui profluio cohibendo. cap. 12.
 De vrinæ profluio, quod Græci Diabetem appellant, tollendo siue cohibendo. cap. 13.

LIB. XIII.

DE morbis mixtis ex adstricto atq; laxo esse agendum, & primum quot sint hi affe-
 ctus, qui mixtorum morborum genere comprehenduntur. cap. 1.
 De curatione febrium synocharum, ardentiumq; maxime æstuosarum. cap. 2.
 De curatione febrium hecticarum, quæ tabidæ euaserunt. cap. 3.
 De febribus, de phlegmonibus, & de alijs morbis adstrictis, quæ habent coniunctam
 aliquam euacuationem, sanandis. cap. 4.
 De spuro sanguinis tollendo. cap. 5.
 De cholera & cardialgia. cap. 6.
 De Diarrhæa tollenda. cap. 7.
 De fluxu hepatico sanando. cap. 8.
 De dysenteria sananda. cap. 9.
 De gonorrhæa sananda. cap. 10.
 De profluio muliebri sanando. cap. 11.

FINIS.



INDEX EORVM OMNIUM, Quæ in toto Opere continentur.

A bluentia medicamenta quæ	89	adstringentia medicamenta in principio morbo-	
abscessus quid	256	rum quorundam adstrictorum conuenire, &	
abscessus in renibus facti signa ex Galeno	242	quomodo conueniant	65
acetii an per os conueniat ad sputum sanguinis	393	adstringentia in principio quarundam phlegmo-	
acida quomodo laxatoria dicantur	349	num cur conueniant	65
acria alium mouere	89	adstringentia non conuenire principio phlegmo-	
acria quomodo alium moueant	378	num malignarum	66
actuatio medicamenti frigidi quid sit	49	adstringentia non conuenire principio phlegmo-	
actuatiorem frigidorum esse in corporibus nanci		num in inguine, axillis, & in partibus post au-	
sci actualem frigiditatem	112	res positarum	66
adamantis lapidis ad venena vis	112	adstringentia lieni obstructo atque inflammato	
adstrictum & laxum qua ratione euidens dici Me-		non conuenire	235
thodici voluerint	21	adstringentia an conueniant in febribus pesti-	
adstrictum atque laxum cur Methodici in species		lentibus	172
non diuiserint	21	adstringentia qua ratione in angina morbo ad-	
adstrictum & laxum quomodo in corporibus di-		stricto conueniant	226
gnoscat	19	adstringentia ad sanandas febres esse inutilia	71
adstrictum in meatibus internis, atque in exter-		adstringentia medicamenta ex accidenti laxant	
nis factum quomodo cognoscatur	20		306
adstrictum in meatibus cum sensibilibus, tum in-		adstringentia medicamenta sanguinis, profusio	
sensibilibus quibus signis cognoscatur	19. et 20		387
adstrictum in corpore quibus signis innotescat	9.	egyptii quali medicina olim uterentur	1
adstricta causa morbum adstrictum faciens quo-		egyptiis phrenitidem exiitalem, Demelmaoi vo-	
plex sit	69	catam esse familiarem	56
adstrictum dari totius & partis	25	egyptii bis in mense in balneo vomitu sanitatis	
adstrictus morbus, qui sit	69	conseruandæ gratiæ uti solent	130
adstricti morbi genere qui affectus comprehen-		egyptii quo vomitorio familiaris in balneis	
dantur	69	utantur	95
adstricti morbi genere an febres omnes compre-		egyptios medicos seruare diatriam	30
hendantur	70	egyptii in insione suspiriosos sanare	346
adstrictum & laxum quomodo ex Galeno cura-		egrotos morbum non sentire quid significet	151
tionem indicet	24	acrem cur principium rerum aliqui posuerint	8
adstricti morbi habentes laxum affectum coniun-		acri laxatorius	77
ctum quomodo curentur	412	asculapium non ex Chirone Centauro, sed ex Apol-	
adstringentia medicamenta quæ sint, & ipsorum		line eius parente medicinam didicisse	1
differentia	24	asculapium Romam peste infectam solo vsu The-	
adstringentia medicamenta ex stirpibus, quæ		riace sanauisse	40
sint	105	etas ex Methodicis an indicet sanguinis vacua-	
adstringentia quæ ex animalibus	106	tionem	86
adstringentia quæ ex fossilibus	106	Aetius de cursu ad hydropicos	82
adstringentium medicamentorum quædam leuiter		Aetius de vsu balnearum	103
adstringere, quædam fortiter, & hæc ad inter-		Aetii medicamentum ad quartanam	188
nos meatus, atque illa ad cutaneos adstringen-		affectus particulares cur euacuationes copiosæ non	
dos vsu habere	24	sanant	54
adstringentia medicamēta an viscera roborent	67	affectus ad chirurgiam attinentes, atque à vene-	
adstringentia exterius adhibita partibus phlegmo-		nis, moribusque vel icibus venenatis obor-	
ne vexatis, prohibere phlegmones resolutio-		tos non referri ad laxum & ad adstrictum	69
nem	68	agarici vsus ad febres periodicas	181
adstringentia medicamēta inflammatis partibus ex-		Albertus magnus de lapide echite	112
terius adhibita damnaße medicos Methodicos		Alex. Trallianus quæ ad quartanam laudauerit	
	68		188

alex-

INDEX.

alexipharmaca ad præservandum à venenis	113	antidotus Esdræ.	114
alexipharmaca quæ in febribus pestilentibus con- ueiunt	171	antidotus Betarnem contra venena.	115
alexandria Aegypti à quibus causis quotannis ha- beat febres pestilentes.	167	antidotus ex sanguinibus.	115
alienum duplex esse scilicet extrinsecum & intrin- secum.	31	antidotus Antiochi Regis Syria.	115
alienum intrinsecum quid, quotuplexq; sit.	31	antidotus Moibani.	115
alienum extrinsecum quid, quotuplexq; sit.	31	antidotus ex nucibus.	113
alienum magnitudine loco & defectu dari.	31	antidoti ex nucibus varij parandi modi.	113
alienum indicare sui ablationem.	32	antidotus Asclepiadis.	114
alienum loco indicat restitutionem.	32	antidotus, quæ demorsos a cane rabido præser- uat à rabie.	141
alienum defectu indicare repletionem.	32	antimonij vtilitas ad febrem quartanam.	188
alienum magnitudine indicare aut diuisionem, aut omnimodam præcisionem.	32	anthrax seu carbo quibus signis dignoscatur.	289. curatio 291.
alij vis contra venena.	112	Antipater medicus.	3
aloe.	93	Antyllus de cursu.	82
aloe mouet hæmorrhoidas.	93	apocrusica medicamenta ex Galeno in principijs phlegmonum qua ratione sint vtilia.	65
aloes præparatio varia.	129	apophlegmatismata medicamenta.	97
alius quibus cibis laxa reddatur.	377	apoplexia cognitio.	318
alius quibus medicamentis moueatur.	378	apoplexia curatio.	319. 320
alui adstricta medicamenta.	203	apoplexiam signa antecedentia.	319
aluum laxantia tam alimenta quam medicamen- ta.	129. & 201	apoplecticis an phlebotomia conueniat.	319
alius à quibus causis cohibeatur.	377	appetitus renouantia.	200
aluum cohibentia.	207	appetitus caninus.	201. 349
alyssum demorsos a cane rabido ab hydrophobia præseruare.	41	apotherapeuticæ exercitationis facultas.	181
ambulatio lege deambulatio.		aquas posse veneno infici.	111
amentia ferina quæ.	337	aquam à carne putrida posse reddi veneficâ.	111
amentia melancholica duplex.	338	aquam tepidam restinguere sitim.	202
amentes qui sint.	337	aquam frigidam, & quo magis frigida, eo minus sitim tollere.	202
amphimerina febris cognitio.	189	aqua frigida quomodo calfaciat.	46
anaphonesis quid.	339	aqua frigida in quibus calfaciat, & in quibus refrigeret.	46
Andreas Laurentius de sectionis loco in hydrope.	255.	aquam insigniter frigidam in debilibus refrige- rare, atque in robustis calfacere, & proinde morbos frigidos tollere.	46
Andreas Laurentius de vijs, per quas pus ex Thorace in renes & vesicam defertur.	277	aquæ frigide occursus aut vincit natium calo- rem, aut colligit: colligit in robusto calore, vin- cit in debili.	46
angine cognitio, & prognosticum.	225	aquam frigidam qui dabant febricitantibus, & qui non.	157
angina occulta & apparens quæ.	224	aqua frigida large affusa qua ratione sanet dolo- res articulorum, atque alios affectus frigidos.	158.
angina species.	225	aquam frigidam caloris percussu calfacere in corporibus robustis.	158
angine cognitio.	224	aquæ frigide in febribus large epotæ vtilitates, & noxæ.	158
angina exitialis quæ.	225	aqua frigida epota qua ratione febres sanet.	158
angine curatio.	226	aqua frigida quando calfaciat, & quando refri- geret.	159
animalia singula habere proprios cibos atq; me- dicamenta.	40	aqua frigida quibus sit dāda, & quibus non.	159
animalia, quæ sola transpiratione viuunt.	364	aquam, quæ frigida est, in corpus assumptam calefieri, & postea corpus recalfacere.	48
animalia, quæ respiratione atq; transpiratione vi- uunt.	364	aqua frigida quomodo sudorifica euadat.	100
animalia exanguia, cur sola transpiratione vi- uant.	363		
animi passiones laxantes.	79		
animi passiones quæ adstringunt.	79		
animi passiones vehementes meatus densare.	72		
antidotus Hippocratis.	114		

aqua

INDEX.

aqua frigida large epota quare ratione ardentis fe- bres sanat.	52	arrira lauz.	155
aquam frigidam large epotatam febres tollere & refrigerando & calfaciendo.	52	ars tuenda sanitatis quid promittat.	117
aqua frigida quo pacto calefaciat. & frigidos mor- bos sanat.	23	arthritidis cognitio, & prognos, & curatio. 296. & 316.	
aqua frigida epota quomodo affertui & adstricto & laxo medeatur.	53	artis tuende sanitatis utilitas.	117
aquam cui rerum principium aliqui esse credide- runt.	8	asari vsus ad quartanam.	188
aqua frigida datur utiliter in syncope oppressis.	384.	asari radices facultas purgatoria.	96
aqua simplici ad mouendum vomitum Aescopum vsus fuisse.	95	Aesclepiades antiquorum medicinam mortis medi- tationem vocauit	143
aquam frigidam large epotam sudorem mouere.	99.	Aesclepiades de vsu balnearum.	102
aqua frigida large epota cur in aliquibus febr- bus conueniat.	51	Aesclepiades in sanos vinculis esse coercendos vo- cauit.	340
aqua actu frigida epota cur sanat febres maxime astuosas.	51	Aesclepiades quid de phlebotomia in paralyti sen- serit.	324
aquam non actu frigidam sed tepidam erysipe- lari conuenire.	50	Aesclepiades de humorum purgatione à cathar- ticis.	90
aquam marinam erysipelati non conuenire, quia adstringit.	50	asse feride vis ad tollendas febres.	181
Aque frigide occursus in quibus innatum calo- rem augeat, & in quibus extinguat.	243	assyri quali medicina olim vsi fuerint.	1
aque frigide potus an conueniat vexatis febr- bus pestilentibus.	172	asthmatis cognitio 345. curatio 446.	
aque fluminis tepide stillicidium ad maniacos utilissimum.	329	athengus de ruta aduersus venena.	112
aque Thermalis vlcibus internis opportuna.	287.	Atomos & vacuum qui posuerint pro rerum prin- cipijs.	3
aque Beate Virginis facultas & vsus.	89	Aitalus methodicus Galeni contemporaneus.	4.
aquam Nili fluminis aluum mouere.	89	Auctor libri medici de prophylactico.	107
aque varie ad febres continentes.	157	Auctorem operis cicuta bis fuisse venenatum.	111.
aque simplicis bonitas, & cognitio.	157	Auctor operis fluore sanguinis per os quando & quomodo vexatus.	397
aque Nili fluminis in Aegypto vsu corpora gra- cilia bonum habitum nancisci.	57	Auenzoarem trimo filio secta vena sanguinem misisse.	86
aque frigide vsus ad febres pyrochous ardentisq; 157.		Auicenna de crurum scarificatione.	57
arbores habentes vmbra venenosam.	111	Auicenna & interpretem acceptum in cognitione sca- rificationis crurum.	87
Archagatus Medicus.	1	Auicenna de signis febris pestilentis.	168
Archigenes Apameus Methodicus.	4	Auicenna suffragium pro fugandis serpenti- bus.	115
archigenes de medicamentis serpentes fugantibus	115.	Aurum perforationis utilitas ad ophthalmicos.	292.
archigenes de medicamentis ad quartanas.	188.	Aures cera obturatas maxime facere ad firman- dam hemorrhogiam.	387
Areteus que dabat ad purulentiam purgandam.	278.	Aurum doloris cognitio.	307
areteus voluit hic triduo bibendum, priusquam in epilepticis caput cantharidibus friceatur.	334.	Aurum dolorem mitigantia.	307
Aristoteles de purgatoria vi medicamentorum.	90.	Aurum inflammatarum cognitio, & curatio.	222. 223.
Aristotelem voluisse ex inimicitia medicamenta atrabere humores.	90	Austera & acida maxime facere ad excitandam ciborum appetentiam.	348

B

Balani emollientes aluum.	129
Balnearum vsus quibusq; utilis.	103
Balnea quos morbos sanent.	103
Balnea ad dolorem capitis, stillicidiaq;	307
Balnea aque dulcis febribus diarrhoeis con- ducere.	145.
Balnearum vsus ad febres.	145. & 161.
Balneura	

INDEX.

<i>balneum tepidum ex aqua dulci ad maniacos</i>	339	<i>caliditatem insignem pestilentiam facere posse.</i>	166.
<i>utile.</i>	339	<i>calor febrilis à quibus accendatur.</i>	143
<i>balnearum in hectis vsus qualis.</i>	196	<i>calorem accendi ex motu corporis animique.</i>	143
<i>balnearum vsus ad quartanam.</i>	189	<i>calorem accendi, à motu, putrefactione, à caloris</i>	
<i>balnea frigida in quibus conueniant hectis.</i>	195	<i>vicinia, pororum obstructione ab vsu esuque cali-</i>	
<i>Bassanensis puer pleuriticus cum hemorrhagia</i>		<i>dorum.</i>	143
<i>sanatus.</i>	413	<i>caloris naturalis extinctionis causæ.</i>	583
<i>bechica medicamenta.</i>	97.98	<i>calor qualis in febre quotidiana.</i>	190
<i>betonica contra venena.</i>	11	<i>calor qualis in febre pestifera appareat.</i>	168
<i>bilis atra à quibus causis fiat.</i>	184	<i>calor febrilis in phrenitide.</i>	215
<i>Boetij Senatoris Romani uxorem profusius vteri</i>		<i>calorem æstuosum in febribus quæ tollunt.</i>	140
<i>vexatam.</i>	82	<i>calor parvis quando suppurationem notet.</i>	260
<i>bolus armenus.</i>	113	<i>calor qui suppurat tumores qualis sit.</i>	257
<i>brassicæ ius ad aluum laxandam quomodo pare-</i>	129. & 378	<i>calculi in renibus dolor.</i>	314
<i>tur.</i>		<i>calculi aliquando per tussim excretos.</i>	343
<i>brassica marina.</i>	94	<i>calculatio quid.</i>	354
<i>βρογχος, seu vocis rauicitas à quibus fiat.</i>	343	<i>cantharidum vim ab exterius ferri ad vesicam</i>	
<i>bubones non admittere vsus adstringentium.</i>	66	<i>ex Aretæo.</i>	334
<i>bulimus quid.</i>	201	<i>cantharidum vsus pro parandis vesicantibus es-</i>	
		<i>se fugiendum.</i>	104
C		<i>cantharidum vsus cum gentiana præseruare</i>	
<i>C. Aureliani libri qui habeantur.</i>	5	<i>homines demorsus à cane rabido ab hydropho-</i>	
<i>C. Aureliani Galeni non meminisse.</i>	4	<i>bia.</i>	41
<i>C. Aurelianus de vomica in pleura sectione sa-</i>	279	<i>caput à quibus causis doleat.</i>	304
<i>nanda.</i>		<i>caput purgia per nares.</i>	130
<i>C. Aurelianus ex Methodicis nusquam in phleg-</i>		<i>cardiognos quid.</i>	310
<i>monis curandis laudauisse vsus adstringen-</i>	65	<i>cardialgie in febribus curatio.</i>	208
<i>tium.</i>		<i>caros quid, superuenire febrib. semiterminis.</i>	326
<i>C. Aurelianus in phlegmonis damnasæ vsus me-</i>		<i>caros quomodo differat à comate atque lethargo.</i>	327
<i>dicamentorum adstringentium, quod strictu-</i>	65	<i>cassie ægyptiæ consideratio.</i>	92
<i>ram augeant.</i>		<i>Cassium medicum febrem ex ebrietate curasse aque</i>	
<i>C. Aurelianus in principio dolorum arthritico-</i>		<i>frigida propinata.</i>	74
<i>rum vsus fuisse medicamentis adstringenti-</i>	66	<i>καταρρεῖος seu destillatio quid.</i>	343
<i>bis.</i>		<i>cathartica medicamenta an laxent.</i>	77
<i>C. Aurelianus reprehenditur, quod dixerit ali-</i>	216	<i>catoches & cataleptis cognitio.</i>	327
<i>quam phrenitiam fieri à solutione.</i>		<i>catoches nomina varia vnde.</i>	327
<i>C. Aurelianus de cursu.</i>	82	<i>catoches signa.</i>	328
<i>C. Aurelianus deambulationem utilem infanie</i>		<i>catoche correpti casus ex Galeno.</i>	328
<i>& asthma cognouit.</i>	81	<i>catochus in febrium accessionibus semper exi-</i>	
<i>C. Aurelianus deambulationem ad quos mor-</i>	81	<i>tialis.</i>	329
<i>bos laudauerit.</i>		<i>catochus in quibus differat à lethargo, apoplexia,</i>	
<i>C. Aurelianus de purgantium medicamentorum</i>		<i>à syncope, & à præfocatione vteri.</i>	329
<i>incommodo.</i>	57	<i>catoche à vermicibus.</i>	329
<i>C. Aurelianus de vsu ellebori in epilepticis.</i>	333	<i>catochi casus ex hemorrhagia sublati.</i>	329
<i>catochymia observationem non facere ad lassitu-</i>		<i>catochi curatio.</i>	330
<i>dines sanandas.</i>	136	<i>cataplasmata ad vomitum sistendum.</i>	404
<i>catochymiam quæ adimunt.</i>	132	<i>causæ conseruantes symmetriam meatuum, an præ-</i>	
<i>catochiam partis tolli sinapismo.</i>	35	<i>seruent à morbis simplicibus, atque ab alijs in</i>	
<i>cachexiam partis tolli sinapismo.</i>	35	<i>organicis constitutis.</i>	119
<i>Cadmus Agenorides medicina auctor.</i>	1	<i>causarum observationem in curandis lassitudinib.</i>	
<i>celiaca passio quid.</i>	404	<i>non esse necessariam.</i>	136
<i>celiacum cum benteria vnum esse affectum.</i>	405	<i>causæ febris tertianæ notæ.</i>	178
<i>caliditatem vehementem meatus densare.</i>	71	<i>causæ febris pestilentis.</i>	166
<i>caliditatem agere rarefaciendo, & hoc modo in</i>		<i>cauterij vsus ad insanos.</i>	340
<i>animalibus morbos simplices facere.</i>	45		
<i>caliditas quomodo calidum morbum faciat.</i>	46		

c ebame-

INDEX

chamædyos vis ad tollendam obstructionem.	351	innoxie.	109
chamædyos vis singularis ad quotidianam.	192	circumforanei quibus dolis decipiant adstantes,	
chamæmeli laus ad tollendas febres.	180	ut credant illos habere alexipharmacum con-	
chamædyos ad febres periodicas vis mirabilis.	18.	tra omnia venena.	109
		Claudium imperatorem fungis mortuum.	111
chremæ lini olei utilitas ad lassitudines.	137	Cleophrantus medicus.	102
Chiron centaurus caput herbarum vires in sylvis		clysters emollientes.	129
obseruare.	1	clysteriorum vsum Methodicos vsui purgantium	
cholera quid sit, cause, atque curatio.	416	lenientium prætulisse.	89
cholera in quo differat à cardialgia.	416. quomo-	clysters deteriorum quibus parentur.	278
do curetur.	417	clysters ad alui fluxum cohibendum.	398
cholera esse morbum mixtum ex laxo & adstri-		clyster ad quartanam singularis apud Aegy-	
cto, quomodoque curetur.	409	ptios frequentatus.	189
cholicum Galenorum quid sit.	94	clysters in dolore colico.	313
cauterij vsus ad epilepticos.	334	cnicus.	96
cauterio plurimum iuuare ad capitis antiquum		coaguli cernini vis contra icterum ferarum veneno-	
dolorem.	307	sarum.	115
cauterium candens in occipite pueris epilepticis		coconidium.	94
an conueniat.	333	coendi impotentia quomodo restituatur.	380
C. Celsus de laxatorijs præsidij.	76. & 153.	coctione quam purgatione febres esse tollendas.	
C. Celsus de præsidij adstrictorijs.	105	161.	
C. Celsus de mittendo sanguine in pueris atque in		coctione quam purgatione cur in quartana febre	
sejibus.	86	sit agendum.	186
C. Celsus de utilitate deambulationis.	81	colicus dolor quibus signis cognoscatur.	312. &
C. Celsus contra Methodicos, quod causa morbo-		à quibus causis fiat ibidem.	
rum inducit curationem.	64	colliquatio in corpore quot modis fiat.	193
C. Celsus deceptum fuisse, qui crediderit febrem		colicus dolor hydropem quando minatur.	313
ex ebrietate sublatam fuisse ex epota aqua tan-		colicis coloris curatio.	313. 314
quam præsidio à sola causa indicato.	64	coli phlegmones curatio.	239
centaurium minus.	94	colocynthis.	94
cephalea & cephalalgia cognitio.	304. 305	cognitionem corporis nature, etatis, sexus & alio-	
cephalea signa ex Aureliano.	305	rum similium pro instituenda curatione non esse	
æpæxop. i. tantum exitium in foribus denota-		necessariam.	65
re.	151	cognitionem etatum, nature, sexus, caliditatis, con-	
cerebri phlegmone vexati signa; curatio.	219	suetudinis & aliorum non facere ad indican-	
ciui alium laxantes.	129. & 377	dam curationem.	44
cibi uenerem mouentes.	380	cognitionem pro indicanda curatione, partium	
ciborum inappetentie cause, & curatio.	200	lesarum natura, causarum, ætatis, anni tempo-	
ciborum appetentiam cibis acidis, austervisque ex-		ris, regionis, atatis, sexus, & similium pa-	
citari.	348	tere confusionem, esseque superfluum & inu-	
cibi appetentiam humores facientes.	348	tilem ex Methodicis cognitum fuisse.	58
cibi fastidij cognitio & curatio.	348	communitates Methodicorum que fuerint ex Gale-	
ciborum temperantia quantum possit ad sanitatem		ni libris. 6.	
tuendam.	131	communitates actiue, & passivæ quæ. 6. & 7.	
cibi apti ad conseruandam sanitatem.	127	communitates Methodicorum in chyrurgica parte	
cibi in febribus conuenientes ex Aegyptijs.	154	medicæ.	69
cibus ad febres tertianas.	176	communitas chyrurgica præcipua est, quod alie-	
cibandi ratio in morbis.	154	num sit, indicare ablationem.	6
cicuta venenosa.	111	communitates Methodicorum quas in medicina	
circuitus dari ex Hippocrate quartanos, quinta-		chyrurgica & prophylactica obseruandas du-	
nos, septimanos, atque nonanos.	184	xiunt.	31
circuitus quintanos & septimanos certos ac distin-		communitates que in chyrurgica.	31
ctos non dari ex Galeno.	184	communitates in medicina prophylactica que	
circuituum in febribus variorum ratio.	184	sint.	42
circumforanei quomodo venena assumunt per os		communitas in medicamentis delecterij quæ.	7

commu-

INDEX.

continuitates Methodicorum in prophylactica.	7	cucurbitula quo pacto adhibenda, ut emulentur	
concoctio quid.	257	sanguinis vacuationem que fit vena secta.	171
concupiscentia.	85	cucurbitula scarificationem crurum imitantes	171.
concupiscentia intermissus quos affectus hominibus in			
ducat.	379	cucurbitularum usus ad epilepticos.	334
Constantini suffragium ad fugandos serpentes.	116.	curationis modus olim apud antiquos frequen-	180
constipationis cutis cause, & curatio.	366	tus ad finiendas febres periodicas.	180
Constantinus Africanus que ad quartanam com-		curatio an ab adstricto atque laxa indicetur.	24
mendauit.	188	curationem ab affectibus indicari.	27
continentium febrium curatio.	153	curationem non indicari ab affectibus qua ratione	27
convulsiones cognitio.	335	cognoscatur.	27
convulsiones cuiusque signa ex Aretæo.	335	curationem non indicari a parte laesa, a natura	
convulsis que conveniant.	336	corporis, ab ætate, a vite studio, consuetudine,	
convulsiones in phreniticis lethales.	217	& ab alijs que Medici Dogmatici voluerunt	
cor. an queat ferre putredinem.	166	facere ad curationem.	8
cordis substantia in febre pestifera an putrescat.	166.	curationem communem etiam particularibus ho-	38
		minibus convenire.	38
cordis palpitacionis cognitio.	346.	curatorius scopus qualis sit in phlegmone sanan-	61
cor paralyti tentari.	323	da.	61
corpora gaudere sanitate quoad meatuum sym-		curationes morborum ab affectibus indicari.	7
metria servatur.	11	cursus inter quas exercitationes a Galeno adnu-	
corpora excrementis multis scatentia magnum nu-		meretur.	82
merum vixisse sana, quoniam servata in ipsis		cursus utilitas ex Galeno.	82
fuerat naturalis meatuum apertio.	12	cursus utilitas ex Aureliano.	82
corpora incalescentia refrigerataque laxatorijs bal-		cursus utilitas ad spleneticos, ad colicum dolorem,	
neis, & inunctionibus sanari.	15	ad immodicam pinguedinem, ad hydropem.	82.
corpora densitate & duritie firmiora reddi.	7		
corpora cutem densam habentia pati ab internis.	12.	cursus quomodo fieri debeat.	82
		cursus ischiadicis utilis ex Antyllo.	82
corpora cutem raram habentia pati ab externis.	12.	cursus quibus affectibus sit utilis.	82
		cursus quomodo ad gonorrhæam conducatur.	82
corpora ex Hippocrate rarioris cutis saniora, &		cutem mollem, laxam, & humidam laxum mor-	
densioris morbidiora esse.	12	bum denotare.	20
corpora fluida fieri oportere pro molienda purga-		cutem asperam, siccamque & duram adstrictum	
tione quomodo ex Hippocrate intelligi debeat.	95.	morbum denotare.	20
		cutis mollis & laxa, quando ad cognoscendum la-	
corpus sanum quale sit.	108	xum morbum debeat observari.	20
coxendici doloris curatio.	300	cutis aspera & dura pro adstricto morbo quando	
Καρυο seu grauedo quid	343	debeat observari.	20
cremores varij ad febricitantes nutriendos.	154	cutim mollem & humidam denotare laxum mor-	
critica icteritia quibus distinguatur a non critica.	202.	bum.	73
		cutis quomodo in laxo affectu primo mollis fiat,	
eritonem obijisse post insignes habitus euacuatio-		& humida, & postea aliquando dura & sicca	
nes.	55	evadat.	73
erurum scarificationis usus in febre pestilente.	170.	cutis in infantibus cur roboretur, & quibus ro-	
		boretur.	121
erurum scarificatio quibus sit utilis.	87	cutis densitatis utilitas.	364
cucumerum usum valde facere ad pestilentium		cutis laxitas quibus utilis.	364
febrium generationem.	166	cutis meatuum stipatio quos morbos faciat.	364.
cucurbitularum usus ad colicum dolorem.	314		
cucurbitularum usus pro euacuatione sanguinis.	88.	cutis meatuum obstructionis cognitio.	364
		cutis stipata quibus cognoscatur.	365
cucurbitularum usus ad amentes.	339	cutis stipationis cause.	365
culina cura pro preservatione a venenis.	110	cutis constipationis curatio.	365

INDEX.

D Aphnoidis fructus. 94
deambulationis consideratio. 80
deambulationis utilitates. 81
deambulationes quibus morbis conducant. 81
deambulationis utilitas ad podagram. 81
deambulationis terminus. 81
deambulationis mensura ex Hippocrate quomodo facienda. 82
deambulationis ad tollendos varios affectus mensura. 82
deambulationis ad tuendam valetudinem mensura. 82
deambulationis perfectæ terminum esse plerumque ex Celso sudorem, atque crebram respirationem. 82
deambulationem opportunam quæ indicent. 82
deambulatio nimia quibus indicetur. 82
decoctum altheæ sem. lini, fenugreci esse laxatorium. 77
decoctum pectorale. 344
decoctum sudorificum ad febres. 181, 182
decocta varia sudorifica. 101
decocta ventrem laxantia. 129
deiectiones male, & quæ exitium præfagiant. 153
deiectiones istericorum quales. 353
delirium continuum cur fiat, ex inflammato dia-
phragmate. 232
delirium in egrotis quibus signis innotescat. 337
serinum quale sit, & a qua causa. 338
demelmaoi Aegyptiorum qui morbus sit, & quomodo curetur. 219
demoniaci qui vocentur. 314
densitatem in corporibus morbosorem esse. 1219
densitatem & raritatem qui posuerint pro rerum principijs. 8
desipientie lethales. 151
desudationum cause. 100
dentes à quibus causis doleant. 309
dentes cur à frigido ledantur, & à calido inuen-
tur. 309
dentibus dolentibus quæ conveniant. 310
dentes canini contra venena. 115
detergentia laxare. 77
diabetis cognitio, & cause 406. non fieri ab affe-
ctu renum inflammatorio. 407
diabetem in venarum atq; renum laxitatem re-
ferendum. 407. curatio. 408.
diarrhææ cognitio. 404
diarrhæa quomodo curetur. 418
Diagoram gaudio interemptum. 79
diaræ febris ex varijs causis curatio ex Gale-
no. 145
diatesi Aureliani vnguenti ad pleuritim. 230

Dioclem voluisse similia non à similibus, sed à co-
trarijs inuari. 68
differentias ætatis, sexus, nature, studij, consue-
tudinis, celi & similium pro indicanda curatio-
ne ex Methodicis non esse observandas. 60
Dionysius Medicus Methodicus. 3
Dioscorides medicus quo tempore in medicina flo-
ruerit. 23
Dioscoridem egisse de medicamentorum faculea
tibus aperientibus non per se, sed quous modo
aperientibus. 23
Dioscorides Anazarbeus de facultate aperiente à
Galeno reprehenditur. 22
Dioscoridem iniuria à Galeno reprehendi. 23
Dioscorides quæ medicamenta ad quartanas febres
tollendas meminerit. 187
Dioscorides ad morsum canis rabidi quæ præsidia
commendauerit. 143
Dioscorides de medicamentis quæ igne accensa su-
gant serpentes. 115
disputatio contra Methodicos, an adstrictum &
laxum curationem indicent. 26
diuretica in febribus. 177
dogma præcipuum Methodicorum quale sit. 15
dogma primum medicæ quamobrem Methodici
in adstrictum atque laxum constituerint. 28
dogma primum in adstrictum & laxum constitu-
tum à quibus fluxerit. 28
dogmatici quot morbos numero constituerint. 15
dogmaticos medicos febres tollere medicamentis
non refrigerantibus sed calefacientibus. 48
dogmatici qua ratione in principio inflammatio-
num vrantur adstringentibus. 66
dogmaticos vsum adstringentium in phlegmonum
principijs admisisse, & qua ratione usan-
tur. 65
dogmaticos medicos febres tollere medicamentis
laxantibus. 47
dogmaticos in multis morbis curandis non fuisse
differentes à Methodicis. 57
dolor quid, differentie, causeque. 301
dolorum differentiarum cause ex Paulo. 302
dolorum variarum causarum cognitio. 197
dolorum differentie cum ex partium affectarum
tum humorum varietate. 212
dolores in partibus sensus ex partibus affectis non
cognosci. 213
dolorum variorum ex varijs partibus ratio. 212
dolores affectis pulmonibus quales. 212
doloris capitis cause. 197
dolor synypitis cur vteri lesi sit signum. 247
dolorum in capite singulorum cause & cognitio.
304. 305.
doloris capitis in febribus curatio. 197
dolores capitis quomodo à frigidis tollantur. 306
dolorum

IX N D EXI

dolorum renum & varijs causis cognitio. 314

dolor renum a vesica dolore quibus distingua- 314

tur. 314

dolores qui in renum phlegmone observantur. 241

dolores qui in vteri phlegmone observantur. 247

dolorum arthriticorum cause. 295

doloris coxendicæ curatio. 300

dolores qui vomicas futuras prenuunt. 259

dolor quomodo vomicam factam denotet. 259

dolor pulsatilis cur in internis phlegmonis sem- 260

per sit. 260

dolorebus podagricis diu intermissis homines in 370

morbos grauioribus labi. 370

dolores per se calidos tolli & quomodo aliquando 303

ex frigidis tollantur. 303

doloris curatio in communi. 302

doloris stomachi in febribus curatio. 198

doloris venteris curatio. 198

dolores antiquos in ventre magnos patientes vo- 311

cati maleficiatos atq; demoniacos. 311

dormientes interius fieri calidiores. 127

dysuria cognitio. 375

dysenterie cognitio et curatio. 419 & 420

dysenteriam esse morbum mixtum ex adstricto 419

& laxo. 419

E Collegata. 98

Ecchymata. 98

Ecchymata lapidis vis contra venenum. 112

elementa prima non primis sed mutuo secundis 46

qualitatibus agere. 46

electri vis ad venenum. 112

electrum. 94

elleborus niger. 94

elleborus albus quo pacto dandus. 96

elleborus albus quomodo preparandus. 96

ellebori preparatio ex oleo. 96

elleborum purgare perinde atque venenum. 91

ellebori albi vsus ad maniacos ex Aureliano. 339

ellebori vsus in paralyti. 324

elleborus albus quando antiqui ad vomicam per 278

stomachum purgandam dabant. 278

elleborismi vsus apud antiquos. 95

elleborismi vsus apud medicos obsoleuit. 95

elleborismi vsus Sacerdotibus cognitus. 95

ellebori albi vsus ad epilepsiam ex Aureliano. 333

emprothotonos quid. 335

empyricorum prognosis. 271, 272

emplastra sudorem cohibentia. 385

emplastrum singularis utilitatis ad quartanam. 189

epicurus de vsu veneceorum. 85

ephemerarum febrium curatio. 145

ephemeram febrem esse passionem adstrictam. 145

epilepsia varia nomina. 330. quid sit, quo duplex-

que, & quibus signis innotescat. 331

epilepsie signa ex Arrepto, & causa. 331

epilepticorum prognosticum. 332

epileptice accessionis curatio. 332

epilepticis pueris an vlla curatio conueniat. 332

epilepticis medicamenta ex veteribus medicis 333

qualia. 333

epilepsia per consensum curatio. 334

epistola Thessali medici Methodici ad C. Hero- 94

nem imperatorem. 94

epithymum. 90

erastriatus de modo quomodo purgantia hu- 90

mores educant. 90

erastriatus tradidit in faucibus conspici tumores 390

quosdam hemorrhoidibus similes per quos san- 390

guis excernitur. 390

erastriatum Diatrium laudasse. 58

erythina medicamenta. 97

erythina ad cephalicam. 307

erysipelatis cognitio. 288

erysipelatis curatio. 290

ecceproticum id est stercoreaceum est aloë. 93

euacuatio quid ex Hippocrate sit. 90

euacuationem corpus laxare. 75

euacuaciones insignes in quibus inutiliter fuerint 55

visæ. 55

euacuaciones communes insignes quos morbos, & 54

quomodo ipsos tollant. 54

euacuaciones communes insignes cur morbos ali- 54

quos non tollant. 54

euacuaciones que faciunt morbos laxos. 19

euacuaciones que non faciunt morbos laxos. 19

euacuaciones immoderatas laxum morbum facere. 73

euacuaciones moderatas atque naturales non face- 73

re morbum laxum. 73

euacuaciones que sunt morbi laxi. 73

euacuaciones insensibiles morbum laxum facien- 73

tes quibus signis cognoscantur. 73

euacuaciones magnas indicari ex Methodicis ex 61

affectus & virium magnitudine. 61

euacuaciones morbis adstrictis superuenientes 413

vsus laxatoriorum presidiorum quando pertur- 413

bet, & mutet in adstrictorios. 413

euacuaciones solite si supprimantur, corpora labi 362

in morbos. 362

euacuaciones dolores mouere in antiquato morbo 297

podagrico. 297

euphorbium. 94

Eustachius Rudius. 413

exanthemata. 153

excretionēs legentes colliquationes ab Erasistra- 19

to fuisse vocatas. 19

excretionēs omnes an laxum morbum faciant. 72

EXCRE-

IX N D E X

excretiones quæ morbum laxum faciunt, & quæ non. 72
 excretio quæ morbum laxum facit. 69 & 230
 exercitationes quid sint. 79
 exercitationum utilitates. 79
 exercitationum differentie. 89
 exercitationes omnes febricitantibus molestæ. 80
 exercitationes laxantes. 133
 exercitationes blandæ quæ sint. 84
 exercitium quando faciendum sit. 132
 exercitationis perfectæ terminus sudor & anhelitus difficultas est. 87
 exercitij terminus qui sit. 133
 exercitium infantulis sufficiens. 133
 exspiratio quid sit. 363

F

Faciei Hippocraticæ significatio. 152
 Facultates medicamentorum qualitativas di-
 stas ratione cognosci. 31
 facultates medicamentorum occultas vocatas ex-
 perientia minimeq; ratione cognosci posse. 31
 facultates emollientes, laxantes, atq; rarefacien-
 tes Galenus, differre inuicem, docuit. 22
 facultates emollientes, laxantes, & rarefacientes
 easdem ex Methodicis dici. 22. easdemque
 omnes etiam aperire. ibidem.
 facultatum emollientium, laxantium atque rare-
 facientium unam eandemque esse naturam. 23
 facultates indurantes, tendentes, atq; densantes
 quomodo ex Galeno inuicem differant; ipsarum
 que unam eandemque esse naturam. 24
 facultates laxantes, emollientes, atq; aperientes
 idem significant. 21
 fames quid sit. 348
 famem corpus laxare. 75
 febris nominis cognitio. 141
 febris definitio. 142
 febres esse morbos adstrictos. 141
 febres, quæ sunt morbi mixti ex laxo & adstricto.
 141.
 febrium differentie omnes. 142
 febres calidæ, quæ, & quæ frigide. 142
 febres simplices, & quæ maleficæ. 142
 febrium generatio ex Hippocrate. 143
 febrium causa ex Asclepiade. 143
 febres ex atomis quomodo fiant. 143
 febris causa ex Galeno. 143
 febres ephemeræ omnes fieri à causis procata-
 rcticis. 144
 febres putridas fieri à meatuum corporis clau-
 sione. 144
 febrem pestilentem quandoq; absq; ulla meatuum
 clausione fieri. 144
 febrium Hæcticarum causa. 144
 febres colliquatiue. 144

febres hætica quæ ab alijs morbis sunt. 144
 febris ephemera unde dicta. 144
 febris ephemera signa. 145
 febrium ephemerarum curatio. 145
 febres putridæ quomodo aliquando fiant à causis
 procatacticis. 146
 febrium putridarum signa. 146
 febris continens quæ & quoduplex sit. 147
 febrium putridarum causa. 147, & 148.
 febris sanguinis cognitio. 148
 febres valde rubentes. 148
 febres an omnes morbi adstricti dicantur, & quæ
 adstricti & quæ laxi morbi sint. 70
 febres synochæ, ardentesq; maxime æstuosæ an
 laxus morbus sint. 70
 febres omnes putridas esse morbos adstrictos quæ
 ratione comprehendantur. 70
 febres putridas ephemeræ, atq; hæticas inci-
 pientes calidis balneis aquæ dulcis, atq; cali-
 dis inunctionibus dulcium oleorum tolli. 71
 febrium putridarum cognitio. 146
 febriem ephemeram esse morbum adstrictum. 145
 febres summæ æstuosæ quomodo dignoscantur ha-
 bere mixtum affectum scilicet adstrictum, &
 laxum. 52
 febres synochas ardentes summæ æstuosas esse
 morbos mixtos ex laxo & adstricto. 51
 febres hæticas esse morbos mixtos ex laxo & ad-
 stricto. 51
 febris synochæ signa. 149
 febris ardens. 149
 febris ardentis, signa, causa. 149
 febres à copiosis euacuationibus curari aliquando
 augeantur. 55
 febris quatenus morbus calidus indicat ex dogma-
 ticis refrigerandum. 47
 febres ardentes curari ab excretionibus biliosis saepe
 non tollantur. 55
 febres concitari ex natatione aquæ marinæ. 143
 febrium continentium curatio. 153
 febrium continuarum prognos. 150
 febres continentes sanguinis uacuatione tolli.
 154.
 febrium continuarum curatio. 163, & 164.
 febrium curatio per sudorificum. 299
 febres & ab æstu, & à frigore, aquæ calidæ lo-
 tione ex Galeno leuari. 15
 febres ephemeræ ex animi passionibus, quatenus
 meatus densant, fieri. 72
 febres sanari multa aqua capiti superfusa. 125
 febris continua, biliosa, pituitosa, atque melanco-
 lica cognitio. 163
 febres colliquatiue. 193
 febris hætica. 193, & 195
 febris hætica species tres, causæq; 193;
 febres

I N D E X.

febres nocturnae quae dicantur.	190	febris pestilentis signa.	169
febres quatenus morbi calidi sunt, non indicare ex Methodicis praesidia refrigerantia.	51	febris pestilentis ephemera vocata, putrida, atque hectica signa.	168
febrim quatenus morbus calidus sit refrigeratorium medicamentum (dicere) indicare videri quippiam logicum.	47	febris quae suppurationem futuram denotat.	259.
febres maxime aestuosas sanari potu aquae frigidae.	71	februm in suppuratis cognitio, esseque eas similes semitertianis.	261
febres omnes putridas fieri non absque meatuum clausura.	71	febris indicans vomitum. 260. similem esse semitertianis. ibidem.	261
febres quae sunt affectus mixtus ex adstricto & laxo.	71	febres in suppuratione facta minores fieri.	262.
febris ephemeram fieri quoque ex causa adstricta demonstratur.	71	febris vomitarum in quo differant a semitertianis.	262
febris maxime aestuosas adstrictioris tolli.	411	febris vomitarum sudorificas plerumque esse & tabidorum.	262
febris hectica tabida esse morbos mixtos ex laxo & adstricto: quibus curentur. 411, & 412	411, & 412	figuram partium exulceratarum non mutare curationem.	64
febrim ab ebrietate ab epota aqua per sudorem discussam fuisse.	64	φλογωσις quid.	210
febris (exceptis valde aestuosis & tabidis) non tolli refrigerantibus.	47	Florentinus de medicamentis, quae fugant serpentes.	115
febris periodicas sudore quomodo moueantur.	101.	fluxum lege laxum.	
febris chronica vino serpentibus infecto sanata.	111.	fluxus hepaticus quomodo curetur.	418
febris tertiana nothae cognitio.	178	senugreci succus ad phthisicos.	282
februm tertianarum cognitio, prognosticum, & curatio. 175, & 176.	178	fomentum ad capitis dolorem.	198
febris tertiana nota quamobrem inuadat absque rigore, horrore, & frigore.	178	fomenta ex Galeno eadem ad oculos inflammatos & ad aures, & ad alias partes conuenire.	61.
febris tertianas nothas aliquando usque ad sex menses perdurasse.	178	fomenta ad quotidianam.	192
febris tertiana nothae curatio.	179	Franciscus a Ponte pictor Basanensis ob melancholiam serinam ex domo praecipitatus, atque mortuus.	338
febris quotidiana cognitio.	189	frictiones laxatoria quae, & quibus utilis.	84
febris quotidiana an vere intermittat.	190	frictionum usus ad tollendas febres chronicas.	85.
febris quotidiana ex acida pituita signa.	190	frictiones ad chronicas febres tollendas quantum usum apud veteres medicos habuerint.	85
febris quotidiana curatio.	190	frictionis mollis usus ad tollendas febres periodicas.	182
febris quartanae prognosticum.	185	frigidas quomodo frigidum morbum faciat.	46.
febrim quartanam debilibus & senibus lethalem esse.	185	frigida quandoque calfacere.	46
febris quartana signa.	184	frigida medicamenta aliquando calfacere.	49
febris quartanae curatio.	187	frigidiorem agere densando, & hoc modo morbum frigidum facere.	45
febres chronicas quomodo frictionibus mollitorijs antiqui sanabunt.	85	frigida medicamenta quomodo calefaciant.	23
febris diariae duo praesidia praecipua.	145	frigida cuti febricitantium adhibita calorem intus claudere, ipsumque idcirco augere.	47
febris pestilentis cognitio.	165	frigida medicamenta (exceptis mortiferis) intra corpus assumpta calsunt, & postea recalcant.	48
febris pestilens in quo a putrida differat.	166	frigida quae non actuari queant assumpta intra corpus.	221
februm pestilentium an detur quarum genus ab aliis distinctum.	167	frigida expiratio lethalis.	151
febris pestilentis causa.	166	frigiditas extremorum quid in febribus significet.	
febrim pestilentem ex aere infecto excitari.	166.		
febrim pestilentem a sola caliditate concitari posse.	154		
febris pestilentis signa, prognosin, & curatio.			

INDEX.

<i>ect.</i>	151	<i>genistæ florum facultas purgatoria.</i>	1
<i>frigidorum vsus quibus febricitantibus sit no-</i>		<i>generationem & corruptionem rarefactione,</i>	3
<i>noxius.</i>	47	<i>densatione perfici.</i>	45
<i>frigidi-tatem in febribus quibus medici adimant,</i>		<i>genitalia quibus medicamentis ad libidinem mo-</i>	45
<i>140.</i>		<i>ueantur.</i>	381
<i>frigidas periodica in febribus quibus tollatur.</i>		<i>gestationum vsus ad quos.</i>	831
<i>200.</i>		<i>gestationis in curru vsus.</i>	84
<i>fractūs adsiringentes aluum laxare & quo tem-</i>		<i>gestationes in lectica vsus & utilitas.</i>	84
<i>pore exhiberi acbeant.</i>	378	<i>gestationes lentæ quibus conducant.</i>	84
<i>fuliginum in corde generatio.</i>	363	<i>gestationis in vehiculo utilitas ex Amyllo.</i>	84
<i>fuliginum impedita euacuatio quos morbos fa-</i>		<i>glans vinguentaria.</i>	96
<i>cit.</i>	364	<i>gonorrhæa quotiensque sit, & quibus signis utraq;</i>	
		<i>interfingatur.</i>	421
		<i>gonorrhæa cognitio, & curatio.</i>	421. & 422
		<i>gratiola.</i>	96
		<i>guadagnina Alpina febre ardente, & si copiosas</i>	
		<i>purgationes habuerit, extincta.</i>	55
		<i>guadagnina curata ab veni profluio.</i>	402
		<i>guaiaci ligni vsus ad quartanam</i>	188
		<i>gyrenaicum succum mouere saluam.</i>	97
		<i>gymnastica ars quid sit.</i>	30
			H
		<i>Hæmatitis lapidis utilitas ad phthisicos</i>	
		<i>283.</i>	
		<i>hamatus lapidis vsus ex Alex. Tralliano ad pus</i>	
		<i>in phthisicis siccandum.</i>	395
		<i>hamitriticus que febris sit.</i>	178
		<i>hemorrhagiam que moueat.</i>	13
		<i>hemorrhagia quibus co-beatur.</i>	387
		<i>hemorrhagia sanguinis suppressa quibus resis-</i>	
		<i>tatur.</i>	370
		<i>hemorrhoidum serpentem facere morbum laxum.</i>	
		<i>42.</i>	
		<i>hemorrhoidales venæ quot sint.</i>	400
		<i>hemorrhoidarum fluxus quos morbus inducat.</i>	
		<i>400.</i>	
		<i>hemorrhoidarum fluidarum curatio.</i>	401
		<i>hemorrhoides suppressæ quibus remedijs restituan-</i>	
		<i>tur. 131. & 371.</i>	
		<i>Haly Abbatis medicamentum ad quartanam.</i>	
		<i>188.</i>	
		<i>hectice febris consummata que.</i>	193
		<i>hecticę febris species tres.</i>	193
		<i>hecticę febris differentię.</i>	195
		<i>hecticarum febrium causę. 163. signa ibidem.</i>	
		<i>hecticarum signum proprium ex calore. & ex pul-</i>	
		<i>su.</i>	194
		<i>hecticis qualis aer conducatur.</i>	194
		<i>hecticis conuenientia.</i>	195
		<i>hecticorum seu tabidorum curatio.</i>	139
		<i>hepar cur obstructionibus sit obnoxium.</i>	349
		<i>hepar inflammatum quibus signis agnoscat.</i>	
		<i>212.</i>	
		<i>hepar quomodo scirrhus iaboret.</i>	350
		<i>hepatis substantiam in dysenterico per aluum ex-</i>	
		<i>certum.</i>	

INDEX.

eretam. 399
 hepatis phlegmones cognitio. 234. prognosticum.
 ibidem.
 signa hepatitis. 234
 hepatis gibbae partis & causae inflammatae signa.
 234.
 hepatitis curatio. 235
 hepatis scirrhosi vexati signa. 350. curatio. 351.
 hepatis vomica cognitio. 266
 hepatis ulcerati signa. 284
 hepatici fluxus curatio. 418
 hepatis carneam substantiam adstringentibus non
 posse roborari, & si exinde roboretur, quomo-
 do id fiat. 67
 hepatis substantia qua ratione adstringentia sint
 contraria. 67
 hepatis substantia carneae, quomodo inueterat ad-
 stringentibus exterius adhibitis. 67
 herpetis cognitio. 283. curatio. 290.
 hermodactylus. 94
 Hieronymus Capellus. 397
 Hieronymus Fracastorius substantiam cordis in
 febre pestifera contendit non putrescere sed
 humores solummodo. 166
 Hieronymus Mercurialis de varijs exercitijs.
 83.
 hilaritatis utilitas. 127. 128
 Hippocratem Artaxerxis Persarum regis aetate
 claruisse. 1
 Hippocratem medicinam à medicis Crotoniensibus atq;
 Cyrenais accepisse. 1
 Hippocratem morbus methodice ubi intellexisse vi-
 sus sit. 17
 Hippocrates de usu purgantium in morbis. 55
 & 77.
 Hippocratem, a frequenti usu purgantium cauendum
 censuisse. 57
 Hippocrates voluit purgantia ex similitudine
 humores attrahere. 90
 Hippocrates de modo quo cathartica purgant.
 90.
 Hippocrates febres magis coctione quam purga-
 tione tollendas censuit. 161
 Hippocrates cur dixerit victum humidum omni-
 bus febribus conuenire. 70
 Hippocrates quibus praesidijs medeatur febribus
 putridis. ibid.
 Hippocratem laudasse usum fomentorum laxatorio-
 rum in pleuritidis principio. 229
 Hippocrates de indicatione sanguinis euacuatio-
 nis. 86
 Hippocrates de mensura deambulationis. 82
 Hippocrates de cursu. 83
 hirudinum usus pro mittendo sanguine. 88
 hirudinum usus qualis ad amentes. 339

hystericas mulieres aliquando sola transpira-
 tione in vita seruari. 363
 Hollerius de viridium ranarum decocti usu
 ad quartanam. 188
 Hollerij medicamentum compositum ad quar-
 tanam. 188
 homines ut sudent quibus tractandi. 101
 homines quibus malis efficiantur ab intermis-
 so veneris concubitu. 379
 horrores quando fiunt ex ebullitione internis
 phlegmonibus. 213
 horrorem esse proprium suppurationis. 260
 horrorem in venicis causa. 260
 horrorem differentia ex suppurationis varie-
 tate. 261
 horrorem in febribus quae adimant. 140
 humiditatem rarefacere. 45
 humorum fluxiones calore & calore conci-
 tari. 214
 humores in corporibus exuperantes non esse
 causas morborum. 53
 humores quietos in suis locis manentes non
 facere morbos. 13
 humores à qualibet causa commotos morbos
 concitare. 13
 humores quietos manentes in corporibus mor-
 bos non facere. 56
 humores commotos ex qualibet causa in cor-
 poribus morbos concitare. 56
 humorum abundantiam in motum actam fa-
 cere morbos, atq; quietam manentem, non
 facere. 56
 humorem in corpore quiescentem epilepsiam
 non concitare. 56
 humorem ad cerebrum commotum facere epi-
 lepsiam, apoplexiam, vertiginemq; cap-
 tis dolorem, & alios efficiens. 56
 humores non esse causas morborum, quomo-
 do intelligi debeat. 56
 humores morbos adstrictos & laxos conci-
 tare. 56
 humores valde putrescibiles plurimum face-
 re ad pestem faciendam. 166
 humores quatenus humores sunt, in morbis
 non indicare curationem. 53
 humores non esse morborum causas quibus
 argumentis demonstratur. 53. 54. 55
 humores in febribus tertianis nothos qua in
 parte putrescant. 178
 humores attrahi à medicamentis ex Hippo-
 crate à similitudine substantiae. 90
 humores an semper per initia phlegmonum
 sint repellendi. 289
 hydragium esse medicamentum laxatorium. 22.
 hydropotem sudorificum. 181
 a hydropis

I N D E X.

hydropis cognitio. 251. curatio. 253. & 254.	inunctiones pro preservatione à bestijs veneno-
hydropis siccus quis. 251	sis. 116
hydropis ascitis signa. 251	inunctiones ex calidis oleis dulcibus omnibus diar-
hydropis tympanitis seu sicce signa. 252	rhæis conducere. 145
hydropis anasarca signa. 252	inunctio Russi ad febres pestiferas tollendas. 173
hypochondriacæ melancholiæ signa & causæ. 341	inunctio ex nitro ad tollendam cutis stipationem.
hypochondriorum loca; quomodo habere focum	366.
putredinis cognoscatur. 182	inunctiones sudorem cohibentes. 385
I.	inunctiones ad quotidianam. 192
Iacobus Antonius Cortusus cum pulsu defi-	inunctiones sudorem mouentes. 183
ciente. 151	inunctiones ad quartanam. 189
icteritia consideratio. 202	inustionis utilitas ad viscera obstructa. 351
icteritia cognitio. 352. & causarum. 353.	inustio ad asthma ex Aegyptijs. 346
icteritia curatio. 203	Iulianus Methodicus. 21
iecoris vlcerati signa. 284	iura ventrem mouentia. 129
ignem cur rerum principium aliqui fecerint. 8	Iulianus Methodicus, contra quem Galenus scrip-
ilei inflammati signum pathognomonicum. 237	sit disputationem apologeticam. 41
iliacæ passionis causæ. 237. & prognosticum ib.	iura ad ventrem laxandum utilia. 378
curatio. 238	iura galli antiqui ad asthmaticos. 346
inspirationis utilitas. 363	iura galli ad quotidianam. 192
inappetentiæ causæ, & curatio. 348	L
incidentia crassos humores laxare. 77	Labores cibos præcedant. 133
indicationes Methodicorum nihil artificij habere.	lac vrinam mouens Aegyptijs familiare. 130
26.	lactis vsus ad prohibendum, ne cantharides ex-
indicationes Methodicorum, quibus ad medendum	terius adhibita vesicam ledant. 334
vruntur, etiam plebeis esse notas. 26	lactis decocti, & chalybeati vsus ad sanguinis
inedia laxat. 78	fluorem cohibendum esse utilem. 398
infantium epilepticorum nutrices quo victu vri	lactis vsus ad phthisicos. 282. & utilitas. ibid.
debeant. 333	lac mouens vrinam. 98
infantes epileptici quibus curentur. 332	lactis vsus ad besticas febres. 195
inflammatio, lege, phlegmone.	lac habere vim subdutoriam. 195
inflammatio quid sit, quod duplexq; 210. 212	lactis utilitas ad stomachi dolorem tollendum.
inflammationis in capite signa. 197	310. 311.
Ioannes Andreas Auria Princeps. 105	lactis vsus esse vnum ex præcipuis auxilijs ad
Inquietatio in febris quibus tollatur. 203	sputum sanguinis ex vlcere pulmonum. 392.
iram vehementem facere meatuum densationem.	λεγοφθαλμοι. 7
71.	λεγοχελαι. 7
iridis consideratio. 93	lapidum vires singulares contra venena. 112
iridis decoctum oscula venarum in vtero aperi-	lapidis in vesica signa. 354
re. 22	lapidum in vesica & in renibus generationis cau-
insaniæ cognitio. 337	se. 354
insanos vinculis coercendos ex Asclepiade. 340	lapides in vesica & renibus an à frigore gigni
imago Serpentarij aduersus venena gestata. 112	possint. 354
ischiadiorum dolorum curatio. 300	lapides in vesica geniti an idem sint cum ijs, qui
ischuriæ cognitio, & curatio. 375	in renibus fiunt. 355
inseffiones ad vesicæ, renum, atque vteri vlcera.	lapides vesicæ hac ætate sectione tuto educi. 355
287.	lapides quomodo absq; sectione per meatum colis
inseffiones ad firmandum vteri profluvium. 402.	educantur ab Aegyptijs. 355
inseffiones ad mouendos menses. 374	lapidis in renibus atq; in vesica curatio. 355
inustiones ad hydropem quomodo Aegyptij pa-	lapides in vesica & renibus comminuentia. 356
rent. 254	laserpitij facultas purgatoria. 97
intestini ilei inflammati cognitio. 237	laserpitium ad quartanam finiendam. 188
intestinatorum vomicarum cognitio. 267	lasiitudinum cognitio. 134
intestinatorum vlceratorum cognitio. 284	lasiitudo quid sit. 134
intestina a quibus fiunt læuia. 404	lasiitudinem triplicem esse. 134
	lasiitu-

I N D E X.

d 2 medica-

INDEX.

medicamenta experimentis cognita olim ad mor- talium commodum in tabellas descripta in Deorum templis apponebantur.	1	medicamenta frigida in corporibus à febre vexa- tis nunquam actuari.	48
medicamenta dari ex Galeno quæ contrarijs eodem tempore agunt facultatibus.	73	medicamenta actu frigida cur in febribus maxi- me fistuosis, atq; in tabidis conueniant.	51
medicamenta ex Aureliano non indicari a partis affectione specie.	62	medicamenta actu frigida cur in morbis adstri- ctis aliquando vtiliter exhibeantur.	51
medicamenta quæ vni homini conueniunt, singu- lis hominibus conuenire.	40	medicamenta frigida mortifera sola esse, quæ in corpore actuentur.	49
medicamenta calida & humida cur omnibus dolo- ribus medeantur.	303	medicamenta potestate frigida in corpore reddi a- ctu calida, & quandoque calfacere.	49
medicamenta calida facultatis mederi etiam mor- bis calidis.	23	medicamenta frigida quomodo assumpta intra cor- pus refrigerent.	49
medicamenta vni speciei conuenientia singulis par- ticularibus conducere.	39	medicamenta frigida intra corpus à calore calfa- cta reddi facultatis laxatorie.	49
medicamenta meatus cutis detergentia & ab in- farctu liberantia cur cuiusvis adstrictionis ex- pertia esse debeant.	68	medicamenta etiam potestate frigida actu cali- da assumpta reddi calida, & idcirco calfacere.	49
Medicamenta incidentia, detergentia, diaphore- tica atque cathartica an laxantium medica- mentorum genere comprehendantur.	76	medicamenta frigida (exceptis mortiferis) in cor- pore assumpta nunquam actuari.	49
medicamenta incidentia & detergentia ex Aure- liano Methodico laxare.	76	medicamenta actu frigida cur in aliquibus febr- bus conueniant.	51
medicamentorum incidentium, detergentium, atq; aperientium vsum Aurelianum in icteritia me- minisse.	353	medicamenta adstringentia nunquam morbo ad- stricto conuenire, sed quatenus adstricto affe- ctui laxus vrgentior est coniunctus.	52
medicamenta abluentia & detergentia quando con- ueniant in ijs, qui calculis in renibus, atq; ve- sica laborant.	356	medicamenta actu frigida actu calidum morbum non tollere.	52
medicamenta abluentia.	89	medicamenta frigida actuari in corpore vbi nan- ciscuntur actualement frigiditatem.	49
medicamenta quæ detergendo purgant.	89	medicamenta frigida in corporibus nunquam fri- giditatem seruare, sed calida reddi à calore, & naturali & praternaturali.	48
medicamenta laxantia quæ purgant.	89	medicamenta actu frigida exterius apposita an conueniant in morbis calidis.	161
medicamenta, quæ emolliant, laxant, rarefaciant, & quæ aperiant.	22	medicamenta purgantia quomodo ex methodicis humores educant.	91
medicamenta laxantia magna, ex Aureliano, in- dicari ab affectus & virium corporis magnitu- dine.	61	medicamenta purgantia qualia Methodici fuerint securi.	91
medicamentum ex cadmia quamobrem non curet vlcus in aure.	63	medicamenta ad dolorem an sint amara.	302
medicamentum ex cadmia cur curet vlcus in cru- re positum.	63	medicamenta humorem melancholicum concoquen- tia.	186
medicamenta ad vlcera interna non nisi viribus refractis peruenire.	63	medicamenta Errhina, Apoplegmatisimata, atq; Bechica quæ sint.	97
medicamenta pro sanandis vlcibus indicari ab vlcis essentia atque ab eiusdem vlcis ma- gnitudine.	63	medicamenta purgantia quoruplicia sint.	89
medicamenta indurantia, tendentia, atq; densan- tia eiusdem facultatis & nature esse contra Galenum.	24	medicamenta vomitoria.	180
medicamenta leuiter adstringentia conuenire ad cutis exiles meatus cobibendos, & efficaciter ad internos amplos claudendos.	24	medicamenta aluum laxantia.	201
medicamenta potestate frigida in morbis calidis assumpta, eos non refrigerando, sed vt laxato- ria, sanare.	48	medicamenta aluum laxantia.	129
		medicamenta aluum mouentia.	378
		medicamenta exterius adhibita aluum mouentia.	379.
		medicamenta purgantia qua vi, & quomodo hu- mores educant.	90
		medicamenta cathartica purgare determinatos hu- mores qui voluerint.	90
		medicamenta purgantia singulis speciebus anima- lium conuenientia.	40
		medi-	

INDEX

medicamenta purgantia, quæ in quotidiana conueniunt.	191	medicamenta in febribus coctionem adiuuantia.	164
medicamenta ad reuocandas menstruas purgationes quæ.	374	medicamenta externa ad febres continuas.	164
medicamenta vrinam mouentia.	130	medicamenta ad tollendam obstructionem à visceribus.	351.352
medicamenta ad vrinam mouendam.	375	medicamenta singularia ad febres continuas.	160
medicamenta vretica.	98	medicamenta vsum habentia in febribus pestilentibus.	171
medicamenta simplicia sudorifica.	100	medicamenta ad febres periodicas.	187
medicamenta venterem mouentia.	380	medicamenta interna ad febres tertianas spurias.	180.
medicamenta per renes & per vterum purgantia.	278	medicamenta exterius in quartana admouenda.	189.
medicamenta vrinam mouentia in febribus.	165	medicamenta danda ante accessionem in quartana febre.	188
medicamenta venenosa omnes homines grauiter ledere.	40	medicamenta danda ante accessionem in quotidiana febre.	192
medicamenta quæ aduersus venena.	112	medicamenta ad quartanam tollendam ex varijs auctoribus deprompta.	188
medicamenta, quæ inunctione præseruant à moribus venenatis.	116	medicamenta ad febrem quotidianam.	191
medicamenta simplicia ad præseruandum à venenis.	113	medicamenta purgantia quamobrem in quotidianis sint suspecta.	191
medicamenta composita alexipharmaca.	113	medicamenta ad cephalicam ex Themisone.	307
medicamenta simplicia serpentes fugantia.	114	medicamenta ad cephalicam ex Aureliano.	307
medicamenta præseruantia à morfu ferarum venenosarum.	114	medicamenta externa ad dolorem capitis.	307
medicamenta igne accensa, quæ fugant reptilia, atq; serpentes.	115	medicamenta iniquitatem in febribus tollentia.	203
medicamenta quæ gestata præseruant à moribus venenosus.	115	medicamenta ad aurium dolorem.	309
medicamenta suppuratoria quæ.	275	medicamenta rigorem periodicum in febribus, vel horrorem, vel frigiditatem adimentia.	140
medicamenta vlcera interna detergentia.	285	medicamenta ad epilepsiam quæ ab antiquis medicis fuerint laudata.	333
medicamenta vlcera pulmonum conglutinantia.	283.	medicamenta ad catalepticos.	330
medicamenta phthisicis conducentia.	282	medicamenta ad stomachi dolorem.	310.311
medicamenta extrinsecus adhibenda ad sputum sanguinis cohibendum.	395	medicamenta ad ventris dolorem.	311
medicamenta sarcotica ab antiquis inuenta quomodo omnibus vlceribus canis conueniant.	33	medicamentum Pauli ad sitim.	202
medicamenta ad hæmorrhagiam sanguinis sistendam.	387	medicamenta ad syncopem.	206
medicamenta ad hæmorrhagiam sistendam.	387	medicamenta interna ad pleuriticis.	230
medicamenta ad fluxum sanguinis ex ore sistendum.	394	medicamenta ad asthmaticos.	346
medicamenta ad sputum sanguinis cum tussi.	394	medicamenta ad tussim.	344
medicamenta composita ad sputum sanguinis cum tussi.	395	medicamenta interna ad colicos dolores.	314
medicamenta adstrictoria in communi.	105	medicamenta iliakis conducentia.	238
medicamenta metasynterica quid sint, ex quibus parentur, & quibus malis medeantur.	104	medicamenta ad lienteriam.	405
medicamenta intra nares indita sanguinis profluvium sistentia.	387. & 388	medicamenta qualia conueniant lieni indurato ex methodicis.	235
medicamentum ex aloë ad cohibendam hæmorrhagiam.	388	medicamenta ad hydropem vexatos.	254
medicamenta ad sanguinem per screatum manantem.	393.	medicamenta ad vteri profluvium cohibendum.	402
medicamenta, quæ ad cutis consipationem conducant.	369	medicamenta ad vrinam suppressam.	26
		medicamenta ad catem adstrictam.	26
		medicamenta ad podagram.	300
		medicamenta quibus genitale refrigeratum intenditur ad concubitum.	381
		medicamenta ad lapides in vesica comminuentia.	356.
		medicamenta ad ischiadicos dolores.	300
		medendi	

I N D E X.

medendi artem primo ortu fuisse rudem & incultam.	1	menstruis purgationibus suppressis, qui morbi oriantur.	372
medicamentorum facultates quomodo ex Galeno experientia cognoscantur.	385	menstruæ purgationes suppressæ quibus remedijs restituantur.	373
medicamentorum facultates qualitativas vocatas & ratione & experientia cognosci.	131	menstruorum profluvium quibus firmetur.	402
medicamentorum facultates à totius substantiæ sympathia, aut antipathia proficiscentes ratione non cognosci posse, sed sola experientia.	31	menstruorum immoderatus fluentium cause.	401
medicos ex tota Italia tanquam damnosos fuisse expuljos.	1	& curatio.	402
medicina Empirica primo innotuit.	1	mensēs suppressi quibus renocentur.	131
medicina Empirica quæ consideret.	1	mensēs mouentia.	99
medicinam Dogmaticam mortalibus secundo loco innotuisse, atq; qualia fuerint ipsius dogmata.	1	metasyncretis quid sit.	8
medicinæ quatuor sectas fuisse.	2	metapoporosis quid sit.	8
medicinam esse adiectionem & detractionem.	30	metasyncreticos, & metapoporosis nomen unde.	11
medicina Methodica quando caperit cognosci.	2	metasyncretica quæ sint medicamenta.	77
medicina Methodica quando floruerit.	2	metasyncretica meatus quomodo aperiant laxentque.	77
medicina Methodica quanto tempore duraverit.	4	metasyncreticorum medicamentorum usus.	103
medicinam Methodicam tercentum annis floruisse.	6	metasyncretica quibus malis medeantur.	103.
medicinæ Methodicæ definitio ex Thessalo.	6	104.	
medicinam in subtractione atque adiectione consistere.	141	methodicorum communitates ex Galeno.	6
medicina Dogmatica quæ dogmata consideret.	1	methodica secta quid sit.	5
medici, qui in secta Methodica claruerunt.	3	methodicæ medicinæ definitio.	5
medicinam prophylacticam posse reduci ad laxum, & ad adstrictum.	42	methodica secta cur rationalis dicta non sit.	6
medicina prophylactica Methodicorum quibus communitatibus perficiatur.	42	methodicorum communitates duas fuisse.	6
medicos Dogmaticos ipsos fuisse ad plures morbos sanandos medicamentis laxatorijs.	57	methodici qua ratione adstrictum & laxum evidens dici voluerint.	21
medicos Dogmaticos in curandis febribus non exequi indicationem à febre desumptam.	47	methodici cur laxum atq; adstrictum in species non diuiserint.	21
medicos Dogmaticos non in omnibus febribus refrigerare.	47	methodici in quibus à Dogmaticis disenserint.	58.
medicina Methodica quæ consideret.	2	methodici in quibus à Dogmaticis disenserint.	58.
medici Dogmatici in quibus videntur metasyncretici.	103	methodici existimarunt ad curationem indicandam non esse necessariam, neq; vtilem cognitionem lesarum partium, naturæ, temperamenti, causarum, caliditatis, anni temporis, ætatis, sexus, studij, & similitum.	58
medicos Crotoniensis & Cyrenaicos ante Hippocratem in medicina claruisse.	1	methodica medicina quando cepit, quibus dogmatibus fuerit constituta.	2
Melchior Guilandinus illo extinctus.	237	methodicis quæ obijciuntur in arte chirurgica.	33.
Melchior Guilandinus hiera ad semunciam assumpta interemptus.	313	methodum Methodicorum nihil habere artificij.	33
melancholice cognitio, signa pathognomonica.	340	methodici in via vlcum curandorum, in quo à plebeis differant.	33
curatio.	341	methodicos suam hypotheseim de meatuum adstrictione atque diffusionem etiam de meatibus internis atq; maximis intellexisse.	18
melancholia hypochondriaca.	341	methodici quid de prophylactica medicina senserint.	107
Melam equestis ordinis succo porri interemptum.	111.	methodici quamobrem prophylacticam medicinam non reduxerint ad adstrictum & laxum.	42
melancholice signa propria.	338	methodicos in multis morbis curandis à Dogmaticis non fuisse differentes.	57
Menemachus Aphrodisiensis.	3	methodicos causarum loco affectus adstrictos atq; laxos habuisse.	16
menstruæ purgationes à quibus causis supprimantur.	377	methodicos causas morbos dixisse.	16
		methodicos calidis morbis recte laxatorijs medicamentis	

INDEX

- eamentis mederi. 53
 methodici in pleuribus curandis ex natura ipsa-
 rum curationem indicari voluerunt. 33
 methodici quo pacto intelligant humores non esse
 causas morborum. 56
 methodici quibus malis vsu metasyncriticorum
 medeantur. 104
 methodicos non fuisse adeo stolidos, qui aequae me-
 derentur moribus venenatis atque non vene-
 natis. 37
 methodicis quibus rationibus fuerit persuasum
 partium lesarum naturas varias, etates, se-
 xum, calum, & similia non indicare curatio-
 nem. 59
 methodicos admittere vsum adstringentium in
 principio phlegmones, quae est morbus adstri-
 ctus. 62
 methodicos vsum purgantium plane non sustulif-
 se. 57
 methodici cur non lenitium purgatoriorum vsum, sed
 valde purgantium potius fuerint complexi. 89
 methodici an vsum adstringentium in quibusdam
 morbis adstrictis voluerint, scilicet in phleg-
 monum principijs. 65
 methodicos etiam Dogmaticos in phlegmonum inter-
 narum initio vsos fuisse medicamentis laxato-
 rijs. 65
 methodicos in febribus (exceptis maxime astuo-
 ris) nunquam admittere vsum medicamentorum
 actu refrigerantium. 47
 methodicos ad tollendum adstrictum aliquando
 habuisse in vsu medicamenta incidentia, atque
 detergentia. 27. & qualibus vsi fuerint. ibid.
 methodici an admittendum vsum adstringen-
 tium in phlegmonum principijs voluerint. 65
 methodicos admisisse vsum adstringentium in prin-
 cipijs phlegmonum. 65
 methodicos adstringentium vsum complexos fuisse
 in principio earum phlegmonum, quae malignae
 non sunt, & quae sunt in partibus ignobilibus. 66
 methodus curandorum adstrictorum morborum,
 quibus laxis morbus superuenit. 413-414
 methodici medentur varijs partibus exulceratis de
 sumpta indicatione ab ulceris magnitudine. 63
 methodus tuendae sanitatis an ex Methodicorum
 placitis constitui possit. 108
 methodus curandi dysenteriam. 419
 mesenterij phlegmonem obfessi cognitio. 240
 mesenterij vomica cognitio. 266
 mesenterij ulcerati cognitio. 284
 milium sudorem mouere. 101
 mithridatium minus ex nucibus. 113
 Mnaseas Methodicus. 3
 morbos simplices in intemperie dari & quomodo
 fiant. 46
 morbos simplices scilicet calidos, frigidos, humi-
 dos, atque siccos per se non indicare curationem. 46
 morbus calidus quomodo indicet medicamentum
 refrigerans, & an actu vel potestate tale. 47
 morbus ex methodicis quod sit. 11
 morbos omnes ex methodicis ad tres reduci, scili-
 cet ad adstrictum, ad laxum, atque mixtum ex
 laxo & adstricto. 6
 morbi, qui ad laxum morbum referuntur. 69
 morbi, qui ad adstrictum morbum referuntur. 69
 morbi adstricti qui sint, & qui laxi. 69
 morbum consistere in meatuum ametria, & sa-
 nitate in symmetria rationibus demonstratur.
 11.
 morborum causas non esse humores, & qualitates
 primas. 7
 morbos ex Dogmaticis etiam indicare sui abla-
 tionem. 32.
 morbos in vitiosa intemperie non habere ex Me-
 thodicis propriam curandi indicationem. 15
 morbos in humorum abundantia atque defectu con-
 sistere. 31
 morbum calidum & frigidum non habere certam
 curationis indicationem. 50
 morborum malignitatem curationem indicare. 36
 morborum calidiorum & frigidiorum cognitionem
 ex Methodicis ad indicandam curationem esse
 inutilem. 50
 morbos in intemperie adstrictos esse praesertim cali-
 dum & frigidum morbum, idcirco laxantibus
 utrumque sanari. 15
 morbos a clausis corporis meatibus complures ex-
 citari, & qui excitentur. 12
 morbos ab apertis meatibus fieri, & qui sint. 12
 morbos copiosas euacuationes non semper tollere.
 53.
 morbi cur ab insignioribus euacuationibus non
 tollantur. 53
 morbus mixtus ex adstricto & laxo an indicet
 curationem. 27
 morbi mixti ex laxo & adstricto an dentur. 73
 morbi mixti ex laxo & adstricto. 410
 morbus mixtus ex adstricto & laxo in corporibus
 quomodo cognoscatur. 21
 morbus mixtus ex laxo & adstricto qua ratio-
 ne fiat. 74
 morbum mixtum ex laxo & adstricto habere mi-
 stam curationis indicationem, scilicet adstringen-
 di & laxandi, sed urgentiori esse incum-
 bendum. 51
 morborum in principijs quae faciendae. 29
 morborum in statu quae sciendae a medicamentis. 29
 morbi qui fiunt ab immoderata meatuum cum ad-
 strictione tum diffusionem. 16-17
 morbus cum adstrictus tum laxis quibus curatur. 17
 morbus

INDEX.

morbus laxus & adstrictus quid sit. 17
 morbum calidum tolli medicamento temperate ca-
 lido. 52
 morbum frigidum tolli medicamento temperate
 calido. 52
 morbum & calidum & frigidum tolli eodem la-
 xatorio medicamento. 50
 morbi acuti quo tempore in Aegypto grassantur. 14
 morbi epidemici, endemici & sporadici. 165
 morbi lateralis cognitio, & prognosis. 227
 mortem sequi aliquando ex nimio gaudio. 25
 mortem in febribus quibus signis medici praeui-
 deant. 151
 morsus à cane rabido quomodo curari debeant. 37
 motum laxare. 79
 mulieres atticæ fugabant serpentes substratis agni
 folijs. 116
 mulieres quibus remedijs ab uteri profocatione
 praeserventur. 361
 mulieres lotionem capitis à dolore ex obstructis in-
 farctisq; meatibus, liberari. 27
 muliebris profluviij cognitio, & curatio. 423

N

Nephritici doloris signa. 31
 natationem in aqua marina febrem indu-
 cere. 105
 navigationes phthisicis quales sint utiles. 282
 navigationis utilitas. 84
 Nicander de medicamentis quæ igne accensa fugant
 serpentes. 115
 Nicandri inunctiones ad preservandum à moribus
 serpentum. 116
 Nicolaus Razeus Dux Olicæ. 296
 Nicolaus Florentinus de monachis ex nigro ara-
 neo venenatis. 110
 nervi ulcerati an habeant propriam medicamen-
 torum indicationem. 64
 nervorum vulneratorum curatio qualis esse de-
 beat. 36
 nervus vulneratis an laxantia ad prohibendam
 inflammationem conveniant. 36
 nervus punctis convenire olea laxantia. 37
 nervorum punctiombus quæ olea conveniant. 37
 nux iuglans ad venenum. 112

O

Obstas in corporibus quomodo tollatur. 139-140.
 obstructio quibus signis innotescat. 349
 obstructio viscerum quibus tollatur. 351, 352
 oculorum inflammationes, quæ in Aegypto gra-
 santur, à quibus causis. 291
 oleum ex seminibus lini secretum esse pleuriticis. 25
 olei amygdalini dulcis utilitas ad ileon. 238
 oleum ex veratro albo paratum vocari oleum san-
 ctum. 311

oleum de scorpionibus Matth. 115
 olei de chalcanto ad quartanam usus. 188
 Olympicus quomodo sanitatem & morbum defi-
 nient. 11
 omenti phlegmones cognitio. 239
 omenti vomice cognitio. 266
 omenti ulcerati cognitio. 284
 ophthalmiæ quæ epidemice quodam tempore in
 Aegypto grassantur. 291
 ophthalmiæ curatio. 291, 292
 opiata ad somnum conciliandum. 204, lesio. 205
 opisthoronos quid. 335
 Oribasius de usu metasyncriticorum. 104
 Oribasius de elzebro albo. 96
 os de corde cervi adversus serpentum morsus. 115
 Oxyrrhodinorum usus in febribus, & an conue-
 niant actu frigida. 161
 oxycratum. 155

P

Palpitationis cordis cognitio. 346, 347
 Palpitationis causa ex Galeno. 347
 Panacea Antonij Musæ. 181
 Pancreatis phlegmone vexati cognitio. 240
 Panem est tritico omnibus particulibus homini-
 bus (licet differant inuicem ætate, tempera-
 mento, sexu, vel alijs differentijs) æque conue-
 nire. 40
 paralyti causa. 323
 paralysis an sit morbus adstrictus. 324
 paralyticis an conveniat phlebotomia. 324
 paralysis cognitio. 325
 paralyti an interna viscera capiantur. 321
 paralysis quibus alijs nominibus vocetur. 321
 paralyti quæ partes corripantur. 321
 paralyti partes singule correptæ quibus signis in-
 notescant. 321, 322
 paralyti vesicæ detentæ signa. 323
 paralysis in supercilijs, palpebris, oculis, lingua,
 labijs, ventriculis cerebri anterioribus, muscu-
 lo siago, mento, faucibus, gutture, stomacho,
 musculo laryngis, & gula, pyloro, ileo intesti-
 no, cæco, colo, recto, vesica, peritonæo, cole,
 meatibus spermaticis, cruribus, brachijs, pedi-
 bus, atq; manibus, factæ signa. 322, 323
 partium lesarum varias naturas, ætates, sexus, &
 similia non mutare essentiam medicamentorum,
 sed aut quantitatem, aut agendi efficaciam. 59
 partem affectam per se curationem indicare qui-
 bus argumentis contra Methodicos demonstrare
 tur. 66
 partes affectas non indicare curationem. 61
 partem affectam per se curationem non indicare,
 quomodo intelligatur. 67
 partes affectas curationem non indicare, & partes
 subiectas affectis partibus. 67

partes

INDEX.

partes hebetis sensus validiora, & acutioris debiliora præidia indicare.	62	modo conueniat in sputo sanguinis affectu laxatorio.	393
partes quasdam hebetis sensus ex morbo fieri maxime sensibiles, & contra acutioris sensus red di minus sensibiles.	62	phlebotomiam in cordis palpitatione magnum vsum habere.	347
partes affectas non habere aliã particularem indicationem, quã medicamentorum essentiam.	62	phlebotomia in colico dolore.	313
partes vlceras cum internas cum externas eadem medicamenta indicare, scilicet siccantia.	62	phlebotomia qua ratione in profluvio sanguinis, cum sit medicamentum laxatorium, vsum habeat.	402
partes corporis, quæ phlegmone vexari solent.	209	phlebotomia cur conueniat in dysenteria.	419
partes varias exulceratas non indicare diuersas medicamentorum facultates, sed vnam solummodo, nempe siccatoriam.	63	phlebotomiam partes dolores articulares patientes replere.	297
partes varias corporis exulceratas non mutare essentiam medicamentorum.	63	phlegmone proprijs nominibus vocatæ quæ, & quæ à partibus affectis nominantur.	209
paruum sensus experitum inflammatarum cognitio.	213	phlegmone quid sit quibusque signis innotescat.	288.
partes, in quibus est putredinis focus, quibus cognoscantur.	182	phlegmonum differentie atque cause.	210
partes corporis quæ fricandæ ad tollendas febres.	182.	phlegmonum cum externarum, tam internarum cognitio.	212
paruum corporis ad tollendas febres periodicas fricandarum varie medicorum opiniones.	182	phlegmone quomodo in partibus sensus experitibus excitata cognoscantur.	213
partes in corpore, quæ suppurari solent.	258	phlegmone quibus signis deprehendantur.	210
parotides in morbis acutis etsi suppurentur, non posse omnino sperari salutem.	293	in visceribus internæ.	212
parotidas non admittere vsum adstringentium.	66	phlegmones generatio. 211. quid sit.	212
parotidum curatio.	293	phlegmone quanto tempore suppurentur.	252
paroptesis ad capitis dolorem.	307	phlegmone omenti, mesenterij, atque pancreatis quibus signis distinguatur à phlegmone hepatis, lienis, atque viscerum musculorum.	240
passiones seu vitia meatuum corporis consistere vel ipsorum contractione vel apertione.	14	phlegmonarum externarum quæ adstringentium vsum admittant.	66
passilli ad fugandos serpentes.	115	phlegmonas malignas non admittere vsum adstringentium.	66.
Paulus de signis febris pestilentis.	168	phlegmone interna cur in Aegypto non familiaris grassentur.	14
peripneumonia cognitio 230. prognosticum.	231	phlegmonarum externarum curatio. 289. 290. 291	
peripneumonia curatio.	232	phlegmones renum cognitio. 241. prognosticum.	242.
peritonæum an tuto secari possit.	279. 280	phlegmones septi transversij curatio.	234
pestus ex fenugreco ad vteri phlegmonem utilis simus.	248	phlegmones vesicæ cognitio.	244
pesti ad menses suppressos.	99	phlegmones vteri cognitio.	247
pesti ad mouendos menses.	374	phlogosis quid sit, quibusque signis deprehendantur.	210. 211
pesti ad firmandum vteri profluvium.	402	phlogosis curatio.	215
pesti ad vlcera vteri.	287	phlogoses diu durantes in phlegmonas quæ ratio ne mutantur.	214
pestilens febris quid sit, & in quo differat à peste.	165.	Philippidem poetam immoderato gaudio interemptum.	70
pestifera febris causa.	166	phrenitidis cognitio 215. cause, & prognostis	218
pestilentis febris signa.	169	216. curatio.	218
pestilentem febrem tolli sudorifico.	172	phrenitidis sympathicæ, & idiopathicæ signa.	233
Petronas medicus in omnibus febribus dabat aquam egrotis.	157	phrenitidis ex leso septo transversio signa.	216
Petrus Aponensis de quadam imagine contra venena.	112	phrenitidis non letalis signa atque exitialis.	216
phlebotomia quomodo epilepticis conueniat.	333	phrenitidis effrenis primo, & postea quæ blanda apparet, generatio.	217
phlebotomia an in sputo sanguinis conueniat, & in qua sanguinis expuitione.	393	phrenitidis exitialis signa omnia.	216. 217
phlebotomia ut medicamentum laxatorium quomodo conueniat in sputo sanguinis affectu laxatorio.	393	phreniticus die tertia interemptus.	56
		phre-	

I N D E X.

phrenitis apud Aegyptios Demelmaoi vocata.	56.	de re reges queant.	110
phrenitis Demelmaoi vocata qualis sit, & quomodo generetur.	56	presidia laxatoria que sint.	75
phibitis cognitio, causa.	281	presidij laxatorij genere que comprehendantur.	75
phibiscorum febris quibus signis cognoscatur.	281.	presidia facientia ad laxandum, atq; ad adstringendum.	119
phthibis ex sputo sanguinis signa.	281	presidia febribus continuis congruentia.	164
phthibi quibus euadunt.	281	presidia plethoram tollentia.	131
phthibiscis que conducant.	282	priapismus quid sit, quibusq; signis cognoscatur, & curatio.	357
phthibisim que sanant.	282	principia rerum esse densitatem & raritatem.	8
pile ludus quotuplex, & quibus sit utilis.	83	principia rerum esse atomos & vacuum.	8
pituitę differentię.	189	principium primum Methodicorum ab Asclepiade fluxisse.	8
pituita falsę cause.	189	Proculus Medicus.	3
pituita acide facientis febrem signa.	190	Prodicus febrientes exercitationibus interficiebat.	80
pituita falsę facientis febrem signa.	190	profluuij muliebris curatio.	423.424
plebeos scire omne alienum sui ablationem indicare, sed qualibus medicamentis illud fiat ignorare.	33	profluuii tria genera.	404
plenitudo humoris an morborum sit causa.	54	profluuium alui prohibere phlebotomiam.	414
plenitudinem in corporibus cum communem tum particularem ab insigni communi euacuatione minui oportere.	54	profluuium ventris quibus cohibeatur.	405
plethore observatio ad sanandas lassitudines non necessaria.	136	prophylacticam medicinam fuisse in praeservatione a venenis rebusq; venenatis.	102
plethora quibus tollatur.	131	prophylacticen Methodicorum presidiis solummodo alexipharmacis atque alexiteriis perfici.	43
pleuritidis cognitio & prognosticum.	227.228	prophylacticam medicinę partem quamobrem Methodici non reduxerint ad adstrictum & laxum.	42
pleuritidis, quę in pulmoniam mutatur, cognitio.	228.	prophylacticam medicinam a Methodicis solummodo in venenis, morsibus & ictibus venenatis fuisse observatam.	42
pleuritidem non esse morbum laxum, neque fieri a fluore.	228. 229	prophylacticam medicinam posse reduci ad laxum & ad adstrictum.	42
pleuriticorum curatio.	229.230	prophylactice an ex Methodicorum placitis constitui possit.	108
pleuritidis Methodica curatio ex Hippocrate.	136	prophylacticam medicinę partem in quibus Methodici obseruarent.	107
pleuritidis qualis sanguinis euacuatio conueniat.	229.	Prosper Alpinus auctor operis ex nauigatione quantum fuerit adiutus.	84
Plinius de milite venenato ex succo porri.	111	psendo lassitudo siccatoria vocata quid, & eius curatio.	138
Plinij suffumigium pro arcendis bestiis venenosis.	116.	psittacus quid valeat ad venenum prodendū.	112
podagrę cognitio, prognosıs, curatioq;	296	psyllij singularis utilitas in febribus cōtinuis.	160
podagra quibus inuenitur.	299.300	pueros statim enixos morboſa gaudere sanitate.	125.
podagrę antiquę curatio.	297.298	puerorum recenter natorum corpora cur adstrictioris roborentur.	121.125
podagricos non ferre vtiliter insignes euacuationes atq; purgationes.	298	pueros habere laxum habitum, idcircoq; ipsos non ferre magnas euacuationes.	60
podagra cohibita quibus presidijs renouetur.	370	pueri cur non ferant magnas euacuationes.	60
polypodium.	94	pueris cur victus calidus & humidus conueniat.	119.
polygoni succum febres sanare.	180	pueri cur fortius aliarum etatum hominibus morbis resıstunt.	86
pondus in parte quando vomitam denotet.	260	pueris densi habitus & fortibus conuenire sanguinis euacuationem.	86
porri facultas venenosa.	111		
potiones ad sitim reſtinguendam.	202		
potus ad conseruandam sanitatem.	127.		
potiones varię sudorificę.	101		
præsius lapis ad venenum.	112		
Praxagoras quę in paralyſi facienda laudauerit.	324.		
Preseruatıo venenorum an habeatur certa, cui ſi-			

INDEX.

pueri cur per multos dies à cibis abstinentes vi-
nant. 86
pueros largas euacuationes perferre. 86
pueris pleuritide laborantibus cur sanguinis va-
cuatio non conuenit. 60
pueri ab epilepsia qui euadant, & quamobrem. 332
pueris epilepticis an curatio conueniat. 332
pueris an conueniat sanguinis euacuatio quomo-
do cognoscatur. 86
pulmonie cognitio. 230. signa. 231
pulsus pessimi in morbis. 151
purgæ vmbilicis vilitas. 83
pulsus Aetij ad spiritum sanguinis. 395
pulueres ad sudorem cohibendum. 385
purgationis definitio. 90
purgatio quid sit ex Galeno. 90
purgantium medicamentorum vtendi ratio cum
ex Dogmaticis tum ex Methodicis. 57
purgantia medicamenta ex Aristotele esse ho-
mini inimica. 91
purgantia que in vsu Methodicis fuerunt. 91
purgantium vsum à Methodicis esse complecten-
tium, demonstratur. 90
purgantibus (lenientibus vulgo vocatis) cur Me-
thodici olim non vsi fuerint. 89
purgantium lenientium vocatorum vsus. 89
purgantia medicamenta quoruplicia sint. 89
purgantia corporibus robustioribus valida conue-
nire, debilibus debilia. 59
purgantia cur in principio morborum haud tutò
exhibeantur. 54
purgantia ex Hippocrate in principio morborum
quando conueniant, & quando non. 54
purgantia quo tempore tutò egrotis exhiberi pos-
sunt. 55
purgantia in quo tempore morbi sint exhibenda. 91
purgantia medicamenta non esse frequentanda. 77
purgantia ex Hippocrate in quibus morbis dari
debeant, & quando. 77
purgantium medicamentorum noxæ. 77
purgantia que in febribus conueniant. 155
purgantia que conueniant in febribus. 177. 180
purgantium vsum in febribus continuis tollendis.
165.
purgantia que in febre quotidiana conueniant. 191
purgantia in antiquo morbo podagrico dolores
excitare. 297
purgationes consuetas cohiberi est causa vt in mor-
bos homines incidunt. 362
purgatio narum cohibita quibus restituatur. 367
puris eruptionis in varijs partibus facta cog-
nitio. 268
puris eruptiones quanto tempore fiant. 268
puris eruptionis que citò, & que tarde fiant. 268
puris eruptionis facta signa. 268

pus, subter cutem latens quibus signis dignosca-
tur. 269
puris eruptionum ad varias partes cognitio. 269
purulentiarum futurarum cognitio. 261
purulentie que salutare. 270. & que pessime.
271.
puris eruptionem que faciant. 275
purulentia quibus vix ex Thorace in ventrem
prolabatur. 277
purulentias e Thorace purgari aliquando per vri-
nam, aliquando per ventrem, & aliquando per
vterum, & aliquando per abscessus. 277
purulentias posse purgari per urinam. 276
pus per quas vias ex Thoracis cavitatem in re-
nes & vesicam feratur. 277
pus in vomitibus pessimum. 272
putredinis cause. 166
putrefactio quid. 257
putredinis focus in qua parte corporis existat in
febris intermittens. 178. 182
putrescendi aptitudinem plurimum facere ad pe-
siferam febris generationem. 166
putridarum febrium cognitio. 146

Qualitates elementorum agere mediantibus
secundis qualitatibus, nempe aut rare-
faciendo, aut densando. 45
qualitates primæ quomodo morbos in animali-
bus faciant. 45
qualitates actiuas potius pati à passiuis, quam
passiuas vocatas ab actiuis. 46
qualitates primas agere secundis qualitatibus. 46
qualitates primas non facere morbos. 45
qualitates primas scilicet caliditatem, frigidita-
tem, humiditatem, siccitatemque per se primo
morbos non facere, sed rarefaciendo, & den-
sando. 45
qualitates primas per se primò non agere sed ra-
refactione & densatione. 45
qualitates primas parum facere ad curationem
instituendam. 50
qualitates primas non esse præcipuas morborum
causas. 53
qualitates primas ad indicandam curationem esse
inutiles. 53
quartanarijs medicamenta conuenientia. 187
quartanæ febris cognitio. 183
quartanæ febrem liberare à magnis morbis. 184
questio de partibus fricandis & inungendis ad
febres periodicas tollendas. 182
quietem tumorem facere. 79
quotidianam febrem vere intermittentem non
dari. R 190
Ranarum viridum decoctum ad quartanam
finiendam. 188

INDEX.

varietatem in corporibus salubriorem esse.	12	sanguinis euacuationem, quæ fit adhibitis cruribus	
refrigerationem ex Hippocrate quæ in ventre sunt		cum scarificatione cucurbitulis, non esse eandem	
indurare.	154	cum illa, quæ fit crurum scarificatione.	88
Reges qualibus hominibus debeant vitam tutan-		sanguinis euacuatio ad animi deliquium an conue-	
dam committere.	110	niat febribus continentibus vexatis.	155
Reges atq; alios magnates non posse præseruari à		sanguinis mittendi in febribus ratio.	156.
venenis.	109	sanguinis ad animi deliquium missionis in febr-	
Reges vinorum ciborumq; prægustatoribus fidere		bus utilitas.	156
non posse.	109	sanguinis euacuationem indicantia ex Methodi-	
Regum præseruatio à venenis quibus perficiatur.		cis Dogmaticisq;.	156
110.		sanguinis reuolutio cur pueris & senibus non con-	
renales dolores quibus cognoscantur.	314	ueniat.	61
renum dolores à grumoso sanguine.	314	sanguinis euacuatio cur in hydropo morbo adstri-	
renum dolor à calculis.	314	cto magno non conueniat.	253
renum dolor à pituita crassa.	314	Sanguinis vacuatio cur in febre diaria non con-	
renum dolor ab acri humore.	314	ueniat.	146
renum phlegmones cognitio. 241 . curatio. 242.		sanguinis euacuatio cur conueniat in febribus cõ-	
243.		tinentibus.	154
renum vomica cognitio.	267.	sanguinis euacuatio qualis conueniat in febribus	
renes ulcerati quibus comprehendantur.	286.	tertianis notis.	179
renum calculis vexatorum cognitio.	354.	sanguinis vacuatio ad capitis dolorem.	197
repellentia in capitis dolore non esse tuta.	198.	sanguinis euacuatio quo pacto ad dolorem capitis	
rerum principia qualia ab antiquis constituta fue-		sint molienda.	307
rint.	89.	sanguinis vacuatio quæ iuuet insanos.	339
respirationis utilitas.	363.	sanguinis vacuatio quæ opthalmicis cõducatur.	292
respiratio lethalis.	151.	sanguinis euacuatio quæ pleuritidis cõueniat.	229
rhobarbari facultas purgatoria.	93.	sanguinis euacuatio in febre quotidiana.	191
rhobarbari morbis calidis aliquibus mederi.	23.	sanguis in quartana febre quando, & quomodo	
Rhasis de signis febris pestilentis.	168.	mittendus.	186
rigor vel horror in febribus periodicis quomodo		sanguinis euacuationem in antiquatis doloribus	
tollatur.	140.	podagricis eos excitare.	297
rigorem periodicum uel frigiditatem in febribus		sanguinis sputum an morbum laxum faciat.	38
per os assumpta quæ tollant.	140.	sanguinis sputum à quibus læsis partibus fiat.	390
rigor quartanarum febrium qualis.	183.185.	sanguinem in asperam arteriam destillans quibus	
rius Sardonius.	335	signis cognoscatur.	390.
Romanos sexcentos annos sine medicis vixisse.	1	sanguinem ex capite in os descendere quibus di-	
rose facultas purgatoria.	93	gnoscat.	390.
rosarum usus ad capitis dolorem.	198	sanguinis per tussim excreti cognitio.	390.
rubea febrilis Nicolai sudorifica.	181	sanguinem aliquando excerni ex venis in fauces	
rubricæ Constantini compositio.	181	desinentibus credidit Erasistratus.	390
rubea trochiscata ad febres.	181	sanguinis ex aspera arteria, & pulmonibus, & Tho-	
rute vis efficax ad febres eximendas.	181	race, ex pleura membrana, diaphragmate pro-	
rute vis alexipharmaca.	112	deutis cognitio.	390. & 391
S.		sanguis quot modis è vasis exeat.	391
Sacerdotes vii elleboro albo ad demonio actos		sanguinis per erosionem exeutis cognitio.	391
95.		sanguis qualis sit venarum, & arteriarum.	391
salus quid.	82	sanguinis sputo quæ conueniant.	394. & 395
salus ad quos affectus utilis.	82	sanguinis per naves profluuij cause.	386.
salsa quomodo alium moueant.	378	sanguinis ex ore profluuium criticum quartanam	
sanguinis stillæ malignæ.	152	tollens.	206.
sanguinis euacuatio à quibus in morbis indice-		sanguinis vomitus cognitio.	389. & curatio. 389
tur ex Methodicis.	86	sanguinis per alium fluoris cognitio.	396
sanguinis vacuationem tanquam magnum laxato-		sanguinis fluoris per alium differentie.	396
rium indicari ex affectus & virium corporis		sanguinis per alium fluor criticus, quibus signis	
magnitudine.	61	distinguitur. à symptomatico.	397
		sanguinis	

INDEX.

sanguinis profluvij per urinam cognitio.	399	secta Methodice definitio.	5. & 6.
sanguinis profluvio per renes, & vesicam que conueniant.	400	secta Methodica quanto tempore durauerit.	4.
sanguinem ab utero que auertunt.	402	sectionis cognitio ad purgandas vomicas ex Thorrace.	279.
sanitas quid sit, quotuplexq;.	108	sectione que tolluntur purulentie. 279. & quomodo.	ibidem.
sanitas quid sit ex Methodicorum sententia.	111	sectionis ad hydropem utilitas, & quomodo facienda.	254. & 255
sanitas & morbus ex Iuliano Methodico quid sit.	11	sectionem in inguine ad vomicas purgandas ex Aretico esse utilem.	280
sanitas & morbus quid ex Galeno.	11	sectionis vsus in hepate purulento.	280
sanitatem consistere in moderata symmetria meatuum, atq; morbum in ametria.	11.	semen retentum seuissima symptomata Corporibus inducere.	379
sanitatem in qua symmetria Dogmatici constituerint.	119	semina urinam mouentia.	130
sanitatem in qua symmetria Methodici constituerint.	119.	Seneca de gestationis utilitate.	84
sanitatem non ex qualitate, quantitateq; humorum turbari, at ab ipsorum motu.	14	Senecam deambulationem destillationi utilem esse cognouisse.	81
sanitatem partium organicarum mutari a recessu clausonis & apertionis meatuum corporis demonstratur.	13	senes.	93
sanitatis tuenda methodum etiam ex Methodicorum placitis constitui posse.	108	senes foliorum vsus ad aluum mouendam.	378
sanitatem conseruantes causas ad quod genera reducantur.	123	senes pleuritide laborantes cur sanguinis vacuationem non ferant.	60
sanitatis tuenda methodi utilitas.	118	senes an habitum laxum habeant.	60
sanitatem tueri quid sit.	118	senes cur non ferant magnas euacuationes.	60
sanitatem inesse corporibus & perfectam, & imperfectam.	118	senibus an sanguinis euacuatio conueniat quomodo cognoscatur.	86
sanitatis conseruande rationem pendere ex usu effectricium causarum.	118	septi transversus varia nomina, & phlegmone.	232
sanitatis precipuum studium esse cibis non satiari.	126	septum transversum nihil ex Hippocrate facere ad prudentiam.	232
sanitas imperfecta quibus conseruetur.	127.	senes a quartana cur maxime patiantur.	185
sanitas perfecta quibus conseruetur.	126	septi transversus inflammati signa.	233
sarbet quid.	202	septo transversus inflammato, cur delirium continuum fiat.	232
satyriasis cognitio.	245	septi transversus inflammati prognosticum.	233
satyrium facere satyriasm.	245	serpentes quibus fugentur.	116
satyriasis in quo differat a priapismo. 246. cura.	246.	serpentarij imago aduersus venena.	112
ibidem.	246.	serum lactis in qua quartana conueniat.	188
scammonium.	94	siccitatem densare.	45
scarificationis crurum utilitas.	87	Sigismundus de Capitiibus Listę phlegmone renum extinctus.	243
scarificatio crurum in pestilentibus febribus.	170	signa quibus morbus laxus in insensibili vacuatione constitutus cognoscitur.	73
scarificationem crurum ex Galeno esse vicariam rene sectionis.	87	signa pathognomonica febris ardentis.	149
scarificationis crurum utilitas maxima in pueris.	87	signa febris synochę.	148. 149
scarificatio crurum pro mittendo sanguine in febribus.	156	signa optima in febribus continuis.	15
scetica febris.	193. 195	signa pessima in febribus continuis.	150. 151
seilla utilitas ad suspiriosos.	346	signorum in febre pestilenti ratio.	168
scirrhosis quomodo in visceribus gignatur.	350.	signa febris pestilentis.	168
quibus cognoscatur. ibidem.	350.	signa virium languorem in febribus denotantia.	151.
scirrhosis quibus signis deprehendatur.	350.	signa lethalia in febribus.	151
scopi duo solummodo promittendo sanguine a Methodicis obseruati.	86	signa phlegmonum.	210. 211. 212.
scotoma quid sit.	325	signa exitium phrenitidum.	217
secta Methodica. lege. medicina Methodica.		signa phlegmonum in partibus sensu destitutis ex-citatarum.	213
		signa saluis in septo transversus inflammato.	233
		signa	

INDEX.

signa pleuritidis.	227	sputa incrassantia.	277
signa pulmonae.	231	sputa attenuantia detergentiaq.	277
signa lienis phlegmone vexati.	235	stellæ maris vis aduersus venena.	112
signa ilei inflammati ex Galeno.	237	stibij preparari facultas purgatoria.	96
signa utriusq. inflammati.	247	stillicidia aquæ tepidæ ad dolorem capitis.	197
signa febris tertianæ nothe.	178	stiptica in dolore capitis inutilia.	198
signa febris quartanæ.	184	stomachus à quibus doleat.	310.
signa febris quotidianæ.	190	stomachi vomica cognitio.	266
similia an similibus conseruentur vel à contrariis.	68.	stomachus ulceratus quibus signis deprehendatur.	284
sinapismus qua ratione ulceribus antiquis conueniat.	33	strabismus.	335
sinapismus quomodo conueniat in curandis ulceribus.	35	stranguriæ causæ, & signa.	375
sinapismus ad suspensiosos.	346	Stratonis suffumigium ad fugandos serpentes.	115.
singultus quales in phreniticis.	217	succus sanuigræci quomodo paretur.	230
singultus in febribus quibus tollatur.	203	sudorum cognitio, & qui in febribus lethales sunt.	152.
siuim humores concitantes.	348	sudores in purulentis seu vomiciis quales fiant.	262.
sitis quæ laxa & quæ adstricta passio sit.	201	sudor qui criticus, & qui symptomaticus.	384
situm in febribus quæ tollunt.	201	sudor qui sit cohibendus.	384
siuim quæ demulcent.	202	sudor immoderatus quibus auxilijs suppressatur.	384.
sitis causæ in febribus, & curatio.	201	sudoris profluvium quæ cohibeant.	385
sitis cognitio ad prognosim.	151	sudores copiosi inutiles qui.	56
sitis mali.	152	sudor in corporibus quibus moueatur.	131
situm varium partium exulceratarum non mutare curationem.	64	sudorem mouentia quæ.	100
somnus quid 190. & quomodo gignatur.	199	sudorem mouentia in febribus.	177
somniculosi qui.	199	sudor quibus modis excitetur.	250
somni humiditatem esse propriam.	199	sudores quibus cohibeantur.	207
somnus conferens sanitati.	127.128	sudorum ratio in febribus quartanis.	184
somnus malus.	127.128	sudor in febre tertiana nothe quibus moueatur.	102.183.
somnus lethalis.	151	sudores quomodo moueantur, & quibus medicamentis.	100
somnum conciliantia.	204.205	sudoris causæ ex Galeno.	100
somnum laxare.	79	sudorem omnem à calore moueri.	100
somnus qua ratione sudorem moueat, & euacuet.	79.	sudoris solita euacuatio cohibita quos morbos faciat.	367
somnolenti quibus praesidijs excitentur.	199	sudorifica interna, atq; externa, quæ.	99
Soranus Ephesius medicus Methodicus.	3	sudorifica sicca quibus conducant.	100
smaragdi vis contra venena.	112	sudorifica humida quibus malis conueniant.	100.
spirabile intro forasq; esse totum corpus.	364	sudor in tina quomodo moueatur.	100
spirationem esse duplicem, scilicet, quæ per os & nares fit, & quæ per cutis meatus.	363	sudorifica cur in paralyticis non conueniant.	325.
spiritus vitales quibus à causis exoluantur.	382	sudorifica ad febres tollendas.	164
spiritus extendens & vrgens & obscurus, & stertorosus lethalis.	151.	sudorificum ad finiendam febrem.	181
sputum sanguinis quas partes læsas denotet.	390	sudorificum hydropoton vocatum.	181
sputum sanguinis cum iussu non semper à partibus respiratorijs fieri, sed aliquando ex sanguine destillante à capite ad guttur.	415.	sudorificum decoctum.	101
sputi sanguinis curatio.	415.	sudorificum ad phlegmonas omenti, mesenterij, atq; pancreatis.	241
sputum in pleuriticis, quale bonum, & malum.	228	Sudorifica quæ in Febre pestilente.	171.173
sputorum in morbis consideratio, & ex ipsis quæ meriem significant.	153	sudorificorum vsus ad quotidianam.	192
sputa purulenta quibus signis cognoscantur.	281	sudorifica ad quartanam tollendam.	188.
		sudorifica	

INDEX.

sudorifica per plures dies cur in Podagrico morbo antiquo non conueniant.	297	tamarindorum pulpa.	93.
sudorificorum vsus in podagra qualis sit utilis.	297.	tabidis heceticis medicamenta actu frigida conuenire.	51.
sudorificorum usus quomodo conueniat in antiqua ta podagra.	298	tempora morbi distingui à temporibus nature.	28.
sudorificorum vsus vtrum possit fieri non progressa exquisita totius corporis & euacuatione & purgatione in Podagra.	298	tempora morborum an indicet curationem, & quomodo indicent.	28
suffusus sudorifici.	101	tempora morborum curationem indicare.	34
suffusus in febribus pestilentibus.	170	tempora morbi curationem indicare.	7
suffusus, qui fugant serpentes, reptiliaq;.	115	tempora morborum uaria presidia indicare.	29.
suffumigia ad fugandos serpentes ceterasq; feras venenatas.	115	temperamenti corporum varietas quid in medicamentis euariet.	60
suffusus ad mouendos menses.	374	Terræ lemnis facultas contra venena ex Galeno.	113.
surditas in febribus quid notet.	151	tertianarum febrium cognitio atq; curatio.	175.
suppuratio quid sit.	256	& 176.	
suppuratio quid sit, & à quibus causis fiat.	257	Tertiana febris nothæ cognitio.	178
suppuratio quando sit speranda.	259	Tetanos quid.	335
suppurations signa.	259	Themisonis medici Methodici cognitio.	39
suppuraciones externe, atq; interne quibus signis cognoscantur.	259	Themisonem Laodiceum Syrium fuisse sectæ Methodicæ auctorem.	2
suppurations ex stentis signa.	259	Themison sectæ Methodicæ inuentor quando in medicina claruerit.	5
suppurations umbilicum esse terminum.	258	Themisonem fuisse, quem Dioscorides scripsit rabie affectum non interijisse.	5
suppuratorum sudores & alia signa.	262	Themison de deambulationis commodis, & quomodo facienda.	81
suppuraciones, quæ in capite fiunt.	263	Themison quæ ad insaniam laudauerit.	339
suppurations in cerebro, in auribus, in gula quæ factæ sunt cognitio.	263	Themison quid de phlebotomia in paralyti senserit.	324
suppurations, quæ fiunt in thorace, cognitio.	263. 264.	Theophrastus de venenis.	109
suppuraciones quæ in stomacho sunt, quibus signis innotescant.	265	Theriacam, si optima sit, omnibus demorsis à vi peris mederi.	41
suppurations in renibus factæ signa.	242	Theriaca Diatesaron.	114
suppurations futuræ signa.	274	Thessali Tralliani Methodici cognitio.	3
suppurent quæ medicamenta.	274	Thessalum Trallianum Methodicam medicinam perfecisse.	2
symmetriam qualitatum atq; humorum mutari à recessu clausionis, & aperitionis meatuum, demonstratur.	13	Thessali medici quot fuerint.	2
symmetriam meatuum conseruantia & destruentia.	119	Thessalos medicos quatuor fuisse.	3
symmetria meatuum vitata morbum facit.	108.	Thessalus Hippocratis Coi medici filius.	3
Synanche.	225	Thessalus Trallianus, qui Medicinam Methodicam perfecit.	3
syncope in quo differat à lipothymia.	382	Thessalus quomodo sanitatem atque morbum definierit.	11
synopes signa propria.	382	Thessali arrogancia atque in medicina auctoritas.	2
syncope quid sit.	382	Thessalus voluit à tempore morbi curationem indicari.	28
syncope quæ auxilia requirat.	384	Thessalum voluisse antiqua vlcera esse renouanda.	24
syncope oppressi quomodo curentur.	384	Thessalus utebatur in vlcere antiquato sinapismo.	103
synopes cognitio, & curatio.	205	Thrasys Mantinensis in venenorum cognitione peritus.	109
synochi cognitio.	148		
T.		Thucydides	
Tabe qui affectus comprehendantur.	280		
Tabida febres quæ.	261		

I N D E X.

<i>Thucydides de peste quæ olim Athenienses inuasit.</i>	166	<i>Venarum ruptionis, apertionis, erosionisquæ signa.</i>	386
<i>timorem vehementem maxime facere ad profuuium sanguinis cohibendum.</i>	392	<i>venerearum utilitates ex Galeno & Rufo.</i>	85.
<i>timor vehemens cur quartana oppressum iuuet.</i>	185.	<i>veneris vsus quæ faciat.</i>	127
<i>tortum quid.</i>	237	<i>veneris vsus intermissus homines quibus malis afficiat.</i>	379
<i>transpirationis causæ, & utilitas.</i>	363	<i>venerem deperditam excitantia.</i>	380
<i>transpiratione sola quæ animalia viuunt, & quæ respiratione etiam conseruentur.</i>	363	<i>venenorum præseruationem haud tutam haberi.</i>	109.
<i>tremores lethales.</i>	151	<i>venenis quæ aduersentur.</i>	112
<i>tremores in phreniticis lethales.</i>	217	<i>venenum quibus modis innoxie per os assumi queat.</i>	109
<i>tremoris cognitio, & curatio.</i>	337	<i>veneris vsus quibus utilis.</i>	85
<i>trismus.</i>	335	<i>venter a quibus doleat.</i>	310
<i>tumores molles indolentes.</i>	248	<i>ventrem subducentia.</i>	201
<i>tumorum internorum cognitio.</i>	249	<i>ventrem cohibentia.</i>	207
<i>tumorum exitus varij qui.</i>	249	<i>ventris dolores antiquatos tolli veratro albo per os exhibitio.</i>	311
<i>tumorum curatio.</i>	249. 250	<i>ventriculi phlegmones cognitio, & cura.</i>	236.
<i>tumores, qui in hypochondrijs, cur facilius & citius suppurentur.</i>	257	<i>ventriculus ulceratus quibus cognoscatur.</i>	284.
<i>tumores, qui iuxta umbilicum & infra fiunt, cur tarde suppurentur.</i>	257	<i>ventris profuuium quibus cohibeatur.</i>	405. & 406.
<i>tumor in mesenterico quomodo cognoscatur.</i>	240.	<i>ventris profuuium quomodo ex Galeno, Hippocrate, & turbet vsum euacuationis sanguinis.</i>	414.
<i>& in pancrea.</i>	ibid.	<i>ventos austrinos plurimum facere ad concitandas febres pestilentes.</i>	167
<i>tumor in omento quomodo cognoscatur.</i>	239	<i>Veratrum sturnis cibum, & hominibus venenum esse.</i>	40
<i>tumoris in pancrea cognitio.</i>	240	<i>vertiginis cognitio & curatio.</i>	326
<i>tumor in angina quid notet.</i>	225	<i>vertiginis cerebro primario leso, & per consensum signa.</i>	326
<i>tumores qui suppurentur.</i>	240	<i>vesicæ phlegmones cognitio, prognosticum, atq; curatio.</i>	244
<i>tumores externi an admittant vsum adstringentium.</i>	66	<i>vesicæ vomica cognitio.</i>	267
<i>tumores malignos non admittere vsum adstringentium.</i>	66	<i>vesicam lesam qualis vrina denotet.</i>	329
<i>turbat.</i>	99	<i>vesicæ doloris cognitio.</i>	315
<i>tussis differentia & causæ.</i>	343	<i>vesicæ vlcera quibus cognoscantur.</i>	286
<i>tussis an sit morbus laxus, vel adstrictus, vel mixtus.</i>	343	<i>vesicæ calculis vexatæ cognitio.</i>	354
<i>tussim non semper denotare passionem partium spiritualium.</i>	390	<i>vesicantia an conueniant in febribus pestilentibus.</i>	173
<i>tussis in hydropse cur sit signum exitiale.</i>	252	<i>vesicantium vsus ex cantbaridibus non esse tutum.</i>	334
<i>tussis remedia.</i>	344. 345	<i>visus ratio qualis in morborum temporibus sit instituenda.</i>	30
<i>tussim sedantia.</i>	200	<i>visus ratio in febribus continentibus.</i>	154
	V	<i>visus ratio in febre tertiana notata.</i>	179
<i>Valde frigida in capitis dolore fugienda.</i>	198.	<i>vigilia quid.</i>	198. 199
<i>Valens siue Vectius Methodicus.</i>	4	<i>vigiles qui.</i>	199
<i>Valentem medicum Messalinæ C. Cæsaris in adulterio deprehensum ad supplicium ductum fuisse.</i>	4	<i>vigiliarum siccitatem esse propriam.</i>	199
<i>vectiones quibus utiles.</i>	83	<i>vigiliarum causæ.</i>	199
<i>venatio quotuplex sit.</i>	83	<i>vigilantes esse interius frigidiores & exterius calidiores.</i>	
<i>venationis interrestris utilitas & ad quos affectus.</i>	83		
<i>venatores solos in quadam pestilentia ex Rhasi seruatos incolumes.</i>	83		

INDEX.

<i>Ediores.</i>	127	<i>vlcus a rei natura indicat ipsum cicatrice clau-</i>	
<i>Vigilię utilitas.</i>	127	<i>dendum.</i>	32.
<i>Vigilię vsus ratio.</i>	127	<i>vlcus cacoethę ex Methodicis pro curatione ef-</i>	
<i>Vigiliam laxare.</i>	79	<i>se renouandum.</i>	32
<i>Vigilia quomodo ex accidenti morbum adstrictum</i>		<i>umbilicum esse terminum suppurationum.</i>	258
<i>faciat.</i>	79	<i>unguentum Nestoris ad quartanam.</i>	189
<i>Vigilia quando morbus adstrictus.</i>	205	<i>vomicarum cognitio.</i>	256
<i>Villanovanus de medicamentis ad quartanam.</i>		<i>vomicę existentis signa.</i>	259
<i>188.</i>		<i>vomica quas partes corporis vexare soleant.</i>	
<i>Vini vsum quę prohibeant in febribus.</i>	163	<i>258.</i>	
<i>Vinum prohibentia quę.</i>	206	<i>vomicarum omnium prognosıs.</i>	270
<i>Vinum in quibus febribus, & quando conueniat.</i>		<i>vomica quę salutaris, & quę lethales.</i>	270, 271.
<i>169.</i>		<i>vomicę quę pessime.</i>	271
<i>Vinum melitibus ad quotidianam.</i>	192	<i>vomicarum in pulmonibus, Thoracis cavitare vel</i>	
<i>Vinum medicatum ad quotidianam.</i>	192	<i>in diaphragmate existentium cognitio.</i>	265.
<i>Vinum posse a venenatis bestijs venenari.</i>	111	<i>vomica seu collectionis in stomacho signa.</i>	265.
<i>Vinum, in quo serpentes fuerant mortui, auxilio</i>		<i>vomica in ventre & pyloro signa.</i>	265
<i>fuisse febribus tertianis chronicis vexatis.</i>		<i>vomica in hepate cognitio.</i>	265
<i>111.</i>		<i>vomica per quas vias expurgentur.</i>	276
<i>Violarum puluis ad febres tollendas.</i>	181	<i>vomicas per vinam aliquando purgari.</i>	276
<i>Viperas vino ex Aristotele declarari.</i>	110	<i>vomicarum in intestinis cognitio.</i>	267
<i>Vinum languorem quę notent.</i>	151	<i>vomicę seu collectionis in renibus, in vesica, atq;</i>	
<i>Vite periodi varietatis in hominibus ratio,</i>		<i>in vtero cognitio,</i>	267
<i>117.</i>		<i>vomica eruptionem adiuvantia.</i>	275, 276
<i>Vlcera cacoethia quando solo sinapismo sanantur,</i>		<i>vomica in quibus partibus chirurgia curari pos-</i>	
<i>& quando purgatio totius corporis medica-</i>		<i>sint, & in quibus non.</i>	273
<i>mentis Catharticis molienda addenda sit.</i>	36	<i>vomicarum curandi scopi.</i>	273
<i>Vlcerum cacoethium cause.</i>	36	<i>vomitus quales in iliaca passione fiant.</i>	238
<i>Vlcerum cacoethium curatio.</i>	36	<i>vomitus prauı.</i>	153
<i>Vlheris malignitas an indicet curationem.</i>	36	<i>vomitum in morbis adstrictis omnibus prohibe-</i>	
<i>Vlcera antiqua pro curatione esse renouanda Thef-</i>		<i>re magna laxantia, praesertim phlebotomia,</i>	
<i>salus vult.</i>	34	<i>atq; pharvaciam.</i>	414.
<i>Vlcera antiqua quomodo a Methodicis curabuntur.</i>		<i>vomitus quando in tertianis febribus excutandus</i>	
<i>339.</i>		<i>& quibus.</i>	180.
<i>Vlcera antiqua Libiorum incisione tolli, & quomo-</i>		<i>vomitum mouentia 95. & 177. & 180.</i>	
<i>do eadem a sinapismo inueniuntur.</i>	33	<i>vomitum inuuantia.</i>	277
<i>Vlcerum partium iborace contentarum cognitio.</i>		<i>vomitum quę sistant</i>	207. & 403.
<i>281.</i>		<i>vomitum quę moucant.</i>	376
<i>Vlceratorum pulmonum signa.</i>	281	<i>vomitoria in quotidiana.</i>	190
<i>Vlcerata tracheę arterię signa.</i>	281	<i>vomituum vsus in quartana febre.</i>	186
<i>Vlcera cacoethia cur diuturna Thessalus appella-</i>		<i>vomitus sanguinis cognitio. 389. curatio. 389.</i>	
<i>uerit.</i>	34	<i>vretica ad febres tollendas.</i>	168.
<i>Vlceratarum internarum partium cognitio.</i>	284	<i>vretica medicamenta.</i>	59
<i>Vlcerum internorum curatio.</i>	285	<i>vrinę, & facies in phreniticis quales lethales sint.</i>	
<i>Vlcerum in pectoris partibus curatio.</i>	282	<i>217.</i>	
<i>Vlcera pulmonis cur difficillime coalescant.</i>	391	<i>vrina male, & quę exitium denotent.</i>	152.
<i>Vlcerum pulmonis prognosticum.</i>	391	<i>vrina ictericorum.</i>	353
<i>Vlceratorum pulmonum prognosticum.</i>	281	<i>vrinę in renum phlegmone quales.</i>	241.
<i>Vlcera pulmonum & aliarum pectoris partium</i>		<i>vrina in febre quotidiana.</i>	190
<i>detergentia.</i>	282, 283.	<i>vrina in febre quartana.</i>	184
<i>Vlcera pulmonum & asperę arterię lapide bę-</i>		<i>vrina suppressa vel non commode exeuntis cogni-</i>	
<i>matite ex Tralliano fuisse sanata.</i>	63	<i>tio.</i>	375
<i>Vlceratorum renum, vesicę atq; vteri curatio.</i>	286	<i>vrina, quę vesicam laesam ostendit.</i>	399.
<i>Vlcera aliquando in corporibus esse conseruanda.</i>		<i>vrinę suppressę remedia.</i>	375
<i>368.</i>		<i>vrinam mouentia medicamenta.</i>	375
		<i>f</i>	<i>vrinam</i>

INDEX.

vinam mouentia	130. & 177. & 204.	cataplesi, apoplexia, atq; Epilepsia.	359
urinalia medicamenta.	98	uteri prefocatio ex retento semine in quo differat	
urine profluuium non fieri à renum affectu inflā		ab ea, que fit à mēstruis retentis.	359
matorio.	407	uteri prefocatio quibus tollatur.	360
urine profluuij cause.	406.	ura & glandularum phlegmone, & curatio.	223
urine suppuratos sanari.	279	vulnus venenatum diu apertum esse seruandum,	
uteri doloris cognitio.	315.	neq; statim claudendum cicatrice.	43
uteri phlegmones cognitio. 247. prognosticum &		vulnus à cane rabido statim non esse claudendum	
curatio.	ibidem		43.
uteri vomice cognitio.	267		
uteri strangulatus cognitio.	358	Ysaac ad quartanam quando, & cum quibus	188
uteri prefocatio quibus distinguatur à syncope,		propinaret theriacam.	



1610. Die XIV. Maij.

Priorem partem Medicinæ Methodicæ, mira eruditione refertâ, quâ
Excellentissimus D.D. Prosper Alpinus, Philosophiæ & Medici-
næ Doctor, admirabili ordine, & singulari Methodo contextuit,
& composuit; cum iam ego Fr. Ambrosius Pat. Ord. Eremitarû
Sancti Augustini in Sacra Theologia Doctor, & Magister, omni
diligenti studio, legendo euoluerim; nil in ea, quod vel esset con-
tra fidem Catholicam, aut repugnans determinationibus Sancto-
rum Patrum, & Sacrorum Conciliorum; siue ob nubilan, aut deni-
grans bonos piorum mores, offendi, ideo iudico dignam, vt in
publicum euulgetur, ac Typis mandetur. In quorum fidem, &c.
Idem qui supra manu propria.

Qua stante attestatone Reu. P. Inq. concedit vt Imprimantur.

Fr. Zaccarias Inquisitor Paduæ.

Octavius Liuellus pro Sereniss. Republica Veneta.

Adi XXI. Maggio 1610.

L'Illustriss. Sig. Podestà hà concesso che sia
stampato il sopr. libro.

V. Canc. Præt.

Errata sic corrigenda.

Pag. 1. lin. 1. lege apponebant

36. Artaxerxis

3. l. 3. expeditam

4. l. 18. laxantibus

24. Iulianus

8. l. 30. rerum

35. Thales

37. atq; meatibus

46. *συναρπυεδος*

διανγυεδος

46. decetnq;

p. 15. l. 39. humiditatem

17. l. 2. laxos

6. quæ

12. pumens

15. transpirationes in-

tercepte

17. euacuatio, vel

17. confusa

22. immoderatus

23. aucti

38. tam

38. posita

39. parentia

52. perferuari

p. 18. l. 26. poros aperiant

exhibentes

40. Multæ

24. 25. colligatione

27. vel quib' manifestè

30. obieratur

33. iudicatorum, quo

febris, aut dolor, si ad

sint, aut omnino tol-

luntur, aut magna ex

parte leuantur

35. ægrotanti

37. ægroti

40. plura

p. 21. l. 43. induratum

43. humectet

p. 22. l. 19. rarefacientia

fluxum

22. hydrelcum

51. in vitro

23. l. 4. at

30. que

36. non errare

43. medicamentis

p. 24. l. 8. parum

25. noluerunt

p. 25. l. 4. decocta

9. scilicet ex

9. ipsos

10. Itaque

14. denique ex

17. quis reprehendere

31. esse

p. 27. l. 8. hæmorrhagiam

11. profluat vt corpus

p. 28. l. 34. at morbi

p. 29. l. 44. vt scripsumus

48. abre

p. 30. l. 10. & 11. aqua, in quatri-

ticez

p. 31. l. 10. notitiam

11. in eundis

p. 35. l. 2. non posse

33. fiunt

36. fi cacoeth.

p. 36. l. 5. non putant

51. enemis

p. 38. l. 13. sepius fluxu tolli

p. 39. l. 14. defendatur

25. intertinguerur

32. laborantibus, ferrè

40. l. 18. aues

37. uuentur

39. ab eodem

43. l. 38. chalafticorum

43. prophylactica

p. 44. l. 9. hominis

13. frigidos humidos

25. similitum existunt

43. indicandum

p. 45. l. 13. Methodici

46. l. 44. & non minus

47. l. 45. caloris

p. 48. l. 3. exalidis, sonchi,

49. l. 27. concocta

35. ptant

50. l. 30. solent

52. l. 12. imminet

37. frigidam

p. 53. l. 16. humidam

55. l. 13. morbi

45. tenuissimis

57. l. 9. quale nam

33. ac

45. inflammatione

59. l. 4. indicat esse

60. l. 52. cutis

61. l. 31. familiaris

63. l. 30. essentia

64. l. 4. curandis

65. l. 3. neque Dogmatici

66. l. 2. medicamentorum

digerentium

p. 67. l. 9. lædatur

68. l. 3. videntur

70. l. 5. dysenteria

74. l. 13. reperiuntur

15. obleruantur

p. 76. l. 35. lapathi

77. l. 34. reliquerit

78. l. 17. maltichina

80. l. 17. sphæriticam

34. pancratium

49. diu

81. l. 8. apotherapepticam

13. habeat

14. incedendum

82. l. 20. recte

35. virgenter

p. 84. l. 6. torpescetena

14. quia hæ

15. damnandæ

34. ferè

36. vitellinæ

p. 85. l. 6. tertianæ chronice

p. 87. l. 24. scarificationem

36. scarificatis

88. l. 17. proximam

30. occipite

34. cum flamma

35. flatum

49. vomitoria

p. 89. l. 29. rosis

92. l. 11. aloem

11. succum

elaterium

93. l. 28. 29. lauunt

31. ad

94. l. 45. calidum secundo

95. l. 4. adstricta

20. enicus

96. l. 2. assidue

3. rumpuntur

36. vero

37. assumptam, crassam

97. l. 14. anagalidis

21. pyrethri 3. j.

21. ana.

25. bryoniæ

p. 98. l. 5. helenij

5. violæ decoctum

33. rotundi ad 3. ij.

42. liliaceum

p. 99. l. 13. inflectionibus

14. pellis

100. l. 22. cum humiditate con-

iuncta

101. l. 7. an.

20. vnc. viij.

24. vnc. iij.

24. vnc. ij.

25. vnc. ij.

28. añ.

29. añ.

33. vnc. vi.

103. l. 4. Archigene

1. 18. 23. caricarum

1. 20. 2. 6. caricis

104. l. 25. 26. añ.

25. pulu.

108. l. 12. Methodici cognoscit

109. l. 12. in margine medica.

3. in margine plant.

14. iudicabimus

111. l. 39. conducerat

113. l. 9. artemisiam

20. euporiston

33. accipe

115. l. 4. phu minor

9. ex triphylli

10. viticis

15. fidant

116. l. 47. hypericum

117. l. 40. seruantes

122. l. 26. causas

123. l. 40. mictio

124. l. 13. quæ consistit

129. l. 52. de arthanita

130. l. 6. mictionem

133. l. 4. excitato

11 concinnitas

135. l. 22. ex quo comprehen-

ditur contra

141. l. 22. curationem

30. colligantes

143. l. 26. moerore

46. calx viua

144. l. 46. acris

145. l. 29. balneo

29. temperate

147. l. 4. innotescant

151. l. 45. præside

152. l. 7. Philisco

43. nigras

44. mutatas

153. l. 14. deficientes

154. l. 45. modico

156. l. 26. aduertissent, & delea-

tur ista parenthefis

157. l. 42. porum

158. l. 9. obstructionem

159. l. 32. epota

160. l. 18. p'syllij ex aqua

29. inieciuntur

43. 3. ij.

161. l. 5. apertioneq.

20. curationi

33. insuauem

34. hydrelcum

162. l. 3. eruditi

17. scripsit

35. fiant

164. l. 2. sanguinis

165. l. 13. non crudo

19. vnc. j.

31. epidemice

43. calefacto

166. l. 46. malignas

167. l. 3. acrem

168. l. 13. veneris

169. l. 32. studendum erit

45. atque in

170. l. 13. ladani

39. sine

171. l. 42. scordeo, galega,

172. l. 8. fescunciam

18. ab actu frigidis

19. quæ

25. carpi

30. 3. j.

48. commendauerimus

29. quam nostram

174. l. 4. dele odorati

175. l. 17. quotidianæ

177. l. 8. diureticis

14. dele candido

47. potionem

179. l. 19. dabimus

180. l. 18. 3. ij.

181. l. 25. ammeos

32. Panacea

37. l. quiritæ

47. cit decoctum

183. l. 37. ipsam

43. octocopodes

184. l. 40. crassitie

52. facere

185. l. 9. febris

28. parandum

31. calidus

186. l. 7. oligophorum

6. vnc. j. s.

- 187.l.15. diacatholiconis
11. vnc. femis.
188.l.20. asarum
40. sagapeni, añ. 3. femis.
189.l.19. 3. iij.
21. ambaris
21. lib. femis, misce
191.l.2. oxy melitis
7. 3. iij.
8. 3. ij.
193.l.11. coriannis
194.l.18. indi cat
199.l.39. oxyrhodinum ex
200.l.7. decoctum assumunt
39. acetarijs
202.l.25. argenteo
32. colorem
34. adstrictam
203.l.32. aut fonschus
204.l.2. hermodactyli
207.l.20. fecus sit
45. melpila aronia fices,
46. immatura
209.l.21. partes
218.l.38. coronalea
45. illorum
223.l.17. Balnea
226.l.44. fenugrecum
227.l.8. hac
228.l.27. versicolora
229.l.51. lini
233.l.2. ab
235.l.8. endiuiz
- 237.l.3. excernuntur
238.l.16. laxatorius
præmittetur
29. express. eq.
239.l.29. similior
34. committunt
240.l.3. citra
29. non raro
49. si hæ apæ
241.l.5. agrimonij
26. clunium
29. venas
242.l.15. defertur
20. si fiat
20. renibus
244.l.6. clunes
24. puris
38. chamemelo
42. horæ
48. croco
49. capitibus
245.l.4. duxerunt
7. sanandas
26. alacritas
30. qui
32. figurat
33. inexplabilem
33. appetitum
36. autem
46. albam
246.l.34. perfecta
247.l.18. caulam
36. abortu
- 248.l.47. aliarum
249.l.21. varij
251.l.24. passionis
252.l.26. generetur
254.l.7. apium
37. inustiones
258.l.24. At nos
259.l.47. præsentem
50. externarum
260.l.6. grauitas
16. febres
261.l.11. citra horrorem
265.l.23. fluctuatione
267.l.47. punctura
268.l.13. excretioni
14. patente
270.l.8. hæ
271.l.32. pleuriticam
275.l.15. vetere
24. lib. mediam
277.l.3. permeans.
8. hac
278.l.9. rumpatur
10. per alium
18. feminum
34. externis sectione
280.l.17. aspera
281.l.42. Veruntamen
282.l.52. radicem iridis
285.l.23. rhus
294.l.14. hanc
28. quidam
295.l.17. calorem
- 295.l.24. iunctæ sunt
297.l.26. posteaquam
300.l.40. externa
301.l.34. factis
306.l.21. ex accidenti
46. occiput
309.l.6. succida
311.l.35. piera
313.l.2. cibi
330.l.24. opinione
333.l.6. purgabantur
337.l.31. phreniticos
338.l.16. est ei
339.l.2. passionem, furentemq;
341.l.24. præsertim ex
344.l.20. in portione
21. dissolutum est
350.l.20. extantiarum
23. similis
352.l.45. si ob
353.l.29. intendatur
364.l.3. transpiratione
10. graui
49. stygno
365.l.24. subitam
379.l.22. plurimo
40. simulque
380.l.3. vltus abstinent
390.l.43. figura
402.l.37. concrementati
404.l.18. semicocta
410.l.42. in morbo fluido hæc
410.l.24. phlegmones



I

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER PRIMVS.

*De varijs medicina sectis, ac de Methodica origine atque
auctoritate. Cap. I.*



E medicina Methodica scripturo, ab eo exordiri libuit, quod ipsa medendi ars primo ortu, rudis, atq; incultra, posteaq; ruditate expurgata sensim varijs temporibus à multis variè cognita, in diuersas sectas fuit diducta. Etenim, vt plerisque persuasum est, primum Chiron Centaurus, cuius nomen in centaureo herba etiam viuit, caput herbarum vires in syluis obseruare, deinde ab ipso Æsculapius, aut sicuti Macrobio visum est, non ab ipso, sed ex Apolline eius parente herbariam medicinam didicit, Neque vero non Cadmus Agenorides Phœnicum Rex, vel Samotrachum nati, herbas heroico illo æuo cognoscere cœperunt: Assirij vero, & Ægyptij, ac aliarum nationum populi, qui sine medicis vitam ducebant, egrotos omnes in forum efferentes, ab ijs, qui tunc aderant, & multa ægritudinum remedia, & curationes, quas fuissent experti, sciscitabantur, & demum in tabellas descripta, in Æsculapij vel aliorum Deorum templis, vt medicamentorum vsus omnibus innotesceret aponebant. Quod a Romanis factum toto illo tempore legimus, quo Archagatum magni nominis medicum Li sania filium Romam à Peloponesso profectum, itemq; alios complures Græcos medicos, Romani ipsorum crudelitate fastiditi (M. Catone auctore) nedum Roma sed ex tota Italia expulerunt. Annis fere sexcentis hi (vt Plinius est auctor) sine medicis vixerunt. Ex ijs itaq; liquido constat, medendi artem primum in obseruatione, & historia fuisse constitutam. Hinc quæ primo floruit secta Empirica fuit appellata, ipsamq; Græci *τηρητικήν*, scilicet obseruatricē, atq; *μνημονευτικήν*, idest, memorem dixerunt. Hæc concursu signorum ægritudines agnoscit, medicamentorum vtilium, atq; expertorum obseruationem considerat, ac ab expertis cognitisq; ad non cognita, attramen similia transitum facit. Perperuo apud omnes nationes hæc medicinæ secta claruit. Post ipsam Dogmatica siue rationalis florere cepit, quam Græci *λογματικήν*, & *ανελογιστικήν* nominarunt. Hanc Hippocrates Cous à Crotoniensibus medicis, & Cyrenaicis (penes quos medicinam olim maxime excoltam floruisse Herodotus est auctor) fortasse acceptam (cum ipse post illos, si Artaxercis Persarum Regis ætate vixit, quod ex epistola ad ipsum regem scripta conijcitur claruerit) perfecit, ac maxime excoluit. Hæc corporis, quod curatur, naturam considerat, omniumq; effectricium causarum vires, quibus corpus cum salubrius, tum insalubrius redditur, scilicet & aeris, ex cælo, regione, anni tempore, constitutione, naturam, & locorum aquarum, potuum, ciborum, consuetudinis vitæq; studij non minus animaduertit, itemq; omnes morborum causas, atq; remediorum facultates. Hanc Græci, atq; complures alij aliarum Nationum populi perpetuo in magno honore habuerunt. Nuncvero ybique locorum primatum obtinet. Demum alia quoq; secta medendi

In 1. Saturnal.

Homer. 4. Iliad.

*Strabo lib. 3. &
lib. 15*

Herodotus lib. 3.

*In lib. 3. ubi de
Dario Persarum
Rege à Democra-
te sanata.*

A

dendi

De Medicina Methodica

2

dendi, clarere cepit, scilicet Methodica appellata, cuius Themisonem laodiceum Syrium auctorem faciunt, qui (ut aiunt) ab Asclepiade rationali occasionem nactus ad Methodicem se contulit. Hæc quasdam tantummodo communiter agnoscens, ab ipsis per contraria curatiua indicationes elicit: Dogmaticorum omnia fere præcepta spernens, haud corporis quod curatur, naturam, vel ullam effectricium causarum agnoscit, ætatem, consuetudinem partes læsas non considerat, eodemque modo & morborum causas. Quæ tamen si verum fieri velimus Romæ & ante Claudium Neronem Imperatorem, ac ipso etiam imperante (quo tempore Thessalus Methodicorum princeps maxime claruit) vsque ad Antonini Pij imperatoris ætatem, atque amplius etiam ceteris alijs medicinæ sectis maxime præualuit. Thessalus ad Neronem principem epistolam misit, in qua hæc legebantur: Cum nouam sectam condiderim, & quæ sola vera sit propterea quod, qui ante me fuerunt, omnes nihil vile prodiderunt, vel ad sanitatem tuendam, vel morbos propulandos. Plinius vero non Thessalum, sed Themisonem istius sectæ, ac vel etiam Vectium Valentem auctores fecisse visus est. De hoc ita habet, Exortus deinde est Vectius Valens adulterio Messalinæ Claudij Cæsaris nobilitatus, pariterque eloquentiæ affectator, is eam potentiam nactus nouam instituit sectam. De summa vero Thessali supra omnes medicos auctoritate hæc subdidit. Eadem ætas Neronis principatu ad Thessalum transfiliuit, delentem cuncta maiorum placita, & rabie quadam in omnis æui medicos perorantem. Quali prudentia, ingenioque estimari vel ex vno argumento abunde potest, cum monumento (quod est Apia via) iatronicem se inscripserit. Galenus quoque methodicem inter celebres medicinæ sectas adnumerare non est veritus. & in libris de locis affectis ita habet: Ego vero re ipsa & publice & priuatim apud eos videlicet, qui sectam quamlibet à me discere cupiebant, ostendi in omnium sectarum scientia (ne maius quicquam dixerò) me esse postponendum nemini. Ex ijs hanc Methodicorum medicinam plures annos supra omnes medicos, maxime æstimatam claruisse nobis esto persuasum. De qua quidem scribere nostrum est institutum, quam prouinciam eo libentius obeundam duximus quod hæc secta in medendo apud antiquos plurimi fuerit æstimata, & quod etiam hac nostra ætate ipsa planè obsoleuerit. Demum addimus quartam quoque fuisse medicinæ sectam, quam Agatinum lacedæmonium inuenisse auctor medicarum definitionum scripsit. Græci hanc *πρωτοθεραπευτική* quasi super compositiuam dixeris, nominarunt. & Alij hæcticem idest habitricem ceterum ipsius nulla nunc habetur, cognitio.

Lib. 29 cap. 1.

In libro de op.
secta ad Trasylb.
cap. 7.
de 3 li cap. 2.

De medicis antiquis, qui olim in secta Methodica claruerunt. Cap. II.

EX medicis antiquis, hi in Methodica secta claruerunt, quippe Themisonem Laodiceum Syrium qui (ut Plinius scribit) ab Asclepiade rationali occasiones nactus ad Methodicæ sectæ inuentionem se contulit, auctor libri, qui introductio & medicus dicitur, Galeno tributi, confirmat, hanc sectam ab ipso incepisse. Quem fuisse primo Dogmaticum ex C. Aureliano Methodico intelligitur, qui in primo oxæon ubi contra ipsum, ut Dogmaticum primum disputasset, postea subdidit: sed postea ex methodica secta multa bona contulit medicinæ. Hanc Thessalus Trallianus perfecit atque absoluit. At hunc ab alijs Thessalis, qui antiquitus fuerunt, distinguo. Etenim vnus fuit Hippocratis Coi medici filius: quem secundum librum epidemiorum, quartum, atque septimum scripsisse, multorum est opinio: De quo in suo monumento hæc scripta sunt.

Thessalus

Cap. 12.

Liber Primus.

Thessalus Hippocratis Cons genere his iacet,

Phæbi à radice immortalis genitus,

Plurima trophea morborum statuit armis medicinæ Gloriam trahens multam non fortuna, sed arte. Alter fuit, quem Alexandro magno venenum, quo ipse interiit, propinasse, multis creditum est. Demum fuit Thessalus nuper dictus Methodicus, quem Galenus alioquin ipsius hostis perpetuus sæpe meminit. Hic est, qui Neronis principatu cuncta maiorum placita delere studuit, quique tandem in monumento victorem medicorum se ipsum scriptum reliquit. Post hos ex Methodicis fuerunt Mnaseas, siue Mnaseus, Dionisius, Proclus aut proculus, quem C. Aurelianus scribit, fuisse Themisonis sectatorem. Post hos Antipater, quem Galenus Methodicū fuisse tradidit. Olympiacus Milesius, Menemachus Aphrodiseus, Soranus ephesius, Leonides Alexandrinus, atque Archigenes Apameus Syrius. His addunt, Vectium Valentem, quem alij Valentem physicum dicunt, adulterio Messalinæ Claudij Cæsaris (vt ait Plinius) nobilitatum, de quo ait Is eam potentiam nactus nouam instituit sectam, Eudemumque itidem alium (vt Tacitus ait) in adulterio Liviæ Drusi Cæsaris deprehensum, quem Aurelianus Themisonis sectatorem facit. Post hunc fuit Attalus medicus Romanus Thessali sectator, ac Iulianus, contra quem Galenus scripsit disputationem apologeticam. Demum ex Methodicis postremo claruit C. Aurelianus, cuius ex multis litterarum monumentis apud nos extant, solummodo morborum Cum Oxæon, tum Chronion libri. Hosque Methodicos fuisse legimus; De quorum doctrina & auctoritate præstabit, quæ potuimus consequi, in medium proferre, atque à Themisone exordiemur, non ab eo, qui fuit tempore Apuleij, de quo meminit in prima apologia, quem eius mancipium fuisse constat, at à Laudiceo Syrio, qui primo Asclepiadis sectator fuit, atque ab ipso postea ad Methodicem se contulit, hunc Plinius summum autorem vocat. Galenus Hieram Themisonis meminit, & descripsit. Paulus Aegineta & Aetius de ipso perhonorificam mentionem fecerunt. De quo iuuen. ita habet.

Morborum omnegenus, quorum si nomina quaras

Promptius espediam quot amauerit Hippia mechos

Quos Themison agros autumnno occiderit vno.

Thessali vero auctoritas Neronis principatu apparuit maxime conspicua, qui cum Nerone magnam habuit familiaritatem, atque ita alijs medicis præualuit, vt comortus in monumento *εργονικω*, inscripserint, quasi medicorum victorem. Homo non fuit certe sine arrogantia, optarem tamen (ait medicus quidam eruditus) libros eius, quos de communitatibus & Syncreticis scripsit, nunc extrare; nam & ex fragmentis quæ vidimus ab alijs citatis constat, eum fuisse acutissimum atque etiam doctissimum. huius sepe meminit Aurelianus. Dionysium quoque siue sit chirurgicus à Scribonio largo citatus, vel Milesius vel Samius, vel qui scripsit de herbis, vt Plinio visum est, vel demum, qui fuit condiscipulus Heraclidis Tarentini (etenim hi fuerunt omnes Dionysij medici) magnæ inter medicos fuisse auctoritatis vnico hoc intelligitur argumento, quod Galenus, Plinius, Celsus, Aurelianus, atque Aetius perhonorificam de ipso mentionem fecerint. Non minoris quoque eruditionis & nominis fuisse Proculum medicum, quem Prodicum esse aliqui putant, ex Galeno conijcitur, qui ipsum citat, & inter alia litterarum monumenta, de natura hominis scripsisse nobis restatum reliquit. Aurelianus ipsum Themisonis sectatorem fecit. Antipatrum vero Galenus suo tempore Romæ medicinam non sine multa laude fecisse, testatur, & in multis locis ipsum perhonorifice nominauit. Menemachum Aphrodiseum citat Galenus & Celsus. Soranum ephesium, qui (Suida auctore) primum Alexandriam profecit, deinde Romam venit, vbi temporibus Traiani & Hadriani Imperatorum medi-

A 3 cinam

In libro Galeni medico. In 3. Chronion cap. 8.

In lib. 4. hist. In 3. Oxæon cap. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

In lib. 14. hist. nat. cap. 17.

In lib. 8. de comp. med. loc. cap. 3. Lib. 3. cap. 15. Lib. 9. cap. 10. In Satyra.

Galen. in 4. de comp. med. loc. c. 7. in 2. de Antidotis 4. de comp. secundū generæ & 5. comp. secundū locos. c. 7. Plin. li. 20. c. 11. & 20. C. Aure 2. Chron. 13. Celsus li. 6. cap. 6. In 2. diff. feb. c. 6. li. 3. chron. c. 8. Lib. 4. de loc. aff. cap. vlt.

cinam exercuit; librosque multos ac optimos in medicina composuit, virum præclarum fuisse, constat. Aurelianus hunc Methodicorum principem facit. Galenus ipsum in medicaminum cognitione claruisse affirmat: vnde ad ipsum merito complura pharmaca referuntur. Archigenis, qui fuit Apameus Syrius, vt auctor libri introductionis ait, eruditionem ac summam præstantiam Galenus & alij multi medici, qui sæpius ipsum in medicina perhonorifice nominarunt, satis perspectam fecerunt. non minus & Valentem physicum Galenus meminit, & si sit Vectius vel Verus Valens Messaling Claudij Cæsaris vxoris adulterio, (vt ait Plinius) nobilitatus, pariterque eloquentiæ affectator, quem (vt scribit Cornelius Tacitus) adulterij reum & confesum Claudius ad supplicium tradi iussit: Hic tamen erudite multa scripsit. Eudemi medici duo fuerunt, fortasse senior atque iunior; huius perhonorifice meminit Galenus; Atheneus, Aurelianus, qui ipsum Themisonis Sectatorem fecit; illius & Galen. & Theophrastus. De Attalo Galeni contemporaneo ipse faretur ipsum fuisse Sorani Ephesijs discipulum, cui cum Galenus persuadere voluisset, vt Theageni Philosopho Cynico iecoris Phlegmone laboranti, ne ad ipsum iecur exterius nudis relaxantibus vteretur, sed & aliquod medicamentorum adstringentis facultatis laxantibus permisceret, ipsum sic ei respondisse apud Galenum ita legitur: Nisi multum tibi tribuerem nihil horum tolerassem; nam in quibus superiores medici passi naufragia sunt prius, quam vera medicina inuenta à nobis esset, ea mihi veluti ignaro suades. Quibus coniecitur hunc ipsum apud Romanos haud parua fuisse auctoritatis, addo quod admissus fuerat curationi Theagenis philosophi Cinici Romæ pluris æstimati. His additur Iuliani Apollonidis Cyprij (vt voluit Galenus discipulus) quem iidem non parua fuisse existimationis vel hoc vno argumento coniecitur, quod Galenus omnium medicorum (vno excepto Hippocrate) facile princeps, contra ipsum apologeticam disputationem scripserit, atque ipsum etiam Alexandriam profectus personatim conuenerit. Paulus Aegineta & Alexander Trallianus ita illum æstimarunt, vt ab ipso oximel purgatorium paratum & accurate descripserint, & plurimum commendauerint. Demum quid de C. Aureliano Siacensi Methodico dicemus? an non eius qui extant libri morborum cum Oxcon, tum Chronion, ipsum medicum doctissimum, grauissimumque fuisse testantur? qui vt ex ipsius scriptis intelligitur, licet Methodicam sectam mordicus tenuerit, feceritque; etiam medicos dogmaticos præcipuos, illustrioresque præmanibus habuit. Atque hi fuerunt, qui in medicina Methodica varijs temporibus claruerunt.

Quanto tempore secta Methodica inter medicos claruerit. Cap. III.

Certum est (vt nullus antiquorum dubitauit) Themisonem laodiceum medicum fuisse Methodicæ sectæ auctore: vnde ab eo tempore sectam Methodicam claruisse dicemus ad tempora vsque in quibus Galenus claruit, quod ex C. Aureliano facile intelligitur, qui cum in libris morborum Oxcon & Chronion, omnes medicos præclaros cuiusvis sectæ meminerit, de Galeno ne verbum quidem. Quod satis certa coniectura videtur, Galenum post Cælum Aurelianus in medicina claruisse, ni dixerimus eadem ætate ambos fuisse, sed quod Aurelianus in Africa claruerit, & Galenus in Europa, euenisse, neque Galenum Aureliani, neque hunc Galeni notitiam habuisse, ex quo mirum non est, si neque Aurelianus Galenum, neque Galenus Aurelianus in suis scriptis meminerit. At hoc vnum quicquid sit, affirmabimus, sectam Methodicam à Themisonis temporibus inceptam

Lib. 3. de comp. secundum genera. cap. 9.

Lib. 7. comp. loc. cap. 6. & li. 9. c. 4. & 5.

Lib. 2. cap. 1. Lib. 4. hist.

Lib. 1. & 6. med. med.

Lib. 9. ex libris de celeribus.

Lib. 3. Oxcon c. 11. & 12.

Lib. 3. de loc. aff. cap. 10. & 9.

comp. loc. c. 5. Theoph. l. 9. hist.

plant. cap. 18. Lib. 13. mech. ca. pis.

” ”

In meth. med. cap.

Lib. 7. cap. 5.

Lib. 11. cap. de po. agra.

incepam ad Galeni vsque ætatem (etenim Iulianus, Attalus, antipater, ac alij medici Methodici fuerunt Galeni contemporanei) floruisse. Themisonem vero ante Dioscoridem Anazarbeum Alexandrinum fuisse, ex eodemmet Dioscoride conijcitur, qui in libro sexto de materia medica de rabie scribens, Themisonis istius ita meminit: Themisonem aliqui demorsum in idem vitium incidisse, & equalisse fatentur alij ipsum cum amico aquam expavescenti morē gereret. & officium exhiberet, quadam naturarum concordia, similem contraxisse affectum sed post multos tandem cruciatus seruatum extitisse. Neque est, vt aliquis dubitet, Themisonem Methodicæ sectæ auctorem Dioscoridem non intelligere, at alterum præstantiorem dictum, qui fuit Apuleij mancipium, cuius meminit Apuleius in prima apologia. At Aurelianus videtur affirmare Themisonem, qui rabie fuit tentatus, fuisse medicum, cum ita dixerit. Aiunt denique Themisonem, quanquam volentem non potuisse, siquidem ex rabido cane quodam fuerit vulneratus, et sic eius curationem assumeret mente, quippè scripturus, continuo admonitus in eandem relaberetur. Quo eundem fuisse Themisonem cum Dioscoridis tum Aureliani liquido constabit, quippe medicum Methodicum. Quare ante Dioscoridis tempora Methodicam medicinam extitisse credendum est. At cum Dioscorides M. Antonij & Cleopatraz temporibus vixerit (His familiarem Alexandria fuisse Suidas est auctor) merito colligitur hanc medendi sectam ante M. Antonij & Cleopatraz ætatem incepisse, atque post Antonini Pij, atque Seueri tempora extitisse, eo enim tempore Galenus Romæ complures Methodicos florere cognouit præsertimque Attalum, Iulianum, atque antipatrum, eorum namque Imperatorum temporibus ipse Galenus Romam venerat, atque in medicina clarere cepit ex quibus quidem annos circiter tercentos, si eos à Marci Antonij, Cleopatrazque temporibus, vsque ad Seueri Imperatoris ætatem metiri voluerimus, medicinam Methodicam claruisse liquido constabit.

Libro 3. Oxeon
cap. 16.

Quid sit medicina Methodica, et quibus principiis fuerit constituta, Cap. IV.

POstequam medici, qui varijs temporibus Methodicā sectam magna cum laude mordicus tenuerunt, ac apud plures mundi nationes in ea claruerunt, à nobis hæcenus fuisse expressi, non minusque etiam quanto tempore ipsorum in ea medicinæ secta auctoritas præualuerit, cognitum est, restat vt quid ea fuerit secta intelligamus, atque qualia quoque principia, siue dogmata habuerit, vt partius magis ad istius medicinæ sectæ notitiam descendamus: Quam prouinciam nobis haud parum fore difficillimam intelligimus, quod Methodicorum apud nos non extant monumenta. Cælum solummodo Aurelianum habemus, cuius libris de istius sectæ dogmatis conscriptis, penitus caremus, eius tantummodo libri morborum Oxeon, atque Chronion, quos legere possumus nobis superfuerunt. Accedit, nullum Græcorum, Latinorum Arabumque librum nunc extare à quo dogmata illiusce sectæ discere protuerimus, (quibusdam exceptis Galeno tributis, quos Galeni non fuisse certo certius credidimus) desiderantur vero sex commentaria quæ de hac secta Galenus scripserat, quæ si extarent præcipua dogmata, quibus ea secta medicinæ fuit constituta, nobis in aperto essent. Itaque auctor definitionum medicarum de hac ipsa secta ita habet: Methodica est ratio, quæ ab apparente progreditur, & in comperti comprehensionem facit, vt si sunt sudores, sunt exigui cutis meatus: apparens enim res sunt sudores, esse autem meatus, incompertum est. Galenus in lib. de sectis ad eos, qui introducuntur de eadem scripsit. Totamque denique suam medicinam ita definiunt, vt eorum co-

Cap. 6.

gnitio

gnitio sit, quæ communia eidentia sunt, quæ ne cæteris omnibus artibus videatur communis definitio (nam illas quoque eorum, quæ communia eidentia sunt notitias esse putant) addunt, ut ea sint, quæ finem medicinæ sequantur, eorumque aliqui, non quæ sequuntur, sed quæ eiusdem fini consentanea sint, adiunxerunt. Pars autem maxima hæc ambo componens, Methodum inquit notitiam eorum esse, quæ communia eidentia sunt, eaque medicinæ fini consentanea, consequentiaque, quidam autem, ut Thessalus, sic, ut eadem proxima ac necessaria sint ad sanitatem adiunxerunt. Quibus constat medicinam Methodicam esse communitatum eidentium ad medicinæ finem seu ad sanitatem consequentium, & necessarium, cognitionem. Porro ut hæc medicinæ secta melius dignoscatur, Communia illa eidentia dogmata, quibus eam condiderunt, accuratius sunt cognoscenda. sed in primis dicamus hanc sectam idcirco non rationalem & dogmaticam dictam fuisse, quod nimirum in eidentibus versetur, quod quidem ipsius erit dogma seu principium: quoniam Dogmatici siue rationales medici coniecturis ad dignoscendos affectus corporis, utantur, & propterea Methodici dixerunt eos in obscuris versari. Communitates vero Methodicorum pro ipsorum medicina constituenda, duæ fuerunt, scilicet adstrictionem & profluvium, a quibus ex ambobus mixtum tertium addunt, Græcis *ποσίδες ἡδὲ στεγνός* dictur a latinis, fluidum & adstrictum. Vnde omnes affectus (vel morbi vel symptomata vel causæ sint) aut adstrictos esse, aut fluidos, aut mixtos, affirmarunt, a quibus curationem indicari voluerunt, nempe si corpus adstrictum sit, laxandum esse, si profluvio laborat adstringendum, si vitium mixtum sit, occurrendum vehementiori malo. Præter has duas communitates, alias quoque Methodicos habuisse, Gal. in lib. de opt. secta ad Trasylb. ita expressit: Non solum autem duas communitates, sed plures etiam statuunt, aliasque in victus ratione, alias in manuum affectione, collocant. In victus quidem ratione adstrictum & fluens, adiunctamque magnitudinem, morbi tempora quatuor initium incrementum, summum impetum & decrementum, celeritatem, longitudinem accessionem. In manuum vero affectione, quod a natura alienum est, ponebant, loco, tempore, & pluribus alijs. Cæterum ut de his communitatibus clarior adhuc cognitio nobis elucescat, siue melius ut tota de hac re notitia habeatur, huc transferenda duxi, quæ in libro introductorio siue medico dicto fuisse de ijs scripta sunt; licet non leuiter dubitem eas omnes communitates, ita ut leguntur, haud fuisse Methodicorum. Ita vero in eo libro scribitur. Methodica communitatibus & simili speculationi adheret, omnes enim particulares affectus ad generales duos reducunt, adstrictum & fluentem, quas communitates vocant, cognoscunt eas ex obortis circa corpus affectionibus in utroque eidenter conspicuis. Quare notas non desiderant, exempli gratia adstrictum inde oriri, quod corpus densatum sit, profluvium ipsius sistatur, omnisque eidentis excretio impediatur. Fluentem vero inde, quod summa corporis cutis rara euaserit, & cuiusque corporis particula excretionem sensibiles intenses sint. Duplicem igitur curationis speciem generales duo corporis morbi ipsis indicant, nempe si corpus adstrictum est, laxandum esse: si profluvio laborat, comprimendum: si vitium mixtum habet, occurrendum vehementiori malo. Cæterum communitates omnes nominant eidentes, harum alias passivas, ut adstrictum & fluens, alias curativas, ut resolvere & tenere: quasdam temporales, initium, incrementum, vigorem seu statum, & inclinationem. Porro medicinæ, quæ manu medetur, communiter in eius ablatione, quod alienum est, consistunt. Duplex enim alienum est, vel extrinsecus vel in corpore, extrinsecus simplex, illius, quod in corpore est, tres numerantur species. At qui extrinsecus, ut spiculum telum, & quod cumque aliud id genus existit, perfectam eductionem ostendit. Eorum, quæ in corpore sunt,

Cap. 30.

Cap. 30.

„ sunt, aliud loco alienum, vt suffusio, eluxatio & fractura, quæ transpositionem, vel
 „ restitutionem in proprium locum indicant. Aliud magnitudine, vt abscessus
 „ omnes, scroti tumores, acrochordones, idest pensilæ verrucæ, phymata & condy-
 „ lomata: Quorum nonnulla diuisionem requirunt, non nulla summam superfluo-
 „ rum præcisionem demonstrant. Aliud defectu alienum, non vt superuacuum,
 „ sed veluti deficiens dicitur, cuiusmodi mutila & curta omnia, sicut in labris, ocu-
 „ lisque cernitur, vnde quidam, λεγοφθαλμοι, & λεγόχελαι, idest leporinos ocu-
 „ los & leporina labra habentes, nominantur; pari modo etiam se habent fistulæ
 „ & vitia profunda, quæ Græci vocant hypophora, sinus, vlcera, aliaque huiusmo-
 „ di omnia, quæ ex defectu repletionem desiderant, atque indicant est vero præ-
 „ ter quatuor chyrgorum communitates & species, quam προφυλακτικὴν,
 „ idest præseruatricem appellant. Apponitur autem & ipsa vt communitas, inde
 „ leterijs & toxicis, bestijsque omnibus quæ virus inspuunt tum venenosis volati-
 „ libus & terrestribus, aquatilibusque. Nam commune omnium genus, vt sint exi-
 „ tialia, non tamen ad adstricti & fluens referuntur, sed aliud est præter hæc ge-
 „ nus. Quare & curatoria ipsorum communitas, alia, præter illam habetur, dicta
 „ prophylactice. Methodicam quoque sectam primum exculpit similis in eiden-
 „ tibus consideratio, sed non in latentibus & abditis, quemadmodum in Ratio-
 „ nali secta. Hoc vnum intercidit discriminis, quod in illa quoque similitum in-
 „ spectio, sed in obscuris consistit: secundum quod ex simili in eidentibus, affe-
 „ ctus, auxilia, tempora, particularia omnia ad generalia reducit. Attamen non
 „ eidentia tantum empiricorum more animaduertunt, sed particularibus nullo
 „ generali cognito insistant. Hactenus auctor libri medici & introductorij dicti,
 „ Ex quibus intelligitur omnes particulares affectus ad duos generales olim Me-
 „ thodicos reduxisse, quippe ad adstrictum & fluentem, quos ex obortis circa cor-
 „ pus affectionibus in utroque eidenter conspicuis, cognoscebant. Tertio notas non
 „ desiderabant ad eos cognoscendos, vnde quartum dogma fuit, duplicem curatio-
 „ nis speciem duos generales affectus indicare, scilicet adstrictum corpus laxan-
 „ dum, & laxum adstringendum. Quinto adstrictum & fluens communitates pas-
 „ suas vocabant, resolvere & tenere actiuas, & temporales communitates dice-
 „ bant morborum principium, augmentum statum atque declinationem. Septimo
 „ in chirurgia quoque communitates duas habebant, scilicet eius quod alienum
 „ est, indicare ablationem, quod cum duplex fuerit, scilicet alienum superfluum,
 „ atque alienum deficiens, huius dicebant ablationem esse repletionem vt partes
 „ mutilæ, curte, vlcera, sinus, & alia similia, illius, quod loco alieni est, vt luxatio &
 „ fractura transpositionem atque reductionem in proprium locum, & quod magni-
 „ tudine alienum est, vt abscessus tumores, phymata, condylomata, aut quandam
 „ solummodo diuisionem siue præcisionem, aut summam præcisionem. Demum
 „ communitatem quoque habent, præter prædictas prophylacticam, idest præserua-
 „ toriam dictam, quam in medicamentis deleterijs, toxicis atque in bestijs omni-
 „ bus virus inspuentibus insectabantur. Hæque fuerunt Methodicorum commu-
 „ nitates ex prædictis locis animaduertse, quibus alias quoque addimus, quippe in
 „ victus ratione adstrictum & fluens maxime obseruari, idemque facere, affectuum
 „ magnitudinem, tempora morbi, celeritatem atque tarditatem, accessionem, at-
 „ que remissionem, ab hisque omnibus indicari victus rationem, tempora item
 „ morborum curationem indicare; Morbi item principium, incrementum prohi-
 „ bent indicare, ac inter morborum principia adstringentibus esse vtendum; corpo-
 „ raque densitate & duritie firmiora reddi; humores & qualitates primas non esse
 „ causas morborum; effectus causarum loco haberi, at non qua causæ sunt, sed qua
 „ communitates indicare, proindeque curationem dicebant ab affectibus indica-
 „ ri, minime autem à symptomatibus: Fluxum cognosci quod corpora mollia sint
 „ fragilia

Gal in li. de sect.
ad eosque. cap. 6.

In li. de opt. sect.
ad Trasyb. c. 7.

fragilia & effæminata, contra adstrictum, quod aspera duraque sint. Præter ea negabant quicquam vtilitatis facere ad indicandam curationem locum in corpore læsum, naturam corporis, ætatem, vitæ studium consuetudinem, tempus anni, cælum, regionēque propterea neque ad curationem instituendam quicquam medicos curiosos esse debere, de frigore de æstu de ebrietatibus, de cruditatibus, de satietate, de fame de lassitudinibus, de ocio, de ciborum generibus atque de mutatis consuetudinibus. Accedit, trium sectarum medicinæ professores in his concordēs fuisse, scilicet primum, quod euidētia præcepta vtilia sint, analogismus, observatio, historia, ad simile transitus, quod historia sine delectu sit vtilis, modus item applicandorum remedium, quod ex alijs alia deprehendantur, quod ijsdem præsentibus malis eadem sint faciēda, quod adiectionibus & de tractionibus sanitas seruetur, & morbi fugantur; quod ad sanitatem retinendam, & morbos tollendos nocentium vsus sit fugiendus: quod ad materiæ adhibendæ notitiam experientia potens atque vtilis sit: quæ nutriunt & quæ non nutriunt, purgantia atque mortifera experientia omnia comperta esse: Hæc fuere medicinæ Methodicæ dogmata quæ etsi maxime confusa mihi visa sint, tamen ne aliquid ab antiquis de hac secta nobis traditum omitteretur, conscribere hic libuit.

Quamobrem Methodici constituerint primum medicina dogma in adstricto, & in fluido, Cap. V.

CVM Methodicorum dogmata cognosci debeant, ab eo exordiri libuit, quod est omnium præcipuum, ac veluti totius illorum medicinæ fundamentum, nimirum morbos scilicet omnes, siue affectus nostri corporis ad duos tantum reduci scilicet ad adstrictum & ad fluidum siue profluens, siue laxū, Græcis *εἰς δύο* dicitur, latinis fluidum & adstrictum, ita vt omnes particulares affectus (vel morbi sint iuxta dogmaticos medicos, vel symptomata, vel causæ) ad hos duos reducerit, scilicet ad adstrictum & ad fluidum, atque admixtum ex utroque. Circa quod placitum illud primum erit cognoscendum, quippe vnde fluxerit, & qua ratione atque auctoritate tueatur. Fluxisse putamus ab illorum philosophorum opinione, quæ fuit, quod verum primordia atomi & vacuum fuerint, vel raritas & densitas. Atomos & vacuum posuerunt Democritus, Epicurus, Leucippus Metrodorus, atque (vt auctor est Galenus) Asclepiades: Densitatem vero & raritatem Anaximenes, Archelaus Atheniensis, Heraclitus, Thalesque anaximenes & Archelaus, idcirco aerem rerum esse principium credidit quod & rarefieri & densari queat, & Heraclitus ignem, & Phales aquam, quod omnium maxime rarefiat & densetur. Galenus hoc principium ab Asclepiade. Dogmatico fluxisse scribit, qui credidit ex atomis corpora constare, absque meatibus, vnde Asclepiades in symmetria & competentia exiguorum meatuum, quos poros appellat (vt Galenus dixit) sanitatem & in ametria inconvēnientia ve morbum constituerat, ex quo Thessalus Methodicus censuit in multis morbis, totum exiguorum meatuum statum immutandum, quod ipsorum naturalem apertionem siue positionem vitiatam esse æstimavit; atque ex hac opinione processit Metasyncretisicos nomen idem planè potestate indicans, quod Græcis *Μεταποροπоеσις*, & latinis exiguorum meatuum status mutatio. Metasyncretis est Metaporopijsis id est meatuum mutatio, Metasyncretis dicitur, quod Græce (ait Galenus) *οὐκ ἐκείνη τὰ σωμὰτα ἢ ὁργανισμὸς*, quasi misceri decernisque corpora dicas. Quæ opinio eorum fuit, qui corpus cula & meatus, aut indiuidua et vacuum aut denique impatibilia & in alterabilia prima elementa statuerunt. Atque ab hac ipsa opinione primum Methodicorum dogma illuxit, quod omnes scilicet affectus reducerentur

In lib. 5. semp.
cap. 24.
Libro 4. Meth.
med. cap. 4.

ducerentur ad meatuum vel clausum vel fluxum, quod nimirum (vt Asclepiades sentijt) in optimo eorum statu sanitas consistat, atque in viciato morbus. Age itaque dicamus hoc principium primum ab ijs venisse philosophis, qui pro rerum principijs atomos, idest, minima corpuscula, atque vacuum siue meatus esse existimarunt. Stoici vacuum extra mundum posuerunt, atque alij tantum solummodo vacui extra mundum esse putarunt, quantum ad respirationem mundi faciat. Etenim mundus igneus cum sit, euentatione indigere putarunt. Vnde corpora, quæ euentatione opus habent, vacuo vri ad euentandum est necessarium; At animalium corpora, aere, qui spaciū (quod inane philosophi posuerunt) est, ad euentationem vtuntur. Atque hinc (vt Galenus docet) cutem, licet primo ortu sibi fuerit continua, spacio temporis perforari, ac plurima nancisci spiramenta ritu cribrorum, necesse est; quod nimirum multæ venæ, arteriæque aperiantur in cutis meatus, ac in ipsius non minus superficiem internam, & in meatuum perforationes non pauca peruenire venarum arteriarumque oscula, nihiloque fecius ad extimam superficiem, ita, vt ibi ipsæ osculis finiant. Hæcque à natura ita fuisse spacia inania & peruia constituta (quod corpus omne intro forasque, auctore Hippocrate, sit transpirabile, siue expirabile, atque inspirabile) Galenus demonstrauit arterias, vbi se dilatant, vnde quaque & per omnes meatus, qui videntur spacia vacua, attrahere non aerem modo, halitumque, sed quicquid etiam trahi facile, ac tenue sit, ad spiritalis essentia impetum expedite consequi. Itaque perinde atque ij philosophi, dicimus adesse extra corpus vacuum quod spaciū esse (cum Galeno) dicimus aere plenum, ad hoc vt calor innatus euentetur, vnde natura in corporibus plures constituit vacuitates, quæ nihil quidem aliud sunt, quam viscerum internorum & omnium partium cauitates meatusque præsertim venarum & arteriarum, quas ideo ad vtramque superficiem cum extimam tum intimam, oscula & meatus habuisse, natura voluit. Quo non tantum extra esse vacuum asserimus, at quinimo etiam intra corporibus inferum. Quo fortasse argumento Methodici à philosophis, qui vacuum dari intra corpus, & in corpore insitum voluerunt, per docti, eum morborum communiter constituerunt, quod morborum quidam ad adstrictum, & quidam ad laxum merito referantur, nam qui atomos pro rerum principijs posuerunt, necessario in corporibus vacuum quoque insertum fateri debuerunt, per quod atomi intro forasque commode permearent. Quod neque Galenus negauit, quippe scitæ, quæ vacuum posuit, illud dogma conuenire, nempe in meatuum symmetria sanitatem consistere, & in ametria morbum, sicuti in fluxu clausuque rerum, quæ per id feruntur in victus ratione, morbos. Quare philosophorum vacuum ponentium, quos eruditissimos, grauissimosque viros fuisse, scimus, auctoritate etiam ea communitas confirmatur. Non tamen nos latet Aristotelem ac complures alios vacuum in corporibus non admisisse, veluti neque omnes philosophos qui post ipsum claruerunt, Aristotelis de vacuo sententiam recepisse. Inter alios, qui vacuum inesse corporibus voluerunt, Ioannes Grammaticus cognomento Philoponus particularem digressionem cōtra Aristotelem de vacuo doctissimam habuit. Non dissimili argumento hoc Methodicorum dogma firmum, atque verum fecisse ij philosophi videntur, qui rerum principia in raritatem & densitatem, vri superius dictum est, retulerunt. Quando in densitatis, raritatisque symmetriam & ammetriam, sanitas & morbus referantur, immodice quidem meatibus rarefactis aut densatis, corpora ad morbum ac iisdem probe ac naturaliter, quod ad raritatem & densitatem pertinet, se habentibus, ad sanitatem inclinant. Densitatem vero & raritatem pro principijs rerum posuisse diximus Anaximenem Archelaum Atheniensem, qui ideo aerem omnium rerum principium esse voluit, quoniam & rareferi & densari queat; Heraclitus ignem, atque eadem ratione

Gal. in lib. de historia philosophica capite de vacuo.

In lib. simp. c. 12.

Lib. 6. epid. ser. 4.

Lib. de usu pulsuum.

In lib. 3. de diff. puls. c. 6.

In apolog. contra Iulianum cap. 4.

In lib. 4. physicorum.

Gal. in libro de diff. morb. cap. 4. & 5.

B Thales

In 1. lib. de ani-
ma com. 105. 32.

In lib. de predi-
camentis cap. de
qualitate.
In 1. simpl. c. 13.

In commento Ti-
mæi Platonis.

In comm. Timæi
Platonis.

Thales aquam, quæ omnium maxime rarefiat & densetur, rerum principium esse statuit. Quem philosophum ab Aristotele nominari cum quadam obseruantia ac reuerentia Simplicius est auctor. His addimus Aristotelem, qui in lib. 8. physicorum ita scribit: Amplius autem omnium passionum principium est densitas & raritas. Etenim graue & leue & molle & durum & calidum & frigidum densitates videntur esse & raritates quædam. Densitas autem & raritas, congregatio & disgregatio, secundum quas generatio & corruptio substantiarum dicitur. Quæ autem congregantur & disgregantur, necesse est & secundum locum mutari. At vero, & eius quod augmentatur & diminuitur, mutatur secundum locum magnitudo. Hæc Simplicius eius interpretæ dicta accepit, tanquam ad propriam ipsius mentem. Aristoteles vero dixit rarum & densum partium quandam positionem esse, cum densum quidem ex eo quippiam sit, quia partes ipsius sibi ipsis propinquæ sunt, rarum autem ex eo quia à se se distant: Quod, & Galenus sentit, cum dicat, rarum esse, cuius partes spacijs inanibus interceptæ sunt. Ex quibus constat in raris corporibus vacuitates esse, in quarum symmetria ad adstrictum & laxum corporum, sanitatem, ut dictum est, insistere Methodici putarunt, & earundem vacuitatum siue meatuum ad adstrictum & laxum in recessu à symmetria, morbum consistere: unde merito dixerunt Methodici omnes affectus ad adstrictum & fluidum reduci. Addo Platonem quoque in Timæo animalia in igne & spiritu ex necessitate vitam habere dixisse: quod maxime (ut Galenus non negauit) in igne & aere animalium vita consisteret. Ignis autem calor est & humores calidi, & spiritus quidem aer, cuius usus est ad conseruandum euentatione calorem, quod confirmat Methodicum principium, quippe sanitatem & morbum in moderata & immoderata adstrictionis atque diffusionis meatuum constitutione consistere, & propterea omnes morbos ad adstrictum & laxum reduci. Quod & Gal. visus est affirmasse, cum ita scripserit: Nam cum quatuor sint elementa ex quibus singula, quæ generantur ortum habent, ignis, terra, aqua & aer: ex his materialiora quidem terram & aquam, efficaciora vero præcipueque in animalibus, ignem & spiritum esse ab omnibus ferè concessum est. Id autem, quod ab ijs gubernatur corpus, multas non solum vacationes manifestas, sed sensu ignotas perspirationes & effluxiones habere necesse est. Quibus intelligitur, sanitatem corporum præcipue consistere in meatuum optimo statu, in quo ignis atque spiritus, (quum sint duo efficaciora elementa, à quorum statu & bono & malo, corporis sanitas vel morbus procedit) recte se habent, nam recte excrementa calida & fumosa exhalant, & euacuantur, calor, qui ignis est transpirat, euentatur per probam meatuum apertionem; quæ si immodica sit, profluuium corpus laborat, si claudantur, adstricto. talemque originem habuit Methodicorum primum dogma, scilicet à philosophorum, qui vacuum atomosque posuerunt, opinione, atque non minus ab ijs, qui densitatem & raritatem, congregationem & disgregationem pro rerum primordijs acceperunt.

Demonstratur primum Methodicorum dogma etiam medicorum auctoritate, ac non minus quoque Dogmaticorum siue Rationalium vocatorum. Cap. VI.

Iam ad præcipuam Methodicorum Communitatem, ac dogma, quo illa secta maxime nitebatur, descendimus, hætenusque ex philosophis, qui pro rerum principijs atomos & vacuum posuerunt, fluxisse, ac non minus etiam ab ijs, qui densitatem raritatem, cōgregationem atque segregationem principia itidem esse

esse voluerunt. Restat, ad maiorem huiusce, dogmatis cognitionem, ut ipsum medicorum quoque rationibus atque auctoritate robaremus ac confirmemus. Quod primum ex sanitatis morbique ratione intelligere operam dabimus, proponentes ea, quæ Methodici de sanitate & morbo olim scripserunt, in qua quidem re ipsorum aliqui confuse satis, uti Galenus animaduertit, quædam definiunt, scilicet sanitatem atque morbum in eodem non esse genere, sed ad diuersa genera referri. Vnde alij dixerunt, sanitatem esse actionem integram corporis, morbum vero non actionem, sed corporis dispositionem, quippe corpus certo modo dispositum. Olympicus dixit sanitatem esse dispositionem per exclusionem morbi, & morbum versionem eius esse, quod secundum naturam est, in id, quod præternaturam est, stabilem. At Thessalus Methodicorum princeps, alijque distinctius sanitatem in symmetria quadam meatuum corporis constituerunt atque in ammetria morbum. Quod dogma ab Asclepiade fluxit, qui ut antea dictum est, sanitatem in exiguius meatuum conuenientia, & morbum in ammetria constituit. Vnde metaphysiceos & metaporphæseos nomen inuenit. Itaque Methodici, sanitatem, quandam symmetriam esse (quod neque Dogmatici negant) constituerunt, addentes corpusculorum & meatuum, quos *σύνους καὶ πόρους* Græci vocant. Contra morbum ammetriam. Quod Iulianus Methodicus (ut auctor est Galenus) ita expressit. Igitur contractionis diffusionisque moderatum statum, commensuratumque statuentes in humanis coagmentis sanitatis illum, nomine appellamus, isti porro mediocritati cum insidiæ à morbis tenduntur, necessario fit, ut patiantur corpora contracta ac dura sicciora, aut diffusa, mollia, que facta atque humida. De qua & Galenus ita habet. Sicuti quæ vacuum ponit, illa conuenire, nempe in meatuum symmetria quadam sanitatem consistere, sicuti in fluxu, clausuræ rerum, quod per id feruntur, secundum victus rationem, morbos. Cum igitur sanitas in quadam symmetria siue moderatione meatuum corporis fuerit à Methodicis constituta, atque agritudo in eorundem meatuum ammetria siue statu immoderato; merito ex hoc collegerunt, duo esse genera morborum siue affectuum curandorum, quippe adstrictum fluxum siue fluidum. Etenim si in meatuum corporis, siue ut ait Iulianus, in eorum contractionis & diffusionis symmetria, siue statu moderato, siue mediocri sanitas consistit (quod non est difficile demonstrare) in eorundem meatuum vel contractionis & diffusionis à mediocritate recessu, morbus agritudine necessario constituetur. In moderato vero meatuum contractionis & diffusionis statu sanitatem maxime consistere, ac propterea corpora habentia meatus moderate ac naturaliter peruios recte valere atque sana existere vel hoc unico argumento facile demonstratur, quod (auctore Hippocrate) foras introque spirabile totum corpus sit, Galenus expirabile atque inspirabile omne corpus esse, ideo consentit, ut in toto corpore caloris natui mediocritas custodiatur; veluti respiratione caloris moderatio seruatur. Cuius sanè caloris transpirationis ad sanitatem conseruandam necessitatem demonstrans in libro de usu pulsum, de meatibus arteriarum ad cutem terminantibus agens, ita scribit: Sicuti nimirum per ora, quæ in cutem finiuntur, quicquid halituosum humidumve excrementum habent, id excernunt. Recipiunt ex circumdante nobis aere, non exiguum portionem, atque idest, quod Hippoc. ait, foras introque spirabile totum corpus esse. Quo fit, ut corpus moderate poros cutis ac cæteros alios meatus corporis habens apertos, mediocriterne adstrictos ac diffusos (quod idem est ac si naturaliter transpirabile esse dicatur) idcirco sanum esse ac recte valere, dicimus. Contra vero ubi à contractionis vel diffusionis moderato statu recesserit, è sanitate in morbum delabi, atque morbosam exinde constitutionem incipere. Tantum potest ad conseruandam sanitatem corpora probe esse disflabilia ac transpirabilia (quod est habere mo-

In 1. meth. meth.
cap. 7.

In Apologia contra Iulianum.
cap. 4.

In 6. epid. sect. 6.
com. 1.

Cap. 5.

deratam meatuum contractionem atque diffusionem seu apertionem) vt corpora vel etiam humida, multisque excrementis scatentia in morbos, quoad in eodem meatuum naturali statu perseverant, non delabantur. Vnde Galenus merito dixit: hæc ipsa multis excrementis scatentia gaudere sanitate seu recte valere quousque meatus corporis à naturali contractionis & diffusionis symmetria minime recesserint. Quibus iisdem immodice vel adstrictis, vel ampliatis corpora morbos incurrere sit necessarium. locum singularem ad hanc rem non tacendum duxi, quòd & huic proposito, & Methodicorum dogmati favere maxime videatur, ita enim Galenus scribit. Veluti nimirum ipsa animantium corpora, tametsi plurimam substantiæ suæ portionem humidam & calidam sunt sortita, magnum tamen annorum numerum sine putredine, ac sana, viuaque exigunt, si seruetur (vt demonstratum est) eorum proprius calor in cordis quidem corpore per respirationem in reliquis omnibus partibus, tum per communiter, quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratio, perspiratione dicitur. Hocque fit, quoniam in corpore bene spirante humores quieti manent, & in non naturaliter perspirante ad motum compelluntur; & sic aliquem morbum concitant. Hinc est, quod corpora alioquin recte spirantia & sana ex aliquo quandoque medicamento purgante commota, in morbos labuntur, quippe humoribus quiescentibus vi purgantis commotis, qua de causa multi perierunt, quod Dominico Zanio, Benedicto Georgio, Patritijs Veneris proximis annis evenit, qui recte valentes purgationis faciendæ gratia ab assumpto pharmaco paulo post, commotis ad cerebrum humoribus, apoplectici, interierunt. Quibus vel etiam ex Galeno demonstratum est, sanitatem in meatuum corporis moderata adstrictione & diffusionem consistere, & quoad corpora in ea symmetria conseruantur, ea sana recte valere. Contra vero, si ab hac ipsa meatuum symmetria recedant, in morbos delabuntur: scilicet meatibus iisdem præter naturam vel auctis ampliatisve, vel adstrictis clausisve. A clausis morbi complures oboriri solent, uti sunt febres inflammationes, fluxiones ad varias partes corporis, à quibus affectus non pauci concitantur. A diffusis ampliatisve, tyncopes, & mors repentina, cachectis, hydrops; Galenus ait, probatissimam corporis constitutionem esse, quæ simul attemperatissima sit, & simul humorum transitum expeditum tenet, & cutem densam habentes, pati ab internis, atque raram, ab externis. Hippocrates, raritatem corporis ad perspirationem, quibus amplius aufertur saniores reddere. Densitatem vero ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbidiores, docuit. Habitus corporis si densior vel adstrictus euaserit, quo calor innatus transpiratio siue eventatio impediatur, febres uti etiam dictum est, fieri, inflammationes, phlegmones atque alios complures affectus apud quosque receptissimum est: neque immerito, cum contractiore habitu, vel obstructione venarum arteriarumque vijs interceptis vel clausis tenuia excrementa per cutis meatus euacuari solita, non euacuentur, quæ cum fuliginosa sint, siue acria febres (auctore Galeno) promptissime accendunt, putridas, & non putridas, quæ si acria sint, sed optimi sanguinis intus collecta minime euacuentur, plethoriam aut summum calorem corporibus inducunt, atque ubi maximus a meatuum symmetria fuerit recessus etiam ad mortem suffocatione corpora prouehi. Quam rem Gale. in libro de caus. morborum ita expresse: Et si quidem stipata fuerint arteriæ, siue (vt nuper dictum est) ob sanguinis redundantiam, siue earum ora obstructis aliquos patiantur, ita ut nullam habeant, transpirandi viam, calorem extinguere necesse est. Quod vero ita affectum est corpus emori, quod si fuerit stipatio modica, non adeo calorem naturalem pati est necessarium. At si quidem in animali corpore veluti fuliginosa quædam ac fumida excrementa tunc constituerint, alius erit

In lib. si meth.
med. cap. 8.

In lib. de succ.
bonit. & vitio
cap. 2.
In 1. de sanit.
tuen. cap. 10.
In lib. de alimē
to circa mediū.

In libro de diff.
morb. cap. 5. in
8. Meth. med. c.
2. in lib. de caus.
morb. c. 2. in 11.
meth. med. c. 9.
Cap. 9.

erit caloris naturalis affectus: alius vero ubi solum vapor quidam suavis atque optimus exhalat. Atque horum utrumque bifariam hoc modo enariat. Cum enim sanguis optimus in corpore fuerit, nullo inquinatus humore superfluo, vapor ex eo incallescens optimus exurgit, qui nihil aut igneum aut aereum secum invehit. Tale quidem corpus cum mediocriter stipari contigerit, breui aut erit plethoricum, aut supra modum calefiet. Et paulo post subiunxit: In corpore autem stipato quod à fumeo excremento obsidetur, aut febris accendetur, ob interclusam interius fuliginosam euaporationem, aut strangulabitur atque extinguetur calor insitus, atque natiuus. Vtrumque vero accidet pro multitudine excrementorum, aut magnitudine stipationis. Nam si fumosa superfluitas, quæ euacuari expetebat, plurima fuerit, atque stipatio vehemens, periculum imminet, ne calor naturalis strangulatus ab excrementis extinguatur, si vero superfluitas pauca fuerit, & stipatio parua febris accendetur. Quare ex his constat, meatuum adstrictionem vel clausiōem, vel obstructionem dicas, ob prohibitam caloris naturalis transpirationem, & humorum ventilationem, atque ob excrementa, quæ per eos meatus quotidie vacuabantur, intus collecta retentaque calidos morbos, plethoriam, putredines, febres, phlegmones, fluxionesque concitare. Non minus quam ipsidem meatibus ad raritatis diffusionisque recessum prouectis, immoderate excretiones, euacuationesque fiant, à quibus corpora resoluntur, contabescunt, atque morbis à calore resoluti, ac diminuti vexantur, & quandoque repente ipsidem immodice laxatis meatibus homines moriuntur, ut in affectu, quæ Græci pericharrian, quasi gaudij excessum, dicunt, obseruatur, quo quosdam subito interiisse Gal. tradidit: & causam esse cordis relaxationem siue arteriarum meatuum immodicam raritatem siue diffusionem vnā cum Hippocrate, statuit. Complures vidimus, qui ex laxatis venarum arteriarumque osculis oborta immodica sanguinis hæmorrhagia, vel continuè interiere. vel paulopost, hydropici facti. Porro sanitatis definitio, à Methodicis tradita (quæ est meatuum corporis adstrictionis diffusionisque moderatus status) ab ijs, quæ diximus maxime erit confirmata. Atque non minus prima ipsorum Communitas, quæ est, quod omnes affectus ad adstrictum & ad laxum reducantur. Neque est, quod Dogmatici similium partium sanitatem non solum in meatuum, sed quinetiam in quatuor qualitarum atque humorum symmetria constituerint, atque partium quoque organicarum in similium compositione, numero, magnitudine & figura. Quando Methodicis fuerit persuasum, quatuor qualitarum, quatuorque humorum symmetriam mutari, turbarique à recessu moderationis meatuum, scilicet adstrictionis ac diffusionis, atque ab ipsidem non minus sanitatem organicarum. Quæ res (si per morbos, febres, inflammationes, phlegmones, tumores, dolores, convulsiones, paralyses, surditates, cecitates, ictericias, tremores, palpitationes, tusses, dispnæas & alios similes affectus intelligemus) non videbitur à veritate aliena, cum ab adstrictionis siue clausiōis meatuum occasione commotis humoribus, ac ipsorum turbata symmetria prædicti affectus atque alij similes fiant. Veluti à diffusionis siue eorundem ampliatiōis non moderato statu, oborto immoderato, cum sanguinis, tum excrementorum profluvio, uti hæmorrhagiæ, lientericiæ diarrhææ, dysentericiæ refrigerationes, siccationes, convulsiones, hydropes & similes alij affectus oboriuntur. Etenim humores quieti in suis locis manentes, habentesque quotidie solitas exhalationes euacuationesque (nisi clausis meatibus cessarit ipsorum euacuatio, euentatio siue distatio) minime morbos excitabunt. Adstrictis vero (ut dictum est) corporis meatibus, humores quasi ab extra intro compulsis, turbantur, commouentur, atque idcirco ad varias partes corporis confluunt, incallescunt, putrescunt, variaque morborum genera concitant, quippe obstructiones, putredines febres, phlegmones, & similes alios morbos. Vnde me-

In 2. de sympt.
caus. cap. 8. in
Meth. med. c. 5.
In 6. epid. sect. 5.
com. 9.

Gal. in 1. de san.
nit. meth. cap. 5.

ritò

*An 3. aphor. com.
11. & com. 22.*

rito Gal. scribit, in autumno plures morbos fieri (quos Hippocrates in aphorismis recensuit) ob aeris ambientis frigiditatem, quod humores ex partibus extremis retrudantur, atque ad interiora membra impellantur. Qua ratione hyeme hos fieri affectus Hippocrates ita meminit: Hyeme vero morbi laterales, & pulmonis inflammationes, grauedines, atque raucedines, ruses, dolores, pectoris & laterum, atque lumborum, & capitis dolores, vertigines & apoplexiæ ex frigiditate ambientis adstrictis meatibus, & maxime in capite (quoniam hac pars minus à frigore defendi queat) humores & in ipsum cerebrum, & ad alias partes defluentes prædictos affectus facere solent. Hinc in Aegypto, Arabia & in alijs locis calidioribus pleuritides, peripneumoniæ, anginae ac aliæ internæ phlegmones haud ita grassari solent. Qui affectus in Aegypto nonnunquam in prima estate maxime inæquali, summe scilicet calida & frigida (in qua interrupti venti campum vocati) summe calidi spirant, & aquilonares summe frigidi) vna cum alijs morbis summe exitialibus grassari solent, de quibus nos in libris de medicina Aegyptiorum abunde scripsimus. Humores verò clausis meatibus cutaneis turbatis ac exinde, ut diximus, commoti, ad visceraque conflui, ea multis obstructionibus replent, a quibus febres, phlegmones, putredines, apoplexiæ, epylepsiæ, surditates, ictenteria, viscerum tumores, cachectici, hidropes, ileos & alia similia oboriuntur. Veluti iisdem meatibus immodicè laxatis, immoderate, excretiones, vel sanguinis è naribus, ore, ventre, renibus hemorrhoidibus, atque ex utero in mulieribus, vel excrementorum, ut sunt immoderati sudores, vomitus, alui fluxus, diabetes, & innati caloris resolutiones fiunt. Vnde calido effluvio copiosius (valde rarefactis, siue fufis cutis meatibus) transpirante, insensibiliterque exhalante, corpora refrigescunt, prælanguent, atque contabescunt. ex his igitur liquido constare videtur, quatuor qualitates, quatuorque humores, licet maxime faciant, ad corporis sanitatem (quæ in ipsorum symmetria quadam consistit, veluti morbus in ametria) conseruandam, & vitandâ, attamen certum est, cum qualitatum tum humorum symmetriam, siue statum quietum ac naturalem incolumen seruari, quoad adstrictionis, diffusionisque meatuum symmetria naturalis seruatur. Quo Galen. merito dixit: multa corpora alioquin multum humida & excrementis scatentia (quia meatuum symmetriam naturalem seruauerunt) ideo magnum numerum annorum sana vixisse. Itaque humorum symmetriam, æqualitatem ac quietem, non ex quantitate ipsorum vel qualitate, vel alia causa ab ipsis mutari, at à meatuum clausione diffusionisque cutis turbari, ad faciendosque morbos commoueri, atque concitari. Quare his maxime videtur dogma illud Methodicorum firmatum, quod est, quod omnes affectus reducantur aut ad adstrictum, aut ad laxum. A quo non abhorere etiam illud Dogmaticorum placitum, apud quosque receptum, videtur, quod est, medicinam in subtractione & adiectione consistere, siue esse subtractionem atque adiectionem, quoniam laxum, indicat adiectionem, adstrictum subtractionem. In laxis namque euacuatione subtrahitur substantia, in adstrictis (quod prohibeatur excrementorum per cutim euacuatio) replentur corpora & proinde morbis adstrictis fiunt obnoxia. Vnum addam ex Galeno antequam huic capiti finem imponam, atque hoc erit, Galenum, qui perpetuo acerrimus Methodicorum hostis visus est, in libro de differentijs morborum, ne verbum quidem de hoc præcipuo Methodicorum dogmate fecisse, cum tamen ex illorum sententia accuratissime hos duos communes morbos & profecutus fuerit, & omnes differentias horum affectuum, quippe meatuum adstrictionis atque ampliationis exactissime docuerit: ita enim scripsit: Sunt autem duæ primæ passionēs, altera
in cap. 4.
 „ ampliatio meatuum, altera angustatio. Nam si prima elementa supponantur
 „ impassibilia, nullæ erunt aliæ præterquam in compositione passionēs. Sola
 autem

*Gal. in lib. 11.
Meth. med. 6, 8.*

*Gal. 11. meth.
cap. 12.*

autem compositio ea, quæ nuper diximus, discrimina recipit. Quare necesse est similarium quamlibet partium, tunc suum habere robur, cum meatuum moderationem obtinet, qua moderatione corrupta, a naturali dispositione digreditur oportet. Sed quoniam vnaquæque mediocritas duplicem patitur corruptionem, alteram exuperantiam, alteram defectum, liquet quod primæ passionum corporum simplicium duplices erunt, quarum altera ex ampliatione altera ex angustatione meatuum consistunt. Hæc Galenus & longe plura & clariora ad adstrictos morbos & laxos facientia in hoc libro expressit: & mirum est, ipsum tantum scribendi laborem tulisse, ut morborum differentias ad Methodicam sectam (quam alibi in multis locis & plurimum damnauit, atque pro nihilo fore habendam censuit) attinentes ita prolixo sermone atque accurate scribere voluerit. At si quis dixerit. Galenum affectus in meatuum vitio secundum sectam quorundam Dogmaticorum, quorum præcipuus fuit Asclepiades, & non secundum Methodicorum suppositionem scripsisse, respondebitur quod si hoc verum est, augeri dogmatis Methodicorum auctoritatem, quoniam etiam Dogmaticorum non pauci constituerint in meatuum adstrictione & diffusionem morbos. Atque ex ijs dogma Methodicorum præcipuum multis medicorum satis persuasum esse haud iniuria videbitur.

Quomodo Methodici affectus communes adstrictos & laxos vocatos generales morbos esse voluerint. Cap. VII.

VNum ex præcipuis, maximisque medicinæ Methodici dogmatis fuisse diximus, affectus omnes ad adstrictum & fluidum siue fluxum siue laxum reduci ac idcirco eosdem aut adstrictos aut fluxos laxosue (quoniam omnes ex meatuum corporis adstrictione, aut diffusionem præternaturali concitantur) fuisse nuncupatos: A Dogmaticis Methodici differunt, quod hos tantum affectus esse voluerint, negantes quidem dari illos, qui in partium vitiosa intemperie constituuntur. Quos Galen. scribit dari secundum sectam, quæ & elementa patibilia supposuit, atque ea esse calidum frigidum, humidum siccum. Itaque hosce morbos in partium temperaturis à Dogmaticis medicis constitutos, existere negarunt, Methodici, quos si forte, fiant omnes ad adstrictum & fluidum reduxerunt, atque propterea ad curationem instituendam illos superfluos esse atque inutiles: Constat enim cum calidum cum frigidum morbum adstrictum esse atque vtrumque medicamento laxante sanari. An non corpora, & calefacta & refrigerata balneis actui calidis iuuantur? non ne partem, corporis calefactam oleo aliquo ex temperatis actu calido iuuamus, atque eodem auxilio etiam refrigeratam? Quod & Galenus in 7. lib. aphorism. Hippocratis, aphor. 42. affirmasse visus est, cum dixerit: Aquæ calidæ lotionem febres & ab æstu & à frigore excitaras leuari: sicci vero morbi omnes cum suapte natura sint adstricti, itidem laxantibus tolluntur. Humidos vero, quandoque adstrictum, & quandoque fluidum siue laxum morbum facere deprehensum est, ideoque aliquando egent laxantibus, & aliquando adstringentibus. Quare affectus in partium vitiosa intemperie (quos morbos simplicissimos Dogmatici vocant) constitutos non habere ad curationem exequendam indicationem, Methodici voluerunt, eosque proinde si fiant (putarunt enim non dari hosce morbos, simplicesque elementorum qualitates morbos non facere, de qua re nos postea accuratius) vel ad adstrictos vel ad fluidos esse referendos. Hos itaque affectus, siue hæc causas communes siue genericas, totius artis medicæ communiter nuncuparunt: Quo fortasse modo Galenus dixit, Methodicos causarum loco affectus hos habuisse, quos itidem morbos esse voluerunt, non

*Gal. in li. de sus.
bonit. & vitio
cap. 2. 1. de sani-
tuend. cap. 1.
In libro de diff.
morb. c. 4. & 5.*

*In li. de opt. sect.
ad Trajyb. c. 23.*

*In lib. de caus.
morb. cap. 1. &
in libro de diff.
morb. cap. 4.*

non secus quam Galenus, obstructions viscerum morbos esse aliquando, modo lædant actiones, affirmavit (quos affectus sub adstricto comprehendi postea demonstrabimus) Neque est, quod meatuum adstrictio & diffusio præternaturalis causæ morborum esse videantur, cum quandoque morbus morbum faciat, vel (ut Galenus est auctor) ex morbo quod alter sepius morbus fiat, ut ex obstructione febris quandoque vel inflammatio succedit; vel melius dicendum, Methodicos adstrictos atque fluidos morbos, licet causæ sint, vocasse, ac constituisse, quod ab ipsis veræ indicationes curatiuæ depromerentur, illisque consultius videretur, à quibus indicationes curationis desumuntur, morbos dici quam causas, quia scilicet statuerint morbos esse qui indicant, & non causas, neque mirum si hæc atque alia diuerso modo quam Dogmatici, nominarint atque constituerint, quod ita fore, illis, pro sua breui curandi morbos methodo constituenda videretur, abhorrebat enim illorum Methodi medendi breuitas tot causarum, symptomatum, morborumque diuisiones, totque ac tantas circa hæc distinctiones differentiasque à Dogmaticis persecutas. Quare hæc causas morbos dixerunt, quod ijs lædantur membrorum operationes, immoderata namque cutis pororum raritas ita vires resoluit, ac deiecit, ut corporis actiones exinde maxime lædat, atque ita aliquando, ut non paucos extinguat, quod multis à nimio gaudio euenisse legimus, non secus faciunt sanguinis atque excrementorum immoderata profluvia. Permagna item obstructions viscus aliquod comprimentes, meatuum itidem validæ clausiones siue adstrictiones ita lædunt, ut exinde suffocatione aliquando corpora interimant. Ex ijs itaque Methodici adstrictum atque fluidum siue laxum morbos esse voluerunt: Quos genericos & communes quoque vel ex eo fecerunt, quod de pluribus particularibus dicerentur. Febres quidem, plegmones, tumores ac alios similes affectus adstrictos, quod adstrictio meatuum, vel in toto corpore facta, vel in parte aliqua eos foueat appellarunt sicuti diarrhæa, lienteria, dysenteria, menstruum, profluuium, diabetes & similes alij affectus fluidi ab ipsis dicebantur. Verū eminuerunt cum Dogmaticis verè sentiendum dixerim, hos scilicet affectus (quos morbos Methodici vocant) causas quidem esse, & non morbos, cum exempli causa à meatuum densatione adstrictioneue morbi fiant, scilicet, febres, phlegmones, tumores, conuulsiones, resolutiones, & alij complures affectus, veluti ab immodica meatuum diffusionem, refrigerationes, syncopes, cachectici, hydropes, & alij similes. At sæpius fit, ut ex fluido affectu morbi adstricti, & ab adstricto laxi fiant. Nam ab immodica pororum diffusionem immoderatus exeunte exhalanteue calore, sunt refrigerationes, cachectici, hydropes & alij, qui affectus adstricti sunt, atque ex immodica meatuum adstrictione non raro multitudo humorum oscula venarum laxat, aperit, profluuiumque facit, & hæc de illo primo Methodicorum dogmate dicta sint, & quomodo illi adstrictos atque laxos affectus morbos, & quidam communes esse voluerint. Nunc vtile erit, ut quid sit adstrictum, & fluidum, & quot modis intelligatur, dicamus.

Quid adstrictum & fluidum siue laxum sit, & quot modis intelligatur. Cap. VIII.

ITaque Methodici per adstrictos morbos intellexerunt, quos meatuum adstrictio perinde ac causa continens fouet, uti in febre putrida, calorem igneum intro adstrictum, adesse, atque foueri à retentis fuliginibus ob meatuum adstrictionem intro pressis, obseruamus & in phrenitide seu in quocunque phlegmone calidum humorem intro pressum vel perstrictum, ut Aurelianus expressit; veluti
& lu-

& luxos dixerunt, qui fouentur, à meatuum diffusione, cuiusmodi est syncopè ex immoderato sanguinis vel excrementorum profluuiò, aut ex immodico repentinò gaudio; obortà virium languor, dissolutioque immoderatus calore percutis meatus profluente. Hos itaque affectus curationem indicare meritò constituerunt, nam febrem putridam vel ephimeram à pororum cutis adstrictione (qui nihil aliud est, quam calor igneus intus adstrictus laxatis apertisue meatibus, atque ita igneo calore, qui intus adstrictus fuerat, exhalante, tolli obseruamus, & syncopem, viriumque resolutionem à laxatis meatibus ortam, si eosdem laxos meatus clausurimus. Ceterum, vt adstricti & laxi cognitio incepta perficiatur, iterum hanc rem parcius magis perstringentes dicimus per adstrictum, seu densum, seu prassum, seu arctum, seu tumen, affectum eos intellexisse, in quo consuetæ, quas corpus, vbi recte valebat, habuit) euacuationes atque purgationes præter naturam cohibita sunt, cuiusmodi sunt per poros cutis fuliginosæ transpirationesue interceptæ, sudores itidem consueti hamorrhagiæ, hæmorrhoides, menstruæ purgationes, alui deiectiones, vrinaque intercepta, atque quæcunque alia fuerit euacuatione vel purgatio sanitatis tempore consuetæ, aciuuans. Per fluidum vero, fluxum, laxum, profluens, diffusum, amplum rarumque corporis immodicam quouis modo factam meatuum rarefactionem, siue ad omnem partem corporis extensionem, seu meatuum expansionem intelligebant, seu vti Galeno placuit, eorum quæ manere debuerant excretionem, aut affectum in quo vel naturales consuetæque vacuationes, purgationesque immoderatus auctæ sunt, vel de nouo factæ, vti sunt menses immodice auctio vel hæmorrhagia sanguinis insolita, aut ex ore sanguis immoderatus profluens, vel ex ventre vel ex utero vel ex hamorrhoidibus, vel ex vesica eodem itidem modo lenteria, diarrhæa, dysenteria atque diabetes. Porro per fluxum humorum, aut vaporum profluuium, aut humores vel vapores, seu fuligines extra corporis meatus sensibiles vel insensibiles immoderate fluentes, intelligimus, veluti per adstrictum, densum, tumens seu tumidum arctum prassum, densum, obstructumque eisdem profectò humores, vel exhalationes, & fuligines, quæ determinato sanitatis tempore vacuari solebant, suppressas, atque cohibitas; vel in aliqua parte adstrictas, pressas, tumentes, siue membra distendendo tumentia, vt ait Aurelianus, reddentes. De his Hippocrates in epidemijs ita habet: Dilatare constingere, alia quædam alia vero non. & Galenus in commento: Dilatare densata oportet: Densare autem, quæ vltra decens ampliata sunt & postea: Arctantur autem & dilatantur vltra naturalem modum interdum vasculorum, quorundam aut membrorum sensibilia oscula: plerumque vero & ratione visibilia tum in cute, quam in profundo corpore posita: atque densata aperire & rarefacere mediocriter calefaciendo, petentia vero cogere adstringendo ac refrigerando. Igitur affectum adstrictum & corporis meatuum, osculorum scilicet ac venarum immodicam quouis modo factam densationem, siue adstrictionem, siue obstructionem vel humorum, vaporumque qui excerni debent cohibitionem, seu suppressionem, esse Methodici statuerunt; ex qua humorum vaporumque vt dictum est, fluxio ad aliquam corporis partem fit, quæ collectiones, phlegmones, febres, dolores, & alia tumentia ab ipsis vocata, concitat; ac nonnunquam exinde vasorum osculorum ora, distenduntur & aperiuntur, vnde affectus contrarius morbo adstricto, fluidus scilicet & latus dictus, oboritur. Per fluxum vero profluens rarum, laxum, diffusum, fluidum, apertumue immoderatam rarefactionem, siue diffusionem vasorum meatuum osculorum, siue viarum rarefactionem seu ampliationem seu apertionem quouis modo factam, intelligimus. Ceterum priusquam vterius ad astricti & laxi cognitionem procedamus, vnum præmittemus, quod videtur scitu necessarium, quod erit perseuerari an in via

Gal in libro de
diff. morb. cap. 5.
In lib. de optim.
sect. ad Trajyb.
cap. 28.

In 6. epid. sect.
2. text. 1.

C Methodi.

In libro de diff.
morbis cap. 7.

Cap.

In libro de diff.
cap. 7.

Methodicorum, meatuum corporis adstrictio & ampliatio laxatione, tantummodo de cutis meatibus, qui sunt visui incompeti, & insensibiles, vel de omnibus alijs viscerum interiorum meatibus, intelligatur. Gal. hoc dicit, dicens: sectam, quæ supponit prima elementa impatibilia tantummodo insensiles, & sensui incompetos poros cutis intellexisse, in eorumque solummodo adstrictione diffusionemque sanitatem, & morbum, constituisse, & Dogmaticos amplos ac sensui manifestos meatus omnes. Esto quod aliquis dicat Galenum non Methodicorum sectam, sed eorum Dogmaticorum, qui corpora prima impatibilia posuerunt, quales fuerunt Democritus, Anaxagoras, Diodorus Cronus, epicurus, Asclepiadesque, qui inter præclaros medicos ab omnibus adnumeratus est, intellexisse isti enim atomos atque in corporibus vacuum dari voluerunt atque ea ratione ex meatuum vitio morbos excitari. Ab his vero non fuisse differentes Methodicos vel etiam ex Galeni Apologia aduersus Iulianum Methodicum colligitur in qua scripsit, positionem morbi adstricti & fluxi ijs convenire, qui vacuum posuerunt; addo ex nuper demonstratis constare Methodicorum sectam, cuius Themison fuit inuentor, ab Asclepiade cepisse, scilicet ab ipsius opinione, quæ fuerat, morbos in exiguum meatuum vitio consistere; verumtamen Methodicos non tantum in exiguum meatuum sed etiam in magnorum ac manifestorum naturali vitioque statu, sanitatem, & morbum posuisse vnico argumento cognoscitur, quippe qui Methodici internas phlegmones, febres, tumores iccoris, lienis, ictericiam & alios huiusmodi affectus inter morbos adstrictos reposuerunt, quæ res cuique vel etiam leuiter in Aureliani libris versato, erit aperta. Etenim in internis phlegmonibus & tumoribus, laxantibus medicamentis non tantum in extimis partibus, cutis meatus respicientibus, vtuntur, sed qui nimo etiam in internis, quæ poros exhibebant, vt etiam internis meatibus adstrictis auxilio sint. Non enim eos latuit non solum morbos concitari externis meatibus sensui immanifestis patientibus, sed quinetiam internis, vnde phrenitim Aurelianus stricturam, lethargum pressuram vocat. Ex quo dantur morbi adstricti & laxi communes, quippe à totius meatuum cutis vitio obortos, ac particulares à quadam parte habente meatuum statum vitiatum, atque hi tum externi, tum interni, externi sunt immodicæ vacuationes cum sensibiles quippe per sudorem, tum halituum seu vaporum, quæ nobis incompetæ sunt, immodicæ adstrictiones, quas febres sequuntur, putredines, & quatenus impedito propter meatuum adstrictionem humorum, vaporumque ad extra motu, effluuioque interius commoti ad aliquam partem precipitant, eamque oborta inflammatione vel tumore tumorem atque adstrictam reddunt vel alio affectu eius cavitates seu meatus vitiant, quod Galenus etiam hisce verbis expressisse visus est dicens: Iam vero cavitatum omnium, quæ partibus debentur, tum magnitudo tum multitudo nisi seruetur, necessario earum occasione lædetur actio. Multum vero huiusmodi ægritudines, nonnullæ coalitu quodam, nonnullæ vero lentorum ac crassorum humorum obstructu consistunt, aliæ vero ipsi corporibus nimium exsiccatis; aut ab aliquo ex circumstantibus ingruenti ac comprimenti angustioribus effectis adueniunt: ipsorum quoque corporum, quæ tales meatus sortita sunt, substantia est aliquando indurata, vel inflammata, vel syderata, vel suppurata, aut inflata, aut quocumque modo aliam adiunctam atque aduentitiam adeptam magnitudinem, ac deinceps ad interiores cauernas tumorem refundens, causa est vt obstruantur meatus. Quare ex ijs deprehenditur: Methodicos non solum meatuum curaneorum, sed aliorum omnium, in cute, in carne in uenis, arterijs atque alijs membris organicis existentium vitium, pro adstricto & laxo morbis constituendis intellexisse.

Quomodo

Quomodo adstrictum & laxum siue fluidum cognoscatur.

Caput VIII.

Ceterum dubium est quomodo adstrictum atque fluidum cognoscatur, quibusue signis ita innotescat, ut sit evidens atque manifestum, uti Methodici voluisse, visi sunt cum fluidum seu laxum, fluxumue adstricto longe notius non habeat ut cognoscatur iudicium facile, eo quia si loquamur de excretionibus manifestis, non omnes, licet copiosius profluant, appareantue, fluxus affectus dici possunt, sed solummodo, quæ ita exeuntes corpus maxime lædunt, quæque morbi existunt. Has colliquationes Erasistratum medicum olim inter antiquos ferè Hippocraticæ auctoritatis appellasse, Galenus est auctor, atque illas non molestas neque cohibendas: vel uti est quædam salutaris purgatio per hemorrhoidas, menses in mulieribus singulis mensibus, ab anno decimo quarto ad quinquagesimum profuentes in puerperisq; menstruæ purgationes, etiam si per multos dies (quandoque ad quadragesimum usque diem protrahuntur) copiose fluxerint, ita hamorrhagiæ, vomitus biliosi, sudores, urinæ copiosæ, aluique deiectiones sponte à natura in recte valentibus excretæ, cum in morbis acutis in die aliquo ex decretorijs critique appareant. Profectò quibus signis eæ euacuationes, quæ Methodicorum laxi morbi dicuntur, nobis innotescant? Hippocrates duobus sanè notis eas cognosci docuit, quippè corporis difficili tolerantia, atque nullo subsequente iuuamento. Etenim fluxus morbus comitem habet malam tolerantiam: Corpora ab hisce fluxibus, licet nullam molestiam sentire videantur, utpotè neque dolorem, neque febrem, attamen resoluuntur vigiles redduntur, ciborum appetitu non valent, sitiunt, color vitatur, ac veluti colliquationes contabescunt, pulsusque debiliores, inæquales atque inordinatiores observantur; ex quo liquido constabit excretiones quidem omnes, cum sanguinis tum excrementorum, quascorpora leuiter ferunt, vel ipsis vel manifeste iuuantur, vel nihil læduntur, neque vires exoluuntur at exinde corpora potius robur accipiunt, atque leuiores euadunt, non esse morbos laxos. Idem in morbo acuto vexatis observantur, quippè quod critique excretiones, quæ ob id laxi affectus non sunt, eo argumento dignoscuntur, quod ab ægrotis leuiter ac sine molestia ferantur, & quia iuuant, atque nihil lædunt; addamus has euacuationes plerumque concocto morbo apparere & in aliquo dierum indicatoriorum, quasi febris vel dolor adsit, aut omnino tollunt, aut magna ex parte leuant, atque proinde egrotati in melius mutantur. Pulsus fiunt vehementiores, æqualioresque, si quis accuratius signa hæc optimarum, ac malarum excretionum, quæ fluxus Methodicorum sunt, perspecta habere cupiat, legat nostros libros de vita & morte egrotantia præfagienda euulgatos: in quibus nos longe plure & accuratiora ad istam rem facientia profecuti fuimus. Itaque fluxus meatuum sensibilium hisce prædictis signis medicis innotescant: Insensibilium verò fluxus; quippè in ijs, quorum corpora ob insensibilem perspirationem immoderatus effluentem resoluuntur, quibus nam notis à nobis dignoscantur? Methodicorum sectatores dicent, hosce etiam fluxus coniecturis quibusdam posse intelligi, scilicet, quod illa corpora, quæ immodice diffusis meatibus dissoluuntur, cutem mollem habeant, atque effeminatam, quæ ita duplici de causa fit primo ab extenuatione partium carnosarum subter cutem positarum, atque etiam, quoniam in ijs madores, seu exiles sudores, cuiusmodi in syncope fit, per cutem exeunt, quibus cutis emollefcit; Accedit idem facere fumidos vapores copiosius expirantes, siue effluentes, qui aliquando in his corporibus perinde ac fumi sensibilibiter exire conspiciuntur. Hæc prædicta signa Methodicorum, quibus fluxus, qui verè tales

In li. de opt. sect.
ad Trafsyb. cap.

In 1 aphor. 2.

In lib. 7.

Gal. in li. de opt.
secta ad Trafsyb.
cap. 29.

C 2 sunt

*In 6. epid. sect. 3.
tex. 27.*

sunt, deprehenduntur, quippe à molli cute desumpta, Hippocrates in epidemijs confirmasse visus est, cum scripserit: Omnis extenuatio laxat cutim, deinde distenditur. Quod signum in ijs non perpetuo erit attendendum, sed illo solummodo tempore, quo fluxus, seu consumptio in carnosas partes subter cutem positas agit, nondum quidem in cutis substantiam consumptione deducta: Tunc temporis cutis illorum corporum erit mollis ac effeminata, quæ postea fluxu perseverante, tensa ac dura euadit, scilicet exinde etiam cutis substantia consumpta.

*In epid. sect. 3.
comm. 29.*

Quam rem Galen. in Hippoc. commento perbelle ita expressit, dicens: Antequam igitur ad ipsam cutis propriam substantiam exhaustio pervenerit, perinde atque euacuati vires & sacci, & vesicæ, cutis laxior redditur, inanitione autem perdurante talis efficitur, qualis aridæ vesicæ, atque coria, quæ præduritia extendi non possunt, tales vero & in vtribus, & vesicis cutis affecta, videtur, cum exsiccata admodum fuerit, at usque dum humida sit, & mollis etiam interno cauo aliquid suscipit, itemque dimittit, suscipiens quidem cum satis expleta fuerit distenditur, cum inanitur autem relaxatur. Quare ex ijs colligimus, quod cutis mollis laxa, atque effeminata in principio exhaustionis erit, pro cognoscendo fluxu eorum corporum, quæ insensibili profluio laborant, satis firma nota: At diu eodem profluio perseverante, ipsa cutis non mollis, sed tensa, duraque observabitur, quæque primo in ipsa facie animadvertetur, signumque erit ad fluxum insensibilem cognoscendum. De quibus Hippoc. in prognosticis ita dixit:

In 1. progr. tex. 7

Fuerit autem eiusmodi nasus acutus, caui oculi, tempora adstricta, aures frigida contractæque & fibræ earum veræ, & item cutis circa frontem dura, intenta, arida & color totius viridis aut niger. At videndum erit, ne hæc cutis contracta dura & arida fiat, aut alimenti inopia, aut ex vigilia, aut cogitatione aut ex quapiam animi passione, vel à dolore, vel ex morbo colliquante, ac discutiente, exitiali, aut denique ex aliqua sensibili vacuatione vel sanguinis vel excrementorum. Quibus omnibus liquidò videtur, fluxum primo cognosci à cute molli effeminataque, at si non mollis, sed dura sit, atque distenta, non perpetuo erit signum fluxus, ut in febribus acutis, exitialibusque phlegmonibus, primis statim diebus tensa duraque & exsiccata cutis auctore Hippocrate apparet, at in longis febribus erit signum colliquationis, & fluxus. Quare mollis, & effeminata cutis erit attendenda pro cognoscendo fluxu, cui signo si alia adiunxerimus, certum iudicium haberi poterit, quippe virum languorem ita ut vix loquantur, pulsus humiles prælanguidos, rarosque: & syncopem, ut in ijs qui gaudio repentino immodicoque laxatis meatibus resolvuntur. Addo corpora suapte natura rari atque diffusi habitus, & causas antegressas, quibus laxari meatus possunt, hisceque signis propositis fluxus Methodicorum dignoscuntur. At de adstricto loquamur, demonstremusque & ipsum quadatenus notum esse. Etenim sensibilibus meatuum adstrictum, affectum consuetarum in corpore euacuationum recordatione siue memoria quisque facile comprehendet, quippe si menstruæ purgationes fuerint omnino suppressæ, cohibitæque vel hæmorrhoides, vel consueta hæmorrhagia sanguinis, uel intercepta urina, uel alius itidem adstricta: At quid de latentium meatuum externorum adstricto dicemus? Huiusmodi affectum, aut lassitudinibus; aut febre oborta conijci, quando densatis meatibus externis necessario febres accendi uel etiam Galenus non negaverit. In corporibus vitiosis succis refertis, adstrictis cutis meatibus (quod prohibeatur transpiratio, & humorum euentatio) putredines fiunt, si loquamur de internis uijis adstrictis, dicemus itidem adstrictum affectum innotescere à proprijs partium passionibus. Exempli gratia apoplexia, epylepsiaque adstrictum in cerebro denotat paralisis in nervis, cecitates surditatesque itidem in nervis, & in meatibus propriorum instrumentorum: Ileon in intestino eiusdem nominis icteritia in hepatis regione, affectus hypo-

In lib. de cat. feb. morborum c. 3.

hypochondriacus in hypochondrijs, maximeq; in sinistro, at an indextro vel in sinistro adstrictus sit affectus, facile & visu & tactu cognoscetur. Quare ex ijs adstrictum & fluxum non esse ignotos affectus intelligitur. Vnde neque mixtus vocatus affectus erit ignotus, quippè ex adstricto & laxo utpotè cum in febre hæmorrhagia, vel alia excretio immodica adfuerit, mixtus enim hic erit affectus, cum febris adstrictum hæmorrhagia fluxum morbum notet eodemmodo cholera, cardiagla, syncope, mixti morbi dicuntur, de qua re posterius nos accuratè scribemus. Cæterum priusquam huic negotio finem imponamus, vnum aliud nos scire oportebit, quippè laxum & adstrictum fuisse dictum principium euidentis, ac per se notum à Methodicis, quo haud signis opus habebit, quibus demonstretur, accognoscatur. Quod tamen absque signis adstrictum & laxum morbum non posse distinctè cognosci, ostendimus cum non omnis euacuatio (vtri dictum est) fluxus dicatur, sed tantum illa, qua corus grauius læditur, & ita non omnis cohibita purgatio vel euacuatio adstrictum faciet, sed quæ itidem graui cum noxa sit. Verum credendum est Methodicos, adstrictum & laxum per se notum esse, atque euidentis ea ratione, quod nemo negare queat adstrictum & fluxum affectum fieri in corporibus, (quando neque Dogmatici hoc vnquam negarint) ac vel etiam, quod ab ijs duobus affectibus omnis curatio, indicetur, quando adstrictum affectum laxando tolli, & laxum adstringendo neminem alicuius sectæ (quæ per contraria indicationes sumit) latuerit.

Cur adstrictum & laxum vel fluidum Methodici in species non diuiserint. Cap. X.

Diximus Methodicos per adstrictum intellexisse densum, durum, siccum, præsum, arctatum, strictum, clausum, tumens, constipatum: & per fluidum profluens laxum, diffusum, ampliatus, auctum, rarum fluxum atque humidum. Hæcque fuisse nomina pertinentia ad adstrictum & laxum, Methodicis familiaria, constat. Iulianus vero (vt auctor est Galenus) Methodicus vilis fuit, adstrictum & fluidum triplici differentia distinxisse, ita enim habet: Isti porro mediocritati cum insidiæ à morbis tenduntur, necessario fit, vt patiantur corpora contracta, ac dura, siccioraue, aut diffusa, molliaque facta, atque humida. Cæterum Methodici neque (vt apud ipsos obseruatum est) in hæc species etiam adstrictum & laxum distingui voluerunt; at contractum, vel arctum durum, atque siccum, ad adstrictum, referri, & diffusum, molle atque humidum, ad laxum. Quod minime ipsorum breui medendi Methodo conueniret, ex quo ne dicam omnes species, at neque illas tres tantum prosequi voluisse, conijcitur: sed omnes confundentes (vtri dictum est) ad adstrictum atque ad fluidum reducebant, vt commodè ab his tantum curatio in morbis indicaretur, siquidem corpore quouis modo adstricto laxandum esse, iudicarunt, ac proinde vtendum medicamentis laxantibus, quæ temperate calida & humida, tenuisque essentia, constituerunt: vel ipsum adstrictum, contractum vel durum, vel siccum, sit, quod medicamentum temperate calidum & humidum (quæ laxantiū natura esse videtur) & aperiat corpus contractum, & emolliat induratum, & humectet siccum: contra, corpore quoque quouis modo diffuso, aut emollito, aut humefacto, adstringendum putarunt, atque ob id adstringentibus vocatis medicamentis esse perpetuo vtendum, quæ frigida, & sicca, crassæque essentia, quippè terrena esse, voluerunt, vel diffusum sit, vel molle, vel humidum redditum, quod medicamentum scilicet adstringens, frigidum, siccum, & terrenum, meatus claudat, emollitum induret, atque humectum siccet. Hæc medicamenta Græci *στυγνῶνα* & Latini ob id claudentia dixerunt.

Quæ

*In Apolog. contra
Iulian. cap. 3.*

*ampli. illi yal
can. dum. alio
alio.*

In 5. simpl. cap.

Quæ Methodicis familiaria fuerunt, ad fluxum in corporibus quouis modo tollendum, quo nomine etiam illa medicamenta comprehenderunt, quæ Dogmatici cutem densantia appellarunt. Veluti ad adstrictum tollendum familiaria, (vbi dictum sit) habuerunt, quæ sunt calida, & humida ac tenuis essentia. Quæque Galenus distinxit, in emollientia, laxantia, atque rarefacientia. Vsum vero anastomoticonum quippè ex Dogmaticis perse aperientium Methodici omnino ad adstrictum tollendum omiserunt, quod hæc fortasse acria sint, mordacia, crasseque essentia. Vnde Aurelianus merito dixit, tumentiam hæc augere. Non esse autem necessariam ad illam Methodum medendi constituendam, eam adstricti & fluxi distinctionem, hoc quidem argumento putarunt, quippè quod cum institutum sit ad adstrictum, meatus aperire & ad fluxum, eosdem adstringere, sat erit ad fluxum meatus quouis modo adstringere, & ad adstrictum, quouis modo illos aperire. Quod medicamentis calidis & humidis (vbi etiam dictum est) præstari posse, voluerunt; cuiusmodi est aqua dulcis calida, hydreleum calidum, oleum dulce tenue, aut decoctum, aut succus expressus, ex malua, ibisco, fænugreco, lino, meliloto, & similibus in aqua percoctis. Hæc emolliunt, rarefaciunt, aperiunt, digerunt, atque humectant, idcirco emollientia, laxantia, rarefacientia, humectantia, fluxum facientia, aperientia humectantiaque nullo inter ipsa posito discrimine, totque hisce nominibus dicta, vnum idemque ex Methodicis sit medicamentum, vna eademque facultas. Exempli gratia decoctum altheæ, seminum lini fænugreci, vel hydreleum calidum, vocant vbi diximus medicamentum mollitorium, laxatorium, rarefaciens, aperiens, atque (vt vno verbo dicam) ad adstrictum morbum tollendum faciens. At ne dum hæc Methodici ex facultatum varietate (quando ex Dogmaticis facultas emollientia differat à laxatoria, à rarefactoria, atque ab aperiente Græcis anastomotica dicta) distincta considerarunt, neque cuiusque prædictarum facultatum differentias, cum emollientium medicamentorum quædam sint humectantia, quippè induratis à ficatione, quæ auxiliantur, quædam calefacientia, scilicet congelatas seu concretas à frigore partes, atque ita induratas soluentia, & quædam euacuantia, tensis quippè ac induratis partibus à repletionem quæ sunt auxilio. Quæ alijs multis non minus differentijs itidem distinguuntur, scilicet quod euacuantium medicamentorum, quædam sint digerentia, discutientiaue, humores atque flatus, quibus partes corporis plenæ tenduntur, quædam detergentia, quædam humores purgantia. Vnde etiam ex Galeno emollientium, quædam calida & humida, quædam calida, & sicca esse obseruantur. De laxantibus itidem, quædam immodice humectantia, quædam digerentia, ac humidum exhaurientia substantiæ musculorum subter cutem positorum. De hac Gal. Quamobrem non simpliciter vna est species laxantium remediorum, vrputa cum alia humectando, alia calfaciendo, alia vero emolliendo, quædam vacuando, nonnulla tumores præter naturam detrahendo, alia etiam per coniugationem horum quampiam agentia, laxare solent. Ita quoque de rarefacientibus, aperientibus anastomoticis, & de obstruentibus. Vnde Galenus merito Methodicos reprehendens, (scilicet quod hæc facultates in species non dixerint) dixit, appellationes simul cum rebus confundere, quicquid obuium est, citra vllam examinationem confundentes; At ne hos solummodo, sed Dioscoridem quoque Anazarbeum, qui de materia medica sex libros doctissimos scripsit, in iisdem Galenus damnauit, nonnumquam medicamentum facultatis aperientis dicentem, quod perse laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonem soluit. Quod vtique verum est, quippè (licet Methodicus non fuerit) ita sensisse: Nam, vt complures locos omittam, decoctum ex radice iridis oscula venarum vtero aperire scripsit. At quis queso non fateatur nostrum Dioscoridem recte de simplicium medicamentorum cum

faculta-

In 14. meth.
med cap. 5. 2. ad
Glauc. c. 5. in 5.
simpl. cap. 3. &
7. & 8.
In 5. simpl. c. 11.

In 1. lib. de materia
med. cap.
deinde.

facultatibus tum vñibus ad medicinam faciendam, scripſiſſe & licet aliquando cuiſpiam medicamento quampiam in eſſe facultatem dixerit, quæ per ſe illud non præſtet vt ex accidenti. Dixit ſanè; vt dictum eſt iridis decoctum oſcula venarum aperire, quod anatoſmotiſmorum ideſt per ſe aperiendum proprium eſſe videtur, ac non minus calida medicamenta cum febris multis tum alijs morbis calidis mederi, & frigida frigidis eodem modo cognitum eſt. Haud enim tenebatur Dioſc. in libris de materia medica medicamentorum ſolummodo facultates per ſe in morbos agentes referre, at quaſuis alias idem præſtantes: Neque eſt, quod nos perpetuo morbis mederi debeamus medicamenti facultate per ſe contrarijs, ſed quouiſmodo contrarijs, Rhabarbarum enim ſcamonium, agri-
 moniũ, apium, chamædriſm, medicamenta calida morbis calidis ac biliſis multis auxilio ſunt, non tamen facultate per ſe morbo contraria, cum ex Dogmaticis calidis morbis refrigerantia medicamenta conueniant. ſæpe fluxu fluxum, vomitu vomitum, & hæmorrhagiam ſanguinis vacuatione medici tollunt; nonnunquam etiam medici frigida aqua large affuſa, malis frigidis, & calida calidis medentur. Hinc balnea frigida in hæcticis, & calida in febris putridis olim uſum habuerunt. De uſu aquæ frigide in morbis frigidis Hippocrates ita ſcripſit;
 „ Eſt autem ubi in diſtentione ſine vlceratione, iuvene bene carnoſo æſtate media
 „ frigida aquæ multæ perſuſio reuocationem caloris facit, calor autem hæc ſoluit,
 „ & poſtea: Tumores articulorum atque dolores abſque vlcere & podagricos quo-
 „ que atq; conuulſa, horum plurima, frigida aqua large affuſa leuat. Quæ oĩa Ga-
 lenus multis in locis confirmauit. Quare Dioſcorides nobis ſimplicium medica-
 mentorum vires, uſusque medicos prænarraturus, cur ſolummodo vires per ſe morbis occurrentes, & non quouiſmodo iſdem contrarias complecti debuit? Sanè dixit multa decocta, atque ex ipſis inſeſſiones vel parata fomenta ex medi-
 camentis moderate calidis, & humidis emollientibus, laxantibus, rarefacienti-
 buſue oſcula venarum, cum in podice tum in vtero, non minusque etiam cura-
 neos meatus adſtriſtos aperire, an non aperiunt? certe quidem quod ſi aperiunt,
 licet non ſin acria mordaciaque in craſſæ eſſentiæ, quæ Græci anatoſmotica ideſt
 vere aperiencia dicunt, quid ad medendum erroris ſit & cum optatum aſſequatur.
 Non enim Dioſcorides veluti Galenus in primis libris ſimplicium, de ſimpliciũ
 ſanè medicamentorum facultatibus agens, tenebatur ſingulas facultates diſtincte
 nobis perſpectas facere. Vnde conſtabit Dioſcoridem immeritò in ijs fuiſſe à
 Galeno damnatum. Quibus proſecto perſuaſionibus Methodicis fuit perſua-
 ſum, ipſos à vera medendi Methodo non & rare, ſi ad adſtriſtum corpus, medica-
 menti moderate calidis & humidis vtantur, cuiuſmodi ſunt olea dulcia calida,
 hydreleum aqua calida, & decocta, parata ex althea, malua, ſanugreco lino & ſi-
 milibus. Hæc extrinſecus calida adhibita ad cutis meatus aperiendos vtilia eſſe
 primo medici omnes ſciunt, at quinetiam oſcula venarum (quod Dioſcoridem tra-
 didiſſe ſcimus) laxare atque aperire. Quod ſi verum eſt, hæc in quam ipſa aperi-
 re, quid tot, tantisque aperiendum differentijs eſt opus? Addo Methodicos re-
 cte quidem ſe ad adſtriſtum hiſce medicamenti, (quippe calidis & humidis, ſci-
 licet ex hydreleo calido, dulcibus oleis ſubſtantiæ tenuis, & ex decoctis nuperrime
 præſcriptis) vt oportere hoc ipſo argumento iudicarunt, quod etiam ex Dogma-
 ticis medicamēta emollientia, laxantia & rarefaciētia vnus eiſdemque eſſe eſſen-
 tiæ videantur, etenim (Gal. auctore) emollientia ſunt calida & humida, laxan-
 tia itidem cutim humectantia; non minus & rarefacientia calida itidem atque
 humida, tenuisque ſubſtantiæ, quibus vna eademque ferme natura ſiue eſſentia
 in his omnibus conſtituitur; licet illa habeant, quaſdam differentias, quibus
 ſecundum magis & minus interſtingui poſſe videantur. Veruntamen prædicta
 etia Methodicorum emollientia omnia id habent, vt meatus laxent, rarefaciant,
 aperiant,

In 5. aphor. 21.

In aphorif. 25.

In 1. ſimpl. c. 4.

in 3. de temp. c.

4. & c. ultimo.

Gal. in 5. ſimpl.
cap.

aperiant, aperiunt inquam laxando & rarefaciendo. Eadem quoque dicemus de fluido siue laxo corpore adstringendo, scilicet Methodicos vlos fuisse densantibus, stegnoticis constipantibus seu claudentibus dictis, cuiusmodi est aqua frigida, aizoum, portulaca, lenticula, palustris, polygonum myrtus, acacia, hypocistis, rubus & alia similia. Neque ad indicandam, curationem meatus apertos adstringentia, distinxerunt Dogmaticorum modo in indurantia, tendentia, atque in densantia, & merito cum vel hæc etiam purum inrerse natura differant, at potius quia quædam remissius, & quædam efficacius agant. Vnde hæc ad oscula venarum claudenda exercent, atque illa quod debilius adstringant, ad meatus cutaneos adstringendos. Accedit etiam quod (Galeno auctore) indurantia medicamenta sunt frigida & humida vel modice sicca, cuiusmodi est semperuium, portulaca, lenticula palustris, solanum, quorum essentiam Dogmatici fecerunt, mixtam ex aquea atque terrea substantia, & medicamenta tendentia cum & siccantia, & refrigerantia itidem sint, atque non minus etiam densantia refrigerent & siccant. Galenus ait, acerbam qualitatem cutem densare, atque densitatem a frigore agi, quod nimirum frigus denset: In libris vero simplicium expressit, densantia medicamenta esse semperuium portulacam lenticulam palustrem, quæ paulo ante dixerat quoque cutem indurare, indurantiaque esse medicamenta. Ita si ex Galeno medicamenta prædicta indurantia itidem densantia sint, a quibus complura quoque tendentium non videntur diuersa, utpote, quæ congelando & siccando cutem tensam reddant, quæ necessario frigida & sicca itidem esse debent. Quare hæc omnia medicamenta scilicet indurantia, densantia, atque tendentia, & idem præstare poterunt, quippe cutis meatus densare, vel id fiat induratione cutis, vel tensione. Merito itaque Methodici ea in species distinguere onluerunt, atque non minus hæc a stegnoticis, stipantibus siue claudentibus vocatis medicamentis, quod hæc omnia adstrictum faciant. At densantia (vbi dictum est) minus efficaciter quam stegnotica agunt idcirco hæc ad ampliores meatus adstringendos usum habuerunt, scilicet venarum arteriarumque osculorum ad nares, ad intestina, ad vterum, atque ad podicem desinentium, & illa ad exiles cutis meatus, qui laxati facilius adstringuntur. Itaque propter prædictas causas Methodici adstrictum & laxum in species diuidere noluerunt.

In lib. 5. simpl.
cap. 2. 10. 11. 14

In lib. 3. de cri-
stib. cap. 13.
In 5. aphorif. 62.
In 7. Meth. med.
cap. 8.
In libro 5. simpl.
cap. 14.

cap. 14.

An ab adstricto atque laxo fluidone curatio indicetur.

Caput XI.

VNum olim dogma apud Methodicos fuit maximi momenti, scilicet an adstrictus & laxus affectus vere curationem indicarent, porro certum est, eas duas communitates siue duos morbos idcirco a Methodicis fuisse inuentos, ut ab ipsis qualis nam vilis profutura curatio sit, indicaretur, vnde ab adstricto atque laxo curationem indicari præcipuum dogma istius sectæ constitutum est, ita ut merito ab adstricto laxandum, & a laxo adstringendum omnino præindicaretur: De quo Dogmate auctor libri de optima secta ad Trasibulum ita habet: At vero indicatione eius, quod conerat, laxitatem in adstrictis esse; in fluentibus vero compressionem: Nam si genui verbi gratia inflammatione laboret relaxare (aiunt) oportere, si fluat alius cohibere. Quod vero adstrictum & laxum vere indicent curationem, facile, si præsidia, quibus morbi cum adstricti tum laxi tolluntur, perspecta habuerimus, intelligemus. Exempli gratia ex adstrictis affectibus sunt febres, phlegmones, tumoresque; atqui quis medicorum est quem lateat febres balneis calidis ex dulci aqua, inunctionibus fomentis atque alijs laxantibus prædijs tolli? Non minus quam interne phlegmones Hippocrates in

in 7. aphorif. 42. dixit: febres multas multa aqua calida capiti superfusa folui, quis quæſo ignorat, in pleuritide, et peripneumonia exterius balnea calida, fotus laxantes inunctionesque vel etiam à Dogmaticis adhiberi, & intus decoctu, vel aquæ ex laxantibus medicamentis paratæ, ſcilicet, chamomelo, malua, althea fenugreco, lino & ſimilibus? quis itidem ignorat in pleuriticis vtiliſſime propinari oleum aliquod dulce calidum laxatiuum; ex ſeminibus lini expreſſum pro ſecreto ad deſperatos quosdam pleuriticos dari ſolet. Quid de tumoribus duris an non & ipſis emollientibus ſanari, Galenus de medicamentis ad lienis tumorem emolliendum ſcribens expreſſum reliquit? Vere ita adſtriſtum laxandum indicare intelligitur, & laxum adſtringendum indicare ex humoribus vel ſanguine ex parte aliqua corporis immoderatus profluente apertius dignoſcetur, quis quæſo etiam ignorat, ſanguine immoderatus vel è naribus, vel ex ore, vel ex ventre, vel ex vtero, vel denique hæmorrhoidibus profluente, omnes medicos ad adſtringentia confugere, vt oſcula venarum arteriarumque claudant, in diarrhæis, lenteriiſ, diſenteriiſque an non curatio medicamentis adſtringentibus fit? Certe quidem, quod ſi ita eſt, reprehendere Methodicos audebit, qui hæc duas communiter pro curatione indicanda conſtituerint, quippe adſtriſtum atque laxum: Hi affectus quandoque in toto corpore & quandoque in parte corporis fiunt, Totius adſtriſtum affectus eſt, vbi totum corpus adſtriſtum patiatur, quo affectu ſæpius animalia ſuffocata pereunt: partis vero adſtriſtum exempli cauſa eſt, vt ſi phlegmone pars quæpiam laboret. Ita laxum totius eſt, vbi in toto corpore rarefactis meatibus vires exalant. Quod ex nimio gaudio aliquando fit. Partis demum laxum dicitur, vbi per partem aliquam immodice diffuſam humores immoderatus fluunt, cuiusmodi eſt ſanguinis profluuium è naribus vel ex ore, aut ex ventre, aut ex vtero, aut hæmorrhoidibus, aut ex veſica, vel vomitus, vel denique alui fluxus. Vterque vero affectus tum partis tum totius ex Methodicis curationem indicare poteſt. Neque immerito, quando totius corporis meatuum diffuſio ſive fluxus adſtringendum neceſſario indicet, & adſtriſtum laxandum, ita & partis, nam vt dictum eſt, exempli gratia genu inflammatione vexato, vt humor in ea parte adſtriſtus digeratur, laxandum eſſi merito voluerunt. Contra fluxum præternaturalem vel vteri, vel ventris, vel hæmorrhoidarum, vel alterius quidem partis indicare cohibentia medicamenta; adſtringentiaque. Neque eſt, quod Methodicis obijciatur, veram tantummodo illam dici indicationem, quæ medicamenta quibus affectus tollitur, detegit, vnde adſtriſtum & laxum vere curationem non indicare, intelligi, ſed ſolummodo affectuſi ſublationem, ſcilicet adſtriſtum laxandum, & laxum adſtringendum, quod nihil profecto erit, quam vtrumque ſui ablationem indicare, quod cum omnibus vel etiam plebeis notum ſit, quippe morbum ſui ablationem indicare, nihil artifiſij videtur hæc Methodus habere, veluti etiam in chyrurgia cum dicunt, calculum, qui in veſica eſt propterea quod toto genere ſit præternaturam ablationem ſui indicare, idem & verrucas, myrmecias, antheromata, ſteathomata, melicerides, & inteſtinum, quod iam in ſcrotum decidit, & luxata omnia, quod loco ipſa præternaturam ſe habeant, reduci in artus debere, aluum fluentem ſiſtendum, vlcus ad cicatricem ducendum. Quæ indicationes nihil artifiſij habent, ignariſque etiam medicinarum hominibus notæ ſunt. At medici eruditi, ea ſcire debent, per quæ languores pelluntur, & vitiata ſanitas reſtituitur, proinde illis indicationibus opus eſſe, quæ particulatim remedia indicant, quibus morbi tolluntur, ex quibus adſtriſtum & laxum vere curationem haud indicare deprehenditur. At quid iſtuc eſt, quod Methodicis obijciatur? An non Dogmatici etiam ab affectibus curationem eodem modo (licet præcipua indicatio cauſarum ſit) deſumunt? An non dicunt febrem ſui ablationem indicare, quæ cum ſit intemperies calida &

D ſicca,

*In lib. 5. ſimpl. e.**Gal. in libro de opt. ſect. ad Træſyſt. cap. 24.*

De simpl. cap. 2.

sicca ideo refrigerantibus humectantibusque tolli, non secus quam Methodici dicant, adstrictum laxantibus medicamentis tollendum, atque laxum adstringentibus. Hasque idcirco indicationes omnibus vel etiam plebeis esse notas nihilque artificij habere, non secus quam omnes (ait Galenus) ab ipsa rei natura ducti, sciunt refrigeratos calfaciendos, calfactos refrigerandos, siccatos humectandos atque humectatos siccandos esse, non minus atque omnes scire vlus cauum carne impleri, sordidum purgari debere, æquabile cicatrice induci, non tamen norunt, quid carne impleat, quid detergat, quid cicatrice claudat, sic sanè etiam si mulculum habeant durum aut tensum, laxumue, quod duro quidem emollientibus sit opus, tenso autem laxantibus laxo vero contendentibus, id satis perspicunt, sed quæ nam medicamenta laxent, tendant, emolliant, prorsus plebei ignorant. Ita & omnes sciunt corpus adstrictum esse laxandum, laxum adstringendum, ignorant, tamen medicamenta quæ adstringunt, atque quæ laxant, Medicis Methodicis cognita, qui sciunt quibus medicamentis adstrictum tollitur, atque laxum, & in hoc à plebeis differunt. Quare non inconuenit Methodicos dixisse adstrictum atque laxum tanquam affectus vtique curationem indicare. Neque est etiam quod dicatur: auxilia non affectis sed facientibus opponi, veluti euacuatio multitudini contraria dicitur, morbo vero nullo, quoniam euacuatio quidem per se multitudini est contraria, ex euidenti vero etiam cuipiam morbo, veluti phlegmoni, quatenus tollit humorem, quo fouetur, & si rursus obijciant aliqui, affectus haud posse indicare curationem, sed causas, eo quia varij affectus vnicam causam habentes, non varia indicent auxilia, at vnum solummodo ex illorum causa indicari: Etenim icteritia atque cholera, quorum affectuum alter adstrictio est, scilicet icteritia, alterque fluxus, quippè cholera non duo indicant auxilia, at vnum solummodo ab vnica ipsorum causa, quæ est bilis abundantia, scilicet euacuatio. Quod tamen nobis non videtur persuasum, cum cholera affectus laxus, euacuatione non tollatur. Neque etiam si dixerint, vnicum affectum à diuersa causa profectum, vnum auxilium indicare, at eius causa varia, diuersa auxilia, vt suppressio vrinæ, quæ à calculo fit incidentia medicamenta exposulat, & quæ sit à phlegmone laxantia, & cuti adstrictæ ab igne (vt in vsta ab igne cute fit) cataphlasmata crustas separantia conueniunt, & adstrictæ à frigidityte, calfacientia: Quibus dicitur, non idcirco hæc argumenta demonstrare, ab affectibus curationem non indicari, quando suppressa vrina cum à calculo, tum à phlegmone tensæ viscæ laxantia medicamenta maxime conueniant: Ad calculos renum Galenus præcipit vias esse dilatandas, renes laxandos, morsusque mitigandos, ad quem affectum particulatim laudauit, oleum anethinum calidum, adipem gallinaceum recentem, phasiani, butyrum, fenugrecum, altheæ semina radicesque quæ singula laxantium genere comprehenduntur. Quibus medici omnes etiam vtuntur familiarius ad suppressam vrinam, cum exterius admotis ex iisdem paratis balneis, fomentis, cataphlasmatis, inunctionibusque vbi vero cathetero vrina educitur, id fit efficaciori præsidio, ex ijs, quæ Methodici fortasse laxantium quoque genere comprehenditur, at hoc ad chyrurgiam spectat, quæ non reduxit suos affectus ad adstrictum atque laxum. Ad cutem vero cum ab ignis actione tum à frigore densata laxantia conuenire, quis dubitabit, cum ad igniustos nihil vtilius, quam oleo dulci tepido ne dum partes vstas illinire, at si fieri potest, per horas in oleo obrutas detinere, quo auxilio qui vti possunt, alijs ad inustas partes sanandas non egent. Mel butyrum & alia medicamenta calida vstis auxilio esse, omnibus practicis notum est. Ex quibus apparet, ab adstricto atque a laxo affectibus curationem indicari, quod si Methodicis adhuc obijcitur, ad cutem cum ab igne tum à frigore densatam laxandam nos errare si auxilia permutauerimus, quandoquidem non pauci, aliqua parte

*In libro de ren.
affect. diagn. &
curat. cap. 4.*

parte corporis vsti, non oleo, sed alio præsidio vtuntur ad ipsam partem sanandam quam sanè ignis flamma proprius vstæ parti admota, ignem tollit quippè quoad ignem in parte vsta susceptum, flamma meatus laxando, ipsumque ad se trahendo digerat, eodemmodo vsti parti medentur. Accedit demum, vt ab affectibus curationem non indicari, dignoscamus, in varijs itidem affectibus ab vnicâ causa proficentibus, ipsos quidem affectus non indicare, pro exemplo acceperunt; plenitudinem alias phlegmonem facientem, & alias hamorrhagiam: hæc fluxus dicitur atque phlegmone adstrictum, qui affectus, euacuatione (non affectibus sed causæ quippè plenitudini contraria) auferuntur. At hamorrhagiam à plenitudine profectam non esse affectum laxum dicimus: nisi ita profusa corpus grauiter lædat ideoque non esse cohibendam. Etenim si absque plenitudine immoderatus sanguis profluxerit, exindeque corpus male se habuerit, laxus vtrique affectus diceretur, indicans cohibendum. Addimus laxantia medicamenta neque omni adstricto affectui satisfacere, si adstrictum præsertim foueatur humore crasso ac lento parti carnosæ pertinaciter inhærescente, quod ipse humor vel etiam maxime diffusis laxatisque meatibus non facile effluat, ad quod dicimus, humoris crassitiem, atque lentorem balneo aque dulcis, vel hydraleo, vel maluæ altheæque decocto diminui, vnde à meatibus effluet humorum etenim substantiam crassam atque viscidam humiditate accedente corrigi, neminem medicorum latere quemadmodum siccitate humores crassescunt, & viscidiores redduntur. Quare humor meatibus adhærescens, lorionibus laxantibus effluet, vnde Mulieres quibus capitis cutanei meatus sæpius ab immunditie infarciuntur, atque ea causa dolorem capitis vel aliquod aliud symptoma pati solent, lixiuijs laxantibus vtentes meatus capitis ab infarctu liberant. Quod vero multæ visciditatis humor pertinaciterque adhærescens non sine multo labore vel etiam laxatis meatibus (vt dixit Galenus) educatur, dubium non est, quando hic humor aliquando neque valide incidentibus, atque detergentibus medicamentis facile cedat. Intus vero meatus infarctos, vt in icteritia & in obstructis fit, medicamenti incidentibus, detergentibusque (laxantium quoque genere à Methodicis comprehensis, vt posterius demonstrabimus) referant, vnde in icteritia succum absintij, intubi agrestis, item decoctum asparagorum, dauci, feniculi & similibus, quæ sunt incidentia, detergentiaque; adhibere Methodici soliti fuerunt. Si vero humores sint tenuiores non crassi, neque visci, necessario apertis laxatisue meatibus effluent. Quo meatuum cutis raritatem Galenus inter causas sudorum recensuit, desudationemque quam Græci *εἰσιδοῦσιν* vocant, in acutis, exitalibusque morbis, vel ex eo quod sit laxatis à prælangue uirtute meatibus, dici perniciosum statuit. Quare adstrictum & laxum curationem indicare merito Methodici uoluerunt Galenus itidem curationem ab affectibus indicari sæpius annuisse uisus est. Etenim huiusmodi affectus cum causæ quoque sint, maxime indicare. Quis ignorat humorem quouismodo in aliqua parte corporis adstrictum laxationem indicare, quod & ut Dogmatici faciant, mittunt sanguinem, purgant humores, & postea admotis partæ affectæ medicamentis digerentibus laxantium genere comprehensis humorem digerunt, atque resoluunt, longe clarius patet, uel sanguinem, uel humores immoderatus profluente, cum corporis damno adstringentia cohibentiaue remedia indicare, quod ut fiat, medici medicamenta adstringentia partibus siue meatibus diffusis admovent. Itaque merito adstrictum laxandum, & laxum adstringendum in curatione indicabit, atque mixtum ex adstricto & laxo, utrumque faciendum, si in diuersis partibus fiant, uel ut aiunt, si in eadem parte cum adstrictum tum laxum sit, urgentiori etit incumbendum, altero non neglecto.

Gal. in apolog.
contra Iulian. c. 7

C. Auro in cap.
de icteritia.

In 9. Meth. med.
cap. 14.

10. Meth. med.
cap. 17.

11. Meth. cap. 7.

12. Meth. med.
cap. 7.

In 2. de comp.
med. secundum
gratia. cap. 6.

*Quomodo Methodici voluerint, tempora quoque morborum
curationem indicare. Cap. XII.*

Methodici non tantum illos duos generales affectus, de quibus hactenus, dis-
seruimus, sed tempora quoque ipsorum curationem quadatenus indicare vo-
luerunt. Hi cum triplicis differentiae, praedictas communitates fecerint, quatenus
vel passivas vocauerunt, ut adstrictum atque fluens, vel curatiuas, ut resolueret &
retinere, vel denique temporales, quae sunt quatuor tempora quippe principium,
augmentum, statum seu vigorem atque declinationem. Verum ubi demonstra-
rum est ex Methodicorum sententia eos affectus curationem indicare, scilicet
adstrictum laxandum, laxum adstringendum (quod nihil aliud est, quam adstri-
ctum resolueret, atque laxum retinere) atque affectum mixtum vtrumque indi-
care, at illud ex his, quod erit magis vrgens. Quare nunc merito cognoscendum
erit, an non etiam ex communitates temporales curationem indicent. Methodi-
cis visum fuit, ipsas indicare cum auxilia, tum vicinis rationem, & particularem
cibum eiusque qualitatem non minus. Qua ratione eadem esse tempora auxi-
liorum atque morbi voluerunt, quod sane dogma seu principium si recte intelli-
gatur non abhorrens a medendi Methodo videtur. Siquidem morborum tem-
pora sint quaedam differentiae, vel varij differentesque status, qui in toto quidem
morborum scilicet tempore, a principio ad finem vsque, observantur. Quae tem-
pora ex quadam morbi causae motione intelliguntur, scilicet motionis causae ini-
tium, incrementum, vigor, atque declinatio. Ceterum haec quidem morborum
tempora a naturae suae coctionis temporibus distinguuntur, atque ita aliquando,
ut quandoque principium naturae seu coctionis dictum, prima duo tempora mor-
bi & quandoque tria, & quandoque quatuor comprehendat scilicet principium
morbi, augmentum, statum & nonnunquam etiam (vbi dictum est) declinationem,
siquidem quandoque contingit, ut morbus ad augmentum, ad statum (& vbi di-
ctum est) nonnunquam ad declinationem perueniat, priusquam finitum sit natu-
rae seu coctionis principium, scilicet antequam in morbo aliquod signum coctio-
nis illuxerit (totum enim hoc tempus morbi, in quo excrementa omnino cruda
apparent, nullumque coctionis signum conspicitur, medici principium naturae
seu coctionis esse volunt) Quibus praemissis dicimus, Methodicos estimauisse
auxiliorum tempora esse non naturae, quae in humorum coctione & cruditate
consistit, ut morbis, scilicet initium, augmentum, statum atque decrementum.
Itaque Methodicis ideo persuasum fuit dari hasce temporales vocatas communi-
tates, a quibus curatio indicetur, licet non sit ab ipsis propria indicatio, cum do-
cuerint ipsam a morbi essentia depromi: Veruntamen indicare varia auxilia, qua-
tenus denotant varios morbi status, in quibus omnibus non eadem auxilia, at
varia exerceri oportet. Quod in externis phlegmonis maxime fit conspicuum.
An non (auctore Galeno) omnes etiam medici dogmatici in varis phlegmo-
num temporibus varia medicamenta adhibent? in principio ipsarum, sanguinis
evacuationem, ventrisque per medicamenta purgatoria laxantiaue instituunt,
quae in statu profecto non usu veniunt; praeterea derivatorijs, reuulsorisque me-
dicamentis tunc temporis incumbunt, a quibus abstinere in alijs temporibus:
quid de topicis medicamentis? in principio quidem repellentibus, in augmen-
to mixtis ex repellentibus atque ex laxantibus seu digerentibus, & in statu (quo
tempore totus humor ad partem inflammata fluxit) digerentibus, vel matura-
rantibus, & adhuc magis in declinatione resoluentibus. Quid an non haec varia
tempora varia auxilia indicare, intelligimus? quo mirum est, quamobrem Ga-
lenus contra Thessalum negauerit, a tempore morbi curationem indicari, & in
hoc

*Gal. in li. de opt.
sect. ad Trachy-
cap. 37.*

*In 2. ad Glau-
in 13 Meth. 2.
in 3. art. med.
cap. 2.*

*In lib. 4. Meth.
med. cap. 4.*

hoc ipsum reprehenderit, qui ob id vlcus antiquum ad facilitandam curationem, innouandum esse, censuit; quippè labia dura, malique coloris & callosa excidendo, atque sanguinem educendo, cum tamen vel etiam Hippocrates idem affirmasse visus (auctore eodem Galeno) fuerit, cum scripserit: & ab inueteratis vlcibus confert id agere, vt sanguis crebro effluat, quantum videtur opportunum esse. Non ne etiam Galenus apertissime dixit, principium morbi ad præsidia ferenda mirum in modum conducere? Quam rem etiam clarius expressit hisce verbis, dicens: Simili modo in oculorum vitijs, pleuritide & omni inflammatione, & in alijs morbis singulis generalia tempora sensu extimata diuersorum auxiliorum vsum significant. Vnde meritò Galenus, vt hoc dogma confirmaret, Hippocratis auctoritate utebatur, in aphorismis scribentis: Incipientibus morbis, si quid mouendum videtur, moue: consistentibus vero præstat conquietere, quinetiam de purgantibus ait: concocta purgare conuenit & mouere non cruda neque in principio, nisi stimulauerint. Adhæc: in morbis acutis raro & in principijs vtendum purgationibus. Quæ Dogmatici medici ad vnguem medendo obseruant; quippè si quid videatur mouendum, in principio esse faciendum, & in statu à medicamentis quiescendum; quod tunc temporis medici consultius à medicamentis cum purgantibus tum euacuationibus abstineant, scilicet quoniam circa initia & fines morborum omnia imbecilliora sunt, ægrotantiumq; natura haud multum morbis conflictatur, vnde ægroti vim medicamentorum facile ferunt, & circa vigores omnia fiunt fortiora; atque tunc ægroti, plurimum à vi morborum conflictati difficilius medicamenta ferre possunt. Hoc inquam tempore non conuenire medicamenta conuenit, ne natura in pugna contra morbum (vt Galenus quoque expressit) atque ad concoctionem humorum maxime occupata, distrahatur: atque etiam, quia in statu vires fortes non sunt, plurimum quidem in pugna morbi resolutæ, in principio vero ægroti viribus non carent, vt & euacuationes sanguinis fiant, & humorum purgationes, siue noxa perferre valeant. Cæterum vbi in statu, Galenus à medicamentis (ne a concoctione natura ægrotantium distrahatur) abstinendum esse dixit statum naturæ concoctionis siue intellexit. Quod & in statu morbi est intelligendum, cum ægroti itidem à vehementia siue à pugna morbi tunc maxime agitentur, debilitenturq; ita, vt commode medicamenta perferre amplius nequeant. Quod dogma cuiusvis sectæ medici in secuti sunt, ita, vt in morborum, naturæq; statibus à ab euacuantibus, atque purgantibus præsidijs omnino abstineant. Quæ in principio facili admittunt. Complures vero sunt, qui in acutis morbis transacta die quarta mittere sanguinem non audent, neque minus aliquod expurgatorijs exhibere. Ex ijs mirum non videtur, si Methodici tempora morborum quoadatenus indicare voluerint; nimirum (quod & ipsi sentierunt) in principio & in augmento euacuationes opportunas esse moliendas, & in statu ab ipsis fore abstinendum, ijsque solummodo vtendum, quæ nihil ægrotos debilitare atque exagitare valent. In multis morbis, hoc dogma vsui medicinæ quadrare videtur, at omnium maxime in phlegmonibus, externis tumoribus inflammationibusq; quoniam in principijs repellentium adstringentiumque vsus (exceptis locis quæ vi scribimus proxima sunt, quando affectu existente post aures, aut sub axillis, aut in inguine omnino à repellentibus sit abstinendum) conuenit. In augmentis vero mixtorum ex repellentibus & laxantibus vsus conducet, sed vrgentiori tamen esse incumbendum, & in statu nudis laxantibus, digerentibus. Quare non ab te à Methodicis fuit pronuntiatum, tempora morborum curationem quoadatenus indicare. Eodem itidem modo voluerunt hæc eadem morborum tempora non parum ad indicandam victus rationem facere, qui perpetuo in principio subtractionem in morbo adstricto faciebant, ob idque à multis Methodicorum diatrium fuit institutum,

In li. de vlcerib.

In lib. de totius
morb. temp. c. 2.
cap. 4.

In libro de tot.
morb. temp. c. 2.
In 2. aphorif. 9.
In 1. aphorif. 27.

stitutum, quod fuit ieiunium siue à cibi abstinentia per tres integros dies, quod quandoque ab ipsis & bis, & ter instituebatur, vbi sanè corpus multis humoribus abundaret, ita vt, si morbus adstrictus (quod maxime in chronicis obseruabant) instituto diatrito non diminuebatur, iterum per alios tres dies iubebant aliqui Methodicorum ægrotos à cibo abstinere, & aliquando tertia vice idem reperebant. Quam dietam ita exquisitam Ægyptij Methodici hac ætate etiam in acutis morbis adunguem seruare videntur, cum in febribus continuis, & internis phlegmonibus, ægrotis præter syupos aquæ dilutos nullum cibum vsque post septimam diem concedant, aliquibus exceptis, qui exhibebant iusculum ex aqua triticea surfures fuerint lotæ, cum aqua rosacea & saccharo candido, vel huius loco lac concedebant à seminibus melonum, aliarumque herbarum facultate frigidarum cum aqua expressum, vel alium ex ijs familiaribus cibis, qui vel nihil vel parum nutriunt quos omnes si quis accurate scire desiderat, legat nostros libros de medicina Ægyptiorum secunda editione euulgandos. At ad Methodicos redeo, qui in morbis acutis tenuissima dieta vtuntur, quam augent etiam in morbi statu, quod tunc temporis morbus adstrictus membra valde tumentia reddat, ideo dietam exquisitam meritò instituunt, quod cibus tumentia augeat, atque hoc ordine morbo declinante (quod minor adstrictio expugnanda superest) melius nutriunt. In quo instituto ab Hippocrate non discessisse visi sunt, cum ipse quoque idem hisce verbis nobis præscripserit: Vbi igitur morbus peracutus est, statim & extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu est vtendum, vbi vero non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbus extremis est mollior: paulo post: Quando morbus in suo vigore constitit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

In 1. aph. 7. & 8.

„ ipse quoque idem hisce verbis nobis præscripserit: Vbi igitur morbus peracutus est, statim & extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu est vtendum, vbi vero non, sed pleniorum victum contingit adhibere, tantum cibi indulgendum est, quantum morbus extremis est mollior: paulo post: Quando morbus in suo vigore constitit, tunc victu tenuissimo vtendum est.

In quibus Methodici cum alijs medicina sectis conuenerint.

Caput XIII.

In li de opr. sect.
ad Trajyb. c. 7.

Non erit inutile, priusquam vterius in secta Methodica illustranda procedamus, vt perspecta habeamus dogmata, quibus Methodici cum alijs medicorum sectis conuenerunt, & quod primum est, in quo (Galeno auctore) conuenerant, fuit, euidentia præcepta vtilia esse, analogismum, obseruationem, historiam, transitum ad similia, modum applicandorum remediolorum, & ex alijs alia deprehendi, atque ijsdem præsentibus eadem esse facienda, adiectione ac subtractione sanitatem conseruari, morbos depelli, & ad morbos tollendos nocentium vsum esse fugiendum, & quod ad materiæ medicamentorum notitiam atinet experientiam valere atque vtilem esse, & quæ nutriunt, & non nutriunt, purgantia, mortiferaque omnia medicamenta experientia comperta fuisse. In quibus sanè placitis ab omni secta admissis, illud animaduerti debet, non æque medicos Rationales, empiricos atque Methodicos se habuisse, at diuersimode ab hisce sectis fuisse accepta, atque in ijs primo, scilicet, quod euidentia vtilia sint, analogismus, obseruatio, historia, & transitus ad similia, hæc enim diuerso modo ad vsum medicinæ receperunt. Dogmatici seu rationales, empirici atque Methodici non minus & in eo præcepto, quod ijsdem præsentibus malis eadem remedia conueniant. Quando Dogmatici ijsdem etiam existentibus malis, in varijs tamen corporis partibus factis, non eadem remedia adhibeant. In alijs vero singulis æque omnes conuenisse visi sunt, in eoque maxime dogmate, quod adiectionibus, & subtractionibus sanitatem seruari, ac morbos fugari præcepitur, quando istud æque omnes medici receperint. Vnde apud omnes receptum est, medicinam esse adiectionem & detractionem, adiectionem quidem deficientium, & sub-

Gal in libro 11.
meth. med. c. 12.

& subtractionem redundantium, Quo morbi in humorum exuperantia, siue plenitudine, atque defectu seu inopia consistunt. Quod placitum facile Methodici acceperunt, quum per adstrictum, tumens plenum, & plenitudinem intelligant, & per fluidum, laxum, deficiens, atque defectum: siquidē, & vti Dogmatici dixerunt, cohibitis vacuationibus (quem affectum adstrictum vocant) humorum plenitudo fiat, atque iisdem immoderatus humoribus effluentibus, defectus, euacuatio, atque inanitio succedat. Quibus eorum sententia constabit, copiam seu plenitudinem tollere euacuationem, & defectum appositionem. Ad medicamentorum vero notitiā experientiam esse vtilem, neque Methodici, neque Dogmatici vnquam negarunt. Cum ij omnes receperint medicamentorum facultates ab antiquioribus medicis inuentas, atque cognitās: Dogmatici itidem complures medicamentorum facultates, omniumque maxime, quæ à tota substantia proficiuntur (quas occultas Medici appellant) experientia tantummodo cognitās esse atque cognosci posse, itidem compertum habuerunt. Galenus Methodo ab experientia deprompta, docuit quomodo possimus facultates simplicium medicamentorum qualitatiuas vocatas, cognoscere. Atque illas (vtdictum est) quæ ex tota medicamentorum substantia prodeunt, nobis sola experientia, minimeque ratione innotescere multis in locis affirmavit. Vnde mirum non est, si ne dum ipsi medici, at quinnimo etiam Dogmatici intellexerint, ac cognouerint, ex medicamentis, quæ nutriunt, quæ non nutriunt, purgantia, atque mortifera siue venenosa innotuisse sola experientia, quod hæc omnia facultate ex tota (vt aiunt) ipsorum substantia (quam vim occultam medici vocant) sympathia aut antipathia aduersus nos agant; atque hæc sunt, quæ circa communitates primas Methodicorum à nobis fuerant scribenda, nunc eas quoque consideremus, quæ itidem in medicina cum chyrurgica, tum prophylatica abijdem fuere obseruatæ.

Galen. 2. Meth.
med. c. 6.

Gal. in 10. simpl.
c. de cæcis fluidis
libris 6. simpl.
cap. 4. Aliff.

In 1. de comp.
med. secundum
gratia. c. 18.

De communitatibus, quas Methodici in medicina chyrurgica obseruarunt atque in prophylatica. Cap. XIII.

Cum vniuersa Methodica medendi secta in tres partes fuerint diuisa, quippe primum in eam, quæ olim medicamentis operabatur, & in illam, quæ manu (quam chyrurgicem medici nominant) exercebatur, atque demum in prophylacticam dictam, idest præseruatoriam. De prima satis superque scripserimus, restat modo, vt de his quoque duabus agamus; scilicet de chyrurgica & prophylactica, & vt à chyrurgica exordiamur, dicimus Methodicis à rei natura primum hanc communitatem satis fuisse, quippe alienum, sui ablationem indicare, vnde quodcumque, quod alienum sit, indicare sui ablationem constat, vt exempli gratia vlcus æquale cicatrice claudendum, cauum carne replendum & sic de alijs. Duplex vero ij alienum constituerunt, quod inquam indicat sui ablationem, vnum extrinsecum dictum, atque alterum intrinsecum vocatum. Alienum vero extrinsecum esse dicunt, quod extrinsecus corporibus infigitur, vt est spiculum, telum, & reliqua similia, quæ omnia perfectam sui ablationem indicant. Alienum vero in corpore intrinsecum vocatum triplex quoque Methodici fecerunt, scilicet, alienum loco, alienum magnitudine, atque alienum defectu. Quod loco alienum dicitur, primam indicationem habet, quia indicat sui restitutionem, scilicet, in naturalem locum, vt fractio, & laxatio, & intestinum, quod in scrotum descendit, quæ restitutionem, siue (vt ait Gal.) reponenda se hac in suo loco doceat. Alienum vero magnitudine uocant, ut abscessus omnes sunt, scroti tumores, acrochordones, idest peniles verrucæ, phymata, condylomata, quorum quædam indicant

indicant solum diuisionem, vt abscessus, quædam omnimodam superfluorum præcisionem, vt verrucæ, phymata, & condylomata. Demum alienum defectu vocarunt, quando partes, vel affectus ex defectu repletionem desiderant, vti sunt primum mutila & curtata omnia, ac vel etiam fistulæ, vlcera profunda hypophora Græcis dicta, sinus, vlceraque alia. Hæc enim ex defectu repletionem indicant. Quas communitates ex natura rei curationem indicare, voluerunt. Neque est quod aliquis dicat, propterea has nihil artificij habere atque ob id plebeis itidem notas esse, scilicet quia membrum laxatum & ij sentiunt in artus reduci, verrucæ tollendam, atque vlcus cicatrice claudendum. Dogmatici quoque morbos indicare sui ablationem dicunt, æque ac Methodici dixerunt, omne alienum sui ablationem indicare; quod si artis etiam ignaris notum videatur, non tamen ipsis sunt nota præsidia medica, quibus alienum tollitur. Etenim vlcus à rei natura cicatrice claudendum indicat, quæ cicatrix non inducitur vlceri cauo minimeque deterfo, ideo, quæ vlceri cicatrice claudendo sunt impedimento, primum indicabunt sui ipsorum ablationem, quibus sublati vlcus ad cicatricem venit. Quare quæ aliena sunt loco, indicant vel restitutionem, vel repositionem, veluti ossa fracta & luxata. Quæ magnitudine sunt aliena, vel perfectam præcisionem, vt verrucæ, phymata condylomataque, vel vnâ tantum incisionem, vt abscessus, qui facta incisione expurgantur, & diminuuntur. Quod vero defectu itidem sunt aliena repletionem restituntur, vti sunt vlcera, fistulæ hypophora sinusque, atque hæc de communitatibus chyrgicis & Methodicorum mente dicta sint. Contra quos, quæ fuerint à Dogmaticis scripta, non erit inutile, vt nos & audiamus, & sedulo consideremus, & si quis hac in re rectus iudex fieri cupiat, sciat oportebit Galenum Thessali alioquin visum fuisse apertissimum hostem, vt propterea plerumque non contra rem sed contra hunc hominem disputare videatur, at vnde tantum aduersus illum inimicitiam contraxerit, ignoro, ni forte dicatur ex inuidia illud euenisse, quod Thessalus in suo monumento iatronicen, idest medicorum victorem se inscripserit, atque eam in arte medica gloriam posteris relinquere ita studuerit, Quam famam & nomen Galenus gloriæ cupidus se solo posteritati tradi in optatis habuerat.

Gal. in 5. simpl.
cap. 1.

De aliquibus, quæ Methodicis obijciuntur, in communitatibus chyrgicis. Cap. XV.

Complura sunt, quæ Methodicis de chyrgicis communitatibus obijciuntur, & præcipua hæc fuerunt, primum, quod eorum Methodus in curandis, vlceribus, tumoribus, fracturis laxationibus, & curandis itidem vesicæ calculis, nihil habeat artificij, etenim etiam plebei non ignorant, quod alienum, & præter naturam est, sui ablationem indicare, scilicet, vt superiori capite dictum est, membrum laxatum & fractum esse restituendum, vlcus cicatrice claudendum, verrucas tollendas, secundo vlcus quoque cauum carne replendum esse æque plebei ac Methodici sciunt, ac forte etiam sarcotico medicamento illud agendum. Tertio, in curandis diuturnis vlceribus, quod à tempore indicatio neutiquam desumi queat, & quod vlcus non sit semper incidendum, ac nouandum, & quod Thessalus in horum vlcerum curatione meminerit, labia dura & mali coloris esse excidenda, cum longe plura sint impedimento quominus vlcus glutinetur, ac non minus reprehenditur, qui ea nominari vlcera diuturna & non cachoete, & quod confusam diuturni vlceris curationem tradiderit ampliusque non esse verum, quod vlcus innouatum, vt cruentum curari debeat, quando vlcus cruentum sit cauum & propterea sarcoctis prius opus habeat, & vt crustam glutinantibus. Non minus

Gal. in 3. Meth.
med. 1.

Cap. 1.
Gal. in 4. Meth.
med. cap. 4.

minus etiam damnatur, quod ad sananda illa vlcera cataplasma exsinapi circumponendum laudauerit, & præcipue cum prius sinapismo, & postea purgatione corporis vtendum, dixerit, quando medicamenta localia maximeque calida non nisi prius corpore purgato adhiberi debeant. Accedit etiam, quod Thessalus voluit vlceris malignitatem curationem indicare, non minusque & diuturnitatem, cum tamen indicare potius videatur dispositionem partis. Præterea, quod Methodici (qui & ipsi dixerunt vlcus planum cicatrice claudendum esse, cauum carne implendum, cruentumque conglutinandum) medicamenta epalotica sarcotica & colletica antiquis cognita receperint, neque in illis componendis idcirco esse laborandum putarunt, Amplius quia curandis vlceribus Methodici non sumunt indicationem à parte affecta, neque à substantia, neque à figura neque à situ; Quæ omnia necessario esse consideranda pro recta vlcerum curatione molienda Dogmatici voluerunt. Damnantur itidem Methodici in neruorum vulneratorum curatione, & præsertim ad illorum inflammationem tollendam. Atque hæc sunt, quæ ipsis in medicina chyrgica obijciuntur. Quæ si accuratius considerentur, haud illi ita, vt aliquibus Dogmaticis visum est, erunt damnandi, & de illo quod primo illis obijcitur, eorum scilicet Methodum nihil habere artificij, alias dictum est; idem hoc propemodum significare videtur, quod Dogmaticorum, in curandis febribus, indicandi ratio habet, quando & ipsi dicant, ipsas, vt causas indicare sui ablationem: exempli gratia membrum laxum erit tendendum, tensum laxandum, induratum emolliendum, & emollitum indurandum, atque sic de multis alijs faciendum quæ, vt ait Galenus, ex natura rei nedum medici, at plebei etiam æque nouerunt, & quod inter hos facit differentiam est, quoniam non æque omnes sciunt qualibus præsidijs hæc tollantur, quæ tantum medicis nota sunt, ita & Methodici dicent, omne quod est alienum, sui ablationem indicare, quibusque etiam medicamentis tollatur, seipsum scire, & in hoc à plebeis, qui hæc ignorant, differre: At si dicatur, etiam plebeos non ignorare, vlcus, exempli gratia cauum carne esse replendum, atque fortasse non minus quoque medicamentis id faciendum esse sarcoticis vocatis, id est generantibus carnem, quæ ab antiquis fuisse composita, & posteritati tradita, ac proinde æque ac plebei Methodici non distinguant, qualibus sarcoticis illud sit faciendum, cum non æque omnia sarcotica ab antiquis composita, & inuenta, omnibus vlceribus cauis conueniant, quandoque enim thus vlceris cauitatem replet, quandoque iris, vel erui farina, quandoque aristolochia; Vnde in hoc ipsi maxime errasse visi sunt, qui communibus compositis sarcoticis ab antiquis inuentis perinde atque plebei caua vlcera in omnibus sufficienter curari posse voluerint, cum tamen hæc non æque in omnibus carnem generent, vt propterea necessario distinguenda sint sarcotica, & cognoscenda, quæ particularibus vlceribus conueniant, & quæ non. Ad quæ Methodici facile respondebunt, sarcoticorum quadam communi distinctione proposita, quippè, quod quadam efficacius, & quadam debilius agant, ad gignendam carnem; proinde vbi debiliter agentia non valeant carnem generare, ad efficaciorum usum confugiendum esse. Quam medicamentorum sarcoticorum differentiam ex vlcerum natura magis quam ex natura partis esse capiendam Methodici duxerunt; Vnde in vlcere humidiori, validiori sarcotico, & in minus humido, debiliiori, opus esse affirmabunt. De indicatione à tempore alias à nobis actum est, ac non minus demonstratum etiam ex Dogmaticorum sententia, morborum varia tempora, varia præsidia indicare: verum quod in antiquo vlcere ad cicatricem non ueniente utile sit, uti Thessalus sentijt, labia scarificari, & ulcus renouari, etiam opiliones, ut recte Galenus ait, cognouerunt; neque inmerito, cum prauo eo sanguine euacuato, ac sublati callosi labijs, & mali coloris in ulcere cortigatur praua (si cum Dogmaticis

E loquamur)

In 1. Meth. c. 10

In 5. simpl. c. 10

In lib. de vlceri-
bus,
In li. 4. Meth.
cap. 4.

Quid. de Cauli-
co in tract. 4.
hoc. l. 6. 1.

loquamur) intemperies, vel adstrictus morbus, quippè tumor tollatur, vlcerisq; meatus adstricti aperiantur, & idcirco calor illiusce partis euentillatur, transpiratq; . Quam rem ita sentisse quoque visus fuit Hippocrates, quum dixerit, (quod Gal. non negauit) & ab inueteratis vlceribus confert, id agere, vt sanguis crebro effluat. Neque, vt opinor, recte à Galeno ad hoc fuit responsum. Quam curationem cum Auicenna, tum alij recentiorum maxime commendarunt. Ait Auicenna; quando corrumpitur, quod est in circuitu vlceris, & viridescit, & nigrescit, cura id scalpellatione, & sanguinis extractione, nec non cucurbitulis. Quare non ita damnandus fuerat Thessalus, qui dixit antiqua vlcera esse nouanda, ac idcirco labia dura, callôsa, maleq; colorata excidenda. Quod hæc præcipue sint impedimento, ne vlcus coalescat. Dixit itaque antiquum vlcus, vt recens cruentumque curandum, quando multa recentia vlcera etiam caua sint, in quibus primo cauitas carne replenda est, & postea conglutinatio anemis medicamentis procuranda; vnde Thessalus quoque supposuit, recentia caua vlcera prius carne esse replenda, quàm, vt cruenta conglutinentur. Omnia, quæ Thessalo Galenus obiecit, prosequi noluimus, quod ex ijs quisque intelligere fortè queat potius contra hominem quam contra rem Galenum disputasse. Quid mirum? si vlcera cachoeæ diuturna appellarit, cum cachoeia vlcera perpetuo diuturna reddat, quæ tardissime ad cicatricem veniunt. Neque etiam confusam curationem illorum vlcum (etsi singula particularia ad eam curationem facientia prosequi noluerit) egisse visus est, cum præcipua, & quæ certam curationem faciunt, tantummodo fuerit prosequutus. Neque etiam ita reprehendendus fuisse videtur, qui cum diurnitatem tum malignitatem in diuturnis vlcibus curationem indicare affirmauerit: De primo nuper egimus, demonstrantes etiam Dogmaticorum medicorum dogmatis tempus in morbis curationem indicare: quod & curationi vlcum diuturnorum maxime quadrare videtur, nam quemadmodum in horum vlcum principio & augmento vsum habuerunt medicamenta, quæ quouis modo vel fluxionem vlcus facientem prohibebant, vel humorum acutam qualitatem vlcerantem corrigere valebant, vel quæ partis temperiem vitiatam humores corruptentem emendare, atque tollere potuerunt; nunc eadem vlcera in statu & vigore constituta, vel quatenus a suo vigore etiam declinantia, diffusorij atque euacuatorij præsidij egere Thessalus docuit. vnde ille labiorum facta excisione sanguinis in ipsis vlcibus euacuationem commendauit, atque non minus medicamenta metasyncritica vocata, & præcipue quæ emplastro ex sinapi confecto agebantur quippe, vt partis (secundum Dogmaticos) cachoeia, quæ in vitia temperie consistit, qua humores vitiantur, tollatur, eiusque partis imbecillitas reparetur, seu, vti Methodicis videbatur, vt meatuum partis adstrictum, à quo, & cachochymia, & debilitas procedit, remoueatur. Quæ tamen præsidia Gal. apertè (vt Thessalò officeret) reprehendit; & particulatim illa, quæ ex sinapi fiunt: quoniam hæc, quod vehementer sint calida & sicca, incidendo, & erodendo, potius vlcus augere apta nata sint, atque non minus quod augeant fluxionem humorum vlcus fouentium, quoniam attractoria quoque vi polleant: & demum quoniam primum Thessalus topica hæc præsidia adhibenda, tentandaque esse voluerit, post hæc (vt vlcus in melius mutetur, & sanari videatur) purgationem catharticis, siue eductorij medicamentis esse moliendam. Quæ quidem si ita fiant, profecto medendi ordo peruertitur, quando in vlcibus sanandis, primum locum (omnibus medicis consentientibus) medicamenta purgatoria habeant, ad purgandos humores ex toto corpore fouentes ipsum vlcus, & postea ea, quæ vlcera parti adhibentur. Verum, etsi hæc vera videantur, tamen non video Thessalum ita ut fit à Galeno, reprehendi debere: Etenim ipse non adhibuit sinapismum supra ipsum vlcus, sed circa id ipsum

ipsum, ac propè vnde vlcus augere posse, intelligatur. Præterea totius corporis curam habuisse non semper, sed in eo tantummodo, si sinapismus non profuisset. Nā si fortè hoc medicamento vlcus melius habuisse ipsi fuerit obseruatum, non est credendum alia remedia fuisse aggressurum. Hæc vero medicamina ex sinapi ad hæc vlcera esse vtilia, eo quidem fortassè nobis persuadebitur, quod vlcera cachoete foueantur à praua partis affectæ intemperie humores affluentes, corrumpente; quæ nihil aliud est, quàm partis cachexia, cum hæc autem sinapismo corrigatur (mutatur. n. illiusce partis intemperies à medicamento istius digerente, rubefaciensq; faculrate) cur reprehendemus Thessalum, qui tale præsidium proposuerit? Neque dicendum est, morbi cachoeriam non consistere in vitiosa partis intemperie, at in humoribus prauis ab intemperie genitis. Quoniam intemperies, quæ cachexia illius partis est, præcipua causa ad vlcus faciendum, existit; sublata enim cachexia, humores non corrumpentur, atque ita incorrupti vlcus non facerent cachoete. Si vero sinapismus augeat humoris fluxionem, quod non negarent Methodici, tamen prauam partis intemperiem, qua humores corrumpuntur, & vlcus fouent, corrigit, quod longe vtilius est ad sanandum vlcus cachoete. Verum quia hæc vlcera diuturna, quæ cachoete sunt, a partis cachexia potissimum conseruantur, quippè humores ipsa affluentes corrumpente, aptosq; ea qualitate ex corruptione adepti ad exulcerandum ipsos faciente. Neque etiam nobis Thessalus reprehensione dignus visus est, in eo quod primo dixerit vitendum sinapismo, & postea purgandum eductorijs pharmacis: Quando non in omnibus vlceribus sinapismo atque purgatione vti oportere senserit. Etenim in ijs, quæ ab euacuato sanguine per labiorum excisionem, melius se habent, ac sanitati restituntur, neque sinapismo neque purgatione opus esse vlla intellexit, vbi vero à sanguinis vacuatione vlcera in melius non mutantur, sinapismus esse adiungendum, atque demum si neque sinapismo sanentur, etiam purgatione largæ esse opus, quæ fiat elleboro, vel alijs similibus medicamentis valenter purgatorijs. Huius vero curationis talis fortè ratio erit, quod hæc vlcera aliquando solummodo foueantur ab imbecillitate partis ob vitiatam temperiem, quæ cachexia est humores corrumpens; & aliquando & ab ea causa, & ab humoribus corruptis ex toto corpore fluentibus ad partem vlceratam; ad vlcera, quæ primo modo fiant, sat erit sinapismus, tollens ipsam partis cachexiam; quæ vero vtramque causam habebunt, præter sinapismum etiam purgatio erit necessaria. At dicunt, ordinem perueriti, quando prius purgatio locum habeat, & mox localia medicamenta. Hoc esset verum, si omnia vlcera diuturna cachoete ab utraque causa fierent, scilicet à partis vitiosa intemperie, quæ cachexia est, humores corrumpente, atque à corruptis humoribus ex toto corpore, uel ex aliqua parte ad ulceratam partem confluentibus; at quia plerumque hæc vlcera fiunt ab affectu solummodo partis, qui ipsam reddit cacheticam, debilemque, atque humores, qui vlcus faciunt, corrumpit absque nullo humorum ex corpore affluxu. Atque in talibus ulceribus curandis meritò Methodici à medicamentis purgatorijs abstinent, tantummodo affectui partis, ut ipsum tollant, incumbentes, cum nulla purgatione sit opus, neq; utile sit redundantes humores medicamentis catharticis commoueri; commoti enim possunt, & ad ulceratam partem decurrere, vlcus augere, & ad alias quoque corporis partes commoti possunt varios affectus, & quandoque grauissimos concitare: addo etiam eductorum medicamento- rum usum, vires debilitare, & præsertim naturales, stomachum uero priuatim labefactare, appetentiam tollere, ac vitare, nec non humores corrumpere, & viderum probam intemperiem vitare. Neque iniuria Methodici plerumque ab usu purgantium ob hæc prædictas causas abhorruerunt, & non nisi magna necessitate coacti illorum usum admiserunt. Quid? non ne etiam Dogmatici usum

purgantium timuerunt? cum omnibus eductorijs medicamentis vim quandam inesse deleteriam, qua naturæ humanæ aduersantur, cognouerint. Quare neque Theſſalus in vlceribus cachectis à partis affectu, nullo humorum affluxu concurrente ſinapiſmū ſufficere putauit. Vbi vero hæc à ſinapiſmo melius non ſe habeant (quod indicium ſit, adiunctum quoque affectui partis eſſe humorum ex corpore affluxum) etiam purgatione eſſe vtendum. Neque eſt, quo d aliquis contra Theſſalum dicat, conſultius eſſe vlcus præter partis cachexiam etiam humorum affluxum cauſam habere prius medicum dignoſcere oportuiſſe, atque ita primo purgationem fore præmittendam, & poſt ipſam ſinapiſmum inſtituere oportere. Verum ita reſpondere poſſent, non facile eſſe, vt medicus cognoscat, partis affectui vlcus facienti humorum ex toto corpore, aut ex aliqua parte affluxum coniunctum eſſe, quod ars cognoscitiua coniecturis ſæpe fallacibus exerceatur. Quamobrem Methodici vtilius dixerunt, ſinapiſmum adhibendum & ipſius utilitatem eſſe prius experiendam, quàm ad medicamentorum purgantium (quæ perpetuo prædictis cauſis multum timuerunt) uſum deuentum eſſet. Namque certius æſtimarunt, poſſe intelligi, an humorum fluxio vlcus cachectæ foueat, ex adhibitis medicamentis ad affectu partē metacriticis vi tollendi vitiatam intemperiem (quem ipſi adſtrictum morbum faciunt) prædiſis. Si enim vlcus non foueatur affluxu humorum, proſectò neceſſario ab uſu prædictorum medicamentorum melius ſe habebit, quod niſi in melius mutetur, ſignum erit, fluxionem humorum impedimento etiam eſſe, ne vlcus coaleſcat, atque tunc deprehendi, medicamentis quoque eductorijs, ad purgandos, & reuellendos humores à parte exulcerata, opus eſſe. Obijcitur præterea Theſſalo à Galeno, quod vlceris quoque malignitatem curationem indicare, dixerit. In qua re non video Theſſalios ſolummodo eſſe reprehendendos, ſed plures etiam Dogmaticorum, qui malignitatem in morbis curationem indicare voluerunt: quid enim? An non Dogmatici in peſte peſtiferis que febris, atque in vulneribus venenatis ſumpta indicatione priuatim à malignitate, alexipharmacis agunt? Cuiusmodi eſt terra ſigillata, terra ſamia, bolus armenus, lapidesque alij, & terræ bezoartice. Non ne etiam in vulneribus & morſibus venenatis theriaca mithridatio, alijsque alexiterijs Chyrurgi vt ſolent? Præſentis vero occaſionis non eſt, vt de hac re, ſcilicet an morborum malignitas curationem indicet, hic longius agatur, idcirco ad aliud, quod Galenus Theſſalijs medicis in neruorum curatione obijcit, tranſeamus; & dicamus non conſtare nobis, qualem Theſſalus curationem particularem ad neruos vulneratos inſtituerit. Quod fortasſe neque Galeno fuiſſe notum ea coniectura, facile dubitatur, quia Theſſali verba de ea curatione non recitauerit, quemadmodum fecit ubi de diuturnorum vlcerum curatione egit. Errores vero quos in curatione neruorum vulneratorū ſe animaduertiſſe, dixit, non à Theſſalo, ſed à quibuſdam ex Theſſali ſectatoribus, qui an recte Methodicam medicinam calluerint, haud planè conſtat, prodierunt, ſed hæc omittamus, & ad ea, quæ Theſſalijs in curatione neruorum vulneratorum obijciuntur, veniamus. Primo ij redarguuntur, quod in punctis neruis iſdem medicamentis uſi fuerint, quibus vt conſueuerant in maximis vulneribus, quippe enemis; ideſt conglutinantibus; quæ curatio eſt ſumme periculofa. quando potius vulnus ſit augendum, vt per ipſum humores effluant, quàm claudendum, ne exinde dolores, inflammationes & cōuulſiones pertimeantur, ad phlegmonesque in iſdem concitatos neruis cum præcauendos tum ſanandos vtendum ſit iuxta communitatem illorum præcipuam medicamentis laxantibus, ſcilicet quod inflammatio quælibet ſit morbus adſtrictus. Ad primum dicimus Methodicos voluiſſe omnia quidē vulnera enermis, curari, attamen ſeruatis (vt aiūt) ſeruandis, quādo neque conſtet illos vlcus cauum itidem ſtatim conglutinatorijs coaleſcendū ſtatuiſſe, ſed

In lib. 4. Meth.
cap. 4.

sed postquam cavititas carne fuerit repleta, neque sordidum priusquam non fuerit probe deterfum: proinde in nervorum itidem punctiōibus non statim ad vulnus conglutinandum ipsos festinasse neque minus etiam in omnibus vulneribus, mor-
fibus, atq; ictibus venenosis, idē esse faciendū. siquidem virus primum per vulnus extrahendū fortē ducebant, ijs, quæ laxant, quod virus in partem vulneratā susce-
ptū, morbum adstrictum faciat. Vnde locum etiam non habebit, quod ab auctore libri de sectis ad eos, qui introducuntur Galeno tributi (quem Galeni non fuisse auderemus affirmare) Thessalijs quibusdam obijcitur; scilicet eos non posse (exem-
pli gratia) recte mederi morfibz à cane rabido inflicto, cum primis diebus nul-
lo signo à morfibz, qui à cane non rabido fiunt, interstinguant? quare illos ijs-
dem enemis morfus curasse, quibus & illos à cane non rabido factos sanabant, sci-
licet statim vulnus conglutinantes; vnde ex hac prava curatione clauso intus vene-
no minimeque per vulnus expurgato quosdam perijsse. Nunquam credere po-
tuimus viros aliquin doctissimos (quod ex quibusdam ipsorum fragmentis conijcitur) scilicet Methodicos celebriores tam stupidos fuisse, qui vulnera ve-
nenata à communi curatione non exceperint, aliaque via ea curare non voluerint.
Eodem itidem modo, & in punctis nervis, eos statim ad conglutinationem venis-
se non constat litterarum monumentis, vel à Themissone, vel à Thessalo, vel ab
alijs, qui in secta Methodica claruerunt, posteritati traditis, licet scripserit Gal.
medicum Thessalium quendam primo enemis medicamentis in nervo vulnera-
to adhibitis, & postea oborta inflammatione appposito emplastro ex tritico, (quod
olim antiqui parabant ex farina triticea oleo atque aqua, & idcirco tripharma-
cum appellarunt) putredine concitata, interemis. Hic fortasse medicus Me-
thodicus non recte Methodicæ sectæ hypothesen tenebat, quod eo argumento
conijcitur, quoniam ille ad inflammationem in puncto nervo obortam, vsus fue-
rit ex farina triticea emplastro putrefactorio. Quis quæso Methodicorum fuit,
qui vnquam docuerit in inflammatione, quæ est morbus adstrictus, perpetuo
suppurantia convenire, cum primum illorum dogma fuisse demonstraverimus, in
adstricto affectu laxantia medicamenta convenire, & non suppurantia. The-
ssalus ijs certe vsus non fuisset, sed solis laxantibus, cuiusmodi vsum quoque
fuisse Galenum in nervorum puncturis ad prohibendam inflammationem con-
stat; cuiusmodi est oleum temperate calidum, antiquum, Sabinumque primum
locum habuisse statuit, quo vsum fuisse scribit, cum in nervis punctis, tum circum
puncturam ipsorum. An non ipsum est medicamentum secundum Methodicos
laxans, quinimo ipsum laxare Galenus in multis locis docuit. Etenim de ner-
vis vulneratis cum dolore ait: Bis ac ter in die, & in nocte solitum fuisse adhibe-
re fomentum ex oleo calido. quid an non etiam ab eodem oleum è seminibus lini
expressum commendatur? quod itidem nemo negabit esse vnum ex vsualibus
laxatorijs, quæ fuere apud Methodicos in usu ad morbos adstrictos: Quare ij non
videntur ita graviter reprehendendi, qui nervos vulneratos, maximeque punctos
curant laxantibus, & anodinis ratione doloris & inflammationis, quæ in ipsis
magno cum timore fieri solent. ad quas inflammationes compescendas, vel pro-
hibendas etiam in vulnerato capite cum ossis fractura, sublato osse duræ membra-
næ affundendum sanguinem columbini atq; rosaceum temperate calidū, voluit,
compluresque oleo solummodo rosaceo affuso calido nullum periculum incurrisse
& sanatos fuisse Galenus itidem scripsit. Igitur neque in nervorum, nervosa-
rumque partium vulneratarum curatione Thessali methodus tanta reprehensione
digna videtur. Veluti Methodici putarunt, magna quoque ventris vulnera
enemis præfidijs esse conglutinanda, servatis tamen servandis, scilicet in primis
aliarum internarum partium prius habita accurata consideratione. Neque enim
ita stupidos fuisse medicos Methodicos, qui spacio quatuor centum fere annorum
super

In 6. Meth. med.
cap. 1.

In 6. Meth. med.
cap. 7.
In 1. de comp.
med. secundum
loc. cap. 8.

In lib. 10. simpli.
cap. de sanguine
columbino in 7.
de comp. med. se-
cundum loc. de
plaga capitis à
perussione.

In 5. Meth. med.
cap. 15.

super omnes alias sectas (vti superius à nobis demonstratum est) in medicina claruerunt, censendum est, vt ventris magnum vulnus statim nulla partium internarum habita consideratione claudendum enæmis voluerint, sed post accuratam internarum partium curationem credendum est uoluisse hanc indicationem locum habere, ita ut quæ prima in mente illorum fuerit indicatio, postremum locum in executione habuerit. Eodem itidem modo Galenus Methodum Methodicorum damnauit, ex eo quod in sputo sanguinis ex ulcere pulmonis mittant sanguinem, quod nihil aliud sit, quam in morbo laxo uti medicamento laxante, sanguinis enim uacuatio (auctore ipso Galeno) medicamentum calasticum, idest laxans est. Ad quod, non inconuenire aliquando dicimus ex accidenti morbum laxum præsidio laxante tolli, perinde ac Dogmatici etiam dicunt, fluxum sæpius tolli. At consultius quoque Methodici responderent, non omne sanguinis sputum laxum morbum dici, sed illud solummodo, quod fit, ubi sanguis immoderatus ita effluit, ut in corpore magnam noxam inducat. At esto etiam quod ob eam causam immoderatus sanguis effluat, ita ut sit morbus laxus, non inconueniet reuulsionis & diuersionis gratia ad sistendum illum fluxum modicum sanguinis, ut posterius clare demonstrabitur, uena secta, uel alio modo educi, Quomodo sæpius Dogmatici hæmorrhagias, menses immoderatus profluentes, uel hæmorrhoidas sistere consueuerunt. Atque hæc sunt, in quibus Medicina Methodica à Dogmaticis damnatur.

Methodicis obijcitur, quod non exerceant medicinam ad homines particulares, sed ad hominem communem, & genericum. Cap. XVI.

In 3. Meth. med.
cap. 7.

STupidissimos Methodicos uocat Galenus, eosq; extremæ dementiae dixit, communem esse omnium hominum curationem putantes, quando non homo communis & genericus sit curandus, at particulares homines natura, ætate, sexu consuetudine atq; studio inter se distincti: Si itaq; inter se homines hisce de causis sunt differentes, & quemq; illorum differente curatione, quæ ad ipsum curandum aliquid ueluti proprii habeat, habere est opus. Vnde Thessalus, quod instituerit Methodum medendi, qua non particulares homines curantur; sed communis & generalis homo maxime damnandus uidetur. Verum (ut uerum aperte fateamur) non ita fuisse ab omnibus iudicatam hanc sectam ea ratione intelligitur, quia cæteris omnibus sectis medicinæ (dico Empiricæ & Dogmaticæ seu rationali) tot annis, uti alias dictum est, ita præualuit, ut non rusticos & plebeos, sed uiros doctos, philosophos, nobiles, magnates, principes, atque Imperatores sibi ipsi maxime addictos habuerit. Neque medici eam sectam in uillis, in oppidis, & in alijs locis uilibus exercuerunt, in medendiq; arte ipsi tantum claruerunt, at quinimo in maximis celeberrimisq; ciuitatibus, cuiusmodi fuit olim magna Roma, in eoq; præsertim tempore, quo ipsa imperatoribus maximis floruit, creditaque merito est, omnium ciuitatum regina, & metropolis. Cur itaq; istius sectæ, illis temporibus admodum celebris eius sectatores fuerunt ita stupidi, & dementes iudicandi? certe Galenus contra Thessalios magis contumeliosus, quam argumentis agere multis uidebitur, qui accurate omnia, quæ Galenus aduersus hunc unum Thessalum, cuius fuit hostis acerrimus, scripsit, animaduertent. At rem aggredior, ut ostendam curationem illam generalem & communem, quam homini communi tantum, & non particulari conuenire Dogmatici statuunt, haud uideri ita inutilem, & perniciosam. licet ipsis primo obijciatur, uti dictum est, non homines particulares eo medendi modo curari, sed hominem genericum

nericum & commune, quæ opinio vel vnico hoc argumento à veritate ab hor-
rere, videtur, quod singulis particularibus non vna curatio propter ipsorum dif-
ferentem naturam, ætatem, sexum, consuetudinem, atque studium, conuenire
possit. Etenim quis medicorum est quem lateat, in calidiori corpore exempli
gratia minus laborandum ad tollendam febrem, quam in frigidiori? idque pro-
pter maiorem, & minorem à naturali statu recessum. atque ita etiam in sicciore
corpore vlcerato validiora siccantia conuenire, & humidiori, minus efficacia. Ex
quo cognitum est, agrestioribus, atque robustioribus corporibus valentiora me-
dicamina conuenire, & mitiora imbecillioribus. Huc accedit etiam, quod alia
medicamenta pueris, alia iuuenibus, alia adultis, atque alia senibus conuenire
quotidiana experientia cognouit, pueri quidem neque vacationes insignes neque
purgationes ferunt, vt iuuenes & adulti faciunt. Quare istis rationibus Metho-
dicorum generica curatio à Dogmaticis est explora. Quæ fortasse, vt defendat;
haud multis quoque rationibus indigna aquoquam estimabitur: Siquidem om-
nium testimonio & confessione constet, corpora omnium particularium homi-
num, ex iisdem constata esse principijs, scilicet ab iisdem elementis, humoribus,
atque partibus, à quibus vnica ab ijs natura fluxit, quam eandem singulis inesse
cognoscimus: neque enim indiuidua specie differunt, sed quibusdam accidenti-
bus, Quorum varietate in singulis curandis, medicamenta non natura, sed po-
tius efficaciori vi, & minus efficaci distincta conueniunt; vnde hæc ipsa ad sin-
gulares homines curandos varia inter se erunt (vt aiunt) secundum magis & mi-
nus, idest secundum maiorem & minorem vim, qua donata sunt, atque hac so-
lummodo differentia curatio generica, à particularium hominum curatione inter-
stinguet, quoniam ad particulares homines, natura, ætate, sexu, studio con-
suetudine distinctos, persanandos, ea quidem cognita esse debent medicamenta,
quæ efficaciter agunt, atque illa non minus quæ blande; Medicos siquidem om-
nes haud latet, pueros, eunuchos, mulieresque molles, non ferre præualida eua-
cuantia, atque purgantia; & viros adultos, robustos, agrestes præualidis iua-
ri: quod in curandis quoque affectibus maxime animaduertitur. Nam pueri
febre, vel phlegmone vexati, neque sanguinis vacationem, neque purgantia
valida æque, vt viri iisdem malis laborantibus, non ferrent, neque vlcerata in
iisdem æque siccantibus medicamentis tollentur, in his efficaciora siccantia,
atque in illis debiliora, requiruntur. Itaque ex ijs facile intelligimus, non ita
damnandam esse genericam Methodicorum curationem, qua ne dum homini
generico, at quinetiam particularibus hominibus differentiis temperamento,
ætate, sexu, studio, consuetudine & quibus libet alijs differentiis distinctis, mederi
posse, adnotatis in medicamentis quibusdam pauculis differentiis, quæ penes
ipsorum maiorem & minorem agendi vim, animaduertuntur. Quo non mirum
est, si medicamenta, conuenientia homini communi, etiam particularibus homi-
nibus probe conuenire ea cautione videantur. Quæ res facile nobis innotescet,
præmissis quibusdam. & primo quod, solæ animalium species & non particula-
ria indiuidua proprios ac distinctos habuerint cum cibis, tum medicamenta at-
que ita, vt in ipsis distinctissima obseruentur, Vnde Gal. merito facultates me-
dicaminum experientia cognoscendas ad hominum vsum docens; dixit: In pri-
mis quidem ac maxime sumendum est iudicandæ facultatis experimentum ab ea
re ad quam dicitur, siquidem non protinus si hominem refrigeret cicuta, & stur-
num refrigerabit: aut si sturnum nutriet, nutriet & hominem, eadem ratione ne-
que si hominem purget veratrum continuo purgabit & coturnices. Quod tamen
in indiuiduis non obseruatur. Etenim veratrum omnibus coturnicibus est cibus,
singulæque coturnices eo cibo nutriuntur, veluti eo cibo omnes homines purgan-
tur. idem quoque esse de medicamentis à multis traditum est neque immerito,
cum,

Gal in 3. Meth.
med cap. 7.
In 2. ad Glau.
cap. 3.
In 6 Meth. med.
cap. 3.
In 6. de comp.
loc med. c. vlt.
In 2. de comp. se-
cundum gratia
cap. 11. In 3.
cap. 3.

cum, vt quædam ex innumeris perstringam, experientia cognitum sit dictamnum exempli gratia non vni ceruo at singulis ceruis vulneratis remedio esse, & veneno singulis ceruis infectis caneros fluuiatiles cinaramque aduersari, & aduersus morbus venenatos mustellæ cuiuslibet rutam deuoratam esse auxilio, & ciconiæ origanum, vrsi formicas; cunilam testudini, apro hederam, oleastrum elephanti, coruo laurum, lactucamque syluestrem draconi. Non enim vni tantum bruto, sed cunctis singulis hæc medicamenta prodesse, cognitum est. longus quidem & nimius labor naturæ fuisset, si singulis eiusdem speciei brutis, singula monstrasset medicamenta, compertum enim est, quod vni eiusdem speciei animali ad medendum conuenit, singulis omnibus suæ speciei conuenire. Ad purgandum quoque eodem modo natura in singulis animalium speciebus se habuisse constat, vt quædam medicamenta purgantia illas ipsa docuerit, quæ omnibus brutis eiusdem speciei ad corpus excrementis exonerandum, conducant; non ne feles commanlis graminis radicibus vomitione purgantur? an non canes lauro? accipit resque voratis suis ipsorum pennis? palumbes vero, graculas, merulas, lauri itidem folio annum fastidium purgare & columbas, turtures, gallinasque helixine, anatesque, anseres, atque cæteras aquaticas oues syderiti herba, & grues palustri iunco, Plinius testatum reliquit? Quid itaque non ne verum est? naturam diuersis animalium speciebus quædam monstrasse præsidia, quibus ad morbos particularia animalia vtiqueant? certe quidem, namque (vt dictum est) eodem modo se habent animalium species ad medicamenta, quo se habent ad nutrimenta. An non hordeum, auena, zea fagopyrum, fenum cibus est omnibus equis, mulisque veluti triticum omnibus hominibus? non enim equorum mulorumque aliqui licet temperamento ætate, sexuque quodammodo differant, hunc cibum respuunt, vel ipsum aliqui illorum non ferunt. Panis etiam è tritico paratus ita singulis hominibus est opportunus cibus, vt nullus ipsum respuat, neque ullus ipsius usu ledatur; non enim Socrati conuenit, & Platoni (quod à Socrate ipse temperamento distinguatur) nequaquam: neque solis pueris, at singulis cum pueris, tum iuuenibus, tum alijs alterius ætatis hominibus cibus est opportunus, non secus & viris & mulieribus, & rusticis, & vrbansis conducit, plebeis, philosophis atque alijs studio differentibus. Quare eodem modo de medicamentis erit sentiendum, quippe quod vni homini conducit, cæteris alijs omnibus conducere; neque varia corporum temperamenta, sexus, ætates, studia, medicamenti essentiam siue naturam vnquam euariant, sed quantitatem solummodo, & ipsorum medicaminum agendi efficaciam, cum ex ijs quidam homines minus efficacia ferant, & quidam etiam valde efficacia exoptent, ipsisque iuuentur. At rem hanc exemplis quibusdam illustremus, & confirmemus, quid an non cognitum est, vnico medicamento innumeros ferè homines eodem affectu, persanatos fuisse? non ne Æsculapius Romam pestilentia infectam solo Theriacæ usu sanauit? quid non ne omnibus hominibus, calidi, frigidi, humidi sicciq; temperamenti, cuiusvis ætatis, sexus studijque peste infectis Theriaca fuit utilis? Quid, etiam non ne Galenus expressum reliquit, in quadam pestilentia, omnes homines cuiusvis temperamenti, ætatis, sexus, usu boli armenij (quem fuisse terram sinopicam Dioscoridis putamus) per os deuorati fuisse iuuatos? Quid etiam de lapide bezuartico dicemus? an non omnibus vtiliter datur, ad venenum deuoratum, & ad febres pestilentes? certe quidem. Si vero de medicamentis quoque venenosis loquamur, non ne cicuta, opium, altercum cantharis, buprestis, salamandra, taxus & alia similia omnes homines cuiuslibet temperamenti, ætatis, sexus, studij, grauiter lædunt? Neque est, vt quis dicat, quoddam venenum deuoratum non eosdem particulares homines æque lædere, quinimo quibusdam deuoratum nihil læsisse; Quod etsi quandoque contingat, non ideo fit quia

quia in hominibus temperamento, ætate, sexu aliquo pacto inuicem distinctis diuerse agat, ita, vt quosdam lædat, & interimat, & quosdam non, at aliam in causam varia à veneno deuorato operatio erit referenda, quæ erit, in quibusdam venenum grauem noxam non inducere, aut quod eius quantitas nimis exilis fuerit adeo, vt priusquam caperit agere, fuerit ab expultrice natura, vel per aluum vel per sudorem vel per vrinam, vel per vomitum excreta; aut quia venenum antidotum inuenit in stomacho, cuius vi impeditum agere non potest, quando cibus pinguis ac vnctuosus in stomacho existens, vim veneni hebetet, ac retardet, quoad vnâ cum excrementis excernatur. Quare illa varia veneni in varijs hominibus operatio, non à differentia naturæ, vel ætatis, vel sexus, vel alterius conditionis prouenit, sed à causis prædictis. Eodem modo si loquamur de alexipharmacis, & alexiterijs, idem verum esse comprehendemus, quando & hæc omnibus particularibus hominibus vel veneno infectis, vel à fera venenata demorsis, medicamenta sint, neq; varie agant ratione varij temperamenti ætatis, sexus, studijque sed quinimo singulis remedio sint. Scribit Galenus de Theriaca, eam esse optimam, quæ omnes homines à viperis demorsos, sanat; quinimo dixit, neminem ex demorsis à viperis, qui theriacam deuorauerit, interiisse. Si itaque omnes demorsi à viperis Theriaca sanantur, quomodo verum erit rationalium medicorum dogma, quod medicamenta in corporibus temperamento, vel ætate, vel sexu, vel studio, diuersis ac varijs, non eadem, sed varia quoque esse debeant? Accedit, quod si non eadem medicamenta, particularibus hominibus natura, vel sexu, vel ætate, vel studio, differentibus conuenirēt, ergo in varijs hominibus à viperis exempli gratia demorsis varia medicamenta alexiteria conuenirent, neque vnicum omnibus conduceret alexiterium, quod tamen omnes falsum intellexerunt, quoniam sola Theriaca (Galeno auctore) sanat omnes à viperis demorsos. adde quod si hoc esset, non tantum ratione variorum hominum demorsorum, at quinimo etiam ratione singularum viperarum mordentium, natura, ætate sexuque diuersarum, alexiteria varia esse debuissent, quod si fieret, medicamenta sermè innumera esse deberent alexiteria, cum tamen pauca sint, quæ omnibus à quibusuis serpentibus vipereis demorsis efficaciter medentur. Quid etiam an non Galenus affirmavit? omnibus hominibus à cane rabido demorsis antidotum ex cinere cancrorum fluuiatilium vstorum ita conducere, vt hæc antidotus multis diebus per os assumpta quoslibet demorsos à cane rabido ab hydrophobia siue à rabie ita præseruauerit, vt ne vnus quidem ex ijs, qui antidotum deuorauerit, rabie fuerit tentatus. Item de alyssis ad rabiem scripsit. Caterum si de purgatorijs etiam sermo habeatur, quid an non omnes purgant? Veratrum deuoratum omnes quidem homines cuiusvis conditionis purgabit, idem scammonium, colocynthis, elaterium & alia purgatoria, & si quibusdam non conueniat veratrum, vel scammonium vel aliud ex medicamentis eductorijs, hoc non fit, quod propter differentem vel naturam, vel ætatem, vel sexum, vel studium diuersum, non purget, at quod vel nimis purgat & agitat, vel minus quam sit opus. Quapropter cum singulis hominibus, licet differant natura vel ætate vel sexu, vel studio, eadem medicamenta conuenire hæcenus demonstrauerimus, quis quæso non intelliget, Galenum contra Thessalum conuicijs potius, quàm rationibus egisse? neque enim stupidi & extreme dementia erunt dicendi, qui constituta generica curatione (quibusdam & pauculis exceptionibus animaduersis) particularibus hominibus mederi posse, existimarint: quod Methodici fecerūt, qui hypothesi generica constituta (quod omnes morbi vel ad adstrictum vel ad laxum reducuntur) in omnibus corporibus, cuiusvis naturæ, ætatis, sexus, temperamenti, studijque, morbo adstricto vexatis, laxantibus medicamentis esse vtendum, & in laxo, adstringentibus voluerunt. atque hæc pauca nobis de hac re sufficiant.

F De parte

*De parte prophylactica, quam Methodici cognouerunt.**Caput XVII.*

Cap. 3.

DEum addimus communitates partis medicinæ prophylacticæ, idest præseruatoriæ: De quibus auctor libri medici vocati ita habet: Iam vero præter quatuor chirurgorum communitates est & species, quam *προφυλακτικὴν* idest præseruatricem appellant. Apponitur autem & ipsa, ut communitas, in deleterijs & toxicis, bestijsque omnibus, quæ virus inspuunt, tum venenosis volatilibus, & terrestribus aquatilibusque. Nam commune omnium genus, ut sint exitialia, non tamen ad adstrictum & fluens. Ex his apparet Methodicos habuisse siue exercuisse partem hanc medicinæ præseruatoriam solummodo in deleterijs medicamentis, siue venenis, quæ deuorata interimunt, & in moribus, & ictibus bestiarum venenosarum. In hisque communitas est, quod hæc scilicet venena, & morsus, ictusque venenati sint exitialia, idcircoque ab ipsis indicari medicamenta cum alexipharmaca tum alexiteria, quæ nostri antidota, & Theriacalia vocant. Quorum quidem medicamentorum usu homines cum à venenis præseruantur, tum à moribus, ictibusque venenosarum ferarum. Vnum adnotamus, quippe illam præseruatoriam communitatem Methodicos solummodo in venenis, moribusque, & ictibus venenatis cognouisse neutiquamque in alia parte medicinæ, quæ etiam ab alijs affectibus in quos homines, & ob prauam victus rationem, atque ob alias causas delabuntur præseruare docet: Idque fortasse, ut putamus, ita erat, quia olim medici fortè non omnium malorum præseruationi dabant operam, sed solummodo (uti dictum est) venenorum, quæ per os assumuntur, aut venenosorum animalium morfu vel ictu quæ corporibus communicantur, prophylacticæ, ob eamque fortasse causam, quod hæc exitialia atque mortifera sint, & ab ipsis clam possint homines extinguere: ex quo huiusmodi præseruatio singulis hominibus cuiuslibet conditionis utilis fuit æstimata, maximeque omnium, Pontificibus, Imperatoribus, Regibus, Principibus, magnatibus, atque diuitibus vtilissima ab omnibus ipsa fuit existimata. Idcirco quæ olim apud antiquos hæc præseruatio in magna existimatione est habita, atque ob id accurate exulta, ne veneno Reges, principes, alijque perpetua formidine tenerentur, atque sapientius interimerentur; cui & illam, quæ pertinet ad morsus, & ictus bestiarum venenosarum, (quod eodem modo ab ipsis veneno itidem homines infecti periculum repentinæ mortis subeant) Methodici forsitan adiunxerunt, in ipsisque cum venenis, tum moribus ictibusque animalium venenosorum præcipuam medicinæ partem prophylacticam consistere ij existimarunt, aliorum affectuum, (quia omnes mortiferi non sunt) non admodum formidatorum ab hominibus, præseruationem methodo curatiua complexi. Vnum scitu dignum est, quomobrem hanc communitatem prophylacticam ad adstrictum & laxum non retulerint. Namque videbatur hæc commode ad adstrictum morbum posse reduci; etenim venenum deuoratum quod inflammat, putredinem concitat, dolores & alia similia inducit, adstrictum affectum facit, veluti quod profluuium sanguinis vel excrementorum inducit, idem affectum laxum efficit, veluti virus ab ictibus, & moribus serpentum, ac aliorum animalium venenosorum in partem vulneratam susceptum, & postea in totum corpus diffusum, morbum profectò adstrictum concitat. Hemorrhous verò serpens excipitur, qui morfu primo etsi adstrictum morbum faciat, quippe corpori virus per partem demersam affundens, tamen hoc virus proprietate quadam meatus corporis immodice laxando immoderato sanguinis profluuium de morfos homines interimit. Plerique vero morbum adstrictum facere videtur, unde mirum non est, si Dioscorides, Nicander, & alij omnes primo ad ve-

ad venena deuorata laxantia medicamenta (vti olea dulcia sunt, adipēs, decocta meliloti, feminum lini, sēnugrēci, althēæ atque similia) maximis laudibus commendauerint: & ad morsus venenatos ictusque, scarificationes, circinationes, inuersiones, putrefacientia, & vlcus dilatantia, fordidumque facientia; quinetiam ad partem demorsam cucurbitulas, sanguinisque quinetiam per venam sectam euacuationem, atque purgationem quæ fit medicamentis laxatorijs, in familiari vsu omnes habuerint: quæ omnia laxantium præsidiorum genere comprehendantur. Non retulerunt tamen (vti dictum est) venenum, morsus, ictusque venenatos ad adstrictum vel laxum, ea forsitan de causa, quod hoc pertineret ad methodum curatiuum, nequaquam vero ad prophylacticum. Hæc solis alexipharmacis, atque alexiterijs medicamentis (quæ cum venenis, tum serpentibus, alijsque feris venenatis à tota (vt medici aiunt) substantia maxime aduersantur) perficitur. Quorum vsus non tenebatur seruari, neque laxi, neque adstricti rationem. Si vero ijs medicamentis, quæ non occulta vi à tota ipsorum substantia proficiscent, sed manifestis qualitatibus, agunt, ad venenatos quidem vti voluerimus, curatio à laxo & adstricto recte poterit indicari; quando virus, aut in vulnus à virulenti vel bestijs, vel telis profectum, susceptumque, aut per os deuoratum adstricti affectus rationem quadantenus habeat. cum intra corpus sit, vel in partem à bestia, aut à telo venenato sauciata, susceptum, morbum adstrictum faciat; ac proinde laxandum indicet. Vnde est, quod in vulnere venenato vulnus non sit continuo cicatrice claudendum, sed per plures dies apertum seruari debeat, ac vel etiam quandoque ampliandum, cum adstricti affectus rationem habeat. etenim intra corpus virus delitescens, vel inflammationem concitat, vel putredinem accendit, vel dolores seuos, vel syncopem, vel alium affectum similem creat, ex quo sanè constat, dignum reprehensione fuisse illum medicum Methodicum, qui vulnus, à morfu canis rabidi infictum statim clausit, cicatriceque ipsum obduxit, vnde hydrophobia siue rabies, qua homo interijt, fuit subsequuta. Cum ex Methodicorum dogmatis vulnus cicatrice claudi haud debuerit, sed potius augeri, & diu apertum seruari (vt virus adstrictum educeretur) ipsum oportuisset. Non secus etiam de epoto veneno obseruandum, dicimus scilicet, ipsum habere morbi adstricti rationem, quare laxandum esse. Quod dogma Dioscorides Anazarbeus scribens de venenatorum curatione in communi, dixit: quam primum in ipsis venenum fore per vomitum educendum, laxantibus medicamentis copiosius epotis, atque postea per ventrem clysteribus itidem laxantibus iniectis. Methodici itidem, quod etiam à Dogmaticis medendo obseruatur, quandoque sanguinem vel secta vena, vel alio modo euacuant, educatorijsque medicamentis purgationem moliuntur, sudorificis, atque diureticis itidem euacuant. quæ præsidia calefactorū, idest laxantium genere, omnia quidem comprehenduntur, atque hæc nobis sufficiant, de communitatibus medicinæ partis prophylacticæ Methodicis cognitis. Fortasse posterius de hac parte prophylacticæ ex Methodicorum mente accuratius scribemus, vt de omnium affectuum præseruatione Methodica via diligens ratio à nobis habeatur.

Gal. in libro de
sect. ad eos quod
in trod. cap.

Finis Libri Primi.

F 2 PROSPE.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER SECVNDVS.

In quibus Methodici à Dogmaticis dissentiant.

Caput I.



*In libro de diff.
morb. cap. 5.*

Methodici in multis à Dogmaticis dissenserunt, & primo quod ii omnes morbos ad adstrictum vel ad laxum reducerint, quoniam ipsi voluerunt, in meatuum homini corporis symmetria, sanitatem, & in ametria, morbum consistere: Dogmatici vero tamen si & ipsi non negarint, morbum dari in meatuum vitio, etiam morbos simplices dari, quos in intemperie constituunt, voluerunt, scilicet, calidos, frigidos, atque siccos; & hos aliquando in nuda qualitate constitutos, & aliquando in qualitate cum materia. Præterea & in organicis partibus morbos complures fieri didicerunt, quos ipsi aut in naturali mutata conformatione constituunt, aut in vitiato partium organicarum numero, aut in magnitudine vitata, aut in mala compositione, aut denique in soluta earum partium unitate, qui morbus communis est & similaribus & organicis partibus. Et quod pertinet etiam ad meatuum morbos, Dogmatici quoque ab ipsis differunt, etenim (uti auctor est Galenus) Methodici morbos præsertim in meatuum occultorum, insensibiliumque vitio constituisse visi sunt, cuiusmodi sunt meatus cutis, quos Græci poros appellant; Dogmatici vero non tantum insensibilium atque occultorum, at quinimo omnium aliorum, qui sensibus manifesti sunt, quales venarum, arteriarum, intestinorum, aliorumque partium similium. Non recte tamen intellegimus, quomodo verum esse potuerit Methodicos considerasse tantummodo vitium meatuum cutis, non autem aliarum partium. cum Methodici febres putridas, phlegmones internos, tumores, obstructions, morbos adstrictos fecerint. de qua re aliàs accuratius tractabitur, nunc reliqua prosequimur, in quibus Methodici à Dogmaticis dissentiant. Itaque (vix dictum est) non concesserunt morbos à solis primis qualitatibus immoderatus auctis fieri, quod elementa haud ipsis qualitatibus primis, sed secundis mutuo alterentur, generentur, corrumpanturque, quippe vel rarefaciendo, vel densando. Non enim aqua in aerem mutatur ignis caliditate, tanquam immediata causa in ipsam agentem, sed ipsam extenuando rarefaciendoque, rarefacta enim aqua fit aer, atque ex aere densato a frigidityte rursus fit aqua. præterea negant etiam humores in corporibus exuperantes per se solos morbos facere posse, etenim si ipsi humores ab alia causa moueantur, profecto morbos concitare non putarunt. Aliàs (vidimus) Galenum scripsisse quosdam multos annos (licet humoribus multis abundauerint) sanos vixisse, quoniam eo toto tempore, meatuum corporis statum commodatum habuerunt. Tercio ad indicandum curationem, non est tempus contendendum, putarunt, in varijs corporum naturis, temperamentisque animaduertendis, non minusque inutilem esse existimarunt, cognitionem variarum ætatum, sexuum, consuetudinum, studiorum, cæli, regionum, annique temporum, atque etiam variarum

variarum partium affectarum. in omnibus vero phlegmonibus nudis laxantibus vrendum esse, nullis adstringentibus ad robur viscerum admistis, voluerunt.

Primas qualitates morbos non facere, ac proinde ab ipsis veram curationem ex Methodicorum dogmatis, non indicari. Cap. II.

Methodici neque simplices qualitates, neque humores morborum causas præcipuas, ita ut ab ipsis curatio indicari queat, esse voluerunt. Primas quidem qualitates quippe caliditatem, frigiditatem, humiditatem, atque siccitatem, per seipsas morbos non facere eo argumento forte opinati fuerunt, quod hæ non immediate, sed medijs secundis qualitatibus morbos facere obseruentur. Non negarent medici (quod Galenus demonstrauit) corpus totum, atque partem etiam corporis morbo calido affici, ex caliditate vtrique posse, cum certo certius illud verum esse apud omnes constet; eodem itidem modo a frigiditate, humiditate, siccitateque partes corporis morbis frigidis, humidis atque siccis affici. Quod vero pertinet ad morbum calidum, compertissimum est, a calore solis, vel ignis, vel ab alia causa calida febrem corporibus induci, partesque reddi vsque adeo calidas, ut ipsarum partium actiones lædantur. verum caliditatem immediate morbum calidum facere ij dubitasse visi sunt, quod mediante quidem rarefactione a caliditate spiritus, atque humores accendantur; veluti aqua ignis caliditate rarefacta feruescit, ita corpus refrigeratur, a frigore poros densante, caloremque a corpore calido compellente, quia enim a frigiditate spiritus, & sanguis intus compellitur, ideo pars frigescit. quæ a caliditate rarefaciente, euocanteque sanguinem & spiritus itidem recalescit. Idem de humiditate atque siccitate deque morbis humidis & siccis dicendum videtur: Namque humiditas quoque rarefaciendo in sicco corpore humidam qualitatem inducit. quod quisque intelliget, si terram in hyeme aquilonia a gelu siccitam, pluuia superueniente humefieri animaduuerit. eodemque etiam modo terram humefactam superueniente siccitate ipsam densante siccam reddi, obseruamus. Quare ea ratione caliditas rarefaciendo spiritus, & humores, morbum calidum inducit, frigiditas cogendo calorem natium intus, ipsamque a parte viuente repellendo, ita refrigerat quandoque; ut pars suffocato calore in canceram prouehatur. Siccum quoque morbum patitur corpus, uti in atrophia fit, siccatione meatibus ita desatis, ut sanguis nequeat deferri ad nutritionem faciendam, atque demum humiditas humidum quoque morbum facit. Humiditatem enim immodicam laxare rarefacereque ex eo quisque cognosceret, qui terram omnium elementorum densissimum elementum affusa aqua liquefcere animaduuerit. Itaque qualitates elementorum primæ non propriam qualitatem inducendo, sed vel rarefaciendo corpora alterare, ij forte voluerunt, illos quidem philosophos secuti, qui raritatem & densitatem rerum principia esse putarunt. Atque hinc generatio & corruptio videtur hisce duobus principijs foueri, ac perfici, cum eodem modo se habeat generatio, atque corruptio in mixtis, quo in elementis: elementorum vero alteratio nulla alia est, quam rarefactio & densatio: Etenim terram omnium elementorum densissimum in aquam mutari, rarefactione, superius dictum est, aqua itidem in aerem mutata rarior redditur, & omnium maxime aer, ubi in ignem fuerit itidem mutatus. Non enim elementorum generationem & corruptionem primis solummodo fieri qualitatibus, obseruamus, quippe calorem a frigore, & frigus a calore pati, & humidum a sicco atque siccum ab humido: potius qualitates primæ actiuæ, a passiuis

In libro de diff. morb.

Gal. in 3. de temp. cap. 4.

uis pati videntur, caliditatem enim a frigiditate non corrumpi, & mutari in frigiditatem, fortè eo argumento deprehendimus, quod in materia combustibili accensus ignis, æque ab aqua cum frigida tum calida extinguatur. si enim caliditas à frigiditate extingueretur, recte nobis persuaderetur, hæc duas primas actiuas qualitates mutuo agere & pati, sed cum (vtri dictum est) exempli gratia, carbonēs igniti affusa aqua cum frigida tum feruenti æque extinguatur, necessario innotescit nobis, caliditatem vel ab humiditate tanquam à contrario pati, vel ab aquæ densiori substantia ignem suffocante, siue extinguente raram ipsius substantiam. Quare elementa cum non à primis, sed à secundis qualitatibus mutuo agere & pati videantur, particularimque à rarefactione & densatione, ergo etiam caliditas, frigiditas, humiditas & siccitas mediantibus secundis qualitatibus scilicet rarefactione & densatione morbos simplices faciunt. Pars quidem, corporis ab ignis caliditate (uti nuper dictum est) rarefacta incalescit. Quoad ipsam fertur copiosus spiritus & sanguis, qui itidem à calore rarefacti, sunt in causa, ut adhuc copia maior substantiæ calidæ attrahatur, unde partem morbo calido affici est necessarium. & ita ab intensa frigiditate extrema pars corporis intense refrigeratur, ita, ut frigidus morbo laboret. quoniam intensa frigiditas in partibus debilibus densando meatus, repellit intus spiritus atque sanguinem, seu melius innatum calorem, qui per poros cutis euentatur, atque idcirco pars cum exanguis a frigiditate repellente reddatur, merito frigescit. In corporibus robustioribus, partes refrigeratæ ab intenso frigore postea recalescunt. In debilioribus vero, calor densatis meatibus suffocatione extinguitur, unde tum insignis partis corruptio subsequi solet, à qua cancræ fiunt. Hoc exemplum scilicet aquæ insigniter frigidæ large alicui parti affusæ, demonstrat nobis, à frigiditate stipata, clausæque summa facie corporis, fieri repercussum & refractum eius caloris, qui à profundo ascendit: qui quidem propter distatus inopiam intro accruatus, simul itidem propter frigidi circumstantis violentiam in altum recedit, & ex succis illic existentibus enutritur, deincepsque intro ipso collecto, auctoque ad summa corporis violentius ruente fieri eiusdem caloris repercussum constat. Quare in robustis partes refrigeratæ postea denuo recalescunt, & in debilibus nunquam recalescunt. Unde Galenus merito dixit: Nam aquæ frigidæ occurfus aut vincit natium calorem, aut colligit: vincit quidem cum debilis fuerit, colligit autem cum fortis, ipsum continens ac diffusi prohibens. Alijs etiam multis rationibus Methodicis fuit persuasum primas qualitates non facere morbos per se ipsas, sed mediantibus quidem secundis, quam rem vel etiam Hippocrates in libro de veteri medicina, accurate disputavit. de qua quidem longius ex Methodicis amplius non agam. At esto quod isti morbi in intemperie simplices dentur, ut rectè à Dogmaticis fuit demonstratum: tamen Methodicis, qui studuerunt breuem methodum medendi constituere, qua nobis vera omnium morborum curandi indicatio monstraretur, non rectè fieri, visum fuit. siquidem tot variæ, innumereque indicationes, (quas Dogmatici à morbis in intemperie (quos sexdecim numero constituerunt) & in conformatione, & in numero, & in magnitudine atque in soluta vnitæ &. Non minus à partium læsarum naturis varijs varijsque temperamentis, habitibus, ætatibus, consuetudinibus, studijs, atque cæli constitutionibus, regionibus annorumque temporibus, desumendas voluerunt, artem medendi nimis longam, prolixam ac etiam confusam reddere viderentur. Unde methodi breuissimæ medendi constituendæ principium à Methodicis ceptum est. Et ut ad primos morbos, qui in primis quatuor qualitatibus à dogmaticis constituti fuerunt, redeam, dico: ex Methodicis nondum compertum, fuisse, curationem per se ab ipsis primis qualitatibus, ut Dogmaticis fuit persuasum, indicari. At de primo loquamur: Constat sanè apud Dogmaticos huiusmodi affectus simplices à contra-

Hipp. in 5. aph.
21. & 25. &
Gal in comm.

Gal. in 5. de tēp.
cap. 5.

In 5. aph. Hipp.
comm. 21. &

Gal. in li. de diff.
morb. cap.

contrarijs suas indicationes habere, quod (vt aiunt) contrarijs contraria curentur. Ita que aiunt morbum calidum medicamentum refrigerans indicare, contra calfactorium, frigidum, & humidum siccans, atque humectans, siccum. vnde in curandis febribus dicunt, ipsam febrem medicamentum refrigerans indicare. An non hoc verum est? profecto in nullis febribus (exceptis ardentissimis & synochis illis, in quibus aegrotis largus algida aqua potus conceditur, atque hecticis tabidis) medendo Dogmatici huic satisfaciunt curationi. Quis etenim illorum vnquam ad illas febres perfanandas medicamentum refrigerans commendauit? Galenus nullis alijs praesidijs, quam calastictis febres (praedictis exceptis) sanare, visus est. atque ipsdem ferè quibus Methodici vtendum esse praecerunt; Ephemeris enim omoibus balnea ex dulci aqua calida parata vtilissima esse Galenus statuit, non minusque inunctiones ex calido oleo. quid? an non haec medicamenta sunt laxantia? Quid de tertianis biliosis? nonne eadem medicamenta ipsis opportunissima esse scripsit? nonne etiam euacuationes per aluum, per vrinam, per vomitum, per sudorem itidem vtilissimas esse statuit? ad quas mouendas decoctum ex apio, petroselino, pulegio atque ex alijs diureticis commendauit, An haec sunt medicamenta refrigerantia, quae à febre tanquam à calido morbo indicantur? Quid de quotidianis & de quartanis febribus dicemus? In his multo minus eam indicationem à febre petitam locum habere, cum in ipsis itidem medicamenta extenuantia, concoquentia, detergentia, aperientia, euacuantiaque calastictorum genere comprehensa, vsum habeant: neque est, vt Dogmatici dicant, in hisce febribus eam indicationem febrilem, quae prima est in mente, postremum locum habere in executione, scilicet illam (licet primo tempore locum non habeat) tamen postea exequi, quippe sublati causis, à quibus ea fouentur febres, quippe vacuatis scilicet crassis & viscidis humoribus, atque sublati itidem obstructionibus, postea commodum tempus habere. Quid dices? sublati illarum febrium causis, esse refrigerandum? quamobrem hoc faciendum? si sublati causis continuò febres tollantur, cur nulla existente febre refrigerandum? à quo refrigerans praesidium tunc indicabitur? si nullus morbus calidus, cum sublata sit febris, hominem teneat. Quis quæso aliquis ita stupidus fuit qui ausus sit vsum refrigerantium in praedictis febribus laudare? Idem & in continuis febribus (ardentissimis, & æstuosis synochis, atque tabidis exceptis) obseruatur, scilicet vt nullus refrigerantium vsum exerceatur. Etenim Dogmatici etiam frigidorum in ijs medicamentorum vsum damnant, & meritò sanè, cum frigida medicamentorum qualitas interius suscepta humorum coctionem impediat, ipsos crassiores & crudiores reddat, atque obstructa foueat. Et exterius quoque frigida partibus febre vexatis, admota, meatus cutis densando, intusque febrilem calorem cogendo compellendoque (cum febrilis caloris resolutionem impedian,) tum ipsum magis augeant febremque exinde prolixiorem efficiant. hinc recte practici medici astantibus iubere solent febricitantes stragulis bene coopertos decumbere, ab aereque frigido, à flabellis, à potuque frigido omnino abstinere quo Aurelianus non iniuria in thorace admodum calore vexato prohibuit, ne rosaceum frigidum vel alia frigida adhibeantur, quod hac meatus densando incendium calori augeant. Quare dicere febrem, quatenus febris idest calidus morbus, est, indicare medicamentum refrigerans, quippiam logicum videtur. Addimus non perpetuo frigida medicamenta refrigerare, at plerumque (vt ex Hippocrate & Galeno nuper demonstratum est) calefacere, vnde Hippocrates scripsit: Dolores frigidos, tumores, conuulsionesque frigidam aquam large affusam sanare: Iraque si vera est indicatio morbi calidi, cur Dogmatici in curandis febribus (exceptis vt superius, dictum est, ardentissimis, synochis æstuosis, atque tabidis de quibus posteriùs accurate agemus) nusquam

1. Oxeon cap. 16

In 5. aphor. 21.
Cap. 25.

nusquam medicamenta actu frigida meminerunt? si dixerint, ptissanam hor-
 daceam, decoctum ex alidis, funci endiuia, portulacæ & similium, quæ faculta-
 ris frigida sunt, apud omnes medicos esse ad febres curandas familiarissima, item
 syropos refrigerantes, succos, atque aquas refrigeratorias: Methodicorum secta-
 tores responderent, hæc decocta facultate frigida prædita, scilicet syropos, suc-
 cos, atque aquas, ægrotantibus non actu frigidas sed calidas exhiberi. Non
 enim ab aliquo Dogmatico hæc actu frigida febre vexatis exhibentur. Quid
 igitur? nonne medicamentum ad febrem tollendam non actu, sed potestate fri-
 gidum ab ipsis exhibetur? certe quidem. Quod tamen non sic ex Dogmatico-
 rum placitis conuenire creditur, siquidem contrarijs (vt omnes aiunt) contraria
 curari debeant. Profecto morbus actu calidus, medicamentum indicabit, quod
 non potestate sed actu frigidum sit. etenim medicamentum quod potestate est
 frigidum, per se non opponitur morbo actu calido, veluti morbus itidem actu fri-
 gidus medicamentum actu calidum indicabit. Neque est, quod Dogmatici di-
 cant, medicamentum, quod potestate est frigidum, non agere ad corrigendum ca-
 lorem, quoad fuerit in corpore actuatum. Actuatumque aduersus febrem agere,
 eiusque caliditati per se opponi, atque ita constare, morbum actu calidum, cuius-
 modi febris est, tolli à medicamento, quod actu est frigidum. Etenim (exempli
 gratia) decoctum aliquod refrigeratorium, actu calidum epotum, priusquam in
 corpore actuatum sit, aduersus febrem non ager, sed solummodo posteaquam
 à calore nostro actuatum sit, idest ipsius facultas refrigerans fuerit actu talis red-
 dita: atque ita verum quidem esse Dogmaticorum placitum dicent, scilicet fe-
 brem, quatenus est morbus calidus, medicamentum frigidum indicare. Quæ
 responsio non videtur plane huic dubio satisfacere, cum nullum medicamentum
 potestate refrigeratorium (excipio narcotica mortifera, vti est cicuta, mandra-
 gora & similia, quæ ob id homines, qui ipsa deuorant, interimunt, quia à
 calore, qui est debilis, nequeunt actu calida in corpore seruari, ideoque refrige-
 scunt, & actu frigida redduntur) epotum, & actuatum, in corpore refrigescat,
 neque actu frigidum fiat: perpetuo namque in corpore à calore nostro ex calefa-
 ctum (exceptis mortiferis refrigeratorijs) calidum seruatur, quinimo etiam,
 quæ actu frigida per os assumuntur, à calore corporis calfiunt, & quoad vel resol-
 uantur vel excernantur calida actu seruantur. Aqua (exempli gratia) quæ oïum
 consensu facultate frigida est, epota, à calore ventris incalefacta, diu adscititiu ca-
 lorem naçta, manet calida, à nativo calore ita incalefacta præsentiaque eiusdem
 calidi adiuta, nunquam in corpore refrigescit, sed perpetuo actu calida manet.
 ex quibuscunque nostrum liquidò constabit, medicamentum actu calidum in
 corpore assumptum (licet sit ex potestate refrigeratorijs) nunquam ibi refrige-
 scere: si vero non refrigescat, quomodo actuatum actu, (vt aiunt) frigidum
 erit? Quæ cum vera sint, quomodo decocta refrigeratoria actu calida epota, fe-
 bre vexatos (quod est apud omnes medicos compertissimum) iuuabunt? Me-
 thodici dicent nulla alia ratione, id facere posse, quod (licet frigida sint) à calo-
 re innato, ac etiam à febrili incalefacta, reddantur temperate calida, atque ita vt
 vere facultate laxantia dici queant, quæ ob id febrem, quæ morbus est adstri-
 ctus, tollunt. Eodem profecto modo, quo aquæ dulcis balneum temperate cali-
 dum febres itidem resoluit, resoluitur enim illa qualitas febrilis medicamento vi
 laxatoria, digerenteue. Redeo ad id, à quo diuerteram, & colligo calidum, atq;
 frigidum morbum Methodicos non concessisse ad medendum, quia hi morbi
 simplices non habent indicationes ad curationem instituendam necessarias; quod
 nos de calido morbo simplici, (febris exemplo) hætenus demonstrauimus: sci-
 licet etiam à Dogmaticis non seruari illam indicationem, quæ à calido morbo
 desumitur. quæ est quod febris (exempli gratia) quatenus calidus est morbus,
 indicet

indiciet medicamentum refrigerans: nam ostendimus febrem, quod actu calidus morbus sit, propterea medicamentum actu frigidum indicare debere. quo medicamento actu frigido nulli Dogmaticorum vnquam vsi sunt, quoniam actu frigida etiam aliquando calefaciant. sed omnes in vsu habuerunt, decocta ex frigidis facultate (vt aiunt) medicamentis parata actu calida febricitantibus exhibere, succosque itidem atque aquas stillatitias ex frigidis herbis paratas, itidem igne incalefactas propinare. Quid est hoc? an non est ad tollendas febres medicamentum actu calidum exhibere, quomodo igitur febris, vt morbus calidus indicat refrigerans? cur, si hoc verum est, non exhibent medicamenta (quod quandoque faciunt in ardentibus synochis, tabidisque febribus) actu frigida? quoniam hæc non conueniunt, cum calefaciant calorem intro cogendo atque pellendo; vt in altero capite demonstrabimus. Neque verum est, quod aliqui respondent, scilicet Dogmaticos ad febrem tollendam exhibere medicamenta potestate frigida, eaque propinare ægrotis actu calida, vt citius ipsorum refrigeratoria facultas à calore in corpore actuetur, actuataque febrilem calorem corrigat, & extinguat. Nos verò demonstrauius, nunquam hæc medicamenta ita actuari in corpore, vt actualet nanciscantur frigiditatem, qua morbo actu calido per se aduersari valeant; perpetuo siquidem hæc (exceptis mortiferis) in corpore adscititium calorem habent & conseruant, hæc enim prius igne incalefacta, actu calida assumuntur intra corpus, & postea à calore cum natiuo tum febrili rursus incalefunt, quoad concoquantur; quare intra corpus assumpta antequam concoquantur à natura & mutantur in nutrimentum, perpetuo actualet caliditatem habent, ita, vt actu calida (licet modice quidem, cum suapte natura nequeant à calore nostro intente calida fieri veluti quæ natura calida sunt, intensius intra corpus à calore nostro incalefunt) merito dicantur. Mutata etiam, postquã concreta sunt, in nutrimentum, calida itidem calidæ substantiæ accessione esse Galenus aliquando aperte demonstrauit. Quare verissimum erit nunquam in corpore hæc medicamenta actu frigida fieri: exceptis mortiferis medicamentis frigidis, quæ, cum rota substantiæ naturæ aduersentur, calorem ita debilitant, vt ab ipso debilitate incalefacta postea in corpore refrigerant, qua refrigeratione in parte principe facta, statim calor natiuus extinguitur. Medicamenta vero, quæ delecteria non sunt, à natura que nostra concoquantur, intra corpus calida assumpta nunquã refrigerant, quare nondum actu frigida sunt, & vt alia nunquam actu calido morbo erunt contraria. Et si denuo perunt, quomodo ipsa cum actu frigida non sint, refrigerent? Compertum cognitumque est prissanum, portulacum, fuscum, lactucam, endiniam, lenticulam palustrem, nympheam, violam, & alia similia per os assumpta etiam calida intra corpus refrigerare. quomodo itaque refrigerant, cum nunquam actualet frigiditatem nanciscantur in corpore? Refrigerant sane, quoniam ab ipsorum frigida essentia concoquenda in nutrimentum; commutanda calor natiuus repatiatur, ac proinde sanguis minus calidus ea coctione gignatur. Quæ enim calida sunt, propter similitudinem quam cum calore natiuo habent, facilius, & minus cum labore alterantur vel in nutrimentum vertuntur, & quod in horum absoluenda coctione calor minus pariat, idcirco sanguis calidior generatur. In febricitantibus verò huiusmodi medicamenta refrigerant, & ob hanc causam, atque etiam, vt superius dictum est, quod hæc calida epota naturam laxantium medicamentorum, quæ temperate calida & humida est, assequantur, etenim ab adscititio calore ignis, cum hæc prius incalefacta propinentur, & postea à calore quoque interno incalefiant, reddantur temperate calida & humida, quæ laxantium medicamentorum facultas est. Itaque hæc merito febri tanquam morbo abstricto, in quo laxantibus vtendum est, mederi dicuntur. Quare merito Methodici voluerunt, morborum calidorum & frigidorum

G cognitio.

In lib. 3. de temperamentis.

cognitionem ad instituendam curationem esse inutilem. Neque est etiam, quod dicant, ut eius utilitatem Dogmatici persuadeant, aquam frigidam herysipelati mederi, & aquam marinam sulphureamque ipsum calidum morbum augere. Quæ cum vera sint, videtur verum dogma esse scilicet calidorum morborum frigida oportere esse remedia: ad quod respondetur, non aquam actu frigidam, sed tepidam quidem herysipelati convenire, nisi repellere humorem in principio fuerit consilium, aqua vero marina non convenit, & quod adstringat, & quod, ut calida & sicca, morbum adstrictum foueat; ita quoque & sulphurea, & similes aliæ. & hæc de simplici affectu calido. Idem de frigido dicimus fore sentiendum, quippè non habere, quatenus frigidus est morbus certam indicationem: Neque est quod calidum medicamentum à morbo frigido indicatum, corpori refrigerato recte medeatur, quoniam non quatenus calidum, sed quatenus etiam meatus laxat, convenit. Ita quoque de passivis qualitatibus observatur: siccitas namq; ab humiditate quatenus laxat, & humiditas à siccitate quatenus densat, corrigitur. Siccitas quippè est adstricti affectus species, quæ quandoque fit ab humido euacuato seu resoluta. quod à validis exercitijs, sole feruenti, ingenti inedia, atque ab immoderata aliqua euacuatione euenire solet, vel denique à medicamentis siccantibus, aut refrigerantibus. A sicco vero affectu Methodici meritò laxans medicamentum indicari aiunt, quod, ut recte quoque Dogmatici cognouerunt, sit temperate calidum, quando adstrictum affectum siccum maxime valeat emendare, atque corrigere; etenim si ab humiditate euacuata illa siccitas fuerit oborta, aut à medicamento siccante, medicamenti humiditate tollitur; si à frigiditate siccitas fiat, à laxantis medicaminis caliditate itidem emendatur. Eodem quoque modo se habet laxus affectus humidus, qui densante siue adstringente medicamento itidem corrigitur. Namque adstringens medicamentum cum frigidum & siccum sit, vtraque qualitate humiditatem tollit, scilicet frigiditate repellendo ac veluti comprimendo, & siccitate cogendo & indurando. qua ratione hyeme ab intensa aeris frigiditate, extimæ cutis partes, terræ item superficies humida, siccari solet. Atque ita nobis ex Methodicis esto persuasum, qualitates primas, primosque affectus simplices parum facere ad curationem instituendam, atque ipsorum cognitionem scitu haud esse necessariam. Quæ opinio etiam alio argumento confirmatur, scilicet quia medici tollunt cum morbos calidos tum frigidos medicamentis laxantibus, an non ab itinere vel à sole incalefactos balneis modice calidis, atque inunctione olei tepidi iuuamus? iisdemque etiam refrigeratos sanamus? Nonne igne vstas aliquas corporis partes affuso copioso oleo tepido sanamus? an non corpora cum incalefacta, tum refrigerata tepidis balneis, fomentis, atque inunctionibus aperte iuuari, experientia docuit? Quare cum vterque morbus cum calidus tum frigidus laxantibus medicamentis tollatur, ergo necessario vterque aliquando adstrictus erit affectus, atque ita de qualitatibus primis simplices morbos in intemperie constituentibus, rem hanc Methodicos sentijse, credendum est.

Quamobrem Methodici in aliquibus morbis adstrictis aliquando frigidis medicamentis utantur. Cap. III.

Cum dixerimus morbos calidos, cuiusmodi sunt febres, esse adstrictos, ac proinde medicamenta indicare laxantia, quorum natura est temperate calida, atque humida, Idcircoque decocta medicamentorum facultate frigidorum, succos, aquas stillatitias febricitantibus non actu frigidam, sed calidam propinari, quoniam hæc cum humida sint, & in corpore adscititiam caliditatem quoque nanciscan-

nanciscantur, sunt naturæ laxantium medicamentorum, quæ per se febribus, inquantum morbi sunt adstricti, medentur. Cum inquam constet hæc vera esse, ac proinde non esse verum, quod à Dogmaticis traditum est, scilicet febres, quatenus morbi sunt calidi, refrigerantia indicare: quoniam si hoc esset, medici ad curandas febres medicamentis actu frigidis uterentur, at cum ipsi non utantur actu frigidis in multis febribus, scilicet in diarrhijs, in putridis, & in hecticis, sed actu calidis, licet potestate frigida sint, eos febribus æque ac Methodici laxantibus mederi, quippe actu calidis atque humidis liquido apparet. Hinc omnes cum in diarrhijs, tum in hecticis seu potius scheticis, idest, quæ in principio sunt, tum in biliosis quoque putridis, non admodum æstuosis, commendarunt balnea aquæ dulcis temperate calida, inunctiones tepidorum oleorum, fomenta, epithemataque. Verum cum omnes medici in omnibus febribus iam dictis exhibeant medicamenta laxantia, idest actu calida, cur in vehementer calidis, colliquatiuis (cuiusmodi sunt ardentes, & synochæ vehementer æstuosæ, atque hecticæ tabidæ) medicamenta actu frigida exhibent? uti est aqua simplex frigida, ac complures refrigeratoriæ potiones actu frigidæ, & similia; hæc enim actu frigida, omnes cum Dogmaticæ, tum Methodicæ sectæ medici, ad prædictas febres maxime æstuosas sanandas perpetuo in usu habuerunt. Verum quamobrem Dogmatici frigidis actu medicamentis ad morbos calidos utendum consueverint, mirum non est, cum ab ipsis sancitum fuerit, morbos contrarijs tolli, quippe frigidos calidis, calidos frigidis, siccos humidis atque humidos siccis. At Methodicos hæc medicamenta actu frigida itidem laudasse, mirum est, cum febres omnes morbos adstrictos in iisdem febribus fecerint, ac proinde laxantibus contrarijs, quæ actu calida sunt, meritò tollendas quoque statuerint. Cur itaque actu frigidorum in iisdem, usum admiserint, & inter multa tantopere in causatione, & in synocho maxime æstuosæ, algidæ aquæ potum commendarunt? Cur in tabidis, potiones actu frigidas, atque balnea itidem frigida summis laudibus omnes medici extulerunt? Etsi de hac eadem re nos itidem postea acturi simus, scilicet cum de febrium continentium curatione sermonem habuerimus, nihilominus, ut omnis ab ijs, quæ statuimus, collaturæ ambiguitas, pauca de iisdem in præsentia fore præmittenda, duximus. atque ut ad rem veniamus, eamque dubitationem tollamus, quæ est, quamobrem Methodici etiam in continuis febribus atque in tabidis usum actu frigidorum probauerint, cum febres omnes morbos adstrictos esse voluerint, & omnia actu frigida, per ipsos dicantur medicamenta adstringentia: pro qua re exacte cognoscenda illud primo ex Methodicis erit supponendum, dari quidem morbos præter adstrictos & fluidos, etiam mixtos ex fluido & ex adstricto. Secundo aliud quoque in morbo mixto ex fluido & ex adstricto curando, itidem supponi oportebit; scilicet urgentiori esse incumbendum. Quid itaque, si non febres continentes vehementer æstuosæ omnes, ac vel etiam tabidæ, sunt morbi mixti ex adstricto & fluido? Primum esse morbos adstrictos non est dubitandum, quod de continentibus putridis, quæ ab obstructis meatibus fountur, vel etiam ex Dogmaticorum placitis intelligitur. Hecticas quoque primo habere igneam caliditatem in solidis partibus adstrictam, quam Dogmatici etiam, ut tollant, balnearum tepidorum, inunctionum atque aliorum ipsius flammæ calorem digerentium medicamentorum (quæ itidem laxantia sunt) usum complectuntur. Porro continentes febres, atque hecticæ in primo (ut aiunt) gradu constitutæ, morbi adstricti sunt. Cæterum ubi in his flammæ calore in principio haud digesto, collimatio in corporibus evidentior apparuerit, ita, ut humiditates partium et solidarum profluant, absumenturque, alter morbus, qui fluxus laxusue dicitur, primum subsequitur. Eodem itidem modo, continentes febres, quæ admodum æstuosæ

æstuosæ sunt, laxum morbum contrahunt, quoniam ingens caliditas febrilis interna, eundem affectum parit, quem externa in partibus extimis; hæc vero aperit meatus cutaneos, laxatque, ut exinde calor innatus copiosius effluat, exhalat, atque resoluatur: illa vero, quippe interna caliditas immoderata, oscula venarum, arteriarumque immoderatus laxans facit morbum itidem laxum, fluxumque dictum, à quo citò naturalis calor immoderatus effluens, & exhalans resolvitur, dissipaturque. unde nec citò laxus hic morbus tollatur, inevitabile exitum subsequitur. Quare cum in ijs febribus vehementer æstuosus sit sanè primo morbus adstrictus, & secundo laxus, primum affectum subsequutus, atque hic magis quidem (quod ab ipso citò calore innato euacuato fluxoque, mors imminet) urgeat, idcirco, cum Methodici semper in misto affectu, virgienti fore incumbendum docuerint in talibus febribus valde æstuosus, in quibus periculum est caloris nativi resolutionis, medicamentorum actu frigidorum usum secuti sunt. Hinc in continentibus febribus vehementer æstuosus, ob eam profectò causam algidæ aquæ largum potum omnes quidem medici exhibere consueverunt: quod laxo morbo valide aduersetur, calorisque nativi fluxum cohibeat: Etenim aqua frigida sua frigiditate densando meatus internos insigni caliditate diffusos, ampliatosque, cogit, caloremque ad suum fontem valide compellit, unde partes iuxta ventriculum & proximæ, calore ab ipsis ad cor compulsæ, primum refrigerantur, densanturque statimque sitis exinde & calor cessat. Calor vero nativus ab immodico calore rarefactis meatibus per totum corpus diffusus, ab aquæ frigiditate intro ad cordis quippe regionem, tanquam ad fontem caloris repulsus, unitus, atque ab humiditatibus istis existentibus nutritus, ac postea auctus roboratusque ad uniuersas partes corporis rursus erumpens, aquam epotam atque humores putridos incalefacit, digerit, atque resoluit. Plerumque largissimos sudores frigidæ aquæ potus, per antiperistasis (vti dictum est) concitat, nonnunquam vomitus biliosi fiunt, & aliquando per aluum copiosi humores profluunt. Quare ex his liquido apparet Methodicos medicamentis adstrictis vocatis, non morbo quidem adstricto, sed fluxo, scilicet meatibus internis præ æstuoso calore febrili immoderatus laxatis atque diffusis, per quos nativus copiosius effluens, citò dissipatur, mederi; vt proinde nedum reprehensione at potius magna laude digni visi sint. Hoc quidem præsidio adstrictorio in hisce febribus vehementer æstuosus, habentibus coniunctum morbum laxum, (qui virgenter cum sit, quod eo innatus calor citò resoluatur, meritò actu frigidum medicamentum, quod densat meatus, cogit calorem intus, ipsumque ad fontem caloris reprimat, ex postulat) vtendum ij voluerunt, quippe aquam frigidam large epotam concedentes. Mirabile dictum est, quomodo tale præsidium expugnet hasce febres, quæ affectum duplicem habent, scilicet, adstrictum atque laxum, dico vehementer æstuosas, in quibus solummodo conveniunt medicamenta actu frigida, non (vt Dogmatici putarunt) quia morbus actu calidus ijs actu frigidis medicamentis tollatur: sed, vt calorem nativum propter insignem caliditatem immoderatus, fuis meatibus, collabentem colligant, uniant, atque ita augeant, vt eo febres denique tollantur, quas non refrigeratione, sed calefactione quidè tolli, liquido constabit quod eæ febres dissoluantur aut sudore copioso, aut vomitu bilioso, aut deiectione biliosa, vel copiosa vrina, quæ euacuationes à potu aquæ frigidæ erumpunt, atque ita hasce febres finiunt: quare neque in hisce febribus actu frigida medicamenta indicantur, cum hæc non frigiditate, sed caliditate potius (vti demonstratum est) tollantur. Superius ostendimus actu frigida actu calidum morbum non tollere, at quinimo ipsum aliquando augere, cum densando meatus prohibeant ipsius resolutionem, sed tollit morbum calidum caliditas, ob validam refrigerationem in robusto corpore subsequuta, scilicet facta reuocatur.

Gal. in 3. de tēp.
cap. 5.

reuocatione caloris: quomodo Hippocrates docuit dolores, tumores, conuulsiones affusa large frigida aqua in robusto corpore, resolui. Quare Methodici recte calidis morbis laxantibus, quæ sunt calida medicamenta, medentur. Et, si in hisce febribus summe æstuosis ipsi quoque exhibeant aquam frigidam, non propterea vtuntur medicamento adstricto in morbo adstricto per se, at quatenus alteri morbo laxo ei coniuncto ob ætuosissimum calorem meatus internos immoderatus diffundentem, & resoluentem innatum calidum, conuenit: namque primo occurrunt patentibus meatibus actu frigidis medicamentis meatus densantibus, & postea calefactione, aqua scilicet hausta incalefacta, intusque naturam laxantem (quæ febri tanquam morbo adstricto medetur) adepta, febrem resoluit. Mirum remedium, quo Methodici medentur morbo mixto ex adstricto atque laxo. laxo tanquam vrgentiori frigiditate insigni aqua occurrit, febri vero tanquam affectui adstricto (quod minus vrgeat) postea eadem aqua incalefacta intus ab aucto calore, tanquam medicamentum laxans, scilicet calidum, atque fumidum febrilem caliditatem digerens, auxilio quoque est. perinde atque balneum tepidum ad easdem febres ab omnibus medicis commendatum, interiorius agit. In hæcticis quoque tabidis, quæ itidem fluxum laxumue morbum habent coniunctum, quippè febrilem calorem postea subsequutum, balnea actu frigida commendantur, non quia febri tanquam morbo adstricto medeantur, sed, vt collabentem calorem innatum, qui perpetuo per poros cutis nimium diffusos immoderatus effluit, colligatur, vniatur atque roboretur. Quare hi non medentur morbis astrictis, licet vtendum voluerint medicamentis actu frigidis, adstringentibus vocatis, at profectò laxis. Cæterum quomodo medicamenta actu frigida in prædictis febribus conueniant, & in quibus etiam non, posterius (cum de illorum febrium curatione scribetur) accurate considerabimus, atque etiam in ultimo libro in quo de morbis mixtis ex adstricto atque ex laxo acturi sumus.

In 5. aphor. 21.
Ch. 25.

*Humores exuperantes in corporibus secundum Methodicos
non esse causas morborum, quæ indicant curationem.*

Caput

III.

Itaque qualitates primas non esse præcipuas morborum causas ex Methodicis ostendimus, atque ideo, esse ad indicandam curationem inutiles. Nunc vero videamus etiam, quibus rationibus illis fuerit persuasum, quatuor humores itidem non esse causas morborum, neque ab ipsis itidem humeribus curationem indicari. Non indicare quidem humores, quatenus humores sunt, curationem ipsi voluerunt, at si indicabunt, sanè quatenus faciunt morbum adstrictum vel laxum indicabunt. Humores non esse morborum causas, nihilque ad curationis indicationem facere, illis eo præsertim argumento fuit persuasum, quod apparen- te copiosa fluxione vel per aluum, vel per sudorem, vel per vomitum, vel denique per urinam, complures morbi (quorum Dogmatici putant humores esse causas) non tollantur. Neque etiam si principio morbi exhibeatur purgans valentissimum, haud semper cedat purgationi morbus. Hydrops etiam non sanatur à copiosa aquei humoris educatione, at alijs quidem, vt tollatur, opus est medicamentis, non purgantibus. Neque eos latet, humorem quandoque in parte quapiam facientem plenitudinem, morbum concitare, qui tamen mirum est quamobrem a diarrhæa copiosa, aut ab urina copiosa, vel a sudore, vel à copioso vomitu, vel ab alui deiectione valido medicamento etiam procurata, non semper tollatur, cum communes euacuationes insignes consumere aliquando particulares plenitudines medicis non sit ignotum: Vnde praxim facientes sæpius

*Gal. in apologia
contra Iulianum.*

sæpius particularem affectum communi, eaque insigni vacuatione facta curare solent, eaque fortasse ratione, quod communes euacuationes humores ab affecta parte diuertant, ita vt non amplius confluant, affectumque foucant, vel augeant. At non recte respondisse ad hoc argumentum visi sunt, qui dixerunt, communem euacuationem insignem necessario quemcunque morbum à communi totius corporis plenitudine factum, tollere; non autem necessario affectum, quem particularis humoris plenitudo facit, sanare. Quod si verum sit, cur Dogmatici arthriticum coxendicumque morbum, conuulsionem, paralysim, tremorem, febrem diuturnam, atque alios complures affectus singulares, quos plenitudo particularis creat, communi, insignique (quam medici medicamentis cum vacuatorijs, tum purgatorijs moliuntur) vacuatione, tollere student? Hi sanè affectus particulares, cum morbi adstricti sint, à copiosis euacuationibus, quæ præsidia laxantia sunt, tolli aliquando solent. si plenitudo fuerit ad vasa, cui dubium, apparente copiosa vacuatione eam tolli oportere, non minusque etiam, si ad virtutem sit, quando euacuato humore, cuius præsentia vires maxime languide redduntur, virium subleuatio necessario succedat. Itaque Iuliani, vel Asclepiadis argumentum, quod humorum plenitudo non sit causa morborum, eo quia insigni facta vel à natura vel ab arte euacuatione, vti dictum est, morbi non tollantur, in suo robore manere videretur. Cum communi insigni vacuatione non solum plenitudinem communem, sed vel etiam particularem minui debere, ratio persuadeat. hanc quidem iuuaret, non ab ipsa parte (licet non nulli voluerint, quædam purgantia particulatim humores à particularibus affectis partibus, attrahere, educereque, atque ita tolli particularem plenitudinem insigni quidem euacuatione posse) humorem educendo, vacuandoque; at diuertendo, vel reuellendo communis vacuatio prohibebit, firmata humoris fluxione, quo minus affectus augeatur, illa vero ipsum humorem facientem plenitudinem minuendo. Cur itaque si plenitudo humoris morborum est causa, copiosa apparente euacuatione morbi non diminuuntur? Compertissimum quidem est, sæpius copiosam alui deiectionem, vel vrinam, vel sudorem, ac vel etiam hemorrhagiam, febrem vel alio morbo vexatis nedum profuisse, at quinimo plurimum lassisse, aut ab ipsa ægrotos in peius ita mutatos fuisse, vt tandem eo morbo interierint. Hincque haud tutò in principio morborum exerceri vsum medicamentorum valide purgantium, intelligitur: quoniam, vt dictum est, hisce purgationibus morbi plerumque non cedant. Ceterum si dicatur etsi morbi ab humoribus fiant (qui si possent statim educi, profectò imminuerentur, tollerenturque) tamen, quod sint crassi scilicet & admodum viscosi, quo pertinaciter adstricti alicui parti adhæreant, propterea educi non possunt; quod dogma in omni morborum principio accuratius seruatur. quo tempore nullæ euacuationes, licet insignes sint, viles æstimantur, qua ratione etiam purgantia medicamenta ab eruditis medicis ex Hippocratis sententia omnino in morborum principio prohibentur, nimirum, quod concocta medicari, & non cruda oporteat, nisi humores turgant. Principio vero morborum humores omnes crudi sunt, turgentes tamen (quod non firmi, neque parti cuiuspiam adhærentes, at segregati per corpus moueantur) licere tunc medicamento educi: Vnde meritò Hippocrates dixit: in acutis morbis raro & per initia medicamento purgante vti oportet, & hoc ipsum cum præmeditatione: Quod in libro de humoribus ita quoque expressit, dicens: Aliis facta coctione humores aut intro, aut foras virgere, aut aliam in partem in quam oportet. Si hæc vera sunt, qui fieri potest, vt in complurium morborum principio excretiones appareant? siquidem morbus crudus est, & humores nondum concocti, nondum segregati, idcircoque ad purgandum inepti sint. In statu vero ac declinatione, quoniam tunc humores probam concoctionem sunt affecti, facile

& tutò

In 1. aphor. 22.

In 1. aphor. 24.

& tutò ipsos educi excernique posse, affirmant, ac idcirco apparere bonas humorum excretiones (quas criticas medici vocant) purgationesque; & medicamentis etiam eosdem educi posse Dogmaticorum plures putarunt. Quo tempore, solummodo purgantia exhibere egrotis possunt. At cur queso hunc agrotis corporibus etiam laborem iniungere debemus? si iam naturæ victoria super morbum innotuit, atque morbum iam natura superauit? Ex quibus illud vnum notatu dignum obiter animaduertitur, scilicet purgandos tantummodo fore humores medicamentis attractorij in salutaribus morbis, atque nunquam in exitalibus. In his humores perpetuo crudi sunt, quod nondum natura ipsis præualuerit, eosque concoxerit. In salutaribus vero solummodo (quod ipsis natura præualeat, ipsosque concoquat) purgationes usum habebunt. De his Methodici haud immerito dubitasse visi sunt, quod non tantum in morbum vigore declinationeque, sed quinetiam in principijs, atque augmentis exitalium morborum copiosæ euacuationes non rarò appareant, à quibus morbi complures dum minuuntur, at sæpius quidem augentur, ab ipsisque ægroti in deterius abeunt. De quibus Hippocrates in epidemijs ait: Alui turbatæ erant, biliosis paucis meris tenuibus mordacibusque. & postea: Quæ infestabant hæc erant: lienterix, dylienterix, tenesmi, alui fluxiones biliosæ tenues mordaces, multæ crudæ, & mordaces, nonnullis etiam aquosæ. & de sudoribus: Sudores multi his tantum aberat, vt recrearent, vt etiam contra læderent. De Critone ait: Deiectiones crebræ biliosæ, periit postridie quam ægrotare cœperat. Queso si humores sunt causæ morborum, cur in morbo bilioso acuto diarrhæa copiosa, biliosa, sudoresque copiosi exeuntes etiam in morbi principio, egrotos perpetuo non iuuabunt? præsertimque quod ijdem humores, quos morbi alicuius biliosi causas faciunt, copiosius excernantur. An non necessario aut humor febrem (exempli causa) ardentem faciens extoto educetur? aut saltem à loco putredinis auelletur, diuertereturque, quo morbi causam minui sit necessarium? Cur in ardentissimis inquam febribus, in quibus exuperant humores biliosi, acres, vsti, & retorridi, damnantur in principio excretiones biliosæ? & in febre melancholica nigra, si ab ipsis succis febres foueantur? si dicatur nigras deiectiones quandoque in morbi vigore vel declinatione non improbari, tamen hoc raro fit. De qua excretionem Hipp. ait: Morbis quibuslibet incipientibus si bilis atra vel supra vel infra exierit, lethale est. & postea: Quibus ex morbis acutis aut ex longis, aut ex vulneribus aut quouis alio modo extenuatis bilis atra, aut qualis sanguis niger descenderit, postridie moriuntur. Quæ igitur ratio est, quæ nobis persuadeat, fluentibus per aluum, vel per alium locum humoribus & copiosius quidem, morbos, quos ipsi fouent, nedum minui, sed plerumque ita augeri, vt ægrotos interimant. Etenim sublata causa tollitur morbus, si itaque humores sunt causæ morborum, cur ipsis vacuatis siue per corpus excretis morbi non tolluntur? Nos sæpius vidimus complures ardentibus febribus vexatos à principio vsque ad exitum habuisse largas excretiones biliosas. Marina Theupola iuuenis nunquam satis ob eius præclaras animi dotes laudata, Mattheo Mauroceno iuueni clarissimo nupta (de qua in libris de prælag, uita & morte egrotantium meminimus) ex abortu in ardentem febrem incidit, cum sæuissimis symptomatibus; sudauit enim large & sæpe, vomuit multa virulenta, & per aluum itidem crebras habuit excretiones biliosas, quibus æstimabatur aliquantulum subleuata, tamen nunquam à febre immunis euasit, habuitque per duos menses diarrhæam biliosam, & aliquando sudores copiosos, quibus tamen crebris euacuationibus nunquam febris sublata fuit, sed tandem ipsa extincta eo morbo est. Guadagnina de Guadagninis mihi olim vxor nunquam satis laudata, ex ardente itidem febre septendecim diebus, diarrhæa biliosa, copiosa & crebra meo magno

In 1. epid. 1.

In li. 4. aph. 21.

Aphor. 25.

cum

cum dolore & damno mortem obijt. Atque hisce rationibus Methodicis fuit persuasum, humores non esse causas morborum. Addunt, vt hanc ipsorum opinionem magis confirmet, compertum esse (quod à Galeno etiam expressum fuit) complures homines, licet corpora ipsorum humoribus valde abundauerint, quoad in ipsis corporibus trāspiratio fuerit seruata incolumis, magnum numerum annorum sanos vixisse. quod non aliam ob causam euenit, quam quod humorum copia, si meatus corporis suam naturalem conformationem seruauerint, morbos non faciat. Compertissimumque est, humores quoad quieti in corpore maneant, nunquam morbos facere: qui si aliquam ob causam ad motum cieantur, statim morbos inuhere, quatenus ad partes commoti, vel adstrictum morbum vel laxum faciant; adstrictum, vbi ad viscus internum delati ipsum vel obstruant, putredinemque initio concitent, febremque vel phlegmonem; Laxum, quatenus ad oscula meatuum corporis fluxi immoderatus euacuantur. Quod vero humorum abundantia in corporibus quiescente manens, minimeque commota, & turgens, morbos non faciat, exemplo epilepticorum, per consensum ab inferna aliqua parte, qui eo malo corripiuntur, facile innotescit. Constat quidem humorem vel vaporem maleficum, quoad quietus in parte à qua subleuatur, maneat, nunquam epilepsiam inducere; qui statim quauis de causa commotus, ascendens ad cerebrum, illud symptoma continuo concitat. At non solum maleficus humor, si ad cerebrum ascenderit, epilepsiam, at quinetiam apoplexiam, acutissimamque phrenitidem. Quam affectus generationem Gal. non potuit non vehementer admirari, scilicet quamobrem sit, quod humor venenosus in corpore tandiu latuerit, absque quod grauem noxam induxerit, & repente exitialem phrenitidem concitauerit. Quales phrenitides Aegyptijs in quibusdam anni temporibus, & constitutionibus solent esse admodum familiares, quæ repente eos inuadunt, paucissimisque horis apoplecticorum modo homines interinunt. Quem morbum (de quo nos in libris de medicina Aegyptiorum scripsimus) Aegyptij Demelmaoi appellant. At mirum est, quamobrem copiosi sudores & vomitus itidem copiosi (si humores biliosi tenuissimi virulentique morbum illum concitantur) non multos iuuerint. Namque de phrenitico, qui tertia die obiit, Hippocrates ita habet; Phreniticus primo, quo decubuit, die virulenta vomuit, & multa & tenuia: febris horrida, copiosus sudor assiduus, toto corpore, ex quibus sanè mirum non est, si Methodici persuasi humores non esse causas morborum, eosque per securationem non indicare voluerint: nisi quatenus morbum vel adstrictum vel laxum faciant. veruntamen cum non omnino purgantia medicamenta (licet à frequenti ipsorum vsu cauendum senserint) ipsi sustulerint, & quandoque ipsorum vsu atque praua aliorum etiam complexi sint, merito humores morborum eos esse materiam voluisse, credendum est; Neque omnino denegasse morbos ab humoribus fieri, sed tamen non ita esse causas morborum intellexerunt, vt ab ipsis primo curatio indicetur, at ipsos quidem indicare sanè, non quatenus humores sint, at quatenus affectus adstrictos vel fluxos laxosue factos denotant, ac proinde humores negarunt esse morborum causas, prout adstrictum & laxum (quos morbos fecerunt) non ab humoribus, sed ab adstrictis vel diffusis meatibus corporis fiant. Quandoque tamen non negare ipsos potuisse ab humoribus adstrictos morbos atque laxos vtique fieri: Adstrictos, vbi commoti in corpore à quauis causa humores ad quampiam partem corporis fluxi, eam inflammant, vel alium affectum ex adstrictis concitantur: laxos vero, si itidem vel ad vteri oscula, vel ad hæmorrhoidas, vel ad vesicam, vel ad ventrem, aut ad cutis poros immoderatus profluxerint. Cæterum (vt dictum est) cum ipsi non quatenus humores, sed quatenus adstrictum vel laxum morbum faciunt, curationem indicare videantur, eatenus morborum causas haud dicendos, putarunt.

Dogmaticos

*In 3. epid. sect. 3.
com. 75.*

Dogmaticos medicos in multis morbis curandis non differre à Methodicis. Cap. V.

Non constat, Dogmaticos medicos in morborum curatione molienda à Methodicis multum fuisse diferentes, quandoquidem Dogmatici (qui post methodicos in medicina magis claruerunt, quiq; Galeni doctrinam præcipue infectati fuerunt) iisdem præsidiorum materijs in medicina facienda, quæ fuerunt Methodicis familiaria, vti sunt, atque nunc etiam vtuntur. si de chirurgicis præsidijs loquamur, qua lenam eorum, quæ apud Methodicos fuerunt in vfu, medicum præsidium Dogmaticos, rationalesue medicos latuit? Nonne sanguinis vacationem, & quæ secta vena, & quæ scarificatione fit, omnes quidem in morbis curandis complexi sunt, familiaremque habuerunt? Nonne etiam æque, ac Methodici scarificatione vtebantur, vti sunt, atque vtuntur? nonne cucurbitularum vsum non minus quam Methodici, Dogmatici æque semper pluri mi fecerunt? Eodem modo & clysteres, frictiones, ligaturæ, inunctiones, fomenta, atque huiusce generis similia præsidia minime eos latuerunt omniaq; ad pharmaceuticam pertinentia non minus atque Methodici in vfu habuerunt, hoc vno excepto, quod nonnulli Methodicorum minus quam Dogmatici purgantium medicamentorum vfu fuerint delectati, quinimo ab ipsis quo magis possit (quod à purgantibus hominis natura abhorreat, atq; ab ipsis lædatur) fore abstinentium putarunt. De quibus Aurelianus ita habet: Sed vitandam probamus frequen-
tem & variam medicaminum potationem, quæ selea educere promittuntur, siue ventrisflua; siue vrinalia: Etenim fitis extenditur, & solidioris cibi fastidium duplicatur, & corporis fortitudo minuitur, atque cibi accepti corrumpuntur, & omnis corporis materia adulterio medicaminum deterior fit. Non tamen vsum planè purgantium sustulerunt, at illis non nisi magna urgente necessitate vtendum præceperunt, à quorum sententia Hippocrates, atque alij qui eius doctrinam secuti sunt, non plane diferentes fuisse visi sunt, cum raro, & in febribus, & in phlegmonis, & in alijs morbis similibus caute (quod corpora lædant) à medicis purgantibus vtendum statuerint; Neque immeritò, etenim purgantia propter vim molestant, qua ventriculum eiusque os maxime lædunt medici inter venena adnumerarunt. Quare Methodici à frequenti vfu medicamentorum purgantium non secus at Dogmatici abstinentium voluerunt. Veruntamen in hoc quidem à Dogmaticis dissentientes fuerunt, quod noluerint purgantia dari, quæ particularem ab occulta quidem facultate ex totius substantiæ similitudine vt Dogmatici aiunt, profecta, humorem educant, at quodcunque purgans valida vi purgatoria præditum omnes superfluentes humores (quæ quorundam quoq; dogmaticorum fuit opinio) posse purgare, illis fuit persuasum. Vnde vtrumque helleborum, & alia, quæ & per aluum & per vomitum purgant, & quæ per os, & per nares itidem purgant, Græcis apophlegmatismata atque errhina dicta, ad purgandum in vfu habuerunt. Quid etiam, nonne veteres Dogmatici medici Methodicorum præsidijs perpetuo ad medendum vti sunt? & quod magis est, Methodicorum modo. Quæ præsidia iuniores etiam ad hanc vsque ætatem in frequenti vfu habere solent. An non si de morbis adstrictis loquamur (quorum genere comprehenduntur febres, ephemeræ, putridæ, inflammones, phlegmones præsertimque angina dictæ, pleuritides, peripneumoniæ, & qui in hepate, renibusque concitantur, dolores, cardiaglicæ & similes alij) cogimur fateri hosce affectus Methodicorum præsidijs laxatorijs Dogmaticos etiam tollere? nonne in ijs omnibus cum Hippoc. tum Gal. tum alij omnes commendarunt fomentorum laxantium vsum? qualia parantur, ex decocto chamomeli, melilori, althææ,
H feminum

*In li. 5. chronion
cap. de isteriis.*

*Gal. in lib. de ijs
quos purg. oportet
in 2. de
nec. rat. in acut.
cum. 15.
In 6. epid.*

feminum lini fanugreci, & similium. Certe quidem, non minusque inunctiones ex oleis, adipibusque laxatorijs; cuiusmodi sunt, quæ ex oleo chamomelino, amygdalino, irino, lilino, & seminibus lini, & seminibus fanugreci, & radiceque cucumeris sylvestris parantur. Quid de balneis aquæ dulcis calidis laxantibus? nonne Galenus omnes ephemeræ febres balneis tollendas præcepit? non minus, & putridas continuas, atque intermittentes, potissimumque tertianas vocatas. Quis est medicorum, qui nesciat in anginosi, pleuritici, peripneumonici affectibus, per exterius laxatorias inunctiones, fomenta, atque balnea conuenire? & non minus omnes quoque ad eisdem affectus per os propinant, vel decocta laxantia, vel olea, vel hydrelæ: præsertimque in pleuritide, peripneumonia, cardiagla, atque in acutis doloribus. Quid de Chirurgicis præsijs dicemus? an non singulis, quæ Methodicis fuere in usu ad medendum (vt etiam dictum est) Dogmatici quoque vsi sunt, atque vtuntur? Cuiusmodi est venæ sectio, scarificatio, cucurbitulæ sectiones, frictiones, ligaturæ, clysteres, balani, inuersiones pessarij, & similia. Quare in hisce præsijs, neque in modo quo ijs vtuntur, Methodici à Dogmaticis non videntur plurimum differre. Eodem item modo conuenisse visi sunt in usu præsidiorum, quibus vti solent, ad hæmorrhagias sistendas, ad mensum, hæmorrhoidumque profluuium, ad diarrheas, dysenterias, lienterias atque ad sudores immoderatus profluentes. etenim ambabus sectis familiaria fuerunt vehementer siccantia, atque adstringentia medicamenta, de quibus nos posterius accuratius sermonem habebimus. Demum, ex Dogmaticis Erasistratus diatritum (quod pertinet ad victus rationem in ægrotis) non minus quam Methodici laudauit, omnes vero in omnibus morbis adstrictis, tenuem ac parcissimum victum laudarunt, & vini abstinentioniam: Quibus quidem cuique constabit, Methodicos à Dogmaticis in curatione complurium affectuum haud plurimum differentes fuisse: Quinimo, vt in progressu istius operis comprehenderetur, parum aut nihil in quamplurimis morbis curandis, licet in methodo curatiua differant, à Methodicis discreparunt.

De dogmatibus, quæ à Methodicis in medendo non admittuntur, & primum, quod non sit necessaria cognitio, ad indicandam curationem læsarum partium, naturæ, causarum, celi, anni temporis, ætatis, studiij atque similium. Cap. VI.

Methodici in multis à Dogmaticis dissenserunt, cum Dogmatici plura ad morborum curationem instituendam necessario obseruanda voluerint, scilicet, corporis naturam, ætatem, sexum, consuetudinem, vitæ studium, partes læsas, morborum causas, internas quippè qualitates, atque humores morbos facientes, anni tempus, regionem, cælum particulare, morborumque causas effectrices, scilicet frigora, æstus, ebrietates, cruditates, satietates, famem, sitim, exercitium, ocium, & similes alias causas. Methodici contra horum cognitionem atque obseruationem pro indicanda curatione scitu minime necessariam inutilemque esse mordicus tenuerunt. Atque non minus prædictorum eam singulorum obseruationem, medicis magnam potius confusionem in medendo parere, medicosque ad deliberandam curationem valde hæsitantes reddi, ipsis creditum est: Quæ dogmata in medendo minime à medicis obseruanda, idcircoque superflua esse, eo quidem præcipuo argumento ijs existimarunt: quod essentia morborum per se indicans curationem vna eademque sit in omnibus corporibus, naturæ, ætate, sexu consuetudine, studio alijsque differentibus. Etenim febris (exempli gratia)

gratia) & in naturis corporum temperatis, & in intemperatis essentia cum sit ex omnium Dogmaticorum placitis morbus calidus & siccus, necessario in illis oibus temperamento etate, sexu alijsq; differentibus esset refrigerandum atque humectandum, in aliquibus tamen plus, & in aliquibus minus. Eodem itidem modo Methodici non iniuria dicunt, in febre, quæ morbus adstrictus est, in omnibus cum natura, tum sexu, tum etate, tum consuetudine, tum alijs differentibus, perpetuo esse laxandum. præsidiaque laxantia ad instituendam curationem, vel ex ipsorum etiam dogmaticorum placitis usu venire, siquidem medicamenta omnia quibus hi febres curari docent, sunt laxantia, scilicet vacuationes, purgationes, balnea, inunctiones, frictiones, & similia, quæ Dogmaticis fuerunt perpetuo ad sanandas febres familiaria. Neque est, quod obijciatur, hosce medicos sua methodo non particulares homines, sed hominem genericum & communem (de qua re aliàs accurate egimus) curare. Quæ curandi methodus à ratione vel hac vnica ratione abhorreere creditur, quoniam particularibus hominibus, propter ipsorum naturæ, ætatis, sexus, consuetudinis, studij atque similibus differentiam, vnica curatio minime conuenire potest. Namque quis quæso est, cui ignotum sit, in corpore calidioris temperamenti febre vexato minus esse refrigerandum, quam in eo quod frigidioris sit naturæ, ob maioremque a naturali temperamento recessum, non secus quam in sicciori corpore vlcerato efficaciora siccantia, & in humidiori debiliora conuenire, omnes norunt. Vnde cognitum est, agrestioribus, atque robustioribus corporibus valentiora medicamenta conuenire, atque mitiora imbecillioribus. Quæ non solum Methodici, sed vel etiam medicæ artis ignari fatebuntur vera esse: Etenim si de purgationibus sermo habeatur, in debilibus, quales (exempli causa) sunt pueri, atque senes, pharmaca debiliora conuenient. Robustis vero, scilicet agrestioribus, & ætatis consistentis, validiora. Quod Methodici hac ipsa de causa fieri fortasse dicerent, quia hæc corpora scilicet robustiora ad adstrictum affectum inclinant, vel aliquid affectus adstricti habent, puerorum vero quippè imbecilliorum corpora aliquid in se laxi itidem continent, vnde hæc ipsa (quod suapte natura habeant propter habitum laxum, vnde euacuentur) mitiori vacuatione atque illa efficaciori erunt laxanda. Non secus etiam de alijs corporum differentijs, penes temperamentum varium, ætatem, sexum, consuetudinem atque studium consideratis, præsidiorum differentia conspicua elucebit, scilicet quod propter has differentias medicamenta æque omnibus particularibus hominibus haud conuenient. Nihil enim, vt Methodicis visum est, interest, ad danda cuique medicamenta, quod vnus homo sit calidior, alter frigidior, vnus siccior, alterque humidior, cum hæ differentia non mutant medicamentorum essentiam, sed vel quantitatem, vel facultatis agendi in medicamenti efficaciam, quasi dixeris secundum magis & minus ea medicamenta variari debere: Quod scilicet in mollioribus (exempli gratia) corporibus minus præsidij vel vacuantis, vel purgantis, vel quod minus efficax sit, conueniat, & in robustioribus, aut quod validum sit, aut plus validi habeat. Ex quibus Methodicis fuit persuasum illam corporum varietatem siue differentiam penes varias corporum particularium naturas, ætates, sexus, consuetudines, vitæ studia consideratam, nihil sanè aliud varietatis ad indicandam curationem argumentari, quam illud quod penes magis (vt aiunt) & minus attenditur, ita vt medica præsidia singulis particularibus hominibus morbo quopiam conflatis adstricto, aut laxo, essentia eadem conueniant, etiam si, ea ipsorum natura sexu, ætate & alijs similibus differens sit, hæcque differentias non mutare medicamentorum essentiam, sed illorum efficaciam, ita vt quædam illarum differentiarum medicamenta laxantia in adstricto morbo, adstringentia in laxo, efficaciora, & quædam minus efficacia exposculent, atque, vt rem exemplis recte comprehen-

H 2 damus,

Galel. 3. meth.
med cap. 7. 2. ad
Glauc cap. 3. in
6 meth med. c. 8
In 6. comp. loc.
cap. vlt.
In 1. comp. secun-
dum gratia cap.
21. & 3. cap. 3.

damus, quis quæſo eſt (vt aliàs dictum eſt) quem lateat, ſi febris exempli gratia in corpore eucrato ſiue temperato accendatur, ex naturæ ratione, minora refrigerantia conuenire, atque in frigidiore natura ſeu temperamento maiora ſeu efficaciora: quod febris noter maiorē caloris reſeſſum, veluti eadem ratione in corpore diſtemperate calido minus refrigerantia propter minorem reſeſſum à naturali temperamento requiruntur. Quid enim in medicamentis ex vario corporum temperamento, varietatis ſit? id proſecto ſolum, quod penes ſolum modum maiorem atque minorem vim agendi, obſeruatur. eodem modo ſi vlcus fiat in corpore ſicciori, medicamentum magis ſiccatorium, veluti in humidiori minus ſiccatorium conueniens erit. Idem à differentia ab ætate & ſexu obſeruatur, quando pueri ſenes & mulieres medicamentis blandioribus ſint tractandæ, efficacioribus vero viri ætatis conſiſtentis; & eodem modo à conſuetudine, atque à vitæ ſtudio: ita vt liquido conſtet, hæc differentias, non indicare pro curatione inſtituenda eſſentiam ſeu naturam præſidiſum, at ſolummodo mitiorem aut efficaciorē medicamentorum vim. Quod nobis ſuadet, medicamenta ex iſtis differentiis, quæ à corporum temperamento, ſexu, ætate, conſuetudine atque ſtudio conſiderantur, non mutari ſpecie atque eſſentia. Quamobrem recte dixiſſe viſi ſunt Methodici, eas differentias in egrōtis corporibus eſſe ad indicandam curationem ſuperſuas, atque paræ utilitatis, cum non mutant eſſentiam medicamentorum. Nam quæ (vt aiunt) perpetuo in morbo adſtriſto, cum à ſolis affectibus per ſe curatio indicetur, uſum habebunt medicamenta laxantia, & in laxo adſtringentia. vel ſint calidi vel frigidi, vel ſicci vel humidi temperamenti, vel cuiuſuiſ ætatis, ſexus, & ſtudio. In febre enim vel phlegmone, qui affectus ex Methodicis ſunt adſtriſti, perpetuo in omnibus cum pueris tum ſenibus tum ætatis conſiſtentis, tum in mulieribus tum in viris, in omniq; vitæ ſtudio, cælo, regione, anni temporibus, vtendum erit laxantibus præſidiis, quæ ſunt euacuationes, purgationesque, quæ ſunt ſanguinis miſſione vel laxatorijs pharmacis vel ſudorificis, vel vomitorijs, vel inſenſibiliter euacuantibus, vel per vrinam, vel alio modo. At ſi aliquis petierit, cur in pueris affectu adſtriſto laborantibus, & in decrepitis ſenibus febre putrida, vel phlegmone itidem vexatis, qui ſunt morbi adſtriſti, ſanguinis vacuationem medici non moliantur, uel purgationem, vel aliud efficac laxatorium, illis reſponderent Methodici in illis propter habitum maxime laxum, validiori laxanti non eſſe opus, quod nimirum vires ea magna laxatoria auxilia in iſtis non ferant. Dogmatici itidem vocant hos debiles, vel virtutis debilis, propter quam debilitatem, haud aptos eſſe, vt inſigniter euacuentur dicunt. Si aliquis vero dubitauerit an ſenes habeant laxum habitum, quoniam cæteris alijs ætatibus ſenum corpora ſint ſicciora, & inſignis ſiccitas non laxi, ſed adſtriſti ſit indicium, reſponderetur, ſenum corpora conſumptione humidi ſubſtantifici, laxa dici oportere, non ſecus quā tabem laxum morbum dicimus, quia in ipſo affectu humiditatum in corpore exiſtentium colliquatio conſumptione facta eſt. Vnde merito ſenes non ferunt laxantia medicamenta: quare licet morbo adſtriſto ſenes vexentur, non magna tamen laxantia admittunt, ſed ſolummodo debilia, & minora. Vnde in pleuritide, morbo adſtriſto, licet perpetuo ſit laxandū in omnibus cuius uiſ ætatis corporibus, tamen Methodici in pueris atque in ſenibus eo affectu vexatis, aut non mittebant ſanguinem, aut parum quidem: quoniam (vt dictum nuper eſt) corpora cum puerorum tum ſenum laxo quadantenus affectu laborant idcircoque in iſtis vires magnas vacuationes non ferunt, quamobrem Methodici viribus non permittentibus in iſdem corporibus adſtriſto etiam affectu magno laborantibus, à ſanguinis vacuatione, & à purgatione, tanquam à magnis laxatorijs præſidiis abſtinebant. Quam rem neque Dogmatici negabunt, cum & ipſi ſciant puerorum corpora, quod meatus cuti nimis laxos habeant ob id

ob id facile resoluantur. Quod cognitum ab omnibus est, illorum corpora quia propter eam laxitatem habent sponte vnde euacuentur, magnas ob id euacuationes non ferre. Quae de causa in iuuenibus, virisque ætatis consistentis, quoniam ipsorum corpora sunt robustiora, viresque robustas habent, largiori sanguinis euacuatione medici vti solent. Itaque huiusmodi corpora scilicet senum, & puerorum virium languore magna præidia laxatoria non ferre deprehenditur. Aurelianus dixit: medicamenta ex affectus, & virium corporis magnitudine indicari. Quare ex illorum sententia à medicis plurimum laborandum non est, ad morbos curandos, vt ipsi corporum affectorum naturam, ætatem, sexum, consuetudinem, atque vitæ studium, cognoscant, cum hisce differentiis non mutetur medicamentorum essentia, sed potius maior ipsorum & minor agendi vis.

In 3. Chronion
cap. 4.

Quod partes affecta non indicent in morbis curationem.

Caput VII.

Idem Methodici faciendum in cognitione partium affectarum, anni temporum, regionum, constitutionum, celi particularis, causarumque morborum. Nimirum & hæc quod non faciant ad indicandam speciem, & essentiam medicamentorum, at ad ipsorum potius vim agendi efficacior, atque debiliorem cognoscendam, non esse animaduertenda voluerunt, idcircoque in illorum cognitione, quod non mutent hæc (vt dictum est) curationis speciem essentiamque medicos incumbere debere. Itaque negarunt (vt à partibus læsis exordiamur) diuersarum partium varias differentesque naturas, figuras, situs vsusque curationem indicare, proindeque ab his non esse petendam morborum curationem. Etenim corporis partes cuiuscumque sint naturæ, figuræ, situs, atque vsus, si morbo adstricto vexentur laxantia ex poscunt; contra, quæ laxum morbum patiuntur, adstringentia. Itaque in omni parte (exempli gratia) inflammata, quod morbo adstricto laboret, laxantium medicamentorum vsus conueniet, Quam rem Gal. in lib. simplicium confirmasse visus est, cum ad omnes inflammationes lac calidum (quod laxatorium est medicamentum) adhibitum commendauerit. Vnde ipsius vsus ad omnes inflammationes in vnaquaque parte corporis concitatus omnibus medicis fuit valde familiare. Commendauit quoque Gal. ad oculos inflammatos fomenta ex decocto meliori fenugreci, & althææ, quibus Veteres medici ad omnes inflammatas partes familiariter vsi fuerunt; quæ hac etiam ætate non minus vsu recepta sunt. quis quæso è medicis medicinam facientibus ille est, quem lateat prædictorum fomentorum vsus ad pleuritim, ad peripneumoniam, atque ad hypochondria inflammata? præsertimque ad lienis, hepatis vterique phlegmonem tollendum? Galenus expresse in libris de composit. med. secundum locos commendauit fomenta eadem ex laxatorijs medicamentis parata ad oculos, ad auresque inflammatas; non minusque ad crurum, brachiorum, genuum, pedum, atque manuum phlegmones in lib. de sectis ad eos, qui introducuntur, laudauerit eadem fomenta laxantia. Neque profecto iniuria, quando, si humor vel in oculos vel in aures vel in quamlibet aliam partem corporis de fluxus phlegmonem fecerit, institutum, & scopus præcipuus omnium quidem medicorum esse debeat, vt humor in parte susceptus, imbibitus vel (vt aiunt Methodici) adstrictus, phlegmonem fouens digeratur, & resoluator ad quam resolutionem laxantia medicamenta maxime faciunt. Neque illis obijciatur in principio quorundam phlegmonum vsus habere (omnium sectarum medicis ita sentientibus) adstringentia: veluti in alijs temporibus, sed maxime in statu & in declinatione digerentia Methodicis laxantia vocata, adhibentur. Itaque

In lib. 10 simpl.
cap. dilatare.
In 4. de comp.
med loc cap.

In 3. li c. 1 & in
4. de comp. med.
cap. 2.
Cap. 8.

Itaque si in principio quarundam partium inflammatarum, qui affectus sunt adstricti, adstringentia medicamenta conueniant, quomodo verum erit, in omni morbo adstricto quamlibet partem obsidente, vsum habere medicamentorum laxantia? & praesertim cum nedum Dogmatici, sed quinimo etiam Methodici illud medendo obseruent, scilicet, vt in principio phlegmonis, qui est morbus adstrictus, quasdam corporis particulas obsidentis medicamenta adstringentia (de qua re posterius nos accuratius) debeant adhiberi, ergo non erit credendum, in morbo adstricto quamcunque partem tenente, perpetuo laxantia vocata medicamenta esse adhibenda. At Methodici non concedent, phlegmonem, de quo praesertim dubitatio est, à principio ad finem vsque totis quatuor temporibus, scilicet in principio, augmento, statu atque declinatione adstrictum morbum vocari debere, at solummodo toto humore faciente phlegmonem, ad partem inflammatam fluxu, & in ipsa imbibito, vel adstricto, quem affectum adstrictum ipsi vocarunt, in principio vero phlegmonis in quo nondum morbus adstrictus factus est, ad prohibendum ne fiat, Methodici (auctore libri de optima secta ad Trasylbulum docente) adstringentibus partem firmabant ac roborabant, vt ab influxu humoris seipsam defendat, de quo argumento paulo post accurate agemus. Itaque verissimum erit ex Methodicis in morbo adstricto quamcunque partem corporis occupante laxantibus, atque in laxo adstringentibus opus esse medicamentis, & proinde partem affectam per se non indicare curationem. Amplius Aurelianus probat medicamenta non indicari à partis affectae specie, argumento à partium sensu deprompto, scilicet, quod partium corporis quaedam sensibiles siue multi sensus sunt, vt oculi, os, ventriculi, aliaeque partes & quaedam minus sensibiles seu hebetis sensus, vt pedis calcaneum atque solea extremæ partis pedis. Omnes quidem medici, inter alia, fatentur hasce partes non eadem medicamenta perferre & proinde diuersa specie medicamenta indicare: quippe hebetis sensus quæ sunt, validiora, efficacioraque exoptulare; & acuti sensus mitiora, atque leuiora: quod tamen experientia falsum esse Methodici dixerunt. namque pedis calcaneum & omnes partes suapte natura hebetis sensus (exempli gratia) fluxione vel inflammatione vexatae, redduntur valde sensibiles & dolorosæ, eodem modo omnes fortasse articulorum partes, quæ suapte natura hebetis sunt sensus, fluxione, aut phlegmone vexatae se habere videntur, maxime sensibiles ac dolorosæ euadentes, mitiora & leuiora exposcunt medicamenta, quæ suapte natura propter hebetem sensum validiora potius exposcerent. Contra, quaedam, quæ maximi sensus sunt, ex fluxione, aut, ex insigni inflammatione quandoque ita obstupescunt, vt paucissimi sensus euadant, quæ ob id non mitiora, quæ suapte natura propter multum sensum exoptulabant, sed validiora quidem stupidi sensus à morbo redditæ indicabunt, ex quibus Aurelianus colligit, partes affectas non habere particularem indicationem, qua mutent, seu euariant medicamentorum essentiam. Quare ex his verum esse intelligunt, in adstricto morbo, in quacunque corporis parte fiat, perpetuo esse laxandum, laxantiaque indicari medicamenta; & in laxo adstringendum, adstringentiaque conuenire medicamenta; inutile idcircoque esse indicationem, quæ à partis cum natura, tum figura tum situ, desumitur. etenim hæc partium varietas non mutat pro instituenda curatione medicamentorum speciem seu naturam, sed quædam alia quæ potius faciunt, non ad indicandam essentiam, sed ad maiorem & minorem in medicamentis agendi vim, vel ad commodiorem agendi modum. Quæ res maxime confirmabitur, si vlcera curatio quomodo fiat, animaduuerterimus. Profectò Methodicorum sententia confirmabitur, quod pars affecta non indicet curationem, neque habeat propriam indicationem. Apud omnes constat, partes vlcera quas cumque siccantibus sanari medicamentis, Et si vlcus in crure existens ab vlce,

In li 3. Chroniam
cap. 4.

ab vlcere, quod pulmones vexat quadatenus differre videatur, veruntamen essentia seu natura vlceris, tum in crure, tum in pulmonibus facti cum vna eademque sit, eadem quoque; medicamenta necessaria esse oportebit, scilicet siccantia. neque est, quod ad partes externas exulceratas omnia quidem medicamenta adhiberi queant, & ad internarum partium vlcerata non quidem omnia admittantur, sed quædam solummodo quæ etiam non nisi artificiose indita illis medentur. Etenim compertum est, ad vlceratos pulmones, saccharum rosaceum, bolum armenium, terram lemniam, lapidem hæmatitem, acaciæ succum, atque alia huiusmodi ex succo plantaginis, centinodij seu poligoni sumpta maxime conuenire. Alexander Trallianus complura cum pulmonum tum asperæ arteriæ vlcerata solo hæmatite lapide tenuissime trito ex succo poligoni epoto omnino coaluisse, atque probe sanata fuisse scriptum reliquit. Quæ singula medicamenta partium externarum vlceribus quoque prompte mederi, experientia cognitum est: neque profecto id iniuria, cum ipsorum natura omnibus vlceribus adprime conueniat, propter vim insigniter siccantem. Verum hæc longe promptius, atque facilius externis partibus vlceratis auxilio sunt, eo quia in externis vlceribus medicamenta viribus integris, nihilque refractis valenter agant. Ad internarum vero partium vlcerata, & ad ea præsertim, ad quæ non nisi longo viarum tractu (vti sunt pulmones) medicamentum peruenit (quoniam priusquam ad vlceratas partes perueniant medicamenta, plurimum à calore patiantur, ipsorumque vires refranguntur, ideoque imbecillius agunt) non nisi longo tempore vlcerata illa sanare possunt. Quamobrem non ita euidenter videntur interna vlcerata iuuare. Itaque neque partes vlceratæ habent propriam indicationem, sed quæ non nisi maiorem minoremque, seu efficaciorē, atque mitiorem vim agendi in medicamentis denotet, nihilque euarians essentiam medicamentorum. Neque est, quod dicant, pulmones & partes corporis humidiores mitiora, & sicciores durioresque efficaciora exposcere. tamen hæ partes vlceratæ, licet inuicem vel temperamento humido siccoque, aut mollitie duritieque differant, non propterea indicabunt aliquid faciens ad essentiam medicamentorum. Siquidem essentiam ipsorum, quæ siccans est, ab illarum partium varietate indicatur magis vel minus siccans. Etenim cum vlceris essentia in humiditate consistat, facultas ob id in medicamentis indicatur siccatoria; diuersæ verò partes non indicant diuersam essentiam medicamentorum facultatis, at minorem, vel maiorem vim in siccando. Neque variæ partes varias diuersasque medicamentorum facultates indicabunt at eandem facultatem, aut efficaciorē aut mitiorem, vti diximus in siccando. hinc est, quod Gal. inquit: Medicamentum ex cadmia, non curare vlcus in aure, maxime vero in crure positum: Neque profecto iniuria id fit, quoniam ex cadmia medicamentum, quod minus efficax siccans sit, quam possit vlcus in aure, cuius substantia admodum sicca atque dura est, quæ proinde medicamentum efficaciter siccans indicaret: potest vero idem vlcus in crure positum sanare, quia vlceris substantia humidior molliorque est, ac idcirco indicatione à natura partis indicatur siccans quidem medicamentum, at quod mitius siccet. Quare partes vlceratæ variæ non mutant essentiam medicamentorum, at certe potius, (vti dictum aliàs est) efficaciam in agendo. Possent quidem & Methodici eam differentiam in curandis diuersarum partium vlceribus obseruare, nimirum, vt in vlceratis partibus siccioribus durioribus, & in agrestium corporum vlceribus medicamenta magis siccantia adhibeant, atque in humidioribus, mollioribus partibus corporis, & in mollioribus corporibus vlceratis, minus siccantia. At absque hac etiam differentia partium obseruatione animaduersa possunt promptius Methodici variarum diuersarumque partium vlceribus mederi, indicatione desumpta ab affectus, scilicet vlceris magnitudine, quandoquidem vbi vlcus in quacumque parte positum,

In lib. 5. meth.
med. cap. 10.

Gal. in 5. meth.
med. cap. 10.

positum, fuerit maxime humidum, profectò medicamentis siccantioribus erit opus, atque ubi parum per se humidum sit, mitioribus minusve siccantibus. Quod præceptum Galenus itidem in durandis oris ulceribus expressum fecisse visus est, cum dixerit: in ulceribus, quæ multum humida sunt, validioribus siccantibus utendum, atque in parum humidis moderate siccantibus. Situs quoque partium exulceratarum non mutat curationem, at modum solummodo curandi, proinde neque medicamenta facultate diuersa. Nam etsi cogantur medici in ulceribus vteri, vesicæ, renum, ventris, intestinorum uti medicamentis actu humidis, quæ medicis instrumentis injiciuntur, non tamen potestate sunt humida sed sicca. Neque etiam Methodici ignorabant, ad vlcera (exempli gratia) stomachi pectoris, & pulmonum conuenientius dari medicamenta, cum ijs, quæ eduntur atque bibuntur, quæ singula medicamenta potestate siccantia sunt. ex quo liquido constat, varios partium ulceratarum situs non habere particularem indicationem, sed potius diuersum modum curationis indicare: quando eadem medicamenta siccantia, actu sicca in externarum partium vlcera indantur, in internarum vero actu etiam humida, & non nisi aliquo instrumento injiciantur. Ad ventris vero vulnera sananda magnum difficileque omnibus medicis fieri negocium, neminem latet. neque ea sanari posse, nisi prius impedimenta tollantur, quibus varijs præsidijs, sublati, medicamentis encæmis Græcis dictis, sarcoticis atque epuloticis ea vlcera sanari, non est medicorum, qui nesciat. Idem de figura partium est dicendum, quando neque varia partium læsarum figura mutet essentiam seu speciem medicamentorum, at solummodo curationis modum, vel medicamentorum vim secundum magis & minus. Ex his itaque patet, partes corporis læsas non indicare per se curationem, sed vel medicamentorum vim intensiorem aut mitiorem, vel varios modos, quibus eadem medicamenta comparari apponique solent, non mutata ipsorum facultate indicata ab essentia seu à natura morbi: quæ si laxa sit, perpetuo adstringentibus; & quæ adstricta, laxantibus præsidijs erit opus, atque ita Methodicis fuit persuasum, nedum corporis naturam, ætatem, sexum, consuetudinem vitæ studium, & similia, indicare per se curationem, at quinimo etiam neque varias corporis partes læsas propriam habere indicationem. Sed quid de nervis dicemus? An non propria medicamenta, quibus ulcerati sanantur, expostulant? Certe quidem videtur, verum si rem hanc accuratius medici animaduertant, intelligent etiam nervos ulceratos non indicare medicamenta specie ab ijs, quæ alijs partibus ulceratis medentur, distincta, sed potius quædam alia, quæ ut in diuersis alijs partibus dictum est, vel plus vel minus siccant, de qua re posterius accurate erit agendum. C. Celsus Methodicis & ipse (quod causarum, ex quibus fiunt morbi, cognitio aliquando pro curatione instituenda sit necessaria) obijciens, hæc contra ipsos scripsit: Ergo etiam ingeniosissimus sæculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius febricitanti cuidam, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cœpisset, cognosceret, aquam frigidam ingessit, qua ille epota cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno & sudore discussit. quod auxilium opportunè prouidit, non ex eo quod aut adstrictum corpus erat, aut fluebat sed ex causa aquæ febris fuit discussa, putauit causas quoque in morbis curandis cum Dogmaticis indicare. At pace tanti viri dixerim ipsummet fuisse confessum febrem diarrhiam illam ex ebrietate sudore fuisse discussam: quid an non aqua epota sudorem quo sublata est febris, promouit? certe quidem, eo quidem modo quo aquam frigidam large epotam in ardentissimis summeque æstuosis febribus & sudore mouere, atque eas febres soluere & diximus, & posterius dicemus. Atque hæc sunt, quibus Methodicis fuit persuasum, ad instituendam in ægrotis curationem, corporis

corporis naturæ; ætatis, sexus, consuetudinis, studij, partiumque læsarum observationem scitu non esse necessariam, Non minusque neque causarum procaccitarum, varij coeli, anni, temporis, regionum & similium, quoniam perpetuo in morbo adstricto sit laxandum, in omnibus inquam cum corporibus cuiusque naturæ sint, ætatis, sexus, consuetudinis, vitæ, studij, tum partibus affectis cuiusque naturæ, figuræ, atque situs icidem sint, atque in morbo laxo in iisdem omnibus corporibus tum partibus læsis perpetuo esse adstringendum.

Cur adstringentia medicamenta in phlegmonum, quæ morbi sunt adstricti, principio conueniant. Cap. VIII.

Methodicorum dogma satis famosum fuit, in phlegmonū principiis adstringentibus esse vtendum, scilicet ad fluxionem, incrementumque phlegmones prohibendum, a quo placito Dogmatici abhorruerunt; Etenim Gal. scripsit, apocritica in principiis inflammationum, quod vim habeant adstringendo repellendi, vtilia esse: siquidem hæc adstrictione robur partibus inflammatis induunt, unde minus prompte fluxionem admittunt, & eorum humorum, qui in ijs iam contenti sunt, tenuissimum extrorsum exprimunt. ex quo loco non leui coniectura deprehenditur, librum de optima secta ad Trasybulam, Galeno tributum, Galeni quidem non fuisse cum de hoc ipso dogmate contra Methodicos in eo libro mordicus multa scribat. sed præsertim, quia ipsi idem, quod ipse expresserat, in multis dixerunt vtilia in phlegmonum principiis esse adstringentia, quia partem affectam robore firmant. & prohibent incrementum phlegmones. Certe ea argumenta, quibus contra Methodicos in eiusdem libri capite 49. ad finem vsque auctor illius libri vsus est, cum ex toto Galenicam doctrinam, oppugnent, aperte demonstrant, eorum librum à Galeno non fuisse scriptum. Itaque cum in principiis phlegmonum, medicamenta laxantia (quod tunc temporis, humores fluentes, nondum affectum adstrictum fecerint) non conueniant, quæ postea in alijs temporibus maxime vsu veniunt, præsertimque in statu atque in declinatione, ergo recte vsus adstringentium medicamentorum opportunus erit. & hæc est vera etiam Dogmaticorum medendi methodus, quam in curandis phlegmonis omnes obseruant. siquidem & ipsi in horum affectuum principio adstringentibus medicamentis humorem repellunt, affectamque partem robore firmant. Galenus vsus adstringentium esse maxime vtilem tradidit ad oculos, ad aures, tonsillas, columellam, antriadem, guttur, sedem, atque ad complures alias partes inflammatas. Quare in hoc videntur conuenire cum Dogmaticis Methodici. Veruntamen sæpius dubitauimus, an hoc dogma fuerit à Methodicis constitutum, eo quod hi quamcumque inflammationem, phlegmonemque morbum adstrictum esse fecerint, quod ex Aureliano de omnibus phlegmonis in libris oxeon scribente apertissime constat. Constat quidem ipsum nunquam in curanda aliqua inflammatione ex propria sententia scribentem, adstringentium vsus commendasse, quinimo ea medicamenta ex aliorum sententia cum in principio phrenitidis & aliarum phlegmonum, laudata, perpetuo damnauit, quod vt ait, pressuram siue adstrictum morbum augeant. præterea cum Methodici omnes fateantur eos affectus esse ex toto adstrictos, debuerunt, non nisi laxantia medicamenta admittere. At cum in principio istorum affectuum humor nondum in parte affecta ex toto adstrictus sit, hæud iniuria adstringentium vsus admittere potuerunt. Cæterum quæ nobis de hoc dubitationem fecerunt, duo sunt. Quorum vnum est, quod constet medicos omnes etiam Dogmaticos in phlegmonis internis etiam initio vsos fuisse medicamentis laxatorijs, an non Hippocrates in 4.

I de vict.

In 11. Meth.
med. cap. 15.

de vict. rat. in acutis in pleuritide statim exordium ab usu medicamentorum esse tradidit; eumque usum Galenus in commento confirmavit? certe quidem. Accedit etiam, quod alterum erat considerandum, in parotidibus, bubonibus atque in alijs axillarum phlegmonis, neque in principio medicos vti adstringentibus, neque etiam in principio phlegmonum malignarum, in quacunque corporis parte oborientium, admitti villo pacto usum adstringentiorum, ad repellendum humorem. Cum itaque hæc vera sint quid de usu adstringentium in phlegmonum principiis dicemus? Methodicos adstringentium repellentiumue usum complexos fuisse in principio earum phlegmonum quæ fiunt in partibus externis, atque ignobilibus. Contra interdici ipsorum medicamentorum usum in phlegmonis cum internis, tum etiam in ijs quæ occupant partes externas, sed quæ proximæ sunt visceribus nobilibus. Demum in omnibus quoque phlegmonis malignis usus adstringentium (quod nullo pacto humor malignus sit à cute repellendus) reprobatur. Quæ dogmata non iniuria, ut aliàs quoque visum est, cum Methodici tum Dogmatici medendo obseruauerunt. Dogmatici, quoniam ad prohibendum inflammationis augmentum incrementumue coguntur repellere à parte affecta humorem, ne morbus quidem plurimum augeatur, Methodici verò quia eodem ferè modo, quod inflammationem, non quæ sit, sed quæ facta est morbum adstrictum vocent, principium inflammationis non esse affectum adstrictum æstimant, quod si verum est, affectibus inflammatorijs in principio medicamenta adstringentia erunt accommodata. Quibus medicamentis adstrictorijs Aurelianus usus est in principio arthriticorum dolorum, ut ex lib. quinto Chronion. cap. 2. constat. At non levis hinc difficultas à Dogmaticis excitari poterit, ut verum esse nequeat, quod Methodici vnquam vel etiam in phlegmonum externarum principiis usus adstringentium commendauerint, cum æstimandum sit, eos minime laruisse, in malignis pestilentibusque phlegmonis, tumoribusque nunquam adstringentia, quia humorem intus pellunt, usum habere potuisse: neque etiam si non malignæ sint, vbi tamen in inguinibus, in axillis, & in adenibus & in retro aures positis partibus oriuntur, etenim in prædictis partibus inflammatis, humorem intus repelli, maxime periculosum est. Proinde neque in harum partium flammatarum principio ex Methodicis adstringentia, quod repellant, vnquam ad medendum usum habuisse, putandum erit. Quia ea fortasse de causa ab ijs factum fuit, cum perpetuo in omni inflammata parte, vel interna, vel internæ proxima (quod morbo adstricto laboret) vtendum laxantibus, ij statuerint. Quæ difficultas ex superius dictis resoluta esse videtur, nimirum quod usus adstringentium in phlegmonum principiis solummodo conueniat, vbi phlegmonæ fuerint in partibus extimis ignobilibus atque expertes cuiusuis malignitatis. A quibus sanè argumentum satis validum colligitur contra Methodicos, partem quippè affectam per se curationem (quod superius ex illorum sententia damnatum est) indicare: Nonne verum est, in adenibus, inguinibus, axillis inflammatis nunquam repellentium usum vtilem esse? & quandoque in partibus remotis ignobilibusque adstringentia admitti? scilicet in principio inflammationis, ad repellendum humorem intus ne augeatur inflammatio. ex quo verum videbitur partes affectas medicamentorum essentiam mutare: nonne partes remotæ inflammatae, in principio adstringentia exposcunt? & inguina, axillæ, adenesque aurium laxantia? An non hæc est, partes diuersas mutare curationem? Quid itaque ad propositam difficultatem dicemus? Illud solummodo, vt Methodicorum partem tueamur, de tumoribus, phlegmonis, & alijs excretionibus, quæ malignæ non sunt, esse intelligendum: scilicet quod in illorum affectuum principio adstringentia conueniant: nequaquam vero in malignis seu pestilentibus, quos affectus Methodicos non intellexisse, cū ipsos, vt superiori libro ostendimus, inter

inter venenatos affectus comprehenderit, quos Methodici non reduxerunt ad adstrictum & ad laxum, at ad alias communitates. Verum esto, quod malignus morbus etiam ad laxum & ad adstrictum referatur, nihilominus etsi tumores phlegmonesque maligni nunquam admittant usum repellentium, ne vel etiam in ipso initio, tamen non ob id sequitur partes affectas habere propriam indicationem, neque enim pars affecta indicat medicamenta laxantia, at pars non affecta sed affectæ proxima indicare videtur, ne adstringentia adhibeantur, ne viscus subiacens parti extimæ inflammatur lædatur, scilicet ab affecta parte ad ipsum humore protruso. Itaque & si hæc vera sunt, quod partes visceribus proximæ laxantia indicent medicamenta, etiam per phlegmonum initia, & remotæ a visceribus per id temporis adstringentia. tamen partes ipsæ affectæ, ut dictum est, non idcirco indicabunt varia medicamenta. Varia enim medicamenta indicat morbus malignus & non malignus, atque partes non phlegmone affectæ, sed internæ ipsis proximæ. Vnde viscera nobilia illis proxima prohibent usum adstringentium.

An in omnibus adstrictis morbis nuda laxantia conueniant, vel adstringentibus commista esse debeant. Cap. IX.

Methodici itidem in omnibus morbis adstrictis voluerunt, esse vtendum nudis laxantibus: Exceptis phlegmonum principiis, in quibus quomodo adstringentia usum habeant, nuperrime visum est. Quod placitum Dogmatici mor dicus damnauerunt, ipsumque ad medendum maxime perniciosum esse statuerunt; quippe quod viscera interna à nudis laxantibus & debilitentur, & exinde non minus phlegmone augeatur veluti adstringentibus roboratur. Quamobrem Galenus Attalum medicum Romanum summopere redarguit, qui ad hepar inflammatum nudis laxantibus utebatur, neque aliquod medicamentum facultatis adstringentis laxantibus miscere voluerit. Caterum vnde sit, quod hepar cuius substantia carnea est, atque mollis, temperamentumque itidem eius est calidum, & humidum, medicamentis adstringentibus, quæ frigidi, sicci que temperamenti, atque terrenæ substantiæ existunt, eiusdem visceris substantiæ planè contrariis, roborari queat, non esse omnibus conspicuum, putamus. Si quidem, ut & Gal. multis in locis expressit: illud quod secundum naturam est, à similibus roboratur, atque à contrariis patitur, debilitaturque. Quis quæso, hepatis substantiæ parenchymati vocatæ, carneæ atque molli, calidi humidique temperamenti, adstringentia medicamenta, quæ substantiæ terrenæ, crassæ, frigidaæ atque sicca, temperamentique frigidi & sicci sunt, similia esse affirmabit? Quinimo hæc hepatis cum substantia tum temperamento contraria erunt iudicanda. Quo pacto igitur hæc poterunt hepatis substantiam per se roborare, si roboratio consensu omnium à similibus sit? Augent difficultatem ea, quæ Galen. in libro de optima secta ad Trasyl. contra Methodicos scripsit, scilicet adstringentia medicamenta viscera minime roborare. Qui locus facit, ut librum hunc Galeni quidem non fuisse, meritò crediderimus, atque etiam quod in alijs libris non spuris oppositum ab ipso traditum, demonstratumque sit; utpote membra adstringentibus roborari, reddique firmiora; promptius sic roborata ab humorum defluxu tueri. In stomacho, diaphragmate, vtero, in cæterisque partibus, quæ sicca duraque substantia constant, non dubium est, quin à modice adstringentibus roborentur, veluti non parum dubitatur de ijs partibus, quæ humidam, mollem laxamue substantiam habent, cuiusmodi est iecoris, lienis, cerebri, medullæ spinalis caro seu substantia humida atque mollis, in his quidem (quod à similibus

*In lib. 13. meth.
cap. 15.*

*In 3. aphor. 18.
In 3. Meth. med.
cap. 3.
In 8. meth. c. 9.*

In 2. aphor. 34.

In 3. Meth. med.
c. 3. & 8.
& in 8. meth. c. 9

In 1. de alim. fa-
cult. cap. 1.
In 2. de alim. fa-
cult. cap. 12.
& in lib. 3. cap.
42.

In lib. 5. simpl.
cap. 12.

In 5. simpl. cap.

fiat facultatis substantiæque roboratio / laxantia medicamenta substantia, ac temperamento similia, videantur posse vim atque robur augere. Nisi vnâ cum Diocle (vt Galenus est auctor) dixerimus, similia non à similibus, sed à contrarijs conseruari, & à similibus lædi, ita, vt in morbosam constitutionem labantur, Quod fortasse corpora calidiora lædantur à calidis, atque frigidiora à frigidis: & hæc à calidis, illaque à frigidis iuuentur, ac roborentur. Verum hoc distincte intelligi oportet, quando, vt Gal. docuit, illud temperamentum, quod secundum naturam se habet, à similibus iuuetur, roboreturque, & quod præter naturam est, à contrarijs: vnde corpora temperata similibus & intemperata contrarijs conseruari sæpe Gal. demonstrauit: Temperatum secundum naturam esse, & distemperatum præter naturam, omnibus liquido constat. Quamobrem si in homine hepar est temperatum, quomodo medicamentis adstringentibus (quæ sunt substantiæ, natureque distemperatæ, atq; vt nuper visum est, ipsius visceris substantiæ molli, atque laxæ planè contraria) iuuabitur, atq; ab ipsis robur accipiet? Addunt, non videri hepati inflammato laxantia adstringentibus simul permista, siue melius adstringentia laxantibus mista conducere, conuenireque posse: eaque præsertim ratione, quod adstringentia impediunt humoris fouentis inflammationem, digestionem, resolutionem, siue euacuationem, quæ fit per poros cutis. siquidem etiam leuiter adstringentia cutis meatus claudere Galenus in libro quinto simplicium satis docte demonstrauit. Quod si verum est, quo pacto per eodem meatus cutis inflammatio hepatis digestionem, siue euacuationem resoluetur? Docet Gal. meatus infarctos, & obstructos, medicamenta detergentia & ab infarctu liberantia, nisi sint cuiusvis adstrictionis expertia, non posse detergere atq; ab infarctu obstructos meatus liberare. quod vel etiam (vt Galenus expressit) à leuissima adstrictione meatus cutis claudantur, qua clausione, cum medicamenti facultas detergentiora intro nequeat penetrare, peruenireque, haud detergere eosdem meatus ab infarctu potest. Cui dubium? clausis cutis meatibus impediri humoris phlegmonem fouentis resolutionem, vtpotè, quæ fiat per meatuum cutaneorum insensibilem euacuationem. Accedit etiam hepatis regionem ipsiusque carneam substantiam, adstrictis in ea parte meatibus, per quos etiam eiusdem visceris calor natius transpirare solet, iuuari, ac roborari posse, non esse credendum. Itaque cum præcipuus scopus in iecore inflammato, esse debeat, vt adstrictus in ea parte humor digeratur, euacueturque, quis medicorum erit, qui vsum moderate laxantium, quæ leuiter digerentia sunt, damnare audeat? præsertimque cum hepati & substantia, & temperamento similia sint. Cæterum aliquis forsitan ex Methodicis concedet, in ea parte hepatis, atque in qualibet alia carnea, & molli inflammata, laxantia ad digerendam inflammationem, debere non esse expertia alicuius adstrictionis, quia hepatis caro parenchima dicta, quæ mollis est atque humida, aliquid laxitatis habere videtur, mitioraque idcirco laxantia exposulet. Quamobrem cuique constabit fortasse laxantia aliquid adstrictæ facultatis mixtum habere, ne nuda laxatione visceris substantia laxa lædatur, oportere. Addimus etiam venarum complurium atque arteriarum, quibus illud viscus est refertissimum, substantiam membranofam, ac duram medicamenta laxantia seu digerentia non admodum humida, sed paululum sicca indicare, exposulareque, qualia forsitan Galen. ad lienis duritiem emolliendam laudauit. At quod illa etiam adstringentia esse debeant, Methodici non admiserunt, quoniam in partibus extimis scilicet cutis, adstrictio omnes claudat meatus, atque exinde impedimento sit, quominus materia seu humor inflammationem faciens per cutis poros digeratur, & resoluatur.

De morborum

De morborum generibus secundum Methodicos, & quales ad adstrictum & quales ad laxum reducantur, & in quibus morbis locum habeat adstrictum et laxum. Cap. X.

DVo fuisse morborum simplicium genera, scilicet, adstrictum, laxum, atque vnum compositorum ex laxo & ex adstricto, satis à nobis superius ex Methodicis demonstratum est; quando ij omnes affectus corpora nostra affligentes ad tria illa genera reducerint. Ab ijs vero excipiuntur omnes affectus, qui ad chirurgiam pertinent, atque ij etiam, qui à venenis, atque à moribus venenatis fiunt. In his enim alijs Communitatibus ad curationem instituendam Methodici vti fuerunt. Itaque morbi sunt vel adstricti vel laxi, vel mixti: per adstrictos autem ij intellexerunt illos, quorum causa immediata, quæ morbum facit, adstricta sit, atque hæc erit vel communis, utpote quando omnes meatus corporis, vel ij maiori ex parte, densantur, clauduntur, siue adstringuntur. Cuiusmodi ex febribus synochæ sunt à meatuum cutis constipatione excitatæ, quas Galenus ab usu balneorum aluminosorum, & aquæ calchantodis obortas sæpius obseruauit. Aut erit causa adstricta particularis, utpote quando in venis quibusdam aut in liene exempli gratia inflammato adstrictionis vitium est. Adstrictum quoque morbum Methodici appellarunt, vbi ipsius causa immediata ipsum fouens (vel hæc sit phlogosis siue flammeus calor, vel humor putrefactus, vel etiam non putrefactus, qui tamen sit in aliqua parte corporis, imbibitus, adstrictusque, quo pars affecta restricta siue pressa, siue conclusa, siue quouis modo impedita, aut eo humore infarcta, quæ pressura in quouis phlegmone obseruatur) sit quouis modo in qualibet parte corporis imbibita, siue conclusa, siue quouis modo infarcta, pressa, vel restricta. Aurelianus phlegmonem pressuram vocare solet, quasi morbum dicat pressum, siue adstrictum. Genere verò adstrictorum morborum comprehenduntur, phlogoses, siue inflammationes, phlegmones, febres, tumores, abcessus, dolores, conuulsiones, & ex particularibus morbis, paralyses, apoplexiæ, insanix, vertigines, epilepsiæ, surditates, aurium tinnitus, cæcitates oculorum, ophthalmiæ, rigores, tremores, palpitationes, torpores, stupores, comæ, appetitus canini, inappetentiæ, quæ non à virium resolutione fiunt, siccitates, cruditates, inflationes, hydropses, icteritiæ, suppressiones alui, vrinæ, mensium, hemorrhoidarum, suppressæ euacuationes, quæ per aures, per nares & per os fieri solent, cordis morbus, palpitaciones, tremores, dispnæ, orthopnæ, arthritides, podagræ, ischiadicæ affectiones, vteri strangulatus, atque alij omnes affectus, quorum causæ sunt in aliqua parte veluti adstrictæ, aut imbibitæ, aut quouis modo pressæ, seu conclusæ. Per laxos verò morbos contra intelligunt eos, quorum causa immediata faciens morbum, sit ampliatio meatuum, diffusio, laxatio; seu eos laxos fluidosue morbos esse voluerunt, qui corporis meatibus immoderatus laxatis, seu diffusis, seu ampliatis, excitantur. Cuiusmodi est syncope, quæ morbus laxus est siue vires resoluantur apertis cutis meatibus, scilicet immoderatus cum calore natiuo tum humido vtili exeunte, siue alio modo. Qua ratione immoderati sudores exeuntes, hæmorrhagia immoderata è naribus, quippè sanguine immoderatus profluente, vel ex ore, tussi aut vomitu, vel excretionem, aut per ventrem, vnde hepatica fluxio vulgo vocata dysenterica erit ex morbis laxis, non minus & menstruorum in mulieribus atque in viris hæmorrhoidarum profluuium, & per vrinam itidem immodica sanguinis excretio. Si verò de excrementorum excretionibus loquamur, ad laxos morbos referentur, diabetes, gonorrhea, vomitus immodicus, lienteria atque diarrhæa. Mixti vero affectus sunt, qui ex adstricto atque ex laxo componuntur, proinde compositos quoque appellarunt, in his enim

enim affectibus mixta affectio fit ex adstricto & ex laxo. ad quod morborum genus reducuntur omnes qui vno eodemque tempore utroque affectu laborant, scilicet adstricto & laxo. cuiusmodi est febris cum hæmorrhagia, aut cum diarrhæa vel dysenteria. Nam febris adstrictus morbus est, & diarrhæa, vel dysenteria laxus. eodem modo, febris cum syncope, & syncope stomachica aut febris cum profluuii vel sanguinis, vel excrementorum. Non minusque febres synochæ, arden-tes, maxime æstuosæ. Cum ingens æstuatio caloris venarum, atque arteriarum oscula nimis aperiat, seu laxet, fitque causa immediata, ut effluuium caloris augeatur, & dissipetur.

De morbis adstrictis, atque an omnes febres adstricti morbi sint. Cap. XI.

Dictum à nobis est morbos adstrictos, esse illos, quorum causa immediata est pressa, densata, clausa, vel adstricta; aut meatuum densatio, adstrictione. Quàdoquidem si hæc cognitio sit exemplis intelligenda, facile phlegmonem, quam esse adstrictum morbum nulli contendunt, habere humorem ipsam immediate facientem, atque fouentem; in parte imbibitum, pressum, ac veluti adstrictum seu in parte restrictum intelligemus, in qua necessario meatuum adstrictio seu densatio seu pressio obseruatur, vnde in omni morbo adstricto adesse meatuum clausionem, seu densationem, seu obstructionem, Methodici voluerunt, atque hanc esse præcipuam morborum causam per se curationem indicantem, illis placitum est. Quo morborum genere, phlegmones, tumoresque omnes, abscessus, atque alios particula res affectus, quos proximo capite figillatim expressos fecimus, comprehendere, nulli dubitarunt: cum in illis omnibus meatuum vitium in adstrictione adesse, apertissime, constet. De febribus vero secus res apud multos se habere visa est, nimirum quod non omnibus morbi adstricti esse videantur. Quod & Galenus contendisse visus est, qui adstrictos morbos febres illas solummodo esse fassus est, quæ à meatuum cutis densatione oriuntur, ceteras verò alias adstrictos affectus esse dubitauit. Neque id profecto iniuria, cum plures à nulla meatuum obstructione fiant, cuiusmodi videntur plures ephimeræ dictæ, quæ (exempli gratia) ab immodico vel solis, vel ignis calore, & quæ ab exercitijs, à vigilijs, à laboribus & à similibus causis fiunt: in ijs enim nullam subesse meatuum adstrictionem apertissime constat. Eodem quoque modo hecticas adstrictas esse planè videtur negandum. Quis quæso in his meatuum clausionem adstrictionemue aliquam qua adstricti morbi dicuntur, subesse affirmabit? Si itaque hæc febres nulla meatuum adstrictione fouentur, quomodo à nobis æstimari poterit, morbos esse adstrictos, ut Methodici affirmarunt. Idem quoque & de synochis, ardentibusque maxime æstuosis, atque de hecticis dicendum erit, in his quidem fluida laxaue affectio apertissime (quod continue in ipsis humidum natuum, humiditatesque aliæ præ igneo calore absumentur) obseruatur, nullaque eas febres obstructione, seu adstrictione meatuum foueri neminem nostrum latet. Atque in illis fluida potius, quam adstricta affectio subesse videtur, quodq; illo argumento deprehenditur quia scilicet illas usu aquæ frigidæ (exhibent enim omnes medici hisce febribus vexatis aquam frigidam) medici tollant. Quid itaque dicendum? Galen. concedit, ephimeras, synochasque, quæ à pororum cutis constipatione fiunt, adstrictos utique morbos dici posse: At si de alijs etiam febribus, quæ ab alijs causis excitantur, iudicium faciendum sit, profecto hæc omnes quoque ex medicaminum, quibus medici etiam Dogmatici illis medentur, facultate laxatoria, fortasse fatebuntur omnes, esse morbos adstrictos: Etenim cum

cum Galeno (si de ephemeris loquamur) omnes alij medici Dogmatici balneum aquæ dulcis temperate calidum, & oleum dulce tepidum ad omnes partes corporis illitum, quæ vere laxantia sunt, in illis febribus maxime commendantur. Quæ inquam cum laxantia medicamenta sint, & febrium illarum naturæ contraria planè esse debeant (si verum est, quod Dogmatici docuerunt, scilicet contraria contrarijs tolli) necessariò colligemus eas febres, cum laxatorijs tollantur medicamentis, necessariò esse morbos adstrictos. Quæ ratione etiam synochas, ardentes & hecticas, cum iisdem laxatorijs balneis alijsque similibus præsidij sanentur, eiusdem generis esse, haud erit dubitandum. Porro si accuratius considerabitur, ex natura laxatoria eorum medicamentorum, quorum vsum ad persanandas omnes febres (exceptis synochis, ardentibus maxime æstuosis, atque hecticis confirmatis) omnes medici sequuntur, facile cognoscetur omnes illas febres esse morbos adstrictos. Addimus in hisce omnibus febribus sanandis omnes medicos cauere omnino ab usu adstringentium, cum illorum vsum febrilem caliditatem, omnium consensu augeat. At quamobrem sit, quod in maxime æstuosis synochis, atque in ardentibus medici omnes frigidam aquam, quæ à Methodicis adstrictiorum medicaminum genere comprehenditur, in potu exhibeant, paucis in præsentia cognoscendum est, quod nulla alia ratione fieri cognoscitur, quam quia synochæ, ardentesque maxime æstuosæ (vt superius quoque demonstratum est) sunt morbi mixti ex adstricto & ex laxo: ex adstricto inquam quoniam non absque meatuum clausione fiunt; Nulla quidem ex Dogmaticis, putrida febris absque interuentu alicuius obstructionis fieri potest, ex laxo etiam, quia propter calorem maxime æstuosum intus oscula venarum, arteriarumque immoderatus laxentur, atque exinde nativus calor copiosius profluat, atque adeo resoluatur, vt ni cito cohibeatur, arteriæque adstringantur, planè, vt pereat, sit necesse. itaque cum æstuosæ febres, habeant morbum mixtum ex adstricto atque ex fluido, & fluidum magis vrgeat, ideo merito actu frigida, quæ nullis alijs in febribus conceduntur, illis febribus vexatis exhibentur. Non minus etiam hecticæ tabidæ, cum in ipsis magis vrgeat fluidus laxusue affectus, actu frigida desiderant. Quare omnes febres (his exceptis) erunt morbi adstricti dicendæ. Neque est, quod dicatur, ephemeræ multas atque hecticas incipientes absque vlla meatuum clausione vel pressura cum fiant non esse morbos adstrictos æstimandos: siquidem, concedunt omnes calorem febrilem esse accensum in corde & ab eo diffundi per vniuersum corpus. quasi dicamus esse adstrictum, imbibitum, ac clausum in corde: vnde licet in externis meatibus cutis nulla subsit adstrictio, siue densatio, siue pressio, saltem aderit in illa parte in qua primo calor accensus est, quod eo argumento, ita esse eognoscimus quoniam laxantibus medicamentis caliditas febrilis exhalet & digeratur, atque adstringentibus augeatur. Namque esto, quod quis ex caliditate solis, vel ignis immodica in ephemeram incidat febrem, an hæc aliqua meatuum clausione fouebitur? certe quidem, quædo (vt rectè Gal. docuit) cutis a cuiusvis molestæ qualitaris cōtactu adstringatur, quæadmodum (vt illæ ait) a contractu aquæ dulcis, quæ sit temperate calida (quod maxime iocundo eo contractu cutis oblectetur) rarefiat, laxeturque ita à vehemētis caliditate, vel à sole vel ab igne qualitatē cuti fore maxime molestā, cuius contractu ipsa necessariò corrugata adstringitur. Ex ira vero quod copiosius spiritus inflammati ad cor ferantur ideo ipsorum copia arterijs immodice oppletis, atque veluti obstructis calor intro clausus auctusque febrem inducit, tum et quod partes corporis à vehementi igneoque feruore siccæscunt, ipsarum meatuum densari sit necesse. Idem forsè videtur dicendum de ijs, quæ à vigilia immoderata, à ieiunio atque ex amore maxime siccantibus, excitantur, quippe præ siccitate densatis meatibus intro-

Galen. in 1. ad
Glauc. cap. 3.

In 6 meth. med.
cap. 7.

introcludatur calor, atque ita augeatur, ut in igneum mutetur, atque exinde febris fiat. Quid de ijs, quæ ex tristitia, moerore atque ex timore excitantur? an non meatibus adstrictis calor nativus in igneum, & febrilem mutatur? Quis dubitat, tristitiam, mæorem atque timorem meatus claudere? Quare ex his liquido cuique constabit, febres omnes morbos adstrictos merito Methodicos appellasse. Quod maxime confirmare videtur illud, quod nuper etiam meminimus, scilicet, quia omnes laxatorijs præfidijs tolluntur, quo in ephemeris atque in scheticis incipientibus intro clausus febrilis calor opera balneorum laxantium atque inunctionum, & frictionum, & aliorum similium exhalat, digeritur, & plane resoluitur. Atque hæc de adstrictis morbis, Nunc ad laxos declinamus.

De morbis laxis, & an omnes excretiones quovismodo appareant, laxum morbum faciant, et quomodo excretiones, quæ sunt morbi laxi, interstrictæ ab alijs dignoscantur. Cap. XII.

Diximus laxos morbos à Methodicis fuisse vocatos, eos omnes, qui meatibus immoderatus diffusis, concitantur, foveanturque. Neque profecto hosce affectus immerito morbos appellarunt, cum ab ipsis, actiones omnes in corporibus læderentur, immoderatus per laxitatem meatuum nativus calido profluente, exhalanteque. Huiusmodi vero excretionum, quas (ut dictum est) morbos laxos vocarunt, quædam sensibus conspicuæ sunt, quædam sensibus ignotæ. Hæ apparent in ijs, qui aut ab immoderato gaudio, aut à re simili exoluti in lympham labuntur. Atque illæ, quæ sensibiles vacuationes dicte sunt, in sudoribus immoderatis, in alui profluvijs, in vomitibus, & in profluviis urinae, in gonorrhæa, & in hæmorrhagia sanguinis vel ex naribus, vel ex ore, vel ex vesica, vel ex aluo, vel ex utero, vel denique ab hæmorrhoidalibus venis consistunt. Ceterum, ut exacte horum morborum rationem assequi possimus, duo à nobis accurate sunt in præsentia cognoscenda, quorum unum erit, an omnes excretiones quovismodo à qualibet parte corporis profluentes sint laxi morbi, & si omnes sint quales laxum morbum faciant; Atque alterum, quibusnam signis distinguemus excretionem, quæ sunt morbi laxi, ab ijs, quæ non sunt morbi: Si Methodici voluissent omnes excretionem quovismodo factas laxum morbum facere, (ut Gal. & alij de ipsis estimavisse, visi sunt) profecto magnum mendacium affirmassent, cum excretio in pauca quantitate profluens, atque etiam si largius, modo secundum naturam profluat, ut in recte valentibus mulieribus si menstrui purgationes, aut in morbis critice appareant, morbi laxi esse nequeunt, siquidem hæc euacuationes morbum non faciunt. Quare excretiones sanguinis, vel excrementorum laxum morbum facientes sunt ex omnes, quæ (quod morbi est proprium) corpora adprime lædunt. Vnde quæ in pauca sunt copia, & in morbis critice apparent, inque recte valentibus naturales, quia nullam offensam pariunt, ideo non morbosæ dici debent, & proinde neque laxum morbum faciunt. Itaque per laxos morbos Methodici intellexerunt, euacuationes immoderatas præternaturales graviter corpora lædentes, vel affectus, qui hæc immediate subsequuntur, easque præsertim, quæ aut per poros cutis sunt, aut ex naribus, aut ex ore, aut ex ventre, aut ex utero, aut ex renibus, aut ex vesica, aut denique à venis hæmorrhoidalibus præter naturam immoderatus erumpunt. Quæ cum laxos morbos faciant, nunc quibus indicij à reliquis alijs euacuationibus interstinguantur (quod sanè ad instituendam curationem scitu est necessarium) intelligi oportet.

oportet. De qua re satis accurate in superiori libro cum egerimus, hic pauca ad-
notabimus. Et primo, quod morbi laxi necessario immoderatas euacuationes,
vel sanguinis, vel excrementorum subsequuntur, & he sunt aut sensibiles, idest, sen-
sibus conspicuæ, aut insensibiles, quæ minime sensibus patent, sed per insensibiles
intelligunt eas, quæ per cutis meatus fiunt. In harum verò cognitione solum-
modo laborandum videtur, quando, quæ sensibus manifestæ sunt euacuationes,
vel sanguinis sint, vel excrementorum, nulla perscrutatione egere videantur.
Cuiuslibet enim notum est, omnem sanguinis hæmorrhagiam immoderatus appa-
rentem, corpusque grauiter ledentem, vel ex naribus, vel ex ore, vel ex ventre,
vel ex vtero, vel ex renibus, vel ex vesica, vel ab hæmorrhoidibus emanantem
esse morbum laxum. & similiter, vel sudorem, vel vomitum, vel alui deiectionem,
vel vrinam, vel semen, vel similem aliam euacuationem, quæ eiusdem sit
conditionis, idem significare. Verum euacuationes, quæ insensibiliter fiunt,
longe difficilius, & laboriosius cognoscuntur. Tamen cognosci profectò etiam
posse superius à nobis demonstratum est. primo ex causis antecedentibus, cuius-
modi sunt, gaudium immoderatum, Vigiliæ, dolores assidui vehementesque.
ex his namque solent corpora insensibiliter exolui, cognoscemus hanc euacuatio-
nem per poros cutis factam, à cute ipsa, quæ in principio, in quo fit calidi innati
effluuium, mollis & veluti humida apparet, quod & à tenuibus quidem humi-
ditatibus, quæ quatenus exudant, aut sint fumi humidi, consumptionem carno-
sarum partium subter cutem positarum subsequentes, cutis emollescit, posteaque
perfeuerante effluuii humidi natiui, & proinde consumptione partium ex carno-
sis partibus ad cutem ipsam etiam communicata, eadem cutis indurefcit. cuius-
modi obseruatur in febribus colliquariis vocatis. præterea (vt dictum est) ap-
parere solent fumi quidam vaporosi à cute exhalantes. Addamus pulsus humiles,
raros, ac valde molles apparentes. Demum si habitus quoque rarus, & laxus
fuerit, idem iudicium, de laxo affectu, certius confirmabitur. atque hisce si-
gnis non erit impossibile, vt laxi morbi, qui fiunt, propter meatuum cutis diffu-
sionem, & rarefactionem, comprehendantur.

Cap. 9.

In 1. lib. cap. 9.

*De morbis mixtis ex adstricto & laxo. & an dentur, & si
dantur, quales sint. Cap. XIII.*

DVbitarunt ex Dogmaticis nonnulli, an morbi mixti ex adstricto atque ex
laxo, darentur, quæ res haud illis dubia videbatur, modo varios affectus
varias corporis partes eodem tempore affligentes obseruassent: siquidem nemi-
nem latet, posse corpus idem iuxta diuersas partes affectas, contrarijs affectibus
eodem quidem tempore vexari. quis ignorat febre putridæ, quæ est morbus ad-
strictus aliquando lienteriam, aliquando diarrhæam, & aliquando dysenteriam,
vel sanguinis profluuium ex naribus, aut ex ventre, aut ex vtero, aut ex hæmor-
rhoidibus exiens, coniungi? & aliquando syncopem, aut sudorem immodicum,
vel colliquationem, quæ morbi laxi sunt, simul accedere? Sed dubium est, an
in eadem parte affecta complicatum vitium ex adstricto atque ex laxo detur,
quod eodem tempore eiusdem corporis partem eandem teneat, atque affligat?
Hoc non concessisse Methodicos (sed illud solummodo quod prius meminimus,
vt potè quod ratione variarum partium affectarum fit) ex Galeno conijciunt, qui
in lib. de comp. med. secundum genera disputans aduersus Methodicos, dixit, da-
ri medicamenta composita, quæ in eadem parte diuersis, contrarijsque faculta-
tibus, scilicet laxantibus, & roborantibus, vno eodemq; tempore agerent: si itaque
non concedebant dari medicamenta (vt auctor est Gal.) quæ simul, eodem tem-

K pore

pore exempli gratia, laxarent, atque roborarent, neque affectus mixtos ex laxo & adstricto dari illos voluisse rationi est consentaneum. Credendum tamen duxerim, in hoc differre Methodicorum sententiam à Dogmaticorum opinione, quoniam ij licet concesserint dari morbum ex adstricto & ex laxo mixtum in eadem etiam parte corporis constitutum, tamen non habentem æqualem mixturam, qua æque mixtum medicamentum ex laxo & ex adstricto ad curationem indicetur: nam hoc est, quod negarunt Methodici, scilicet non dari morbum tantum affectus laxi habentem, quantum adstricti habet: quod idem est, ac si dixerint, non dari affectum æque adstricti & laxi habentem, vel æqualem mixturam, naturamque ex laxo atque ex adstricto. quæ opinio neque planè à ratione abhorre videtur, cum corpora symmetra habentia æqualem mixturam in contrarijs temperamentis aut non dentur, aut rarissima quidem ostendantur. Vnde affectus quoque æque mixti ex adstricto, & ex laxo, aut planè non reperiuntur, aut rarissime observentur; proinde neque concessere dari medicamenta æquæ laxæ, & adstrictæ facultatis habentia, quæ ab eo mixto affectu indicentur. Illis itaque visum est, dari quidem morbum eandem partem vexantem affectu adstricto simul, & laxo: sed qui non æqualem habeat laxi, & adstricti mixturam, at quinimo ita inclinet, vel ad adstrictum, vel laxum, vt propterea prævalens in mixtura morbus vel adstrictus vel laxus sit, qui curationem indicet, vnde non abs re in sua methodo statuerunt, in affectu mixto, ab vrgentiori curationem indicari oportere. & ob id voluerunt, vbi affectus mixtus ad adstrictum vergit, laxandum esse, atque adstringendum, cum affectus ad laxum tendat. Idem ferè Dogmatici observare consueverunt, in morbis in temperamentis constitutis, nam si pars corporis frigidior calefaciens medicamentum indicat, & calidior facta, refrigerans indicabit, & sic de alijs qualitatibus à symmetro recedentibus. Quare dari quidem mixtum morbum ex adstricto, & ex laxo ij voluerunt, & in varijs partibus corporis, & in eadem non minus parte positum. sed qui non symmetrus, seu æque medius inter adstrictum atque laxum sit, vt propterea neque medicamentum æquæ mixtæ facultatis vsum habuisse in methodo Methodica constet, sed in mixtura alterum prævalere, & prævalentem magis vrgentem appellarunt, à quo per se curatio indicatur.

Finis Libri Secundi.

PROSPE

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER TERTIVS.

De medicamentis laxantibus, adstrictos morbos tollentibus. Caput I.



Quoniam nos ex Methodicis duo solummodo morborum genera esse statuerimus, scilicet adstrictum atque laxum, duo quoque idcirco praesidiorum genera fuerunt merito constituta, quippe laxantia seu adstrictum tollentia, atque adstringentia, quae laxum affectum quoque adimunt. Praesidium vero laxatorium appellarunt Methodici, quod tumorem in corpore factum quouismodo tollit. hoc autem duobus profecto modis fit, vno modo meatus corporis adstrictos laxando, aperiendoue, atque altero, quod intus est, vel humoris, vel vaporis, vel qualitatis alicuius, stricturam faciens, diminuendo. Ad illud agendum, omnia praesidia seu medicamenta erunt accommodata, quae temperate sunt calida, atque essentiae quidem tenuioris, cuiusmodi sunt balnea ex aqua dulci, lauacraque temperate calida, aer calidus, & humidus suffusus atque fomenta calida. Ad id vero, quod intus est (Methodici stricturam vocant) tollendum, ea accommodata sunt, quae quouis modo corpus euacuant, purgantque. Cuiusmodi sunt, sanguinem quouis modo euacuantia, sudorem, urinam, sputumque mouentia, non minus & quae per vomitum, & per aluum, per os atque per nares euacuant. his adduntur, per insensibilem euacuationem (quae per poros cutis fit) laxantia, digerentiaue. Hinc laxatoriorum medicaminum genere comprehenduntur, phlebotomia, idest sanguinis euacuatio, per venam aut arteriam lectam, crurum scarificatio, cucurbitulae cum scarificatione affixae, & citra scarificationem etiam, sudorifica, vretica, deiectoria, vomitoria, bechica, apophlegmatis mata, & Errina dicta, quippe quae per os, per pulmones, & per nares euacuant. De sanguinis vacuatione, quae fit per venae sectionem, quod ipsa sit κατὰ σκεῖνον, idest laxatorium praesidium Galenus multis in locis expressit (Methodici venae sectionem nedum laxatorium simpliciter, sed magnum quidem laxatorium esse voluerunt) Scarificationem vero, cucurbitulas cum scarificatione & citra scarificationem (quas Aurelianus cuphas appellat) & alia praedicta praesidia corpus laxare, eo quidem intelligitur argumento, quod haec omnia euacuent, quandoquidem omnis euacuatio ex Methodicis corpus laxet. His adiunxerunt Methodici alia praesidia ad laxandum accommodata, scilicet aeris caliditatem (quo celum calidum, constitutio anni calida, tempus aestiuum, corpus laxare apta sunt) cibi abstinentiam (vnde diatrium, scilicet tempus trium dierum, in quo aegroti ab omni cibo abstinebant, fuit à Methodicis quibusdam inuentum) fames itidem corpus laxat: eodem quoque modo corporis exercitiorum omnia genera, animique laxationes quouis modo factae, corpus digerere atque laxare aptae, sunt praesidia laxantia in communi, quorum quaelibet vtilia sunt ad morbos adstrictos tollendos. Quae omnia Methodicis fuisse familiaria Celsus est auctor. qui de his ita scripsit:

K 2 Atque

*In 4. de vici. rar.
in acut. com. 19*

In lib. 3. cap. 6.

Atque id quoque videndum est, quod quidam solum præcipiunt: an adstrictum corpus sit, an profluat. quorum alterum strangulat quod continet: alterum digerit. nam si adstrictum est, ducenda alius est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morbosum sanguinem etiam mississe, concussisse vehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest, vtile est etiam ducere in balneum, prius dimittere in solium: tum vngere, iterum ad solium redire, multaue aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere: vti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque oleribus, qualia sunt, lapatium, vrtica, malua, vel iure etiam concharum, muscutorumue, aut locustarum, neque danda caro nisi elixa est. At potio debet esse magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc vltra quam sitis coget. poteritque à balneo etiam pinguius aut dulcius dari vinum. poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. hæcenus Celsus de præsidij laxantium apud medicos Methodicos vsitatis.

An genere laxantium medicamentorum Methodici comprehenderint medicamenta incidentia, detergentia, diaphoretica atque cathartica. Cap. II.

NUM non videtur tacendū, de quo Dogmatici maxime dubitasse visi sunt, an scilicet Methodici laxatoriorum genere comprehendere quoque voluerint illa medicamenta, quæ humores crassos incidunt, comminuunt, extenuantque coptica Græcis dicta; & viscidos detergunt, meatusque ab infarctu liberant, quæ ecphratica, & eccathartica Galen. vocat. Atque non minus etiam diaphoreticas, idest discussorias, & catharticas siue purgatorias facultates habentia. De incidentibus extenuantibusque medicamentis, an laxatoriorum genere comprehendere debeant, res fortasse maxime dubia videbitur, ex Galeno scilicet, qui in libris methodi med. scribit, vltro Methodicos diffugere à disquirendis facultatibus vim tenuandi, incidendique habentibus. Verumtamen oppositum fuisse à Methodicis fortasse obseruatum, maxime erit dubitandum, ex Cælio præsertim. Aureliano inter Methodicos non spernendæ auctoritatis medico: Constat enim ipsum ad ictēritiam, commendasse præter asparagum, daucum, feniculum ex attenuantibus & incidentibus, etiam capparis radices, acetum in quo anchusa fuerit per aliquod tempus infusa, scillam itidem torridam & subassatam ex melle, & ad calculos in vesica comminuendos eodem modo medicamenta valde acria, quippe quæ attenuant, & incidunt valenter; cuiusmodi, sunt radix lupati, capparis, struthij, pelij herbæ itemque panacis. Quod apertissime colligitur ex lib. 2. Oxeon cap. 3. in quo de angina curatione agens, docet sputum crasse factum in gutture, esse attenuandum: inter quæ medicamenta laudat, moderate acria: quo loco etiam dixit dari laxantia mitiorum materiarum, at efficacia. longe manifestius apparet vsū attenuantium medicamentorum Methodicis fuisse cognitum in lib. 5. Chron. c. 8. ex eodem Aureliano. Quid de detergentibus, atque ab infarctu liberantibus? an non in ictēritia ex obstructione à crassis, lentisque humoribus facta exhibebat succum absinthij, intybi sylvestris, asparagi, feniculi atque scillæ, quorum facultas est deterforia: hæc enim attenuant, incidunt, ac valenter detergunt. Eodem quoque modo de diaphoreticis ex eodem auctore illos medicos sentisse, conijcitur, cum ipse in lib. 3. Oxeon dixerit: Cuminum & origanum, quod sint acerrimæ facultatis fluentia, aliquando aperire. Ceterum videamus etiam an hæc esse laxatoria possit ratione intelligi (supposito Aureliano id quoque voluisse) si primo de ijs medicamentis loquamur, quæ incidunt,

In lib. 5. cap. 5.

In lib. Chron. c. 8.
de ictēritia.

Aure. in 5. Chron.
cap. 4.

Cap. 11.

dunt, & attenuant, quis quæſo erit, qui id negare contendat? ſiquidem verum ſit humoribus craſſis incifis atque extenuatis & lentis deterſis corpora laxa fluidaue reddi viasque aperiri. Hippocrates in aphoriſmſ dicebat, corpora cum quis purgare voluerit, fluida in primis fieri oportere: & Galenus in commento (licet hoc Methodici de corporibus, vt expreſſit Hippoc. & non de humoribus faciendum putarint) ait: corpora fluida reddi humoribus craſſis incifis & attenuatis, viſcidisq; deterſis. Quo res ſatis in aperto eſſe apparet, vt, quæ humores craſſos attenuant, & incidunt medicamenta, non minusq; etiam & quæ viſcidos detergunt, laxent, & idcirco, laxatoriorum genere comprehendantur? Addimus his etiam Metaſyncritica, quæ ſunt vehementer calida, ſcilicet rubefacientia, Aureliano reſcorporatiua appellata, quibus vt conſueuerunt, ad adſtriſtos cutis meatus in morbo adſtriſto alijs laxatorijs non iuuantibus. Nam in articu- lari phlegmone, ſublata inflammatione adhibent affectæ cuti talia medicamenta quæ attrahendo humorem quo meatus denſabantur ad cutem, ipſumque digerendo, reſtituunt partem priſtino habitui, ac temperamento, quo illiusce partis pori aperiuntur, atque priſtinum ſtatum naturalem accipiunt. Itaque prædicta omnia medicamenta cum humores attenuando, incidendo, ac detergendo, non minusq; etiam digerendo, quoadatenus abſumant, atque euacuent, meritò laxare corpora apta eſſe haud erit dubitandum. At quid de medicamentis purgatorijs, catharticis vocatis? An non & ipſa quoque purgando humores laxare dicuntur? certe quidem, licet ipſorum vſum frequentem ex Merhodicis aliqui maxime dam- narint, tum quia putarunt humores non eſſe morborum cauſas, niſi quatenus ad ſtriſtum vel fluidum affectum faciunt, tum etiam, quod vſus ipſorum corporibus eſſet multis de cauſis incommodus. Quam rem Aurel. ita expreſſit: ſed vitan- dam probamus frequentem & variam medicaminum potationem, qua ſellea de- ducere promittuntur, ſiue ventriſlua, ſiue vrinalia. Etenim ſitis extenditur & ſo- lidioris cibi faſtidium duplicatur & corporis fortitudo minuitur, atque cibi acce- pri corrumpuntur, & omnis corporis materia. Quod neque Galenus etiam ex Dogmaticis contendit, cum multis in locis medicamenta purgantia, quæ natu- ram hominibus moleſtiſſimam habeant, & idcirco inter deleteria comprehenſa, ſtomachum grauiter lædere, ipſiusq; os præſertim, coctionem ciborum turbare, cibos corrumpere, vires deiſcere, atque humores optimos corrumpere nobis ſcri- ptum reliquit. Cuius quidem opinionis Hippocrates quoque fuiſſe viſus eſt, qui raro purgantibus utebatur, præſertimque in acutis morbis: Quo mirum non eſt, ſi ipſe in ijs ægrotis, quos in epidemijs reſcenſuit, pauciſſimis, vel nullis purgan- tibus fuerit vſus, in quibus maxime ſuſpecta ſimilia medicamenta habuiſſe, con- ſtat. de qua re in libro de purgantibus, ita habet: Quicumque igitur à fortibus febribus corripiuntur, his medicamenta purgatoria dari non oportet, donec remi- ſerit febris; ſin minus, ſaltem non intra quatuordecim dies, carnes enim ipſorum & ventres, quum calidi ſint, medicamenta aſſumunt & nihil purgantur, & febris maior ſit, & color euertitur, & morbi, regij ſpeciem præſeferunt, commota enim bile & non purgata non forbere vult æger, neque bibere, ſed omnia abominatur & plerumque perit. Addè hæc concoctionibus maxime aduerſari. Quam rem ipſum confirmariſſe conſtat etiam in lib. 4. de vict. rat. in acutis, ita ſcribentem. Sed medicamenta purgantia in febribus non admouebis, nempe ſi ventrem moue- ris, vrina non maturabitur, febrisq; citra tum ſudorem, tum iudicationem in longum protrahetur tempus. Accedit etiam quod humores in corpore quiſcen- tes purgantium occaſione commoueantur, & ad viſcera conſuentes, morbos gra- ues concitent, quos poſtea à purgantibus non commoti, in exitiales morbos, à quibus non pauci à purgatorio medicamento commoti, in exitiales morbos, à quibus poſtea interempti ſunt, inciderunt. Quibus nobis planè conſtabit, vel etiam

Lib. 5. Chron. c. de iſſeritia.

In 6. epid. In lib. de iis, quos purg. oportet.

Tex. 44.

Dogma-

Dogmaticos frequentem purgantium medicamentorum vsum haud ita facile commendasse. Non tamen credendum erit hæc etiam ipsa, idcirco non esse laxatoria, cum humores purgando maxime laxent, vnde à multis merito laxatoria dicta sunt. nimirum, quod vi insigniter laxatoria hæc valeant. Hæc vero propterea vel etiam Methodici & laxatoria esse voluerunt, & quandoque in morbis adstrictis abigendis vsum habere non spernendum, quibus in morbis iisdem sanatu difficilimis Methodicos etiam olim constat fuisse vfos. Sed quid de vulgo (quod leniendo præsertim aluum subducant) lenientibus vocatis, dicemus? Nonne aperte aluum subducendo laxant? ita quidem apparet, Quorum etiam vsum non temere in morbis tollendis erit immoderatus sequendus, cum & horum non pauca hominis naturæ aduersentur, proinde frequens ipsorum vsum non sine multa molestia erit, minus verò molesta hæc erunt, quam cathartica esse dixerimus. De hac eademque re posterius, ubi ex professo de purgatorijs medicamentis sermonem instituerimus, rursus accuratius agemus. Horum tamen complura si Methodici cognouissent, frequentius ad laxandum, securiusque vfi fuissent, cuiusmodi est, manna legitima scilicet mostichina dicta, cassia cathartica, tamarindus, mirabolanus purgatorius, & simile aliud. Itaque ex ijs aliquis amplius non dubitabit, medicamenta incidentia, attenuantia, detergentia, diaphoretica, metasyncritica, atque purgantia copora laxare, proindeque laxatoriorum genere comprehendi oportere.

De præsidijis particularibus laxatorijs, & primo de ijs, quæ in victus ratione obseruari debent. Cap. III.

Cum de præsidijis laxatorijs in communi scripserimus, reliquum est, ut de iisdem in particulari agamus. Itaque si ab aere exordiamur, dicemus, aerem cum substantia lucida, tum caliditate cutim ipsam laxare. Itaque aer lucidus ferrenusque laxat, omniumque maxime qui calidus est, hunc enim dissipando, dispersendoque; laxare docuit etiam Galenus in libro de causis morborum. ex quo merito de inflammatione vexatis Aurelianus locutus, ait: De hinc ob obscuræ rationis proprietatem strictura laborantes, in lucido atque tepido & amplo medio crater locamus: At dices Hippocratem scripsisse contrarium: cum in 4. de victus rat. in acutis de febribus grauibz atque implacidis ita dixerit: Decumbere autem in conclaui obscuro debent & lecto maxime molli. Galen. in comm. ait non tanquam maturatorium, sed potius tanquam implaciditatis inquietationisque correctorium, nimirum quod in obscuro facilius queiti maneant agroti anxij. Aurelianus quoque cum in ijs, tum maxime in phreniticis damnat aerem nimis lucidum: In ediam quoque laxare, cum humores absumentum tumentia tollat, omnes fatentur, veluti à copia cibi partes tument; Vnde plerique medicorum per morborum initia famem, sitimque desiderant. Methodicorumque aliqui propterea in sanandis morbis diatritum, id est tridui in ediam, in qua per triduum omnino à cibis abstinere egrotos, cogebant, inuenerunt: ex cibis vero atque ex poribus laudabant, qui temperate calidus atque humidus sit. Hinc fortasse Hippocrates in aphorismis victum humidum omnibus febricitantibus laudando Methodicis fauere visus est, qui perinde ac Dogmatici in calidis morbis, maximeque in febribus cibum actu calidum & humidum exhibere consueverunt. Quod non (ut aliquibus est visum) scilicet, quia humidus cibus febre quatenus morbus siccus existit, aduersetur, intelligendum esse videtur: Quandoquidem si eo modo febribus omnibus humidum cibum Hippocrates conuenire voluisset, frigidum quidem etiam cibum non omisisset, utpote qui frigidityte occurrit febrium caliditati, in qua

Cap. 3.
E. Oxon. c. 9.

Tex 48.

in qua præcipua febris essentia (quod Dogmatici omnes febrem esse voluerint igneum calorem, scilicet vehementer calidum & siccum) consistit. Itaque dixisset, victum frigidum atque humidum febricitantibus esse vtilem. At dixit humidum, quoniam febres sunt morbi adstricti, quibus opponitur cibus laxatorius, qui est, temperatè calidus atque humidus, quo omnes Medici in febribus familiarius vti solent. Simplex etiam, quam uarius ad laxandum aptior, quia minus replet, atque etiam ille, qui attenuans est. somnus etiam, qui naturalis est, ut & Antyllus ait, remittit quæ tensa sunt, emollitque indurata, fundit cohærentia. Quare vnum ex laxatorijs auxilijs esse solet, non rarò etiam vbi corpora humiditatis abundant, sudorem copiosum promouet. quandoque vero contrarium facit, isque omnis, qui naturalis non est, præsertimque si in principijs morborum, & accessionum prolixius fiat, hic enim adstrictum affectum auget, præsertimque (ut dictum est) si in febrium acutarum, atque inflammationum principijs, & in augmentis exercentur. Vigilia quoque humores digerendo laxat, tumentiam tollit, quandoque vero ex accidenti adstrictum auget, eaque maxime quæ immoderatis in capitis affectibus calidis perseverat. à vigilijs quidem immoderatus solent sæpius homines in amentiam, & aliquando in phrenitum prouehi, in quibus affectibus semper erit inutilis, veluti in frigidis humidisque cerebri affectibus semper est utilis, utpote, quæ humores digerendo tumentiam minuit; ex animi quoque perturbationibus gaudium, seu letitia corporum meatus laxat, hilarisque idcirco moderate redditus animus, plurimum utilitatis adfert ad morbos sanandos, tum quia calor innatus moderate calefacit, digerit tenues humores, concoquit crudos scilicet aucto calore: Immoderatum vero gaudium (quod meatus corporis immoderatus laxet, exindeque immoderatus cum humidum substantificum digerat, tum calidum itidem innatum exhalet) repente interimit. In quem modum Polycritam nobilem feminam, Philippidem comædiarum poetam, Diagoram aliosque multos obiisse Aristoteles, Galenus, Plinius atque alij posteris tradiderunt. Contra vero timor, ira, mœstitia, & similes animi passionibus, adstringunt, adstrictumque affectum faciunt. Motus itidem in corpore factus quæadmodum laxat, ita quies immodica tumentiam parit. veluti eodem modo cum excrementorum retentiones morbos adstrictos faciant, ita euacuationes contrariorum affectuum sunt causa. At de varijs motibus primò, & postea de euacuationibus, tanquam de præsidijs maxime laxatorijs accuratius nunc est agendum.

De præsidijs laxatorijs, quæ ex varijs exercitiorum generibus depromuntur. Cap. IV.

Exercitationes omnes, cum ex euacuatorijs præsidijs sint (etenim humores fundunt, digerunt, & absumunt) corpora laxare aptæ sunt, ideoque de ipsis meritò nunc agimus. Hæ (ut omnes fatentur) motus in corporibus vehementes sunt, quoad respiratio, ut Antyllus auctor est, frequentior reddatur, & ad corporis cum ruborem tum ad sudorem incipientem continuandi, quorum profectò omnium illud est commune, quippe, ut ex ipsis in corpore calor augeatur, auctusque meatus euacuet, vehementiq; spiritus impetu excrementa expellantur, proindeque meatus laxant, tumentia tollunt, atque morbum adstrictum emendant, quemadmodum etiam organica membra ad ipsorum obeundas actiones siccatione roborant atq; firman. Sed ne quis idcirco ambigat, an vere corpus laxent, laxare sanè certum est, cum obstructorum membrorum, & cutis meatuum humorem quidem obstruentem digerant, atque euacuent. Quam laxationem sic Methodici intellexisse visi sunt. Exercitationes vero multis differentijs inter-

stinguun-

stinguuntur, hisceque particulatim ex ipsarum motus varietate: quædam namque magnæ, vehementes, seu violentæ dicuntur, quædam parvæ, quædam celeres, & quædam tardæ: atque ex his, compositæ quædam sunt, magnæ & celeres, ut cursus, pugna umbratilis, ludus parvæ pilæ: Quædam magnæ & lentæ, ut fodere, per loca montuosa ambulare. Quædam contra sunt parvæ, & celeres, ut equitare, vehi in lecticis & similes aliæ. Quædam parvæ & lentæ sunt, ut deambulatio, lentaque cum in lectica tum in curru vectatio, tarda que equitatio. Harum vero omnium quædam totum corpus respiciunt, ut ambulatio, cursus, ludus pilæ, & similes aliæ: quædam particulares dicuntur, quoniam non totum corpus, sed partes quasdam exercent, uti vociferatio, lectio, cantus. hisce differentijs præmissis, præstabit nunc exercitationum utilitates nos perspectas habere: Plurimum hæc conferunt utilitatis primo ad sanitatem conseruandam, unde omnia exercitationum genera ad artem Gymnasticen facere apud omnes planè constat; quinimo Gymnasticen esse quandam artem omnes ferè definiunt, qua omnium exercitationum facultates hominibus gratia sanitatis innotescunt. Hanc triplicem, scilicet cubisticam, sphaericam, atque Orchesticam Gymnasticam fecerunt. Omnes itaque exercitationes pro tuenda valetudine utiles sunt, harum verò quædam in quibusdam morbis particularibus, maximeque chronicis usum apud antiquos olim habuerunt, in calidis verò & acutis, vel nullum vel paucissimum usum, præstetimque in febribus: licet ex antiquis aliqui ad febres quoque persanandas exercitationes commendarint, quos tamen Hippocrates maxime reprehendit, cum in epimedij hæc de ipsis scripserit: Prodicus febrientes interficiebat, cursus, luctationibus, motibus calidis. Neque desunt aliqui hac nostra ætate, qui per suam febrem validis exercitijs tolli posse, & ipsi febre vexati similibus exercitijs vti seipso interemerunt. Quasdam vero declinantibus febribus esse utiles neminem medicorum later, cuiusmodi sunt frictiones quædam. Maxime vero omnium exercitationes moderatæ usum in ægrorum conualescentijs habere videntur, atque in compluribus non minus morbis diuturnis. His præmissis, nunc particulares exercitationes, quibus Gymnasticæ, cum ad sanitatis tutelam, tum ad morbos persanandos olim familiarius utebantur, subiungamus; de quibus à nobis pro laxantium præsidiorum cognitione in presentia est agendum: Huiusmodi sunt, ambulatio, cursus, saltus, venatio, lucta, pugna umbratilis, iaculatio, pilæ ludus, pugilatus, paucetium, Cestus, halteris, discus, spiritus cohibitio, vociferatio, lectio, cantus, risus, atque fletus.

6. epid. sex. 3.
sex. 32.

De deambulatione, cursu, saltu, venatione, ludo pilæ, pugna umbratili, lucta, gestatione, vectatione frictioneque præsidij laxatorijs. Cap. V.

DEambulatio inter omnes exercitationes, & ad tuendam valetudinem, & ad complures affectus persanandos, est utilissima; de qua meritò primo loco à nobis fuit agendum. Hæc verò cum multiplicis differentię sit, & plurimi faciat ad ipsius facultates cognoscendas ipsius cognitio, ideo accurate hanc rem pertractaturi, primum hæc omnes differentias adnotabimus. deinceps propriam cuiuslibet differentię utilitatem, atque demum qualem huiusmodi exercitatio terminum habere debeat, dicemus. Itaque deambulationes variæ sunt, ex motu, ex loco, atque ex tempore. Ex motu quædam sunt celeres, quædam tardæ, quædam vehementes, quædam lenes seu remissæ, quædam breves, quædam longæ, quædam rectæ, quædam curvæ, quædam æquales & quædam inæquales. Ex loco etiam variæ sunt, quando ipsarum quædam fiunt sub dio, in sole, quædam in umbra,

vmbra, & quædam sub tecto, & in locis subterraneis, quædā in locis planis fiunt,
 quædā in inæqualibus, scilicet montes vel scalas ascendendo. Quædam etiam ex
 tēpore mutuo distinguuntur, quarū quædam propterea dicuntur æstiuæ, hybernæ,
 vernæ, autumnales, quædam matutinæ, quædam vespertinæ, quædam ante cibum
 quædamque post cibum, cum meridianum, tum vespertinum. Distinguunt alij
 deambulationem, in eam, quæ auxiliij causa fit, & in eam, quæ ad corporis præser-
 vationē itidem vsum habet. ac vel ē in apothera peticā appellatam, quæ vel post
 grauiiores exercitationes, vel post purgationes quas medicamēta fecerint, vel post
 vomitiones locū habet. Hanc aiunt animū remittere, spiritum commutare & in or-
 dinem adducere, distenta soluere, thoracem expurgare, & similia facere: At his
 dimissis, de ea tantum, quæ præsidij causa adhibetur, agamus, cum ipsa solum-
 modo ad morborum curationem locum habet. Hæc vero (auctore Antyllo) &
 multa & contenta esse debet, tum crura impariter mouenda, calcibusque inciden-
 dum: tum pectoribus pedum cum poplitum contentione ambulandum: ac initio
 quidem quiete, deinceps vero vehementius: & rursus vicissim remittendum.
 Verum quæ recurandi causa initor, pauca & placide administrata, & quietæ, ani-
 mi corporis effusioni coniuncta esse debet. ex quo fit, vt quietæ deambulationes
 imbecillioribus accommodatæ sint, eadem quoque conueniunt, qui à cibo deam-
 bulationibus vtuntur, itemque ijs, qui nuper ē somno sunt experfecti. & qui an-
 te maiores exercitationes ad eas ineundas se deambulando præparant. Hæc ex
 Antyllo de differentijs deambulationum. Nunc ipsarum vim atque facultatem
 indagemus. Itaque omnis deambulatio, qua exercitatio est, vim habet humi-
 ditates corporis absumendi, siccandiue, atque exinde tumentia tollendi, meatus-
 que idcirco ab humore adstrictos, ac pressos laxandi aperiendique. Debilius
 id præstant, lenes, placidæ, quiescētes, non ueloces, longæ, rectæ, in vmbra, vel
 sub tecto, quæ fiunt per loca planā, equaliaque, quæque in hyeme & autumnō
 fiunt. & quæ post cenam. Efficacius vehementes, veloces, breues, curuæ, sub
 dio, adhuc magis in sole, matutine ante cibum, quæ in vere & in æstate per lo-
 ca inæqualia, montuosa ascendendo, descendendoque moluntur, & quæ cum
 crurum intentione aut calcibus incumbendo fiunt. Non minusque etiam, quæ
 in loco clauso ventis, non persato ineuntur. Hinc ad adstrictum tollendum hæc
 sunt efficaciores, illæ vero imbecilliores. commendantur vero ad capitis frigi-
 dos humidosque affectus, atque etiam ad eosdem in Thorace atque in pulmonib-
 us obortos, vtilissime itidem sunt stomacho humescēti, dolenti, & in quo cibus
 coacescit, atque corrumpitur. Seneca moderatam deambulationē destillationi
 apprime vtilem esse cognouit. Aurelianus ad infantiā & ad asthma commenda-
 uit. Ad capitis dolorem, non minus velocem ad colicos affectus, ad polysarchiā,
 longam & rectam ad epilepticos, & vehementem ad frigidos omnes affectus, &
 ad tumorem. Celsus ad spirandi difficultatem, ad sacrum ignem atque ad ele-
 phantiasm. Themison Methodicus atrophia laborantes xii stadiorum spacium
 gressu conficere iussit. at in quam atrophia: non in ea, quæ tabidos conco-
 mitatur, sed quæ vel venarum vel arteriarum adstrictis ductibus fit, vel ex ali-
 cuius visceris interni tumore. His addimus deambulationem ad omnes affectus,
 qui humiditatis copia fouentur vtilem esse; cum sua vi digerente vel siccante
 (Hippocrate auctore) humores absumat, exindeque & tumentia tollat, atque
 non minus morbos adstrictos vocatos. Hinc ad podagricas inflammationes, si
 fiat per loca montuosa inæqualia, & per multa spacia, ita vtilis esse est deprehen-
 sa, vt sola obortam podagram non raro omnino eadem die resolverit, quod mihi
 non semel contigit. Terminus vero cuiusque deambulationis erit, quo ad corpus
 intumescat, & rubrum seu floridum fiat, motusque prompti, æquales & concinni
 edantur: modo fiat deambulatio tuendę valetudinis causa, quando ad quosdam
 L affectus

Oribas. in 6. col-
 lect. c. 21. ex An-
 tylo.

Epiſt. 79.

1. Chron. c. 1.

4. Chron. c. 7.

4. Chron. c. 4.

affectus tollendos in deambulationibus alia mensura fit opus, atque ita, ut quandoque Hippocrates ad eam faciendam stadiorum numerum à denario scilicet ad centenarium expresse præscripserit. illius vero deambulationis, quæ tuendæ valetudinis causa fit, terminus erit ex Galeno (ut nuper dictum est) quando corpus plenum atque rubrum redditur, æqualiterque atque numero se mouetur plerumque, ut Celsus notauit, sudor atque anhelitus difficultas, seu crebra anhelatio exercitationis perfectæ nobis indicio esse solet, quamquam neque perpetuo in sudorem quiescere debeat deambulatio, neque in anhelitus mutationem, cum ea, quæ per accliuem locum fit, atque breuis est utrumque excitare citissime apta sit, etsi nondum corpus perfecte laxatum est. Itaque opportunam esse deambulationem conijciemus, ubi (uti dictum est) corpus intumescat, rubescat, promptèque & æqualiter moueatur: Nimiam vero esse, ubi color deterior euaserit, membraque ingrauescant, & lassitudinem sentiant, flauescereque incipiant. Atque hæc de deambulatione. Cum cursus sit (Antyllo auctore) deambulatio vehemens & concitata, ideoque inter vehementes exercitationes adnumeretur, merito de ipso post deambulationem agimus: Galenus tamen cursum inter ceteras exercitationes, quæ citra violentiam obeuntur recensuit. Huius quidæ exercitationis differentias hisce verbis Oribasius ex Antyllo cõplexus est: Est ergo cursus quidam, qui recta ad anteriora fit, qui inde etiam dixit: Alius in posteriora, quem recursum vocant, alius in orbem, quem circumcursum nominant: omnis verò cursus, ut Galenus est auctor, corpus extenuat, humoresque atque carnem minuit, proindeque merito partes corporis humiditatibus tumentes emendat, ac idcirco in multis morbis adstrictis olim apud antiquos usum habuisse constat. Aurelianus ad immodicam pinguedinem tollendam cursum maxime commendauit. non minusque etiam colicum patientes cursu iuuari: Hippocrates valde humidis corporibus utilem esse statuit. Ad splenem ita esse utilem à multis est traditum, ut solis cursibus & deambulationibus quoddam spleneticos sanatos fuisse constet. Etius ad hydropicos ipsum esse opportunissimum statuit. Aurelianus ad capitis dolorem tollendū, vestiti ut currant, magnopere laudauit. Antylus verò (si Oribasio credimus) in renum morbis & seminis profluuiis, ait ipse, ut asseruatum quoddam auxilium, nos cursum adhibuimus. at ne quis dicat, non recte seminis profluuiis, quod morbus profluens sit, cursum conuenire. At resolutio est, quod gonorrhæa idest profluuium seminis, etsi sit morbus laxus tamen fouetur à causa adstricta quæ vrgentia est, idcirco laxatorijs præsidij tollitur unde moderatum in quo etiam non utile semen, sed excrementitia humiditas ab vniuerso corpore ad genitalia delabens excernitur, non laxi, sed potius adstricti morbi, cum vniuersum corpus humiditatibus tumeat, qualitatem videtur habere, idcirco ad ipsum tollendum, cursus absumentum humiditatem ut præsidium laxatorium, maxime conueniet. Huiusmodi profluuiis olim uxorem Boetij Senatoris Romani laborasse constat. Quod Galenus medicamentis laxatorijs ademptum fuisse scripsit. At de hoc affectu accuratius in vltimo libro agemus, in quo scilicet de morbis mixtis ex adstricto & laxo sermo fiet. Ex Antyllo etiam cursus prodest ischiadicis, in quibus in cursus initio vix moueri possunt, sed ubi in cursu sunt, ita properant, ut morbi propemodum obliti videantur. in ijs vero, quorum viscera torquentur, & qui fungos esitarunt, & qui à scorpionibus icti sunt, nos cursus profuisse obseruauimus. Qui vero recto corpore currunt, plurimum sudant, quo singulis morbis, qui ab humiditate fiunt, efficaciter, remedio sunt. Facilitate cursibus saltus videtur similis, cum sit vehemens exercitatio atque velox modo diu sine vlla intermissione continetur, qua calor internus maxime augetur, unde plurimum excrementorum absument, Quo fit, ut ad capitis dolorem, paralysim, stuporem atque ad alios complures affectus à multis fuerit commendatus.

In li. de internis
affectibus.
In 2. de sanit.
tuen. cap. 12.

In lib. 1. cap. 2.

In 2. de sanitate
tuen. cap. 10.
Libro 6. collect.
cap. 21.

In 2. de sanitate
tuen. cap. 10.

In lib. 4. Chron.
cap. 4.
In 1. de dicta.

Theod. Prisc. in
2. ad Timot. cap.
25.
Orib. lib. 6. colic.
lect. cap. 22.

In lib. de præfæ
sugat ad post. 10.

darus. His exercitationibus venatio non dissimilis esse videtur, quinimo huiusmodi est, quæ multas in se exercitationes continet, scilicet cursus, ambulationes, saltus & similes alias. Cū hæc triplex sit, quippè volatiliū, aquatiliū, atq; terrestriū, de ea, quæ terrestria homines venatione insectantur, loquimur, tanquā ad sanitatis cum tutelam, tum ad morbos abigendos, accommodatiori. hæc vero vel pedestris vel equestris dicitur, hæc illa minus valens est, pedestris itaque in montibus, quæ sit longe efficacior, quā in planis. vtraque vehemens & celer, inæqualis exercitatio est, qua plurimum incallescunt corpora, humoresque efficaciter funduntur, liquantur, & in sudorem prouehuntur copiosius, vnde in corporibus omnia tumentia atque adstricta facile tolluntur. quo à multis morbis venatores seipso precauent, ab ijsque omnibus, qui à crudis humiditatibus fouentur. Rhasis scribit in quadam pestilentia solos venatores incolumes seruatos fuisse. Arthriticis morbis vexati venatione maxime iuuantur, præsertimque antequam hi affectus antiquitatem contraxerint. ad morbos quoque capitis à frigidis humoribus obortos non parum utilis est. Venationi similis est exercitatio pile, omniumque maxime parua, quando in hac etiam homines cogantur ambulare, currere, saltare ac varijs motibus moueri. Varias verò habet differentias, ex varia pilarum magnitudine. Antyllus namque distinguit in paruam, atque in magnam, & paruam omnium esse paruissimam, qua manibus ludunt, alteram paulo maiorem, cum qua cubitos cubitis miscentes ludunt, atque tertiam, adhuc maiorem esse. Et magnam iterum esse mediocriter, & plus iusto magnam, & quasdam illarum plenas esse, atque aliquas inanes, quas folliculos idcirco appellant. huiusmodi exercitationes magnæ & celeres cum sint, ideo facultate à venationibus parum differunt, eademque idcirco præstabunt. His non dissimilis erit, pugna vmbrailis, lucta atque similes aliæ exercitationes, vehementes atque celeres de quibus, qui plura desiderant, legant ex antiquis præter alios Antyllum, & ex recentioribus Hieronymum Mercurialem atque alios, qui de singulis ex antiquorum sententia accuratissime, scripserunt. At posteaquam nos de exercitationibus ijs, quæ cum vehementia celeritatem habent, egimus, iam de alijs, quæ neque vehementes, neque celeres sunt, quæque vsum habuerunt, ad plures morbos longos atque ad conualescentes, nos itidem agere, opportunū esse duximus. Inter quas ex vitiatores apud antiquos fuerunt, scilicet equitationes, variæque gestationes, & uestiones, quibus antiquorum non pauci, ad quosdam morbos finiendos vti fuerunt. Hæc verò cum varijs modis fiant, scilicet aut in equis, aut in curru, aut in lectica, aut in sella, aut in lectis pensilibus, aut in cunis, aut in nauibus, varijs quoque differentijs distinguuntur, ac quadatenus etiā idcirco facultate, atque vtu differunt. In hoc tamen omnes simul videntur conuenire, quoniam singulæ, quæ exercitationes sunt parvæ, atque tardæ, inter debiles adnumerantur, ideoque non recte valentibus at solūmodo ualitudinarijs senibusque conueniunt. Hæc solent moderatam caloris auctiōem facere, sensim humorumque reliquias, quibus morbi fouentur, benigne calfaciendo, concoquendo, extenuando atque digerendo, resolvere: At in his gestationibus, quemadmodum & in omnibus alijs, modus desideratur, quandoquidem, qui vel febre longa vexantur, vel alio quouis morbo longo, debent prima die gestari quoad probe incaluerint, quod fiet, si uestio seu gestatio per horam processerit, ita ut auctore Antyllo hoc tempore quinque stadia, qui uehitur, perfecerit. & postea alijs diebus singulis addunt stadia quinque. & hic ordo seruari per plures debet dies, præsertimque, quoad ad triginta stadia (quod spaciū ferè quatuor miliaribus Italicis perficitur) peruentum sit. Ad quem terminum cum peruenerint, debebunt prosequi uestiōem gestationemue, quoad sanitati restituantur. Porro harum gestationum & uestionum auctorem primū fuisse Asclepiadem

In li. 26. cap. 3.

medicum Prusienſem Plinius poſteriorum memoria tradidit, ipſumque haſce blandas exercitationes inueniſſe ait, vt agrotantium voluptatibus obſequens, apud homines magnam quidem gloriam, atque auctoritatem nanciſceretur. Neque abs re factum, eſt, cum hæ blandæ exercitationes, vt etiam dictum eſt, poſſint in ægrotis corporibus calorem augere, ipſorumque torpeſcentes excitare, humoremque crudum concoquere, atque ipſius multitudinem comminuere. Hinc geſtationes, veſtionesque lentas plurimum conducere febribus diuturnis, Melancholicis, arthriticis, aſthmaticis, hæmoptoicis, ſtomachicis, atrophia, atque coli doloribus vexatis, ſpleneticis, obſtructis, obefis, ex antiquis Theodorus Priſcianus, Areteus, Aſclepiades, Aurelianus, Celfus & alij cognouerunt. Cæterum ſi de particularibus aliquid dicamus, equitationes ad plura non ſpernendas quotidiana nos experientia docuit, at eas intelligimus, quæ tarde & absque ſuccuſſatione ſunt, quin hæc, licet in quibuſdam affectibus particularibus ſint vitales, tamen maiori ex parte damnanda (quod internis viſceribus maxime officiant) iure merito videntur. Geſtationem vero in vehiculo factam (ait Antyllus) vim habere quandam amolendi, commouendi que morbos ſtabiles & permanentes: hanc ad bilem faucibus infixam diſcutiendam, atque ad ſpiritus denſitatem extenuandam ſibi plurimum proſuiſſe Seneca nobis ſcriptum reliquit, & Aurelianus ad capitis dolorem priuatim, ad paralifin, vertiginem, epileſiam, & ad grauem ophthalmiam, ad ſurditatem etiam homines per longam viâ geſtari oportere voluit. In curru etiam geſtationem eſſe exercitationem efficaciorē ſtatuit, vnde ipſam ad carnis multitudinem diminuendam maxime commendauit. Commotio vero illa, quæ in geſtatis in lectica fit, apta eſt, humores expulſioni aptos reddere. Denum ſi de nauigatione loquamur in mari tranquillo, ex hac ipſa commotione calor augetur, concoctioque promptius fit, vnde omnes ferè dum nauigant, famelici euadunt. In procelloſo magna fit in corporibus commotio, ita, vt homines complures ex ea in crebras, copioſasque vomitiones ferantur, quibus corpora maxime purgantur, atque exinde à multis etiam ſanatu difficilimis morbis liberentur. Quod nobis in Ægyptum nauigantibus contigit, qui cum multa bile abundaremus, perpetuum incendium ſentiebamus, ſitique immodica exardebamus perpetuo, linguaque cum reliquis oris partibus non minus aſpera fuerat quam in ijs, qui febribus ardentibus vexantur, quamobrem ſtomachus maxime languebat, corpusque nihil nutrebat, perpetuo color ferò ictericus. Quibus malis, poſteaquam nauigando in mari procelloſo maxime turbati, incredibilem bilis amaræ & ſtæuæ & vitallinæ copiam vomitibus crebris reieciimus, omnino liberati ſumus. De qua procelloſa maris tempeſtate, nos in præſatione ad libros de medicina Aegyptiorum accurate ſcripſimus. aque ex motu corporis hæc laxare apta nata ſunt.

*In epiſt. 56.**In 1. Chron. 1.**In 4. Chron.*

De frictionibus laxatorijs, atque de venereis.

Caput VI.

EX laxatorijs frictionibus ſunt, molles, & multæ, omniumque maxime, quæ cum oleis laxatorijs moliuntur, illæ aut volis manuum aut mollibus lintheis ſunt. olea vero cum quibus adhibentur, ſunt omnia, quæ vim laxandi habent, cuiuſmodi eſt, hydrelæum, & oleum commune dulce, amygdalinum cum dulce tum amarum, tum quod ex ſeminibus lini, ſenugreci, ex radicibusque altheæ, cucumeris ſylueſtris, & ex ſimilibus paratur, tum etiam ex floribus chamæmeli, melilotique. Hæ omnes vitiles ſunt ad cutem adſtrictam, vnde in omnibus febribus, quæ ab ea cauſa oriuntur, vſum habuerunt. Iuuant omnes putridas febres

febres (Oribasio auctore) ea excepta, quæ ab interna fouetur inflammatione, hanc enim frictiones minime iuuant. ad frigus & ad horrorem antiqui in vfu habuerunt ex calidis oleis frictiones ad omnes dorsi partes factas, qui vſus in periodicis maxime conuenit, præſertimque in chronicis, ſcilicet diu durantibus: quæ difficilimo negotio reſoluuntur, cuiuſmodi ſunt, tertianum chronicum, quotidianæ, & quartanæ; Haſce ita antiqui curabant, quippè per duas horas antequam inuadat acceſſio fricabant vniuerſum corpus, vti Galeno placuit, vel hypochondria atque omnes dorsi partes, vt alijs viſum fuit, linteo calido, molli & mox illinebant partes omnes fricatas oleo calido, ex ijs, quæ facultatem habent diſcuſſoriam, cuiuſmodi eſt, oleum chamæmelinum, rutaceum, anethinum, de ſinapi, de euphorbio, de pipere, & huiuſmodi alia datoque etiam per os calido medicamento diſcuſſorio, cuiuſmodi ex compoſitis eſt Theriaca, Mitridatum, & ex ſimplicibus, chamædriſ, chamæmelum, agaricus, eupatorium, & ſimilia, ægrotosque exinde ſtragulis probè contectos ſudare procurant. At de hoc præſidio medico longe accuratius (Deo fauente) ſcribemus poſterius. At ad venerea venimus, quæ quod corpora laxent, Galenus (licet Epicurus dixerit venerearum rerum nullum vſum eſſe ſalubrem) exinde colligit, quoniam calorem venus augeat, digeritque vniuerſum corpus, atque, quod magis concubitus eſt proprium, plurimum ſeminis euacuando, contenta, maxime laxat: Vnde meritò Galenus dixit, quosdam, niſi venere vrantur, aſſidue vexari capitis grauitate, cibos faſtidire, febribusque reddi obnoxios, & viciari ciborum concoctionem. Quosdamque etiam nouiſſe ait, qui cum antea à coitu abſtinentes melancholici euaserint, liberos ad concubitum redeunt, & ab eo, & ab alijs affectibus, quos patiebantur, euafiſſe. Aliquosque ab eo abſtinentes, cum antea venere familiaris vſi fuiſſent, torpidos, pigros, ſegnesque euafiſſe, & melancholicos. Oribasius ex Rufo ait: Ex rebus venereis hæc commoda ſunt, quod ſuperuacuum eſt inaniunt, corpus agile reddunt, ad incrementum promouent, & magis virile efficiunt. Animo vero id præſtatur à venere, vt impeditam rationis vim explicet, iramque vehementem ſedet. Ideo fit, vt venus melancholicis, ſi quid aliud, accommodatiſſimum ſit remedium. Eadem integros ſenſus reddit eorum, qui cunq; alio inſaniæ genere laborant. Summe facit etiam ad morbos, qui ex pituita naſcuntur. alij ab inedia ad cibum facile ſumendum redierunt. alij à conuinis pollutionibus, quæ in ſomnis fiebant, ſunt liberati,

In lib. 6. collyſt.
cap. 20.

*De venarum & arteriarum ſectiōe pro molienda ſanguinis
euacuatione, de crurum ſcarificatione, de cucurbitulis,
atque de hirudinibus. Cap. VII.*

Sanguinis euacuationem, quocumque modo fiat, aut ex natura, aut ex arte, corpus laxare, neminem medicorum (vno excepto Eraſiſtrato, atque ipſius ſectatoribus miſſionem ſanguinis damnantibus) latere deprehendimus. Venarum vero atque arteriarum ſectiōem eſſe vnum ex magnis laxatorijs Galenus multis in locis affirmauit. Apud Aegyptios, Arabes, atque aliorum complurium orientis locorum medicos, arteriarum non minus quam venarum ſectiōem pro faciendâ miſſione ſanguinis in vſu eſſe familiariffimo, nos in libris de medicina Aegyptiorum ſcripſimus. Methodici ſanguinis euacuationem indicari à morbo adſtricto magno, atque à virium robore voluerunt. A morbo inquam adſtricto tanquam laxatorium præſidium, & à morbo magno, quod ſit omnium laxatoriorum medicamentorum maximum præſidium, atque à virium robore, quoniam

In 4. viſt. 112.
com. 19.

In tex. 9.

In lib. 1. cap.

In lib. 2. cap. 5.

quoniam viribus non permittentibus non mittunt sanguinem. Mirum certe est, quamobrem Galenus in 4. lib. meth. med. scripserit Methodicos pro indicanda sanguinis euacuatione morbi magnitudinem non considerasse: cum C. Aurelianus Methodicus, sæpe expressum fecerit, sanguinis euacuationem indicari à morbo magno & viribus. à quo dogmate haud visus est abhorreere diuinus Hippocrates, cum in 4. de vict. ratione ita scripserit: In morbis acutis sanguinem detrahes, si vehemens morbus videatur, florueritque ægrotanti ætas, & virium robur adfuerit. duo scopi sunt præcipui, scilicet morbus vehemens, magnusue, atque virium robur; quibus quidem obseruatis perpetuo erit sanguis mittendus, atque hi scopi sunt necessarij, quoniam nisi morbus magnus sit, & adfuerit virium robur, non necessario sanguinem vacuari oportebit. Aetas vero florescens est aptissima ad mittendum sanguinem, tamen in acutis morbis existente morbo magno, permittentibus viribus, vel etiam in alijs ætatibus erit mittendus sanguis. Methodici vero ætatem ad mittendum sanguinem scitu non esse necessariam putarunt, quoniam (ut nuper dictum est) etiam in alijs ætatibus mittitur sanguis. At dicet aliquis: omissa indicatione ab ætate, quomodo cognoscemus, in pueris atque in senibus an conueniat sanguinis missio? Senes non aptos sanguinis euacuationi esse cognoscimus ex virium languore (cognito ex ijs singulis quibus nobis innotescit, præsertimque ex pulsibus non vehementibus, raris, tardisq;) In pueris verò, si virium robur adsit, morbo acuto vehementi vexatis, sanguinem esse mittendum (præsertimque si habitus non laxus sed densus fuerit) omnes ferè Arabes & Latini voluerunt. De qua re Celsus meritò habet: interest enim non quæ ætas sit neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillis est, aut si mulier quæ grauida non est, parum valet, male sanguis mittitur: emoritur enim vis, quæ his supererat & hoc modo erepta est. At firmus puer & robustus senex & grauida mulier valens turò curatur. Vtrum vero in pueris missio sanguinis conueniat, & quomodo fieri in ipsis debeat, in libris de medic. Aegypt. à nobis satis accuratè disputatum olim fuit. Itaque etiam in puero densi ac firmi habitus, si aliquando ipse acuto magno morbo corripiatur sanguinem secta vena mittere à ratione non abhorret, neque est, quod puerorum (ut ait Galenus, atque veritas suadet) substantia sit valde humida & calida, vnde facile exhalet, euaporetque; quoniam pueri (firmi habitus præsertim) omnes magno virium robore pollent, atque etiam, quod hi plurimum alimento alantur, cruditatibusq; idcirco abundant, quibus concoctis plurimum sanguinis gignatur. atque hinc est, quod pueri morbis uexati aliquando per multos dies à cibo abstinentes uiuunt, atque morbos graues superant; ex quo etiam apparet, quamobrem (quia magnis viribus ualent) maximis morbis fortius aliarum ætatum hominibus resistent; Atque etiam non minus, eos facile, ac fortiter magnis morbis deprehensos perferre largas sanguinis eruptiones (quas rectè quoque ualentes, & creberrimas, & copiosissimas complures habere innoxie solent, aliquando solas, aliquandoque etiam unà cum sudoribus copiosis, & alui fluxionibus) à quibus sanè euacuationibus, tantum abest, ipsos exolui, & debilitari, ut robustiores magis aduersus morbum euadant. Vnde meritò aliquando ipsi pueri uenæ sectionem ferre poterunt (ob idque scribunt, Auenzoarem trimo eius filio ab acuto morbo, ut liberaret, uenam secuisse) quod præsidij genus in morbo solummodo qui acutus, atque uehemens sit, locum habebit. longè tutius Aegyptij, Arabes atque alij aliarum nationum medici in pueris ex acuto morbo oppressis scarificatis cruribus mittere sanguinem consueverunt. Verum enim uero non in omni adstricto morbo Methodici secta uena sanguinem mittebant, at in eo solummodo, qui magnus uehemensque sit, ut propterea magno laxatorio præsidio egeat; neque etiam semper in robustis senibus eadem ratione sanguinem

guinem mittebant, si morbo non magno laborabant, nimirum quia minori laxatorio quam sit sanguinis vacuatio, sperent morbum ipsum non magnum superari posse. atque hæc obiter de sanguinis vacuatione per venam sectam, tanquam de magno præsidio laxatorio, huic succedit sanguinis euacuatio, quæ molitur scarificationis cruribus. hanc crurum scarificationem (quam etiam malleolorum scarificationem, quoniam crus scarificantes à cruris parte, quam malleolum vocant incipiant, veteres medici appellarunt) proxime accedere ad venæ sectionem, venæque sectionis merito, vicarium esse præsidium laxatorium nos olim in nostris libris de medic. Aegyptiorum euulgatis satis superque demonstrauimus: præsertimque quoniam malleolorum hæc scarificatio æque eandem sanguinis copiam educat, ac venæ sectio, eamque faciat non confertim & violentia, vt cucurbitulæ cum scarificatione appositæ faciunt, sed sensim ac sensim: Vnde merito Galenus de hac ipsa in aphorismorum commentarijs locutus, ita habet: Euacuatio omnium humorum, quæ quidem exquisitissima est, fit per venæ sectionem, proxima autem huic illa est, quæ fit, per malleolorum scarificationem. Hinc est, quod omnibus à morbis adstrictis præsertimque a febribus putridis, & ab inflammationibus cum externis, tum internis, vexatis hæc sanguinis euacuatio utilis est, omniumque maxime in corporibus aliquid laxi habentibus, in quibus haud tuto venæ sectio adhiberi potest, cuiusmodi sunt pueri, mulieres, eunuchi atque senes, in quibus merito singulis, Aegyptios, Arabes, atque aliarum nationum medicos hanc ipsam familiariter exercere, in libris de medicina Aegyptiorum tradidimus. Galenus vnum de hac ipsa notauit, scilicet malleolorum scarificationem longe vtilius exerceri in ijs corporibus, qui sanguine tenuiori abundant, cuiusmodi sunt corpora puerorum, mulierum, & similibus. Dicitur satis non potest, quantopere vtilis sit, in pueris febribus putridis, malignis, pestilentibusque atque internis phlegmonis vexatis, quod nimirum per malleolorum scarificationem quantum sanguinis desideratur iucunde euacuetur, maximeque à partibus supernis hæc euacuatio reuolat, & quod à partibus remotis scilicet à cruribus fiat, vires haud multum resoluat. Nos sæpius vidimus in multis, qui febre acuta, maligna vel pestilenti consistebantur, oborto delirio, vel surditate, vel vigilibus redditus ægrotis, vel insigniter capite dolentibus, statim ex malleolorum scarificatione sanguine multo euacuato, oia hæc symptomata fuisse sedata. Vtilissima est in variolis atque in morbillis, nec non et in malignis exanthematibus. Plures decepti fuerunt, putantes hanc sanguinis euacuationem esse eandem cum ea, quæ fit scarificati cruribus cum adhibitis cucurbitulis, hocque facile iudicauerunt decepti verbis Auicennæ, quæ hæc sunt: Et ventosæ quidē, quæ cruribus superponuntur, sunt minutioni propinquæ, & mundificant sanguinem, prouocant menstrua. & potest. Et ei quidem, quæ ex mulieribus alba existit, ac laxa, sanguinem habens subtilem ventosæ in cruribus positæ sunt meliores, quam phlebotomia, quæ fit in saphena. Interpres Auicennæ pessime hæc loca fuit interpretatus, qui cum non cognouerit malleolorum scarificationem, multo minusque modum quo fieri debeat, putans sanguinem non caliditate aquæ calidæ seu eius calido balneo quo ad crura scarificantes vtuntur, educi, sed cucurbitularum vi attractoria, non scarificationem sed ventosas perperam vertit. Errauit sanè qui crediderit, euacuationem sanguinis cucurbitulis cruribus cum scarificatione affixis eandem esse, vel proximum ei, quæ fit per venæ sectionem: cum ab adhibitis cucurbitulis cruribus, neque copia sanguinis dematur ei, quæ per venam sectam euacuatur, similis, neque sensim ac sensim, vt in venæ sectione fit, educitur, sed vi attractoria, confertim ac non sine violentia, per scarificationem autem crurum eo modo quo Antiqui nobis præscriperunt, educitur æque fere, atque venæ sectione fit, ea, vel proxima sanguinis copia, sensim ac sensim, iucundeque nulla profecto violentia

In 2. aphor. 17.

In lib. 1. fin. 4.
cap. 21.

Cap. 11.

Com. 17.

In lib. de curat.
per sang. miss.
cap. 19.
In lib. de hirud.
venis.

violentia facta. Quare differunt hæ vacuationes, scilicet, quæ crurum vel malleolorum scarificatione fiunt, ab ijs, quæ affixis cucurbitulis molliuntur. Quo apparet deceptos fuisse, & decipi etiam hac etate multos, qui æstimarint, crurum scarificationem, esse præsidium laxatorium euacuatoriumque, quod adhibitis cucurbitulis cum scarificatione cruribus fit: Hic error ab Auicennæ interpretatione processit, qui cum (vt diximus) malleolorum scarificationem veteribus Græcis medicis quippè Galeno, Apollonio, Antyllo atque alijs familiarem non cognouisset, legit: ventosas cruribus appositas minutioni esse proximas; & postea: ventosas in cruribus positas in corporibus mulierum, quæ alba & laxa sunt, idcircoque habentia sanguinem subtilem, esse meliores ipsa venæ sectione ex saphena. Hæc Auicenna verbatim ex Galeno accepit, ita in libro de curat. per sanguinis missionem, dicente: Porro ex mulieribus quæ albidiores sunt, sanguinem tenuem acervare solent, quocirca adhibitis malleolorum scarificationibus maxime vacuantur, atque quæ nigriores sunt secta vena curato. De qua euacuatione in 2. lib. aphorism. ita inquit: Euacuationem æqualiter omnium humorum, quæ quidem exquisitissima est, fieri per venæ sectionem, & huic esse primam, quæ per malleolorum scarificationem, & non dixit: per cucurbitulas (vt Auicennæ interpretes vertit) cruribus adhibitas. De hac vero scarificatione malleolorum nos accuratissime ex veterum medicorum sententiâ in libris de medicis Aegypti. scripsimus. ideoque qui plura de hoc præsidio scire desiderat, legat librum tertium. Tertium locum habent inter prædicta præsidia laxantia, cucurbitulæ (quas perperâ vicarium esse venæ sectionis complures existimarunt. Hæ quidem euacuando laxant, neque inutilem aliquando in corporibus sanguine subtiliori abundantibus præstant sanguinis vacuationem, potissimumque si præmissa vniuersali sanguinis vacuatione per venam sectam, postea dorsi partibus vel cruribus adhibeantur: Qua methodo adhibendas esse cucurbitulas voluisse Hippocratem, Galenus est auctor, scilicet vt nunquam admoueantur, nisi euacuationem sit totum corpus prius. Ait enim: Incipientes aut vigentes capitis gravitate, dolores à plenitudine per cucurbitulam in occipiti positam vel solam vel cum scarificationibus iuuat, verum totum corpus antea vacuatum esse oportet. Hinc plures fortasse cucurbitulas inter topica medicamenta, quod eæ vsum quoque habeant, corpore euacuato non iniuriâ comprehenderunt. Vsum etiam habent cucurbitulæ flammæ tantummodo admotæ, sine scarificatione, nam hæ digerendo humorem, vel flatu, laxant. Huc accedit vsus hirudinum, quas vacuandi sanguinis gratia sæpe medici venis admouent. quandoque in pueris, vt sanguinem euacuent, plerumque hæmorrhoidibus ad totum corpus euacuandum, qui vsus vsque adeo apud quosdam medicos in curandis morbis inualuit, vt sæpius omiſsa sectione venæ non sine magno errore ad mittendum sanguinem ab hæmorrhoidibus festinant, quæ euacuatio aliquando in ijs non est improbanda, qui habent eas venas magnas, innatasque, quique alias soliti sunt habere largas sanguinis euacuationes per huiusmodi venas. Sed in alijs præstabit, præmissa vniuersali sanguinis vacuatione per venæ sectionem id facere.

De medicamentis laxatorijs, quæ humores è corporibus educendo purgandoque variis modis id præstant. Cap. VIII.

Quod medicamenta quouis modo purgatoria corpus adstrictum atque tumens laxent, neminem nostrum cum ex ijs, quæ hæcenus à nobis dicta sunt, rum ex ijs, quæ nunc dicentur, latere putamus: cum scilicet medicamenta Græcis Cathartica, Latinis eductoria, Methodicisque ventrisflua, atque promitoria dicta,

dicta, vel sint vere, aut non vere eductoria, humores, atque excrementa corpus tumens, ac adstrictum reddentia, purgando excrementorumque multitudinem minuendo, laxent: Eductoria vero per se dicta sunt, quæ & Dogmaticorum sententia attrahendo etiam ex partibus longinquis humores, educunt, atque purgant, cuiusmodi est vterque helleborus, scammonium, colocynthis, coccognidiū, agaricus & similia. Et quæ non sunt per se purgantia, dicuntur, quæ non attrahendo, sed vel abluendo, vel detergendo, vel molliendo & laxando, vel expultricem mouendo, vel denique comprimendo, humores per aluum, aut per vomitum educunt. Abluentia medicamenta sunt, quæ stomachum, ventremque abluendo, laxant, vt aqua simplex largius epota, cuiusmodi est Ægyptia ex Nilo flumine, ex qua epotata aduenit in ea regione solent omnes ferè in diarrhæam, cum primum illa vti ceperint, incidere: serum itidem lactis claresfactum, aquæ itidem Thermales, in agro Patavino Beatæ Virginis dicta, atque in agro Lucensi Villensis appellata. Detergendo vero ventrem laxant, aqua salsa, cuiusmodi est marina, Tecturianaque vulgo dicta. omnia etiam medicamenta, amara, acria & nitrosa detergendo purgant, vt aloë, absinthium, manna vulgaris, piper, ginger, ceteraque omnia vehementer acria: Huius generis sunt, cepe, allia, porra & similia; brassica etiam, & beta detergendo aluum mouent. lubricando seu laxando præstant hoc idem vinum dulcissimum, mulsæ, pinguedines omnes, olea dulcia, iuraque vel carnum vel piscium pingua, non minus quam lac ipsum caprillum, asininum, equinum. Comprimendo vero tamarendi substantia epota, cum etiâ Mirabolanus, pyra malaque cydonia præsertimque ab assumpto cibo. Certe mirum est, apud Aurelium magnæ olim inter Methodicos auctoritatis medicum, nusquam ipsum meminisse aliquod ex ijs lenitorijs pharmacis laxatorijs, cum ea vere aluum subducendo laxent, tumentiaque atque adstricta tollere queant. Multo minus mirari licet, cur & ipse in totis libris, in quibus scripsit de morbis cum acutis tum chronicis, (non meminerit, mannam, Cassiam Ægyptiam, tamarindum, serum lactis, syrupum de robis soluentem, itemque è manna, & ex dulcibus granatis paratum, de quibus à nobis in libris de medicina Ægyptiorum scriptum est & alia similia, quæ ipsis ignota fuisse credendum est. At fortasse hæc eadem etsi nouissent Methodici, non habuissent in vsu frequenti ad curandos morbos, tum quia ipsa humores potius mouere, quam educere apta nata sint, vnde timendum ex ipsorum vsu sit, sepius quiescentes humores commotos minimeque præ ipsorum vi non efficaci eductos, posse ad varias partes corporis fluentes, varios morbos concitare, eosque etiam non raro perniciosos. Plures sanè fuerunt, qui cum recte valerent, purgationis gratia à deuorato pharmaco lenitorio, commotis humoribus prauis abundantibus, in morbos inciderunt, compluresque ipsorum interierunt. Præterea dicunt, etiam à leniter eductorijs stomachum vexari, cibi appetitum vitiari, sitim incendi, viresque collabi. Veruntamen nos prædictorum purgantiam vsu nedum damnamus, at quinimo vtilissimum esse scimus, modo ea exhibeantur in ea virtutis vi, vt solummodo ea excrementa quæ in stomacho atque ventre sunt, purgent, nulloque modo eos humores, qui in venis existunt, commouere atque educere apta sint, quando ad huiusmodi humores educendos, opus sit medicamenti non debilititer, sed valide purgatorijs. hinc Methodicis ad morbos summe peruicaces sanatuque difficillimos hellebori albi, & nigri vsus fuit familiaris. Hincque non recte etiam faciunt ij, qui prædicta lenitoria, purgantia, vel in maiori, quam deceat, quantitate (qua à venis, primarum viarum excrementis eductis, humores quoque commouere ad educationem possunt) exhibent; vel pharmacorum attrahentium permixtione reddita (lenitorijs vocatis) efficaciora. Itaque si lenitoria pharmaca exhibeantur quantitate moderata, qua solummodo excrementa in primis vijs

M

contenta

contenta educant, haud fore ægrotis ad tollendos morbos inutilia, existimamus. Quod vero hæc omnia stomachum vexent, appetentiam vitient sitim accendant, vires deiciant, atque alias ægrotis incommoditates concitent, ipsis vsum clysteriorum Methodici idcirco prætulerunt, eosque merito in familiari vfu habuerunt: quandoquidem clysteres possunt, & laxando, & detergendo, flatusque digerendo, ac vel etiam purgando (si ex medicamentis laxatorijs, vel ex deterfiorijs vel ex attractorijs parentur) ægrotis auxilio esse. Atque hæc hi nullo incommodo præstant: neque enim stomachum subuertunt, neque ciborum appetitum tollunt, neque sitim accendant, neque ab ipsorum vfu vires patiuntur. Catharticorum verò lenientium vocatorum, quæ nuper meminimus, usum in morbis sanandis, velint, nolint, Methodici admittere debent. cum & hæc laxent, & sæpe longe utilior sit laxatio, & ipsius maius quod sequitur commodum, quam incommodum, quo ventriculus afficitur. Cæterum denuo ad purgantia medicamenta redeamus, de quibus illud in primis firmemus, quippe omnino purgantium vsum esse ab omnibus medicis vel etiam Methodicis admittendum, cum medicis euacuationis sponte à natura recte operante factæ, atque purgationis sint imitatores: hæc excrementa & humores respiciat, illa sanguinem. Hinc purgationem definiunt medici Dogmatici, quod sit eorum humorum qui sola qualitate infestant, euacuatio. Galenus scribit Hippocratem confluisse absolute euacuationem appellare, vbi æque omnes humores simul euacuantur, atque purgationem in qua humores qui praua qualitate infecti sunt, educuntur. vnde etiam Gal. expressit: vbi æque omnes humores simul abundant, sanguinis vacuatione opus esse, atque vbi unus, vel aliqui, purgatione. Itaque si omnes concedunt, medicos naturam sanguinem excernentem uacuantemque eiusdem sanguinis missione vel uena secta, vel scarificatis malleolis, vel adhibitis cucurbitulis, vel quouis alio modo imitari debere, cur eandem excrementa, aut per uomitum, aut per aluum, aut per aliam partem corporis excernentem, pharmacis laxatorijs haud imitandam Methodici dicent? Quæ si imitanda erit, profecto usum purgantium concedere ij debebunt. Hoc uiso, cum ipsa pharmaca excrementa moueant, atque educant, hoc alterum cognoscendum erit, quomodo, & qua ui, ea educant. In qua re non parum ueteres philosophi discordes fuerunt; Erasistratus eiusque sectatores putarunt medicamenta euacuare æqualiter omne genus humoris, potissimumque valide purgantia, scilicet quæ & humores excrementios tenuiores, & crassiores educunt: debilia vero solummodo humores tenuiores, neutiquamque crassiores educere. à qua opinione fortasse Aristoteles non dissensisse uisus fuit, qui & ipse omnes humores excrementitios pharmaca purgare uoluit. Alij determinatos humores à medicamentis trahi uoluerunt, ut Asclepiades, Hippocrates, Galenus atque alij medici Dogmatici. Asclepiades tamen in hoc ab alijs discrepauit, qui licet uoluerit, cholagoga bilem attrahere, phlegmagoga pituitam, hydragoga aquam, & melonagoga melancholiam, quod etiam Dogmaticis placuit, tamen uoluit, medicamenta non tales humores determinatos (quos trahant in corpore) inuenire, sed ex alteratione medicamenti assumpti eos generari, & postea educi: Hippoc. uero supponit eosdem in corpore educendos genitos, talesque medicamentis, quales sunt, educi. Plerique Dogmaticorum putarunt hosce humores à medicamentis proprietate totius substantiæ (Galeno auctore) trahi. Namq; Hippocrates in libris de natura humana, ita habet: In quem modum stirpes & femina posteaquam in terram iacta fuerint, attrahit vnumquodque, quicquid in terra repererit, quod ei naturali affinitate congruit (at uero terre inest acidum, dulce, amarum, salsum & omnimodum) primum itaque illius plurimum attrahit, quod natura sibi proximum est, subinde autem alia, sic & medicamenta in corpore faciunt. Aristoteles uero uisus est,

non

Gal. in 2. aph. 27
In 1. lib. de hum.
mor. sex. 12.

In 7. aph. 8.

In 1. de nat.
hum. com. 39.

non similitudine quidem, sed potius inimicitia, eam humorum educationem fieri. De his ita scripsit: Vbi enim ventrem adierunt, resolutaque sunt, statim ad venas per easdem feruntur semitas, quibus permeat cibus, mox cum nihilo concoqui potuerint, sed vidrice perstiterunt potentia, relabuntur, & quæ sibi obstant secum detrahunt, quæ res purgatio vocitatur. Profectò ex his constare duo nobis videntur, vnum, quod medicamenta naturæ nostræ inimica sint, quippè quæ nihil à calore nativum incalescunt concoquantur, & proinde per eosdem meatus exeant, seu melius à venarum expultrice propulsentur ad ventrem, quæ aut per stomachum, aut per ventrem ab ipsorum molesta qualitate expultrice commota, postea reijciuntur. Alterum, quod ad ventrem à venis relabentia, secum humores, quos offendunt ad ventrem itidem detrahant. Qui profectò humores vel ut Galeno placuit, familiaritate substantiæ, medicamenta secuti, vel vnà ab expultrice iisdem medicamentorum vi commoti, cum ipsis medicamentis ad ventrem vel ad stomachum primum propellantur, & deinceps à stomacho ad ventrem propulsa educantur. Huius opinionis fortasse Methodici fuisse visi sunt, eo præsertim argumento persuasi, quod hæc maxime corpora vexarent, ac læderent, quo perpetuo ab ipsis cauendum esse voluerunt, atque non nisi ex insigni morborum perniciacia coacti atque in morbis sanatu difficillimis ad purgantium medicamentorum usum aliquando confugiebant, ad eorumque præsertim usum, quæ quod hominibus maxime molesta (ut meritò idcirco deleteria atque venenosa ab omnibus fuerint dicta) sint, præualide purgant. Elleborus quidem vterque illis præter alia fuit maxime ad purgandum familiaris, qui fortasse vi deleteria efficaci intra ventrem assumptus, instar veneni magnas turbationes mouendo efficaciter, omnes humores excrementitios purgat eo modo, quo sæpius vidimus complures à prauorum fungorum esu cum per vomitum tum per ventrem fuisse maxime purgatos. Itaque Methodici non omnium quidem purgantium usum, sed præualidorum tantum in morbis sanatu difficillimis aliquando amplexi fuerunt, quod hæc omnes humores, cum tenues tum crassos efficaciter educendo magnam quidem laxationem in corporibus facerent, quando debilia non crassos viscidosque, sed solummodo tenuiores educere queant. Atque hæc opinio eadem prorsus fuisse videtur, quam Erasistratus olim magni nominis medicus fuit insecutus, vel ab ipso eandem methodicòs mutuatos fuisse, haud immeritò æstimari potest. Caterum priusquam huic capiti finem imponamus, Vnum paucis adhuc superest dicendum, scilicet, quo tempore in morbis medicamenta purgatoria conueniant, an quocumque morbi tempore, ut quibusdam visum est, id faciendum? an in principio humoribus non turgentibus, an solummodo morbo concocto. Plerisque eruditioribus Dogmaticis visum est, numquam in principio nisi humores turgeant, posse (quod præ cruditate medicamentis humores non cedant) commode purgari, iisdem vero turgentibus quocumque tempore adhibenda esse pharmaca, tentandamque esse ipsorum educationem, quoniã humores turgentibus sint in motu, facileque huc illucque vi medicamenti purgatorij pellantur, attrahanturque. Non turgentibus vero, nunquam in principio, sed perpetuo humoribus concoctis, quod tempus morbi medicis significant vrine cæteraque alia excrementa coctionem habentia. Methodicis autem non nisi post humorum factam concoctionem (cum demum in morbis purgantia exhibeant, posteaquã alijs laxatorijs præsidij multis pertentatis morbos non cedere uiderint) exhibere consueuerunt. Atque hæc de tempore pharmaca vtendi in morbis, atque de vere purgantibus medicamentis. De lenitorijs vero pharmacis aliter res se habebit, siquidem illa instar clysteriorum aluum leniendo subducentia, quo cumque morbi tempore exhiberi ægrotis poterunt.

In 1 problem. 43

Hipp. in 1. aph. 22. & in 4. de viñ. rat. in acut. 43.

Hipp. 2 aph. 19. in 2. de viñ. rat. in acut. ten. 11.

De medicamentis simplicibus, quæ corpora laxare apta sunt. Caput IX.

Simplicium medicamentorum, quæ per ventrem purgant, sanè quædam lenientia dicuntur, quædam purgantia, quæ duplicis quoque esse differentie constat, quandoquidem horum quædam laxant cum quadam roboratione, atque hæc à nostris benedicta appellata fuerunt: & quædam laxantia solummodo sunt. Itaque de singulis acturi à lenientibus vulgo vocatis & à benedictis exordientes, dicimus ex ijs, ad vsum, medicinæ nostris principaliora cognita esse cassiam Ægyptiam vulgo catharticam dictam, mannam mastichinam, calabrem, tamarindum, rosarum infusionem, aloë, Myrobolanum, serum lactis, succus granatorum dulcium Ægyptiorum, rhabarbarum mechiocam, Agaricum, turpetum, polypodium, senam, epithymum, iridem. Vehementer vero laxantia sunt; Scamonium siue diagridium, elleborus albus, niger, colocynthis, coecognidion, timeleæ folia, mezereon Arabibus dicta. hermodactylus, succus cucumeris sylvestris, quem elateriam Græci appellant. brassica marina vulgo soldanella, piper montanum, scilicet grana daphnoidis siue laureolæ, latyris & cataputia appellata, euphorbium, centaurum minus, squamma æris, & similia. At de singulorum tantummodo facultate nunc paucis agemus, quando nostrum hoc in loco non fuerit institutum, pertinentia ad istorum medicamentorum cognitionem pertractare; qui hoc etiam scire desiderant, plures cum ex antiquis, tum ex recentioribus commentarios habere poterunt, apud quos prædictorum omnium medicamentorum laxantium rationem assequuntur. De cassia vero Ægyptia, de manna, de tamarindo itemque de quibusdam alijs, nos cum in libris de medicina Ægyptiorum, tum in libro de plantis Ægypti, satis accurate scripsimus; Cassiæ vero pulpam quod ad primas facultates pertinet, calidam atque humidam secundo excessu esse medici statuunt, emollientemque ex secundis, lenitoriam laxatoriamque atque digerentem facultatem habere: atque ex tertijs laxando suauem bilem atque pituitam clementer purgare. Quam facultatem laxatoriam non esse ex toto emollientiam, at quinetiam non modicum eductoriæ facultatis simpliciter emollientiæ mixtum habere, multis non iniuria est visum; quam rem ita esse, homines ab eius esu abhorre, nobis argumento erit, facultatem vero eductoriæ non multam quidem ei inesse mixtam, ea ratione intelligimus, quod facile à calore in multis ita concoquatur ut in nutrimentum abeat. Vnde si copiosius exhibeatur, potest quidem etiam in venis humores commouere & turbare, neque tamen potest eos educere, vnde ipsius vsum non erit in omnibus corporibus tutus si (ut dictum est) copiosius exhibeatur, vel alicui eductorio pharmaco mixta, semunciam vero ipsius ac vel etiam vnciam integram, & ad decem vsque & duodecim drachmas in adultis, atque in robustis corporibus eam exhibere tuto poterimus, at ex Methodicis ad vnciam concedi poterit, utpote quæ clysteriorum emollientium vicem gerat, ventremque satis emolliat. Manna optima, quæ vere manna est, id est mel roscidum, ex substantiæ figura mastichina vocata, habet facultatem temperate calidam atque humidam, lenitoriam, quæ leniendo, nihil eductoriæ catharticeque facultatis in se continet. Quo mirum non est, si homines libentissime eam ipsam in cibo etiam assument, gustu nihilo ferè differentem ab optimo saccharo, hoc excepto, quod sit ipso dulcior, substantiæque tenuioris, & quæ facilius, quam saccharum digeritur. hanc Ægyptij habent optimam, apud ipsosque ipsius usus est admodum familiaris, præsertim in morbis acutis, pectoris & pulmonum, atque in febribus biliosis: ipsi vero exhibent eius unciam vel geminas cum libris duabus aquæ Nili fluminis claresactæ, vel

ex iure

ex iure pulli usque ad tres uncias uel quatuor. Ab hac ipsa ueluti diuersa est manna calabris uocata, uelut quæ in diuersa prouincia, diuerso quoque modo proueniat, ita facultate à priori maxime differt: calida enim est supra primum usque ad secundum excessum, ut ab ipsius manifesta acrimonia, qua faucibus molesta est, intelligitur: atque humida eodem itidem ordine est, detergit, emollit, laxat, digerit, uentremque subducit, cum leniendo, tum etiam propria ui laxatoria cuius etiam particeps uidetur. Vnde gustui minime grata est. Hanc mannâ antiquorum propterea non esse meritò uiri doctissimi existimarunt, quinimo potius succum quendam ueluti bituminosum, quem ornus in quadam Calabriae parte certo anni tempore vna cum nutrimento trahit, quique in ramis gummi modo resudat, ac non minus in folijs, quæ illa in ramis, exsudat, ut gustui suauior est, ita facultate purgatoria inferior. efficacius enim purgat, quæ ex truncis, minus quæ ex ramulis, omniumque minime, quæ in folijs colligitur. Medici Patauini eam ad quatuor & etiam ad quinque uncias familiariter exhibent, ex decocto aliquo uel iure pulli uel ex aqua aliqua stillatitia dissolutam. Tamariindorum fructuum pulpa frigida & sicca secundo, ac (ut alijs etiam visum est) tertio excessu, visa est, extenuat, incidit, laxat, aperit, per ventremque bilem fluam educit, sitim tollit, feruorem sanguinis compescit, eius infusum datur ad laxandum, eique inest facultas leniter laxatoria: Datur ex aqua uel ex iure pulli uel ex decocto aliquo. dosisque est ab uncia ad quatuor usque. Pulpa parum aluum subducit, daturque à drachmis duabus usque ad quatuor. Eodem modo rosa licet refrigeret, & sic ut adstringat ac roboret, tamen clementer purgat bilem & pituitam quod eius succus præstat ex sero lactis epotus, atque etiam eius infusum, ex quo paratur syrupus vulgo solutiuis vocatus, quem ex iure uel ex aqua stillatitia exhibent ad uncias quatuor. Aloe est itidem calida secundo, sic tertio excessu, interius detergit, aperitque oscula venarum ex eius facultate anastomatica. medicamentum escoproticum, id est, stercoraceum est. succum lauat, succo aliquo refrigerante ad commodendam vim anastomaticam qua incendit, oscula venarum aperit, unde hæmorrhoidas mouere ipsius usum assiduū, longa experientia cognitum est, datur ab obolis duobus ab obulos octo. Iridis succus laxatorius non minus quoque est, calidus sicca secundo excessu, extenuat, detergit, concoquit, digerit, laxat, purgatque per ventrem crassam pituitam, atque bilem, non minusque etiam, ut Arabibus visum est, aqueum, serosumue humorem, unde ad alcitim hydropem succus epotus, à drachmis quatuor, ad unciam usque & semis ab omnibus commendatur. Senæ folia & folliculi in usu itidem sunt ad purgandum, at differre plures folia à folliculis voluerunt, quod folliculi calidi sint ordine secundo, sicci primo, contra folia calida primo, atque sicca secundo, detergunt, ab infarctu liberant, aperiunt, digerunt, clementerque purgant vltimam bilem atque pituitam. puluis foliorum ex iure uel ex vino drachmæ pondere epotus aluum lubricam reddit, idemque facit infusum, dosis est vni foliorum semuncia in decocto proportionato feruenti, uel in sero lactis, uel in vino per noctem maceretur. Rhabarbarum Dogmatici vocant medicamentum benedictum, quod vnum ex ijs sit catharticis, quæ laxando roborant. calidum & siccum ordine secundo faciunt, detergit, aperit, digerit, viscera roborat, meatus ab infarctu liberat, purgat clementer bilem atque pituitam, vel eius puluis exhibetur, vel eius infusum: dosis est a dragma usque ad geminam. Mechiorum radix proximis annis ex occidentalibus indijs ad nos perlata, calida primo, sicca secundo, detergit, aperit, digerit, laxatque purgando clementer cum pituitam, tum serosum humorem, datur à chachma usque ad quatuor. Turbit calefacit, siccatur tertio excessu, inflammat fauces, mordicat, vlcera, atque pituitam crassam atque melancholiam purgando, laxat, quod efficacius, commodiusque præstabit

Rabit si vna cū modico gingiberis, & saccharo, ipsius gemine drachmæ exhibean-
 tur. Polypodium vero calidum secundo, & siccum tertio faciunt, extenuat, de-
 tergitque valenter, digerit, purgatque pituitam crassam & melancholiam, datur
 ipsius decoctū in vino, in iure carnis vel in decocto florū & fructuum cordialium,
 & datur à drachmis duabus vsque ad quatuor. Epithymum itidem calidum sic-
 cum (Galeno auctore) est, detergit, aperit, purgatque eius infusum vel decoctum
 vltos humores, ad infusum parandum maior quātitas erit quatuor drachmarum.
 Myrobolani frigidi sicci primo excessu existunt, ipsorum substantia adstringit,
 meatus claudit, ipsius vero decoctum, vel infusum vi laxatoria præditum est,
 qua flauī (vulgo citrini vocati) purgant flauam bilem, nigri nigram, chepali vo-
 cati, emblici atque belerici pituitam: decoctum paratur ex drachmis quinque.
 At iam descendimus ad maiora seu efficaciora laxantia: Huiusmodi est scammo-
 nium, quod calefacit & siccāt supra tertium excessum, inflamat, mordicat, in-
 cidit, detergit, aperit, discutit, purgandoque flauam bilem laxat, datur à granis
 tribus vsque ad duodecim. Elleborus vero niger tertio quoque ordine calefacit,
 siccāt, extenuat, detergit valenterque exedit, educitq; flauam bilem atq; vltam,
 datur à scriptulo ad duos. Colocynthis eiusdem facultatis primæ videtur, proin-
 de extenuat, ac detergit valenter, aperit, discutit, pituitam aliosque crassos hu-
 mores efficacissime ducit, datur itidem à scriptulo vsq; ad geminum. Coccog-
 nidium, scilicet fructus Thymeleæ quarto excessu calefacit, siccāt idcircoque vrit,
 inflamat, vlcera, bilemque & pituitam subducendo valide laxat, neque ex-
 hibebitur plus quam ponderis quindecim granorum. Eiusdem plantæ folia
 eadem vi pollent laxatoria, qua valenter educunt etiam serosum humorem, vnde
 ad ascitum hydropem apud multos vsum habuerunt. hermodactilus, qui est radix
 cholchici Græcorum, in locis calidioribus, atque in vere ex terra effossa, eo præ-
 sertim tempore quo hæc planta folia, caules fructusque tulit, & non nisi in locis
 montuosis, folique planè expositis. huiusmodi radix (optima quæ in Aegypto
 habetur, vulgari officinarum duplo minor est) calida est sicca secundo excessu, di-
 gerit, detergit, purgatque pituitam crassam & lentam, puluis aromatibus corre-
 ctus datur à drachma, vsque ad duas. & in portione, vsque sex drachmas, deco-
 quunt, & robustis decoctum propinant. Succus cucumeris syluestris Græci e-
 latereon vocant est ex ijs, quæ calida sicca sunt secundi ordinis, quæque valenter
 incidit, extenuat, discutit, purgatque a granis duobus vsque ad quinque pitui-
 tam, atque aqueum humorem. Brassica marina eiusdem est temperamenti atq;
 laxatoriæ facultatis, fructus daphnoidis vocant piper montanum calidos siccosq;
 faciunt excessu tertio, inflamment, mordicant vlcera, liquant, lentamque
 pituitam educunt, si exhibeantur grana duodecim & vsque ad quindecim. eiusdē
 ferè facultatis esse visa est lathyrus (catapucia vulgo vocata) cum & ipsa eo-
 dem modo calefaciat, siccet, inflamet, vlcera, aperiat, seminaque à semiscrip-
 tulo ad scriptulum epota purgant valenter, bilem, pituitam atque serosas hu-
 miditates. Euphorbium longe calidius est, atque ita, vt multum inflamet,
 vlcera, aperiat, fundet, liquet, pituitamque crassam, lentam, & aqueum hu-
 morem valentissime purget, daturque a semiscriptulo ad scriptulum. Centau-
 rium minus calidum siccum secundo excessu esse statuunt, siccum tertio, ideoque
 valenter detergit, deobstruit, discutit, biliosaque crassa pituitosa, serosaque ex-
 crementa valenter subducit, puluis datur à drachma ad duas, & infusum, decoctū
 que paratur ex uncia una, & in robustis aliquando ex duabus uncis, atque hæc
 sunt pharmaca per ventrem purgantia, laxantiaque.

De medicamentis vomitoriis. Cap. X.

Methodici vomitum in morbis promouere familiarius quam aluum medicamentis consueverunt, namque hac euacuatione corpora adstricta atque tumentia maxime laxabant, itaque de vomitu cientibus, eoque modo laxantibus medicamentis fore, ut in presentia agamus, utile duximus. Exordiemur vero à clementissimis, & tutissimis, quæ sunt in primis aqua dulcis tepida, hoc quidem vomitorio constat. Etopum vsum fuisse, ut ab ipsius heri consensu deuorati ficus reijcerentur, alij addunt modicum aceti, alij syrupum acetosum, replent enim stomachum aqua tepida, & postea eam reuomentes purgantur, Aegyptij bis in mense tuenda sanitatis gratia in balneo vomunt ter quater, tantum aquæ in qua radix glizzirizæ ebullierit, & modicum seminum faniculorum assumentes, quantum stomachus continere potest, postea aqua tota reiecta maxime vomitione purgantur. Nonnulli hydrelæo, alij decocto corticis radicis raphani, alij agarici decocto, alij mulla dilutione vomitionem mouent. At hisce vomitorijs omisis ad medicamenta violenter vomitum cientia, descendam, quæ cum sint duplicis differentia, scilicet, quod quædam solummodo per vomitum purgant, & quædam cum vomitu, tum alui deiectione simul, hæc sunt, stibium præparatum, alari radix, glans vnguentaria, gratiola, genistæ flores & semina, elleborus albus, enicus, staphidis agria. Elleborus albus inter medicamenta vomitoria perpetuo apud omnes gentes præcipuum locum obtinuit, fuitque in vfu elleborismus idest purgatio per elleborum album admodum familiaris apud antiquos, ad morbos sanatu difficillimos tollendos, cuius quidem vfu complures ab affectibus ferè prorsus insanabilibus sanabantur, atque cito, & probe, vta: sanationes miracula viderentur: vnde olim antiquorum illorum medicorum laus insigniter augebatur. Nunc vero non sine agrotantium damno, atque magno artis medicæ dedecore, ipsius vsum apud omnes ferè medicos obsoleuit, qui nunc neque audent, neque sciunt, quomodo veratrum album exhibendum sit. obsoleuit inquam apud omnes ferè cuiusvis nationis medicos, non tamen apud eos sacerdotes qui vbique ferè locorum hac ætate profitentur mederi malis ferè omnibus sanatu rebellibus (quæ omnia dicunt à maleficijs ortum habere, idcircoque, sacris verbis sacrisque inunctionibus, atque alijs medicamentis ab ipsis excogitatis sanari). Isti vero fingunt olea sancta, quæ per os etiam exhibent, vel aquam aliquam itidem sanctam stillatitiam, vel paruissimam quædam catapocia, quæ omnia ferè, ut nos certificati sumus, radices veratri albi recipiunt. Hæc mirifice etiam ad dæmonio actos isti meritò laudant, atque præsertim ad malos (aiunt) spiritus a corporibus profugandos: Neque ipsi sentiuntur, quando hæc medicamenta non raro in corporibus multis, quæ per os assumpserunt, spiritus vel etiam optimos resolverint, vel suffocarint, subsecuta exinde illorum morte. Negandum tamen non est, quosdam illis medicamentis probè sanari, atque neque absque multa illorum sacerdotum laude. Itaque si elleborus albus rectè exhibeatur, atque primò corporibus paratis, scilicet laxatis stomachi partibus cum internis tum externis, internis quidè laxatorijs vel ex iuribus vel ex decoctis, vel ex oleis, vel ex hydrelæis: & externis ex fomentis, inunctionibus, laxatorijsque, de quibus nos posterius loquemur, atque hoc est, ut nos existimauimus, quod Hippocrates diuinus in aphorismis dixit: corpora cum quis purgare voluerit, primum fluida facere oportet. Quo non rectè Gal. in commentario dixisse vilus est, corpora fluida fieri, humoribus quidem purgandis præparatis, quod non inquit Hippocrates, qui dixit, non humores, at corpora quidem reddi fluida, ut facilius atque sine noxa medicamenti vim laxatoriam perferre possint, etenim periculum est, ne venæ, arteriæque nisi prius fuerint emollitæ, ab ea

in lib. 8. coll. 17.
la. p. 3.

ab ea medicamento vehementi agitatione, qua assidue partes violentè mouentur, agitantur, & vexantur, rumpantur, atque etiam ne homines suffocentur, nisi partes stomachi laxatæ facile educationi humorum copiosæ cedant. Merito itaque elleborus dandus solummodo est corporibus præparatis. Oribasius ex Herodoto de elleboro ita habet: Elleborus decoctus dari apud nos minimo periculo solet, eius apparandi hæc est ratio. Ellebori libram senis aquæ heminis triduo maceratam lento igni decoquimus vsque dum tertia pars aquæ consumpta sit, deinde elleborum, cum mellis heminas duas decocto addimus, itemque decoquimus donec non inquinet, ex hoc damus ijs, qui non admodum purgandi sunt. cochlearia duo: robustis vero mystri magnitudinem. Purgatio quæ per huiusmodi fit, neque strangulationis neque ullum aliud damnum quod nimia purgatio solet inducere, vnquam nobis attulit. Nonnulli ex recentioribus parant elleborum accipientes 3. l. s. vini dulcis, aromatici lib. 1. Thuris 3is, Hipperici 3i. sacchari 3ij, bulliant ad consumptionem medietatis. Cuius decocti dant uncias tres. Aliqui religiosi ebulliant elleborum in oleo, & oleum (vocantes ipsum benedictum) egrotis exhibent. quidam ciuis Bassanensis Patavium uxorem phreneticam conduxit, sibi persuasus ipsam ex magnis continuisque deliramentis obseruatis, demonibus vexari, sacerdotem in hac re magni nominis accersuit, cuius iussu mulieri propinato oleo sancto, ex vomituque concitato dictum incredibile est humorum variorum potissimumque biliosorum quantum eductum fuerit, scilicet ad plures libras: à qua purgatione postridie mulier expirauit. Non negandum tamen posse huiusmodi ellebori ex oleo præparationem, corpora facilius, & minus moleste (quod oleum vim ellebori acrem, & cathartica & obtundat & simul vnâ stomachi partes emolliat & laxet) ferre: Itaque albus elleborus præter vim purgatoriam, qua per vomitum purgat violentè omnes humores, calefacit etiam siccaturque ferè ad tertium excessum, incidit, extenuat, crassosque humores detergit, liquat, & mordicat. Asari radix, quæ eiusdem est temperamenti cum elleboro, purgat ellebori quoque modo per vomitum (Dioscoride auctore) bilem atque pituitam: datur eius puluis ex vino a drachma ad duas, & eius decoctum paratur ex geminis drachmis ad quatuor vsque ascendendo. Decoctum vero ex drachma paratum cum apio purgat per urinam. Cnicus vero scilicet seminis pulpa expressa, ad semunciam deuorata, per vomitum pituitam atque aqueum humorem purgat. Et pulpa glandis vnguentariæ eiusdem cum cnicu naturæ ad drachmas duas ex mulsa epota, pituitam crassam & lentam per vomitum itidem expellit. staphysagria vera, calida sicca tertio excessu est, extenuans, detergens, mordicansque, ad drachmam ex mulsa assumpta crassa crassam itidem pituitam educit. stibium vero præparatum, cuius laxatoriam facultatem recentioribus solummodo notam esse prorsusque veteribus ignotam, complures voluerunt, pondere quatuor granorum, sed felicius vinum aromaticum in quo stibium per diem manserit maceratum, probè percolatum, atque epotum vinum purgat per vomitum violentè omnes humores. Nonnullis præter vomitum etiam ventrem mouere solet. Genistæ flores, atque semina vim purgatoriam habent. si ad drachmam exhibeantur, vel si decoctum ex semuncia aut ex uncia seminum vel florum paratum exhibeatur, purgabit cum per vomitum tum per ventrem pituitam crassam. Gratiola demum quam aliqui esse centaureum minus antiquorum existimarunt, si ad drachmam ex vino exhibeatur, purgat violentè per uomitum, & per aluum bilem, atque pituitam.

De Errbi-

De Errhinis, apophlegmatismis atque bechicis laxatoriis.

Caput XI.

Medicamenta Græcis Errhina, nostris nasalia, & caputpurgia, laxantium præsidiorum genere Methodici quoque comprehenderunt, quinimo ea in familiari usu habuerunt. Neque iniuria, ut putamus, cum hisce medicamentis caput purgeretur, eiusque tumentia diminuatur. Horum vero, ut de catharticiis etiam dictum est, quædam per se educendo aut attrahendo ex capite humorem ipsum purgant, quædam non per se, sed vel laxando vel detergendo, vel expultricem mouendo. illa sunt vere cathartica, de quibus in superiori capite egimus, cuiusmodi est elleborus, scamonium, agaricus, & simile aliud ex vere laxatorijs. Hæc sunt exempli gratia, succus vel decoctum maluarum, Mercurialis, altheæ, hordei, lac, aqua dulcis tepida, & serum lactis, detergendo vero idem præstant, betæ succus vel decoctum, iridis, cyclamini, vnagalidis, foliorum hederæ, amaraci, cucumeris sylvestris, melanthij feminum, hyssopique Arabum, atque saluæ, detergendo vero & expultricem mouendo elleborus albus per nares purgat, prarmica, origanum, marum, sinapi, pyrettrum, thymus, piper, & alia similia, trita & in nares indita sternutamenta, mouendo purgant, idcircoque prarmica dicta sunt. & quæ liquida, errhina. Ex his quandoque composita parantur. ut si exempli causa pararetur decoctum errhinum, vel caputpurgium liquidum, accipientes radicis pyrettri vñ 3i, pulegij, origani, dictamni vñ m. i. agarici Th. 3ij, amaraci p. i. hisque omnibus in aquæ libra ebullitis, quoad pars tertia absumatur, additisque syrupi rosati laxatiui & mellis ros. laxatiui vn. 3iij. errhinum parabitur. ex simplicibus vero mitioribus in usu familiari sunt succus maluarum, amarici, hederæ, cyclamini, iridis, cucumeris sylvestris, brymiæ & similia. Atque hæc pauca de Errhinis, cum simplicibus, tum compositis nobis sufficiant. de quibus plura dicenda haud putauimus, cum pene innumeris fiat ex dogmaticis, qui de ipsis medicamentis accuratissime scripserunt, apud quos studiosi caputpurgia omnia, quibus ad morbos tollendos erit opus, discere poterunt. Idem idcirco de apophlegmatismis, vulgo masticatorijs appellatis, atque de bechicis faciendum duximus. satis quidem nobis erit, horum præsidiorum communia arguisse & permonstrasse, quando particularia omnia, quorum usus est ad medendum, apud omnes, qui de praxi scripserunt, possint cognosci. Itaque medicamenta quæ Græci apophlegmatismata vocarunt, omnia fere fuerunt, ad caput pituitosis excrementis purgandum, vnde vel gargarismata ex medicamentis vehementer calidis & acerbis parantur, scilicet decoctum quod in ore gargarizant. Cuiusmodi esset, quod pararetur in aqua vel vino, ex sinapi, pyretro, pipere, & similibus, hoc summe efficax erit ad pituitam purgandam. At solent hæc scilicet vehementer acra, ut pyrettrum, piper, sinapi, tenuissime trita ceræ masticæque permiscere, & ita massam parare, cuius modicum in ore continentes, dentibusque tractantes plurimum saluæ educunt. Hocque vehementer calidum & acrum proprium esse videtur, ut nimirum commansa saluam multam attrahant in os. Vnde de laserpitio, quod fuerat succus calidissimus & acerrimus, merito Dioscoridē scripsisse, putamus: Cyrenaicum si quis degustauerit, humorem toto corpore ciet. longe melius Serapio legisse visus est, qui dixit, laserpitium degustatum, scilicet cyrenaicum (quod omnium sit præstantissimum) saluam multam attrahere. Accedunt quoque bechica Græcis dicta, idest, illa quæ per eum excrementa educendo, seu purgando itidem laxant, hæc vero omnia sunt, quæ emolliunt, incidunt, extenuant, atque detergunt. Galenus dixit hæc calida esse oportere, moderateque sicca. Vehementer vero calida, vehementerque

N sicca

Lib. 3. de meth.
med. cap. 76.

ficca inepta sunt, vt pectoris, pulmonumque partes purgare queant. Quare omnia dulcia erunt bechicis medicamentis accommodata, vt saccharum, mel, sapa, melicratum ex fructibus iuiaba, sebasten, ficus, filiqua dulcis: ex medicamentis radix iridis, helerici, glizzirhize, & tussilago, violæ adiunctum, hyssopus Arabica, marrubium, & similia. habentur complura bechica composita, cuiusmodi est ecclema Grecis & loch Arabibus dictum, vt diacodion uocatum simplex Galeni, loch de psyllio, de pino, sanum vocatum, & expertum, de pulmone vulpis, de papauere, de praffio pauli, de scilla, de carthamo, arque cōplura alia recentioribus medicis maxime cognita.

De medicamentis per vesicam, atque per uterum euacuantibus. Cap. XII.

VRetica medicamenta, Græcis dicta, & latinis vrinalia, per renes atque per vesicam euacuando corpora laxare, neminem medicorum latet. Horum præcipua (auctore Galeno) sunt vehementer calida & ficca, vt cassia aromatica, cinamomum, meum, iris, & similia. quædam vero etiam frigida sunt, tenuioris essentię, vt semina melonum, cucurbitæ, cucumeris, maluarum, & similia. Quæ ex seminibus seu fructibus vrinam mouent, sunt semina ammeos, feniculi, apij, petroselinij, dauci cretici, sileris montani, erisimi, solatri vesicarij, bacce iuni-peri, semina melonum, anguriæ, cucumeris, cucurbitæ, & similia. ex folijs & floribus euacuant per vrinam cymæ, calaminthæ, mentastri, pulegij, origani, croci, fenecionis, sabinæ, abrotani & similia. Hæc enim dantur à drachma ad geminas drachmas tenuissime trita ex vino albo tenui, aut ex iisdem in mortario contusis: lac ex aqua fabacea, vel ex aqua anonidis, quæ cæteris præfertur ad mouendam vrinam, vel ex alia aqua vreticâ exprimitur, & ad uncias quatuor exhibetur: Ex radicibus efficax est, cassia aromatica, gingiber, Cyperus, Rusci radix, feniculi, asparagi, rubæ tinctorum, liquiritiæ, acori, asari, mei, phu vtriusque, spicæ celticæ, & schænanthi, hæc singula tenuissime trita ad drachmas geminas, epota ex aqua stillatitia vretica, vel ex vino albo, mouent efficacius vrinam; vel ex iisdem ipsis paratum in vino albo tenui decoctum. Apud plures decoctum quinque radicum in usu est, scilicet petroselinij, rusci, asparagi, apij, & feniculi, alij addunt modicum sabinæ foliorum, ex qua decocti vis vretica longe efficacior fit. Nonnulli accipiunt radicem cyperi rotundi vn. 3ij, zinziberis 3ij, in libra vini albi tenuis ebulliunt, quoad tertia pars absumatur, & reliquum calidum propinant. ex simplicibus vero vreticis aliqui pro secreto exhibent per os seminum erisimi tritorum ex eodem vino 3ij, temper salici cum successu: quidam non iniuria ad idem comendant aquam stillatitiam ex radicibus anonidis, raphani, & eryngij marini, pastinacæ itidem marinæ, acori itidem radicum, rubæ tinctorum, alka kengi fructuum, saninæ foliorum, scolopendriæque. Ex iisdem etiam medicamentis parant, cum olea, tum fomenta, tum emplastra, pubi & perineo calida adhibenda. Itaque ex oleis commendatur, rutaceum, anethinum, chamæmelinum, amigdalinum, Gliaceum, irinum, de scorpionibus de Keiri: ipso calido inungunt pubem, & perineum. ex fomentis autem ea commendantur, quæ ex althea, fenugreco, perdicio, chamæmelo, amaraco, artemesia, origano, calamento, sisimbrio, thymo, hyssopo, parantur. Contusas hæc herbas uel minutim incisas frigunt in sartagine cum oleo uel butyro calido, & adhibent, pubi atque perineo. Ad id uero cataplasma maxime efficax est, quod recipit raphani contusi, parietariæ, creffionis an. m. i. frigunt cum adipe suillo in sartagine, atque adhibent calidum pubi & perineo. parantur quoque fomenta ex illorum decocto

decocto in vino albo tenui, & infusiones non minus. Hæc de vrinilibus nobis dixisse sufficiet. Iam tempus suadet, vt ad ea, quæ vterum purgant, declinemus: sanè ea existunt, quæ & sanguinem seu menses educunt, & per vterum excrementa quoque expurgant, sanguinem seu menses mouent, quæ etiam vrinam mouere diximus, at menses mouentia vrinilibus longe calidiora, efficacioraque esse debent, cum sanguis ad vterum nulla ipsius visceris propria attractione attrahatur; aqueus vero humor à renibus attrahitur, ex quo vrinale euacuatorium longe fortius eo quod menses mouere debet, esse oportebit. Hinc mouendi menses provincia vsque adeo est difficilis, vt à medicamentis quidem per os deuoratis neuiquam sanguis aliquando profluat, ni etiam alijs eiusdem facultatis in vterum inditis, sanguiniseductio adiuuetur. Quamobrem res longe melius agatur si uel incessionibus vel fomentis, vel decoctis in ipsum vterum iniectis, vel pressis laxatorijs inditis ea purgatio procurabitur. Per os datur summa cum utilitate decoctum pulegij, Calaminthæ, & adianti recentissimi, cū saccharo. Quod si parabitur in vino albo tenui, præstabit magis. Aliqui pro secreto habent conseruam boraginis ex vino albo tenui dissolutam per os assumptam. Aliqui propinquant decoctum sabinæ, cum pulegio, & calamintha. Non pauci suffitus parant, ex medicamentis aromaticis, scilicet ex Cinnamomo, cassia aromatica, Caryophyllis, croco, nuce miristica, calamo vulgari aromatico acoro, & similib. quidā lotiones pedum magis commendant, paratas ex pulegij, calaminthæ, sabinæ, origani, mentastri & similib. decocto. Quidam magis pessus, ex hydromele cum scammonio, vel elleboro, vel colocynthide, vel agarico, vel elaterio, vel ciclamino, vel ex fructibus contusis cucumeris sylvestris & ex similibus paratos inditosq; in utrum commendant.

De presidijs, quæ sudorem mouendo, laxant.

Caput XIII.

INter medicamenta laxatoria, sudorifica appellata, primas partes habere videntur, quod copiam humorum in toto corporis habitu redundantium euacuent, atque idcirco in corporis partibus omnem tumentiam tollant, atque laxent. Hæc vero duplicis differentię sunt, quippè quod quædam sint interna, & quædam externa, nimirum quæ & per os interius assumuntur & quæ per exterius vsum habent. De internis sudorificis antiqui nobis pauca scripta reliquerunt, quandoquidem omnes externa sudorifica in vsum habuerunt. Interna sunt calida & sicca supra tertium excessum, tenuioris essentię. Qua facultate interius assumpta humores calefaciunt, extenuant, fundunt & liquant, atque aliquo externo calore coadiuuante, humorem ad cutem vehunt, & per sudorem euacuant: huiusmodi facultatis esse calamintham, chamæmelum, nepetam, origanum, pulegium, aristolochiam, cyclaminum, iuniperum, lignum indū, guaiacum, selsastras, chinam, salsam parillam, smilacem asperam, harundinem & similia, medici experientia cognouerunt. Quorum sanè decoctum ipsi ad mouendum sudorem habent in vsum familiari ad complures affectus sanandos. Verum non omnia quæ sudorem mouent, sunt vehementer calida, quando & mediocriter calida sufficiant ad eam faciendam euacuationem, vt radix chinæ, smilacis asperæ, salsæ parillæ, harundinisque & similib. Namque aqua vel etiam simplex frigida, in corpore vehementius incalefacta, sudorem mouet, quod medici in ijs, qui febre fynocha, aut ardenti cum magno caloris æstu vexantur, ab epota aqua multa vel etiam algida in æstate aliquando obleruant, scilicet, quod & Galenus quoque fatetur, eos in largum sudorem quandoq; ab ea epota aqua erumpere.

N 2 erumpere.

In 3. de sympt.
caus. cap. 2.

In 1. lib. simpl.

erumpere. Non raro etiam pituitana hordeacea sudorem mouere solet. Ceterum etsi hæc vera sint, non negandum tamen erit, sudorifica omnia, & calida & vehementer calida esse debere, eadem sane causa sudoris effectrix, cum interna tum externa vehemens caliditas est, à calore enim omnis sudor mouetur, vel à natura moueatur vel ab arte. A natura (licet Galenus dicat sudorem fieri aut humoris copia, aut tenuitate, aut corporis raritate) perpetuo sudores à calore vel naturali vel præternaturali concitantur; hinc in febribus solent à calore erumpere copiosi sudores, & copiosiores, quo calor febrilis sit vehementior atque efficacior, ut in quartanis febribus fit, quarum calor cum sit magis quam in alijs febribus efficax, in ipsarum statu & declinatione (quo tempore humores crassi sunt maxime extenuati) copiosissimos sudores fundit. Eodem quoque modo complures dormientes, quod ex somno corpora interius plurimum calefiunt, sudant, cuius quidem causa est calor naturalis auctus. Excipiuntur à sudoribus, madores & desudationes vocatæ, quæ sunt absque ullo calore, cute nimis laxata, ut in moribundis fit, carnis (ut Galenus docet) retentrice extincta, ac sublata, unde in ipsis non sudores, sed madores apparent. Addo, ex sudorificis externis, certo deprehendi à calore sudores fieri, cum omnibus notum sit, homines vel in calido hypocausto, vel in tina, quam olim latini & baptisterium, & labrum appellarunt, vel igne indito, aut in eo suffitibus calidis, aut vaporibus calidis excitatis homines sudare. Quare caliditas insignis cum interna tum externa sudorem mouere apta est, vel cum siccitate, vel cum caliditate coniuncta existat. unde sudorifica omnia erunt vehementer calida: Neque est, ut aliquis dicat, aquam uel etiam frigidam, decoctum chinæ, harundinis, & aliorum medicamentorum, quæ non sunt facultate uel calida, uel non uehementer calida, sudorem ciere: hæc namque non quatenus frigida, sed quatenus calida proprie sudorifica dicuntur. Etenim ex Galeno etiam aqua simplex, quæ frigida est, incalefacta calefacit. Itaque ex ijs decocta parata cum actu calida exhibeantur, intusque etiam calefiant, adiuvante calore externo, mirum non est, si sudorifica euadant. An vero hæc sint sicca uel humida? profecto sudorifica interna actu quæ humida sunt, facilius sudorem mouent, quam sicca, si vero actu humida, facultate etiam sicca sint, longe facilius itidem sudorem mouebunt, externa sudorifica uehementer calida sunt, quæ uel sunt sicca (quibus ij vtuntur qui pro inueterata lue gallica sudorem mouere volunt) uel humida, scilicet quæ in mitioribus malis tollendis usum habent, etiam in corporibus calidis siccis, habitusque gracilis, quibus cum sicca nocua sint, humida idcirco maxime utilia erunt. Huiusmodique naturæ sunt medicamenta sudorifica. Quorum usus erit, vel in hypocausto vel in clibano, vel in tina seu in labro ligneo, seu in dolio oblongo. In quo vel ignitis carbonibus positis, vel ferreis laminis, vel lapidibus molaribus vel pyritis ignitis, aspersisque decocto herbarum vi discussoria præditarum aer ad sudorem mouendum incalefit: aut decocto itidem facultatis humectatoriæ, refrigeratoriæque, ut in corporibus gracilibus & siccis, atque in affectibus calidis atque siccis, cuiusmodi est impetigo, elephantiasis & similes alij affectus. unde in ijs, suffitibus ex decocto maluarum, violarum, althææ & similibus, paratis, loca in quibus sudandum est, calefieri debent. atque hæc caliditas externa sudorificum est, sine quo sudor non promouebitur. sunt aliqui qui in lectulo calido stragulis cooperti, ab epoto sudorifico facile sudant. sudorifica vero sunt ex simplicibus, medicamentis, calamintha, chamæmelum, pulegium, cyclaminus, aristolochia, chamedrys, dictamnus, origanum, lignum indum, guaiacum, sessaphras, iuniperus, laurus, similia aspera, chyna, harundo, & similia: Parant in aqua decoctum, quod ad decem uncias calidum propinant, hominesque stragulis calidis contegunt vel præuocis dorso & omnibus partibus corporis ex oleo actu, facultateque calido cum leui frictione.

Quo

Quo præsidio febres periodicae sanatu difficillimæ abiguntur, scilicet ab interno sudorifico ante accessionem per duas horas calido exhibito, & præfricato præuocatoque corpore, ut dictum est, sudore copiosius prouocato. ex compositis sudorificis complura sunt in usu, cum interna tum externa, ex internis, sunt in usu decocta ex calamintha, chamæmelo & ciclamino parata: ut si (exempli gratia) tale decoctum pararetur, quod recipit, cymarum, calaminthæ montanæ, chamæmeli un. p. ij, radices cyclamini ziiij, vel florum cyclamini itidem. p. ij, bulliant in libra aquæ ad consumptionem tertiæ partis, & decoctum percolatum calidum exhibeatur, & stragulis calidis in lectulo cooperiantur, post mediumque horæ calidum hypocaustum, vel tinam, seu dolium calidum ingrediatur. vel accipe calaminthæ p. ij, radices harundinis sicca minutim incisæ ziiij, bulliant in libra aquæ ad consumptionem tertiæ partis, & percolatū hoc decoctum ijs calidū nos propinamus. Variæ et portiones sudorificæ medicis huius ætatis sunt notissime, quæ parantur ex ligno indo, vel guaiaco vel ex salsa parilla vel ex china radice, quæ portiones ad luem gallicam expugnandam maxime commendantur; quarum erit omnium efficacissima nimirum, quæ accipit ligni indi raspati, zis. corticis ligni zij. salsæ parillæ minutim incisæ ziiij, aquæ communis lib. iii. calaminthæ montanæ p. iij, macerentur spacio horarum XXIII. & lento igne ebulliant ad consumptionem medietatis. & colentur: dosisque erit ad zviij. Mitius sudorificum erit, quod paratur ex radice chinæ minutim incisæ, radices harundinis & ligni indi un. ziiij. in libris duabus aquæ decoquitur quoad tertia pars, uel medietas absumatur. Nonnulli huiusmodi sudorificum calidum epotum plurimum cōmendant. quod recipit decocti milij ziiij, vini albi aromatici zij. calidum propinent. parant vero decoctum milij, decoquentes milium à corticibus mundatis zij. in libra aquæ, quoad ipsum milium aperiatur. & percolatum decoctum exhibent. Apud Gal. fuit ad sudorem mouendum olim antidotus Athanasia appellata quæ parabatur accipiendo croci, spicæ, nardi, un. zij, cinamomi, cassiæ lignæ, myrrhæ, iunci odorati, un. zj. omnibus tritis, melleq; exceptis electuariū parabatur. cuius quidem medici olim exhibebant ad febrem magnitudinem, & hominem calidis stragulis cooperiebant, ut sudaret, verum facilius succedet si duplicata dosi exhibeatur, & superbibatur decocti calidi calaminthæ zvj. hæc de internis sufficiant. Raro antiqui internis sudorificis utebantur, quod solis externis sudores large & commodè moueri possent. Inter externa hoc Gal. commendasse visus est ad finiendas febres cum sudore: quod recipit olei, cinnamomi, chamæmeli, un. zij, fol. lauri, p. ii, natri ziiij, aceti zij, bulliant, quoad acetum absumatur, atque hoc calido cum leui frictione inungitur dorsum, & omnes partes corporis. Quidam suffitus parant, conspersis vel lapidibus ignitis, vel ferreis laminibus itidem ignitis vel carbonibus accensis pulueribus, qui ex aromaribus parantur, ijsque in tinâ doliari sudorem mouent. Alij ad luem gallicam sudore expugnandam, hoc suffitu vtuntur, quem parant accipientes cinnabaris mineralis zij, thuris masculi zj, galliæ muscatæ zj, omnibus contritis, carbonibusque vel lapidibus ignitis conspersis triduo suffiuntur. Indiæ Gomoræ gentes luem gallicam sudore finiunt, suffitu ex folio Magney, vulgo herbariorum aloes feminæ, minutim inciso, atque in vase vitreato clauso decocto parato, per osq; angustum eius fumo suscepto, in sudorem ijs largissimum quo sanantur funduntur. sudare vero homines aut in lectulo calidis stragulis contextos obseruamus, vel in hypocausto vndique conclusos, vel capite excluso, vel in doliari vaporario, quod tinam labrum & baptisterium antiqui appellarunt. In hoc ipso dolio qui sudant, aut calore ignis vtuntur, quem ignitis carbonibus intropositis faciunt, aut suffitu calido ex multa aqua calida, in dolium proiecta, eo tamen artificio, ne sudaturos tangat, vel ex lebetæ aquam ebullientem continentē, quidam alij tinam stragulis coopertam calefaciunt,

Gal. in 8. comp.
med. loc. cap. 7e

ciunt, aspergentes decocto ex herbis opportunis parato lapides ignitos aut ferreas laminas candentes. Quidam alij sudare ægrotos student in capsâ lignea, hominis longitudinis vndique stragulis clausa, in qua decumbit ægrotus vndiq; (capite excepto, quod extra capsulam manet) stragulis clausus. Quod vaporarium multi in capite extremo iuxta pedes eorum, qui vt sudent, decumbunt, igne repolito calefaciunt. Nonnulli etiam in clibano extracto igne vndique clausi sudant. cuius sudationis meminit Aetius, ad virus rubetæ discutiendum. sudare in multis morbis adstrictis est vtile, nimirum ad febres putridas, periodicasq; ad tumores externos digerendos, ad conuulsos non ab exiccatis nervosis partibus, ad hydropicos, ad articulares dolores, ad luem veneream atque ad alios affectus, de quibus posterius, cum de ipsorum curatione sermonem instituerimus, accuratius itidem agemus.

De balneis laxatorijs ad morbos adstrictos tollendos.

Caput XIV.

Quantopere balneorum laxantium vsus ad quamplures adstrictos morbos tollendos vtilis sit, non est, vt multis nobis persuadeatur, cum istuc omnibus medicis praxim facientibus sit manifestissimum. Per balneum intelligimus corpora in aquam demergi dulcem calidam, quæ erit temperate calida, Galenus distinxit, facultates aquæ ex vario temperamento, namque frigidam refrigerare ait, tepidam modice itidem refrigerare & humectare, temperate calidam moderate calefacere, humectare, & iusto calidiorem ipsam multum calefacere, & non humectare. Balnea vero laxatoria moderate calida sunt, quo temperamento corpora calefaciunt, humectant, aperiunt, attenuant, digerunt, vrinam, aluum, sudoremque mouent, dolores mitigant atque alia huiuscemodi opera faciunt. Vnde mirum non est, si ad complures adstrictos morbos sint utilissima, atque apud antiquos fuerint in frequentissimo vsu præsertimque ad febres tollendas, qui vsus veteribus medicis notissimus in multis Italiæ locis nunc ferè omnino obsoleuit. Cleophrantus Antiquis, siue medicus non in omnibus balneo utebatur, At Asclepiades longe in balneorum vsu fuit Cleophranto audacior. Hoc vnum verum erit, quod balnea dulcia temperate calida in multis morbis atque in multis symptomatibus vtilissima sunt. Ad febres quidem diarrhias omnes, ad putridas biliosas, cum intermittentes tum continuas, atque ad alias putridas, vbi aliquod non subsit viscus inflammatum, vel aliqua pars debilis atque (vt aiunt Dogmatici) non nisi etiam euacuato prius corpore apparentibusque in vrinis signis concoctionis: atque ad hæcticas non minus. Ad omnes itidem lassitudines cum tensiuis, tum inflammatorias, tum vlcerosas, quod digerendo balnea tensionem laxent, atque inflammationem non minus tollunt, & biliosum acutumq; humorem vlcerosam lassitudinem fouentem digerunt, humiditateque acrimoniam humoris heberant. conferunt itidem dulcia balnea præmissa corporis totius euacuatione, (ex Dogmaticorum sententia) ad dolorem capitis, ad hæmicraniam, ad phrenitimque sed vtiliora sunt tepida, quod digerant, atque humectent, qua ratione ipsis maxime iuuatos vidimus plures melancholicos, maniacos, atque furiosos. In quibus morbis solent medici præter balneum, in quod (capite excepto) totum corpus immergunt, etiam stillicidium supra futuram capitis coronalem dictam eiusdem tepidæ aquæ commendare; quod præsidium plurimum illis conferre, non est mirum, cum capitis partem laram, scilicet cerebrum respiciat, atque maxime ipsam laxando, digerendoque in ipso humorem contentum, vel vaporem iuuat. Ad conuulsiones à siccatione ortas, vtilissimum est prædictum

prædictum balneum, quod plurimum humectet, ad oculorū item dolores, (Hippocrate etiam auctore) atque ad tabem quoque. Ad anginam priuatim post principium exterius ab Archigone commendabatur, multosque Aetius ex ipsis balneis plurimum iuuatos se vidisse scripsit. Ad icterum vero balnea prædicta ab omnibus medicis maxime commendantur. & ad calculos in renibus, ad suppressos menses atque ad similes alios affectus. Hactenus de laxatorio balneo, quod aqua dulci temperate calida paratur. Parantur vero quandoque ex hydraleo, ex oleo, atque ex lacte. Ex arte factis compositisque balneis, quædam ex aqua, in qua medicamentis emollientibus decocta sint, commendari solent. emollientia autem medicamenta sunt althea, malua, chamæmelum, fenugrecum, linum, cucumer sylvestris, melilotus, & similia; Quædam parantur ex decocto digerentium medicamentorum, cuiusmodi est, iridis radix, cyclamini, acori, phuseniculi, apij, asari, & similia, & ex herbis, origanum, calamentha, mentastrum, stecas, pulegium, dictamnium, thymus, anethum, ruta, thymbra, saluia & similes aliæ. Semina etiam huic negotio accommodata, hæcerunt, scilicet apij, petroselinum, feniculi, anisi, fileris montani, dauci, ammeos, cardamomi & similia. Ad hæc balnea pertinent quoque, fomenta cum emollientia, tum digerentia, epithemata, infusiones, & similia præsidia; inunctiones itidem ex oleis temperate calidis, vel discussorijs, laudantur. post balnea arte facta, restant naturalia, idest, quæ ex natura fiunt, quæque medici & mineralia, & thermalia vocant, huiusmodi erunt bituminosa atque sulphurea, quæ vim habent emollientem, & digerentem vnde innumeris fere morbis adstrictis vtilia sunt. At cum de his complures viri dignissimi eruditissime scripserint, nihil aliud scribam ad eos sanè viros doctissimos, scilicet ad Falopium, ad Baccium atque ad alios lubens medicæ studiosos remittens.

De præsidijs Metasyncriticis Cap. XV.

Medicamenta Græcis Metasyncritica vocata, ab Aureliano recorporatiua vocata, apud plerosque antiquorum in vsu fuerunt, ad omnes (vt Oribasius est auctor) diutissime inueteratos morbos, cum cætera auxilia nihil profecerint, hæc quidem medicamenta emplastra fuerunt, ex valde calidis acerbisque medicamentis parata, cuiusmodi fuit sinapismus, vel quod ex euphorbio, vel ex thapsia vel ex alio simili medicamento parabatur. Horū vsus Dogmatici quem admodum in morbis frigidis atque humidis satis commendarunt, ita in calidis atque siccis plurimum damnarunt. Methodici vero cum in calidis siccisque tum in frigidis humidisque morbis adstrictis indiscriminatim his medicamentis utebantur, quod, hæc plurimum ad omnem antiquatam meatuum stricturam tollendam valerent. vnde Thessalus etiam in cute antiquo vlcere vexata sinapismum (Galeno auctore) commendauit, ea fortasse de causa, quoniam & cutis, & caro ferè indurata, liuoreque ac duritie acta, insignem in meatibus stricturam patiatur, qua caloris transpiratione prohibita, eius sanitas vitatur. Dogmatici hunc morbum vitiatam intemperiem, qua pars cachexia laborat, vitiatoque habitu, dicunt. Quam intemperiem, & cachexiam cum metasyncritica, idest medicamenta vehementer calida & acria, non solum ruborem inducentia, at quin etiam exulcerationem, absumant, scilicet optimum sanguinem attrahendo vitiatumque digerendo & vacuando, pristinum cum temperamentum tum habitum illis partibus restituant. Dogmatici (vt dictum etiam est) in morbis iisdem, sed à frigida humidaque causa, minime autem à calida atque sicca obortis, Metasyncriticorum medicamentorum vsus complexi fuerunt. Cæterum

Lib. 10. collect.
medici. cap. 41.

(ait

(ait Oribasius) qui affectus dignoscere non possunt, ad eiusmodi medicamenta, veluti (vt aiunt) ad sacram anchoram confugiunt, & sæpe id quod opus est, efficiunt, quia plerosque homines eiusmodi affectiones, ob malam & vitiatam victus rationem infectant. Non cognoscunt sæpe hos affectus, quoniam apparet apertissime sæpius in quapiam parte corporis loca ex aliqua causa insignem meatuum stricturam patientia, non iuuari neque medicamentis quibuslibet calidis neque frigidis, neque siccis, neque humidis, vel tumorem adimentibus vel vlcus consolidantibus. Cum vero metasyncritica vehementi caliditate aperiendo, ac optimum sanguinem apertis meatibus, quo pars læsa nutriatur, attrahendo, vitiatumque digerendo atque euacuando, partem ad optimum meatuum statum restituunt, mirum non est, si praua illa intemperies, quæ malum habitum partis fouet, restituatur, vnde Methodici ijs in antiquatis affectibus, scilicet in dolore capitis antiquo, in conuulsis, in tumentibus, in resolutis, in membris atrophica & macie laborantibus & in alijs similibus affectibus vti solebant. hæc medicamenta (vt dictum est) ex medicamentis acrisbus rubefaciuntibus, atque vesicæ etiam concitantibus parantur. Antiqui, cum opus fuerat vehementi metasyncritico, parabant ipsum, accipientes (exempli gratia) caricum pridictum calida aqua maceratarum, & expressarum ʒij, sinapi optimi puluerizati ʒiij contusis in mortario caricibus, & misto sinapi massam parabant. Alij ex euphorbio, thapsia, piretro, clematide vrent cum fermento eadem parare medicamenta solent, vel cum caricibus contusis hæc permiscentes parabant, itaque si vehemens metasyncriticum desideraretur, hoc profecto esset, quod recipit caricum in tepida aqua per diem maceratarum (expressa ab ipsis aqua) exempli gratia ʒi, euphorbij pul. Thapsiæ radices, vel succi vn. ʒiij, sinapi itidem pul. pyretri, un. 3. v. Contusis caricibus ceterisque tenuissime tritis, & exceptis simul massa paratur ad vsum. Adhibent hæc medicamenta cuti, & detinent aliquot quoad ipsa inflammetur, & rubescat, vel quoad pustulæ excitentur. Fugiant omnes à cantharidibus, quoniam etiam exterius adhibere solent in vesica inflammationem ventris, tormina atque sanguinis profluuium inducere, etenim illarum deleteria à calore actiua facultas etiam ab extremis partibus ad vesicam, cui et rota substantia aduersatur, fertur, eamque grauiter lædit. Detracto medicamento ad leniendum partis dolorem, utebantur antiqui vel rosaceo, vel amygdalino oleo, vel succo foliorum maluarum. Hac ætate inungunt chyrurgi partem butyro recenti, folium brassicæ superponentes & hæc de metasyncriticis.

De præsiidijs in communi. Cap. XVI.

POSTeaquam de laxatorijs præsiidijs & in communi & in particulari egimus, restat, vt de adstrictorijs quoque loquamur, siquidem & hæc scitu nobis sunt necessaria ad laxos morbos tollendos. De his vero scribentes, ab aeris qualitate primum exordimur, qui aer erit frigidus, & obscurus, meatus enim a frigido aere densantur, coniuuentque, non minusque etiam ab obscuro, crasso, hoc quidem spiritus & humores in corporibus incrassantur, conseruanturque veluti à caliditate & celeritate aeris & digeruntur, & euacuantur. Cibus debet esse multus, multique nutrimenti, frigidus siccus, substantiæ etiam non tenuis crassæ, facultatisque adstrictoriæ ficcantis: vnde panem tostum in cibo Methodici, carnemque assam dabant. vtrum vero simplex, vel compositus cibus variusue conueniat, haud plane deliberatum fuisse constat, cum aliquibus visum sit, cibum varium replere magis & tumentia atque adstricta fovere, quod eo appetentia plus excitata homines plus nutrimenti assument, alij simplicem conuenientiorē esse

esse voluerunt, cuius opinionis Celsus fuisse est visus. Potus itidem debet esse multum nutrens, cuiusmodi est vinum nigrum, crassæ substantiæ, atque austerrum. Quies vero & ocium ad laxos affectus est accommodatissimum, veluti motus in corporibus, humores digerendo, & vapores. resoluendo, tumentia tollunt. ex animi quoque passionibus, timor, mærorque adstrictum fouent, & ira, etsi per se non adstringat, tamen fundendo, & mouendo humores, plerunque morbum adstrictum facere solet, quippè partibus corporis humorum fluxione tumentibus, atque in adstrictum venientibus. si de somno loquamur, frequens & multus, non consuetus & naturalis adstrictum fouet. cutem adstrictam balnea frigida, vel adstringentia faciunt, & augent, quo Galenus meritorè quosdam qui natauerant in aquis adstringentibus, cuiusmodi est marina, aluminosa, & Calchantodis, in febrem synocha incurrisse scribit. Non semel & nos quoque multos, post narrationem in marina aqua, febre correptos vidimus, eosque præsertim, quorum corpora fuliginibus multis abundabant, hi quidem facillimi esse solent, vt ex quacunque causa adstrictoria, meatibus cutis coniuuentibus, in febrem delabantur. Cuiusmodi olim fuisse Andream Auriam Iuniorem Ioan. Andream Auriam Principis filium in pueritia, meminimus, quem synocha non putrida à narratione in mari, vexatum non semel præ manibus curandum lanuæ habuimus. atque hæc sunt præsidia adstrictoria in victus ratione obseruata. Quæ Celsus perbelle ita expressit: Contra vero si corpus profluat, sudor coerendus: quies adhibenda erit tenebris, somnoque quandocunque volet, vtendum. non nisi leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, vbi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces aut præcordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. si vero sudor exercet, duranda cutis est, vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id vitium est, oleo corpus inungendum est, si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem flore æger est, cum venit in balneum, prius vngendus, deinde in solium demittendus est. si in cute vitium est, frigida quoque quam calida aqua melius vtetur, vbi ad cibum ventum est, dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam minime corrumpi possit; panis tostus, caro assa, vinum asperum, vel subausterum, si venter profluat, calidum, si sudores nocent, vomitusque sunt, frigidum. Cæterum his præmissis, ratio expostulat, vt ad singularia medicamenta, quorum perpetuo fuit vsus ad astringendum, descendamus.

In lib. 3. cap. 6.

De medicamentis adstrictoriis in particulari.

Caput XVII.

Medicamenta adstrictoria cum ex triplici materia depromantur, scilicet ex stirpibus, ex animalibus, atque ex fossilibus. Ex stirpibus adstringunt, rosa, absinthium, myrti folia, & fructus, acaciæ Aegyptiacæ flores, folia atque fructus, necnon ex ipsis succus expressus, qui præcipue in vsu semper fuit ad affectus laxatorios, ex plantis vero plantago commendatur verbascum, polygonum sanguinella, dicta tantopere ab Alex. Tralliano ad spurum sanguinis concelebrata. equisetum hippuris & cauda equina dictum, oleæ cum folia tum fructus immaturi, citus, atque hypocistis, licium, lentiscus, myrtus, Oxianthæ Theophrasti fructus, cum etiam à Matthiolo creditæ fructus mirifice adstringunt, pruni sylvestris fructus, pyra syluestria, mala cydonia, mala granata acerba, ipsorum fructuum cortex, puramen, citinus & nuclei. balauftia omnia cum orientalia tum Italica. ligustri folia & fructus; phyllitis, rumex cruentus, sanguis draconis officinarum, laurus

O thinnus,

thinus, folia scilicet atque fructus, alaterni folia, mespili cum aroniae tum fetoniae fructus atque semina, cornua immatura, enanthe, idest, vitis sylvestris, vuarum semina racemique. Ex animalibus pauca sunt ad vsum medicinae adstringentia cognita, vt coagulum, vngues, & pili praesertim leporini. Ex fossilibus vero, plura sunt: ex aquis enim omnes salsae, calchantodes, aluminosa, ferreae valenter adstringunt, ex succis vero concretis, calchantum alumen, chalcitis, gipsum, ex terris, samia, selinusia, lemnia, cretica, rubrica sinopica, quam nos alias demonstrauimus esse bolum armenum Galeni, rubrica fabrilis, creta & similes aliae. Torque sunt medicamenta adstrictoria quae morbis laxis seu profluis remedio esse possunt. Nunc de medicamentis, quae mixtam vim cum laxantem tum adstringentem habent, agimus.

De medicamentis facultatem mixtam ex adstricto atque ex laxo habentibus. Cap. XVIII.

In lib. 1. cap. 4.

Non possum non vehementer admirari Galenum in libris de medicamentorum compositione secundum genera, Thessalum Methodicum maxime reprehendentem, vt qui negauerit dari medicamentum mixtum, ex contrariis potentibus, potissimumque ex facultate adstrictoria atque laxatoria, cum necessario Methodicos omnes illud ex ipsorum methodi placitis voluisse, eo argumento intelligatur, quod dogma illorum fuerit praecipuum, vt dentur morbi adstricti, laxi, atque mixti ex adstricto & ex laxo, si concedebant dari morbos mixtos ex adstricto & ex laxo, atque hosce morbos per se omnes curationem indicare, verum quoque erit dari medicamenta mixtarum facultatum ex adstricta atque laxa facultate: profecto si morbus adstrictus indicat laxandum, & laxus adstringendum, cur mixtus ex laxo & adstricto affectus medicamenti mixtam facultatem ex laxo & adstricto, haud indicabit? Huiusmodi vero medicamenta ex simplicibus erunt, exempli gratia, chamamelum, quod praeter laxatoriam vim etiam modicum adstrictionis habeat, Melilotus, rosa, absinthium, aloë, cichoreum, senecio, hyeraceum, chondrilla, pentaphyllum, hederæ, carpopalladium, xiloballadium, opoballadium, cinnamomum, cassia aromatica, spica cum Indica tum celtica, phu cum magnum tum paruum; ex medicamentis etiam purgatorijs, Rhabarbarum, rhaponticum, tamarendi, pruni myrabolani, & alia similia, ex quibus, atque ex alijs simpliciter laxatorijs, & adstrictorijs poterunt parari composita medicamenta, maxime ad affectum mixtum ex laxo & adstricto accommodata. Verum enim vero cum Galenus vir summæ in medicina auctoritatis apertissime loco superius citato & alibi damnauerit Thessalios medicos, qui negarint dari medicamenta composita vel à natura vel ab arte habentia contrarias facultates, ijsque omnibus simul in parte agentia, ita vt simul exempli gratia in parte inflammata digerant, atque partem roborent, non dubitabimus Methodicos illius fuisse sententiae, quod in vna eadem parte cum dari morbum mixtum ex adstricto & laxo noluerint, ita negasse dari medicamenta agentia simul in eadem parte laxatorijs adstrictorijsque facultatibus. siquidem in omni phlegmone vel tumore morbis adstrictis, vtendum putarint nudis laxatorijs. Quod vero alio modo detur morbus mixtus ex laxo & adstricto, hoc fuisse demonstrauimus vnum ex ipsorum praecipuis dogmatis. At de hac re alias accuratius Deo fauente agemus.

Finis Libri Tertij.

PROSPE-

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER QVARTVS.

*Agitur ex Methodicis de medicina parte prophylactice, &
primo in quibus eam obseruari.* Cap. I.



Vm hæcenus de Methodicorum dogmatis ad medendi methodum constituendam abunde scripserimus, præstabit, vt nos, priusquam ad particulares affectus cum adstrictos tum laxos curâdos accedamus, de ea medicinæ parte, quam prophylacticam Græci, & nostri præseruatiuam appellant, aliquid etiam agamus. De qua auctor libri medici vocari ait: Iam vero præter quatuor chyrgorum communitates est & species, quam *προφυλακτικὴν*, idest præseruatricem appellant. Apponitur autem & ipsa, vt communitas in deleterijs & toxicis, bestijsque omnibus, quæ virus inspuunt, tum venenosis volatilibus, & terrestribus aquatilibusque. Nam commune omnium genus, vt sint exitialia, non tamen ad adstrictum & fluens referuntur, sed aliud est præter hæc genus. quare & curatoria ipsorum communitas alia præter illam habetur, dicta prophylactice. Ex quibus colligitur Methodicos vlos quoque fuisse præseruatione, non tamen in omnibus ijs, in quibus dogmatici. siquidem constat solummodo eos præseruatricem fecisse non in tuenda valetudine ab ijs affectibus, in quos corpora ob prauam victus rationem delabuntur, sed vt eadem tuerentur a veneno, vel quod ex medicamentis deleterijs provenit, aut quod à feris bestijsque venenatis morfu vel ictu communicatur. Ipsorum vero communitas est, vt etiam alias dictum est, quod venena morsus & ictus venenati sint exitialia, & propterea ipsa indicare medicamenta cum alexipharmaca, tum alexiteria, quorum vsu corpora præseruanda esse voluerunt. Quod vero hæc ipsi voluerint, vel eo solo argumento facile cognoscitur, quoniam Methodici cum in alijs multis, tum maxime in medicamentorum facultatibus atque vsu cum alijs medicorum sectis planè conuenerunt. Ceterum illam communitatem præseruatoriam, nimirum quod venena & morsus ictusque ferarum venenosarum sint exitialia, & proinde indicare ea medicamenta, quæ ab exitio præseruant, qualia sunt (consentientibus omnibus medicorum sectis) quæ Græcis alexipharmaca & alexiteria & nostris antidota appellantur, eo libentius obseruandam hanc duxerunt, vt ab insidijs venenorum homines defenderent, omniumque maxime imperatores, reges atque principes, quibus non raro ex ea causa miserandos casus euenire obseruarent. Accedit etiam Methodicos ob id fortasse solummodo venenorum, bestiarumque venenosarum morsuum & ictuum præseruationem æstimauisse, minime vero eam, quæ alios affectus & à praua victus ratione & à quibuslibet alijs causis proficiscentes complectitur, quoniam ab hisce affectibus corpora tueri, ac præseruari posse haud ita certè, & tuto intelligerent, Atque etiam quod visum illis non fuerit hanc præseruationem omnino esse necessariam, uti est illa, quæ præuisionem

O 2 à venenis

a venenis atque a venenatis moribus vel ictibus respicit. si hæc negligere-
tur, certum mortis periculum frequentius compluribus hominibus impende-
re videbant.

*An possit constitui methodus tuenda sanitatis ex Methodico-
rum dogmatis. Cap. II.*

Diximus non constare apud medicos methodicos olim fuisse in usu sanitatis
præseruationem, ab illis præsertim malis, quæ ex mala victus ratione, atque
ab extrinsecus incidentibus causis excitari solent, quanquam & Romanos &
alias gentes huic studio incubuisse maxime constet, ex usu cum frictionum, tum
exercitationum tum balneorum, quibus complures gentes assiduæ pro tuenda
valitudine operam dabant. An vero Methodici hanc medicinæ partem prophylacti-
cæ, quæ corpora tueretur ab ijs affectibus, qui (vt dictum est) cum a prano
victu tum ab alijs extrinsecus occurrentibus causis ortum habent, haud planè
constat. quemadmodum eam, de ijs affectibus, quos cum venena vel per os as-
sumpta, vel quomodolibet corporibus adhibita, tum bestia venenosæ morfu vel
ictu inducunt, eos plurimi fecisse atque in usu habuisse, superius ostendimus.
Vtrum verò ex Methodicorum placitis queat methodus constitui, qua corpora
ab omnibus malis præseruentur, haud esse impossibile, duximus. Namque, vt
ex Dogmaticis Galenus docuit, sanitas in corporibus aut incolumis seruetur, aut
vitio laborat, hæc medicamentis pristino statui restitui debet, & illa penitus
conseruari; conseruabitur sanè ex ijs causis, quas ob id Galenus conseruatrices
vocat quatenus eæ affectus adstrictos atque laxos respiciunt, scilicet aut fouent,
aut adimunt. Corpus sanè illud sanum esse dicemus, in quo naturalis siue mode-
rata symmetria meatuum seruetur, addimus cum externorum tum internorum
quando ipsorum vitium seu vitiata symmetria morbum faciat. Hæc vero sym-
metria erit, aut omnibus numeris absoluta, aut aliquantum a perfectissima defi-
ciens, itaque quis non deprehendet vtramque posse conseruari & tueri, remotis ijs
singulis, quæ valent aut meatus magis uel laxare uel constringere; quod maxi-
me fiet in ea, quæ perfecta est, At non minus etiam in ea, quæ ad quoddam vitium
inclinat, etsi quod sanitas quoque sit, nullus morbus exinde promoueat. Nam-
que exempli causa, si corporis meatus quippiam ad adstrictum inclinauerint, por-
terunt adhibentes usum leuiter laxantium, illud vitium ita corrigere, ut ij ad per-
fectiorem uel minus uitiosam symmetriam facile reducantur. Atque eodem iti-
dem modo si aliqui laxiores parentioresque euaserint, usu contrariorum scilicet
adstringentium, ad salubriorem statum reducuntur. sanitas uerò, quæ in meatuum
perfecta & absoluta symmetria fundatur, & consistit, similibus omnino, ut Dog-
matici quoque uoluerunt, erit conseruanda. Exempli gratia sit puer boni cor-
poris habitus, omnino meatus cum externos tum internos habens liberos, a que
mediocriter laxos seu amplos, idcirco perfecta gaudens sanitate, similibus erit
conseruandus; quippe ijs, quæ laxare apta nata sunt, ueluti a contrarijs erit ar-
cendus, atque defendendus. siquidem aer temperate calidus maxime conseruare
aptus erit ipsius sanitatem, contra frigidus, qui aptus est meatus angustiores red-
dere, eius sanitati detrimento erit. sic etiam ex cibis atque ex potibus, qui tempe-
rate calidi sunt & humidi, substantiæ tenuis, minimæ crassæ uel lentæ, uim habe-
bunt internorum meatuum symmetriam conseruandi. Contra illam uitiabunt ex
cibis atque ex potibus, qui frigidi sunt, substantiæ crassæ uel uiscidæ, qua possunt
meatus infarciri atque obstrui. Quamobrem non dubium erit, corporum sani-
tatem posse etiam ex Methodicorum placitis methodo constituta, conseruari
atque

atque rueri, at quomodo hoc ipsum præstandum sit, posterius dicemus. Nunc de prophylactice, quam ipsi cum ut à venenis, tum à bestiis ferisque venenosis homines præcauerent, exercuerunt, agendum est.

*An homines præseruari possint à venenis, atque à morsibus
ictibusque ferarum venenosarum. Cap. III.*

Fortasse Reges, Principes, atque alij cuiusvis conditionis homines neque à venenis poterunt præseruari, tanta hac ætate hominum prauitas est, ut nulla via hominem ad quodecunque malum perpetrandum lateat. ac, ut Dioscorides ait, qui clam venena exhibere volunt, ita insidias temperare, ut peritissimum quemque decipiant. Theophrastus scribit Thrasyā Mantinensem in venenorum studio peritissimū, tale venenū cōperisse, ut facile, & absque ullo dolore inferre obitum posset. si est venenorum cum copiam tū varietatē spectemus, hoc profecto negociū præseruationis futurū maxime difficile indicabimus, cū ubique locorum, & gentiū venena reperiri queant, atque etiam aliqua vsque adeo plerisque occulta, ita multis familiaria sint, ut ipsorum complura homines assidue & pedibus contingant & oculi videant. Neque est, ut reges pincernis, atque ijs, qui prægustant dapes fidere queant, cum ab ipsis multis in modis decipiantur. primum non est tutum prandentibus & cœnantibus regibus, ut vinum dapesque tunc, ab ijs prægustentur, consultius quidem fecissent, si antequam vel prandium facerent, vel cœnarent, ad minus per duas vel tres horas vina & dapes ab illis prægustatas sedulo obseruassent. Quo profecto tempore venena omnia actiuata in corporibus esse solent. hoc errore quoque plæbei omnes ferè, maximeque mulierculæ duci solent, quæ si fungos fortè esitaturæ sint, tunc modicum panis imbuti in iure fungorum canibus vel felibus mandendum proijciunt, quem si non comederint, timeant ne fungi venenati sint, at cum paulum temporis expectarint, canemque vel fœlem ab eo deuorato illæsum viderint, fungos & ipsæ absque ullo timore comedunt, unde non expectato exitu in tempore opportuno, quo venenum solet in corporibus actuari sæpius multi magnum ex fungorum esu vitæ discrimen subierunt. At neque etiam pincernis & dapum prægustatoribus, si in tempore quoque vinum & dapes prægustauerint, reges fidere oportebit, siquidem aut antidoto quapiam assumpta, aut aliquo alio cibo quouis modo alexipharmaco vorato, tutò vinum venenatum, atque dapes venenatas prægustare poterunt, nihilo enim ipsi vi antidoti assumpti à veneno lædentur. aut enim vi antidoti vis veneni irrita reddetur, & præsertim quia & parum degustarint, & illud quoque partis superioris, in qua minus veneni est, cum maiori ex parte resideat. aut ij prius stomacho cibis ad id opportunis repleto (cuiusmodi sunt iura pingua, lac, pinguedinesque omnes) venenum assumptum per plures horas sine vlla læsione ferre possunt, ita ut regum principumque, quos veneno interimere vinò uel dapibus uenenatis consilium est, prægustatores finito prandio uel cœna, domum reuersi unà cum voratis cibis etiam uenenum assumptum euomant. Hoc circumforanei sedulo facere solent, ipsorumque non paucos sæpius absque ullo incommodo fecisse scimus, ut ignaris hominibus persuaderent, se aduersus omnia uenena secretum habere: Quod ut persuadeant, priusquam domo egrediantur, iuribus pinguibus, cuiusmodi sunt, quæ à decoctis ueruecis intestinis, uel ex capite fiunt, uel lacte, uel maluarum decocto unà cum copioso butyro facto, stomachum replent, mox in aspectum hominum prodeunt, atque paulopost, præmissis admirandis laudibus sui medicamenti alexipharmaci uendendi, modicum cuiusvis ueneni per os coram auditoribus, spectatoribusque assument ac post

*In libro 6. de re
medica cap.
In 9. de hist. pa-
lunt. cap. 18.*

post ipsum, suum medicamentum quoque per os assumunt, à quo cum nullam per id temporis læsionem sentiant, maxime propterea ab omnibus admirantur, atque exinde persuadentur, circumforaneos habere contra omnia venena alexipharmacum præstantissimum, atque ita ex ipsis emuncta pecunia, domum reuertuntur, digitisque intra os positis cum cibis venenum vomitione reijciunt. Quibus omnibus venenorum præcautio admodum difficilis videtur, haud parumque incerta. Quemadmodum etiam non minus difficile æstimatur, homines à reptilium, ceterarumque bestiarum venenosarum veneno tueri posse, cum ubique locorum & bestiarum venenatarum sint, quæ vel morfu vel ictu venenum communicant corporibus. Veruntamen, etsi hæc præseruatio hæc propositas habeat difficultates, ea, quæ faciunt ad præseruationem cum venenorum, tum bestiarum venenosarum in medium afferemus.

De ijs, quæ faciunt ad præseruationem à venenis.

Caput. IV.

PLura quidem faciunt ad homines à venenis præseruandos, quorum quædam ad ipsos pertinere videntur, quædam in supellestilibus considerantur, & alia in quibusdam medicamentis præsens venenum prodentibus, & maxime vi alexipharmaca venenis aduersantibus. Debent profectò pontifices, imperatores, reges, atque principes, qui solent maxime à venenis timere (vt vitam securam, tranquillamque ducere queant) esse optimi christiani, iusti, perliberales, nullis officere, omnibus auxilio esse, & tales esse vt ab omnibus amentur, colantur, venerationeque, qui ita sunt, proculdubio vtrumque in latus ocioso dormire possunt, absque vllò venenorum timore. namque qui ipsis seruiunt assidue pro ipsorum salute vigilant. Debent insuper viros, qui ipsis seruiant, habere nobiles, fideles, nullis vitijs addictos, iustos, & religiosos. his enim Reges & principes maxime fidere possunt. Contra temere faciunt, qui vitam seruis tutandam ignobilibus non religiosis, atque vitiosis committunt: namque ni ab ipsis frequentius infidie instruantur, mirabile erit. Debent non minus principes medicos habere apud ipsos medicinam facturos, qui in rerum naturalium studio, præsertimque in venenorum cognitione sint exercitatissimi. vt & ipsos à venenis præcauere, & veneno infectos opportunis medicamentis sanare sciant. Atque hæc curare primum principes ijs debebunt, qui à venenis præseruari cupiunt. Secundo loco ad idem assequendum in supellestilibus cura, ne forte aliquo modo subsit venenum, sedulo habenda erit, omniumque maxime in culina: hæc aut subditi custodienda est, aut in loco vndique clauso, & contexto. In ipsa omnia vasa planè clausa, contextaque seruari oportebit, præsertimque vinaria, olearia, aquearia, & coquinaria: quando sæpe ex laquearibus animalcula cadant, quæ vinum, vel oleum, vel aquam, vel denique ferculum in olla, veneno afficere solent, huiusmodi sunt araneorum quidam, phalangia, scorpiones, eruce nigre & similia. Nicolaus Florentinus narrat olim Florentiæ Cænobijs quorundam Monachorum ferè omnimodam dissolutionem ab simili causa se vidisse, scilicet compluribus monachis ferculo ex araneo nigro, qui in ollam ebullientem ex laquearibus deciderat, interemptis. scimus nos non paucos, qui brassicam decoctam cum erucis viridibus quas vulgus langos vocat, comederant, grauiter fuisse ex veneno læsos. serpentes vini quoque, vt Aristoteles est auctor, incontinentes sunt. vnde viperas ait quosdam vino cum fistilibus ad sepes disposito venari, quod ebriæ capiantur. Quamobrem serpentes vini odore, in dolia & in alia vasa vinaria facile descendunt, vique suffocantur, ex quo vinum venenosam qualitatē suscipere, est necessarium, qua

qua illos, qui eo ad potum vsi sunt, grauiter lœdit, licet quibusdam morbis sanatu difficillimis remedio sit. Galenus scribit huiusmodi vinum leprosos sanare experientia in multis deprehensum fuisse, unde vsus carniū viperarum ad eosdem affectus incepit. Abhinc non plures annos Ferrarię, dolium vino plenum in cella vinaria ciuis cuiuspiam, cum sine operculo apertum diu fuisset, compluribus serpentibus ex ijs, quos vulgus angues & anzas appellat, reple- tum est, serpentesque a vino suffocati, in eo putrefacti sunt. Quo vino cognitum est, innumeros a chronicis febribus difficillimisque vexatos, qui eo vsi fuerant, sanatos fuisse: primus ex ijs ægrotis, cum vinum alicubi non inuenisset, quod ipsi placeret, rogauit ciuem illum diuitem, qui solitus esset uaria uinorum ge- nera habere, ut vinum aliquod ei mitteret, quod eius gustui gratum fore putaret, ille ex eo (ignarus planè quod in eo essent serpentes mortui) quod ceteris melius iudicasset, misit ægrotis, quod cum tere gustui omnium acceptissimum uisum fue- rit, eoque usus fuisset ægrotus paucissimis diebus prorsus a morbo conualuit. alij itidem complures huiusce optimi uini fama suasi, cum ex eo paucos dies bibissent, itidem sanati sunt, & post hos alij itidem eodem modo ferè innumeri. Quare ui- ni dominus exinde commotus, & uehementer quidem illius uini cum gustum optimum, tum facultatem, qua omnes ægroti sanabantur, admiratus, huiusce rei causam ut sciret, uinum è dolio totum eduxit, quo educto serpentes complures semiputridi inuenti rem manifestam planè fecerunt. Addimus nos etiam, qua- dam animalia, licet uenenata non sint, cuiusmodi sunt mures, lacerte, canes, & alia huiusmodi, quorum caro uel in uino, uel in oleo, uel in aqua usque adeo ali- quando putrescit, ut liquorem pessima qualitate afficiant. Hinc deprehensum est, aquas aliquando pureorum uel fluminum a rebus putridis, aut a ueneno quopiam uenenata qualitate infici. Hasce calamitates non raro sentiunt urbes atque oppi- da ab inimico exercitu obfessa. Non omitram aquam putri aliqua re infectam, posse inter alia mala ijs, qui ea in potu utuntur, febrem putridam concitare. Quo morbo principem quendam ab ea causa longo tempore laborasse ab Auen- zoare cognitum fuit, qui in aqua, quę in uase quodam ad principis usum conser- uabatur, frustum carnis omnino putridę dedita opera positum inuenit, unde mu- tata aqua princeps conualuit. Addo etiam lubens, in quibusdam locis, scilicet opacis, & humidis, usque adeo nasci copiosius, & promptius cicutam, ut si pe- troselini vulgaris semina terre committantur, maiori ex parte cicuta nascatur, quę recenter nata, ita uulgari petroselino est similis, ut uel etiam eruditos de- cipiat, Quo caueant coqui in condiendis cibis, ne hanc pro folijs petroselini accipiant. Bis me ancilla eo cicuta ueneno affecit, quę ad quosdam pisces co- quendos folia cicutę loco foliorum petroselini acceperat, & piscis ius condi- uerat. Demum, qui riment a uenenis, debent cauere a iusculis & a ferculis co- loratoribus redditis, tum conditis odoribus, & saporibus dulcibus, quando faci- le in ijs uenena occultentur: a succis suspectis, scilicet a succo lactucę (auctore Galeno in 3. de temp. c. 4.) a succo porri. Plinius Melam uirum equestris ordinis a deuoratis tribus drachmis succi porrorum sine dolore expirasse, posteritati tra- didit. Caueant homines a carnibus putridis, ab anguillis & piscibus suspec- tis de ueneno. Caueant maxime a fungis: His Claudium imperatorem ab Agrip- pina fuisse uenenatum in historijs constat: a locis pessimi aeris, ab aquis uitiolis, atque etiam ne dormiant sub umbra nucis iuglandis, neque sub taxo, aut sub pi- no aut sub buxo arbore. Aer quidem iuxta hasce arbores instar ueneni lœdit.

De medi.

*De medicamentis, quæ præsens venenum prodere creduntur,
atque de alijs quouis modo à venenis præseruan-
tibus. Caput V.*

Quidam putant cornu, quod linguam serpentis vocant (quod perperam ali-
qui putarunt esse cerasus serpentis) præsentem veneno sudare, & lapidem
præsum, vulgo plasma dictum colorem & splendorem, si venenum præsens sit
amittere. Quod & lapillum rubetæ seu ranæ terrestris aureo anulo ita insertum,
ut digitum aliquo modo tangat, si præsens adfuerit venenum, eam digiti cutem
quam tangit, instar carbonis accensi inurere dicitur. De adamante scribunt
ipsum gestatum sinistro brachio inter humerum atque cubitum adnexum, om-
nium profecto venenorum vim irritam reddere. Rhasis in lib. 2. continentis scri-
bit ex Sarach, qui timent venenum collo gestent aut smaragdum aut præsum.
Plinius tradidit, stellam marinam illitam sanguine vulpino limini superiori aut
clauo æreo ianuæ affixam, venena prohibere. Albertus Magnus lapidem Echi-
tem vocatum (vulgo etiam aquilinum) tantam vim contra venena habere scrip-
psit, ut supposito cibi venenati non possint degluti, eoque sublato deglutian-
tur. Alij aiunt accensam candelam positam super pedem dextrum vulturis in-
star candelabrum, præsentem veneno extingui. & vas ex electro fossili factum, si
contineat venenum, stridere, atque vas itidem ex aurichalco, quo principes
ad potum utuntur, si venenum habeat, in varios mutari colores. Pittacū auent
deprehensum est præsentem veneno præter consuetum exclamare atque voci ferare.
His addunt alij imagines & characteres præcauentes à venenis. Sanè imaginem
serpentarij cum suis stellis in quopiam lapide precioso insculptam aduersus cup-
eta venena vtilissime gestari Albertus Magnus posteris tradidit. Petrus Aponon-
sis ait idem facere hominem genibus flexis serpente cinctum, cuius caput dextra
teneat, caudam sinistra in lapide hæmatite sculptum aureo annulo gestatum.
Hæc facientia ad præseruationem à venenis proposuimus, & longe plura his si-
milis proposuissimus, si certo fore illis fidendum credidissimus; fatemur nos
prædictorum certam cognitionem minime assecutos, sed tamen ipsa in præsentia
non omittenda duximus, quod à viris alioquin celeberrimis fuerint posterorum
memoriæ tradita. At de illis modo agamus, quæ certe omnes medici sciunt
maxime à venenis præseruare posse. ex innumeris ferè ad hanc rem à multis co-
gnitis, & litterarum monumentis traditis, præcipua feligam, eaque solummo-
do adnotabo; & primo simplicia, Hæc vero sunt, nuges iuglandes stomacho ie-
iuno deuoratæ, anchusa, lysimachia, ruta, qua fortasse ad præcauendum à vene-
nis nihil vtilius. De hac Atheneus in 3. Deypn. scribit, olim, quod Archelaus
Ponti Rex consueuerit suos populos veneno interimere, eos ob id à quibusdam
perdoctos consueuisse quotidie, antequam domo egrederentur, rutam edere,
atque ita seipsum defendisse à tirāni crudelitate. Betonica item trita & ex vino ad-
geminas drachmas epota maxime præseruat. Nonnulli hanc ipsam vel etiam so-
lummmodo gestatam idem præstare affirmarunt. Non minoris ad id efficaciæ fen-
culus esse deprehensus est, cum ipsius radix, tum folia, tum semina. post ipsum
calamintha, atque serpillum magnis laudibus euehuntur. Allium summopere
aduersus omnia venena celebratur. Quod particularim Galenus in epidemijs
confirmauit. Efficacissimum quidem allium est aduersus omnia venena exitia-
lia medicamentum, præsertimque contra frigida, atque putrefacientia. Diosco-
rides cedromela, idest citria, præsertimque semina, vim contra venena præstan-
tissimam habere, atque Arabes etiam omnium maxime tradiderunt; citriorum
vero succus acidus parcius magis ad putrefacientia, & cortices ad frigida. com-
mendantur

Serapio Aber
Mesuay.

In 6. epid. sect.
6. comm. 5.

mendantur itidem ab omnibus semina napi ex vino, radix raphani, smilacis asperæ folia, atque fructus; Terram lemniam Galenus inquit experientia didicisse, ad cantharides, & lepus marinum ita præstare, ut proprietate quadam terra hæc deuorata per vomitum omne venenū expellat. Bolus item Armenus est ad præseruandum à venenis vtilissimus, non minus quam sint lapides bezoartici, omnes qui in certis Indicis generantur. Auellanas ieiuno stomacho deuoratas & pistachia ex vino decocta præseruare etiam à venenis deprehensum est. Taraxacum item artemisiæ, distamnium creticum, abrotanum, crisimi semina, eryngij radicem, nardum celticam, marrubium, laserpitium, peucedani radicem, & succum, aristolochiam longam, rutæ sylvestris semen, castoreum, polium, baccas iuniperi & innumera alia, quæ breuitati studens omitto, à veneno præseruare comperitum est. Hæc enim ex vino quotidie ad drachmam & semis deuorata possunt homines proculdubio à venenis præseruare. Atque hæc ex simplicibus alexipharmacis nobis sufficiant. Nunc ad quædam etiam composita descendimus, quæ efficaciori vi prædita ad præcauendum à venenis multi cognouerunt. Inter quæ primo loco nobis occurrit medicamentum ex ficibus siccis, nucibus iuglandibus, folijs rutæ, atque ex sale paratum; hoc quidem omnes cum Græci tum Arabes tum latini ex veteribus maximis laudibus ad præcauendum à venenis profecuti fuerunt. Dioscorides in præfatione libri sexti de re medica. & in 2. libro yposiston, quod ex nucibus, ficibus, & rutæ folijs paratur, plurimum commendauit. Galenus in lib. 2. de aliment. facultatibus ex ficibus siccis, & nucibus tantum paratum laudat, cui in libro de succorum bonit. & vitio, folia rutæ addidit. Paulus vero ex Galeno parat ipsum, ex folijs rutæ siccat drachmis (exempli gratia) viginti, nucibus duabus, salis & ficus siccat singulorum drachma media. Omnibus in mortario contusis fit massa, quam nucis iuglandis magnitudine ex vino adhibent. Aëtius tamen ex Theodoro hanc antidotum sic parari scripsit: Similimum quod accipit nucum iuglandium vnciam, ficuum pinguium sextantem, sesami seminum itidem vnciam, atque ex alijs additur foliorum rutæ triens. Ex Arabibus Auenenna ita hanc parari antidotum scribit, scilicet, quæ recipit, rutæ siccat drachmas XX. nucum iuglandium drachmas duas, salis & ficuum siccatarum singul. drachmas quinque. hoc quidem Rhasis ita parandum censuit: Accipit nucum mundatarum vnciam, salis, foliorum rutæ singulorum drachmam & semis, ficuum albarum quantum sat sit ad commixtionem. Quod medicamentum æque laudatum est ab Auenzoare, Auerrhoe, & omnibus alijs medicis Arabibus. hoc vero quomodocumque paratum, semper erit maxime proficuum.

De quo medicamento Plinius ita scripsit: In Sanctuarijs Mithridatis maximi regis deuicti Cn. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & rutæ folijs viginti simul tritis, addito salis grano, & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illa die: de quo etiam Macer.

Cap. 146.
Cap.

In lib. 13. c. 462

In li. 4. sen. 6. c. 1

In lib. 8. ad Almens. cap. 1.

In lib. 23. hist. natur. cap. 8.

Hoc Mithridates Rex Ponti sepe probauit,

Qui rutæ folijs viginti cum sale pauco

Et magnis nucibus binis caricisque duabus

Ieiunus vici confurgens mane solebat.

His addidit Dioscorides magnum Mithridatium, ad differentiā minoris, quo nomine appellat prædictum, quæ ex ficibus, nucibus atque ruta paratur. Antidotum è scineo, Theriacamque magnam. longe plura sunt recentioribus inuenta, quæ cum sint omnibus nota, lubens prætereo. Atque hæc de medicamentis ad præseruandos homines à venenis.

De ijs, quæ præservant à reptilibus, serpentibus, atq; ab alijs omnibus bestiis venenatis. Cap. VI.

Methodum cognosci, quæ possint homines ab omnibus bestiis, ferisque venenatis præcaueri, omnibus vtilissimum est, illisque maxime, qui in locis remotis nauigant, exterarumque regiones perlustrant, quique subdiu noctu dormire coguntur, non minusque & versari in locis venenosis feris scatentibus. Ab ijs itaque præcauebunt, si & studio vtantur, ne primum loca, quæ bestiis venenosis abundant, habitent, atque etiam medicamenta, quæ quouis modo ab ipsarum bestiarum veneno defendunt, si probè cognita habuerint. Ex quibus quædam per os assumpta id præstant. & quædam igne accensa fuffitu, odoreque fuggant omnes feras venenatas: & aliqua substrata idem faciunt; nonnulla etiam solummodo gestata. Et aliqua quoque tuebuntur corpora ab iisdem feris, si ex ipsis medicamentis inunctiones parabuntur, atque ipsis corpora illinentur. Nunc vero ea medicamenta proponamus, quæ per os assumpta singularem vim ad præcauendum præferunt, atque à simplicibus exordiamur. Inter hæc præclare id præstant spinæ albæ femina ad geminam drachmam trita & ex vino pota: Anchusæ item atque pastinacæ radix eodem modo assumpta, ius polij ad uncias quinque, nec non scordeum ex vino itidem exhibitum, vtrumque dictamnium, cum creticum, tum album in officinis vocatum. Gentianæ itidem radix trita ad geminam drachmam ex vino pota, triphyllum aspalrites, tragoriganum, atque origanum. de quo Macer:

„ Nidor combusta serpentes effugat omnes,

„ Et quod vis animal infundens ore venenum.

„ Hoc ideo miscere cibis messoribus est mos,

„ Vt se forte sopor fessos depresserit illos.

„ Vermibus à nocuis tuto requiescere possint.

Iridis radix trita atque pota idem præstabit, & acorus, nardus celtica, cinnamomum, cassia aromatica, opobalsamum, phu radix, itidemque helenij, bdellium, baccae iuniperi, & platani fructus virides. succus foliorum fraxini, decoctum foliorum paliuri, viticis femina, coagula plura, præferimque ceruinum, atque leporinum, succus porrorum ex melle epotus, lapides bezaartici vocati ex vino ad sex grana epoti, terra lemnia, in officinis sigillata dicta (Galeno auctore) præservat à venenis, terraque item Melita, quam vulgus terram sancti Pauli appellat. Hæc de simplicibus medicamentis alexiterijs, nobis sufficiant, nunc ad composita descendimus. Primum locum perpetuo obtinuit Theriaca magna, Mithridatium. atque alterum Mithridatium, quod (Plinio auctore) deuictio Mithridate fuit repertum in eius Sanctuarijs, & Galenus hanc antidotum retulit in Apollonium murem. Hanc ipsam fieri superius quoque diximus ex duabus nucibus siccis, & totidem ficis, & rutæ folijs viginti, addito grano salis. hanc merito cæteris omnibus omnes præferunt contra venena, & contra ferarum venenorum virus. est & antidotus Hippocratis, quæ, vt Actuarius est auctor, Athenas à peste liberavit. Antidotus Eldræ tantopere ad venenatorum ictus concelebrata, datur in vino fabæ magnitudine, & etiam ad venena nucis ponticæ magnitudine. Vtraque antidotus descripta est, apud Actuarium. est & Theriaca diatesaron dicta, quæ paratur ex aristolochiæ, gentianæ, baccarum lauri, & myrrhæ æquis portionibus. Paratur pulvis, qui ad drachmam & semis in vino datur. Non minoris efficacæ erit etiam antidotus Asclepiadis, quæ componitur ex terræ lemnæ, & baccarum lauri æquis portionibus, tritisque ex melle paratur. bibitur nucis ponicæ magnitudine ex aquæ mulæ cyathis duabus. huic addimus antidotum

*In lib. 5. cap. de
antidotis.
Ibidem.
In lib. 5. cap. 6.*

antidotum medici Betarnem Siciliae, quae in medicinis expertis Galeno tribuitur legitur, ipsiusque vim aduersus venena complures experientia comprobarunt. haec vero recipit foliorum laureolae, luri sigillati, phu men, apij, cinnamomi an. 3. i. ruta, xilobalsami, carpobalsami an. 3. ij, tritis ex melle paratur electuariū, cuius drachinae duae dantur fortibus, & sesqui dragma debilibus. Antidotus item ex sanguinibus Gal. non erit omittenda. Non omittā et antidotū praestantissimā ab Antiocho Syriae Rege in Aesculapij templo olim aduersus ferarū venenū dicatū. Parabatur. n. triphylli asphaltites, opoponacis, serpilli an. 3. v. anisorū sem. feniculi, vinei atq; apij an. 3. x. farinae orobi vnc. i. haec trita in pastillos efformantur, qui sint adpondus scriptulorū quinque, qua quantitate Antiochus ex vini vncijs quatuor & semis vti solebat. Ex recentioribus etiā, est antidotus Moibani, oleum de scorpionibus compositum multorum, & praesertim Andreae Matthioli & aliorum, quae breuitati studentes libenter omittimus. Nonnulli quibusdam solummodo gestatis ita fidant, vt credant praeseruari a morfu, & ictu ferarum venenosarum seiplos posse. ex quibus haec praecipua ab ijs aestimata fuerunt. scilicet dentes canini, quibus gestatis vis a Plinio & ab alijs tribuitur praecauēdi homines a reptilibus serpentibus atque ab alijs feris venenosis. Coagulum ceruinum manibus contriectatum homines per diem securos reddit, a bestiarum venenosarum iniurijs. Officula quoque in ceruorum corde inuenta (quae idcirco ossa de corde cerui officinae vocant) gestata idem praestare multis est persuasum, haecque Alexander Benedictus ad praeseruandum a bestiarum venenosarum moribus & ictibus plurimum commendauit. & Plinius dauci radicem gestatam, atque draconticuli etiam non minus. Ex lapidibus quoque gagatem Constantinus in Geoponicis tradidit. Plinius cor vulturis atque iecur gestari vtiliter scribit. longe his efficaciora sunt, quae igne accensa & suffitu ex ipsis parato, odore reptilia, serpentes atque alias feras a nobis arcent. Cuiusmodi ex Dioscoride est abrotanum accensum scilicet igne, viticisque itidem igne accensa folia, flores, atque etiam fructus idem efficacius praestant, item nasturtium, calamintha, cornu ceruinum, serpillum, scordeum, peucedani radix, atque semina, polium, opoponax, galbana, assa fetida, lapis gages vocatus, melanthium, iuniperi baccae gentianae radix, dictamnium creticum, atque album dictum; Alibi addidit Dioscorides ad suffitu fugandos serpentes, atque ceteras feras venenatas, bdellium, bitumen, castoreum, sagapenum, cardamomum atque cedri ramenta. Nicander his addidit cornu caprinum, libanotidem, sulphur, galbanum, atque vriticam. Haec quidem igne accensa, reptilia omnia, serpentes, & alias bestias venenosas, quam longissime fugant. ex compositis suffitibus efficax est, qui paratur ex radice lilij, cornu ceruino vngueque caprae aequis portionibus. Pastilli etiam ad idem praestandum hi maxime a Nicandro commendantur, nimirum ipsis ex igne accensis suffitu parato. Qui componuntur ex assae fetidae melanthij, galbanae, cornu ceruini, hyssopi, sulphuris, radice peucedani, pyretri, vnguuium, caprarum aequis portionibus, ex quibus tritis ex aceto formantur pastilli, quibus in ignem coniectis suffitus fit maxime efficax. Florentinus in Geoponicis scripsit: nunquam fera venenata accessura, vbi adeps ceruinus, aut radix centaurei maioris, aut lapis gages, aut dictamnium creticum, aut aquilae vel milui fimus cum styrace mixtus suffiatur. Galenus ait, pyretum, sulphur, cornu ceruinum pinguedinem & pulmonem asini accensum ac suffitum efficaciter cuncta animalia venenosa fugare. Archigenes laudauit vngulas caprarum atque pilos igne accensos. est & Stratonis suffumigium, maxime ab omnibus confirmatum, quod recipit galbanam, radicis cachryos, cornu cerui, melanthijs an. partes aequales, quibus tritis ex aceto pastilli formantur, atque cum eo vti velis oleo madesfacito, igneque accendito. Auicenna laudat hunc pastillum, qui recipit, styracis, cornu ceruini, melanthij atque

P 2 bituminis,

In 2. sporillon.
cap. 197.

In lib. de mod. facili parabil ad Solonem. c. 59.

In 13. de agri-
cultura ex Flori-
simo, cap. 8.

bituminis, quibus tritis & mixtis ignis aspergendus est. Plinius ex simplicibus addidit allium crematum, nepetam, cunilaginem, adipem canis rabidi, capillos mulierum, filicem, artemisiam, ebulum, cyclamen, iuniperum, ramos malorum puniceorum, ceruinum cornu, coagulum, sanguinemque ceruorum: caprarum cornu, ungulam, pilos, coagulum leporis. & Constantinus inquit: Qui vero iam sunt, abiguntur radice lilij, aut cornu ceruini aut ungularum caprinarum suffitu. omne autem reptile fugabis si laferis succum (quem assam facidam esse nos aliquando demonstraui) & nigellam & galbanum, & cerui cornu & hyssopum, & sulphur & pyretum, & peucedanum & ungulas caprarum miscueris, deinde triueris, & acetum acre affuderis, factisque inde pilulis paruis fumum & vaporem excitaueris. Q. Serenus de his ita habet:

„Vis & mirificos cauius perdiscere odores,

„Accensis quibus arceatur teterrima serpens

„Aut styracem vras, aut atris vulturis alams,

„Vel nepetam aut frondem rigida, stirpemque myrica

Sed age dicamus etiam inunctiones, quibus corpora inuncta, a venenosorum animalium iniurijs defenduntur. Ex Dioscoride constat medullam ceruinam inunctam id efficacissime prestare atque etiam non minus ipsum adipem ceruinum, atque etiam elephanthinum. Erucis quoque in oleo tritis inunctos non posse a serpentibus lacerari, plures affirmant, idem faciet adeps leonis sanguisque seris corpora illinantur. coagulum item leporinum manibus solummodo (Plinio auctore) ita statum. Cedri baccae ex Nicandro tritae, ac conyza, peucedanum, & saluia in oleo decocta, succusque herbae dracontiae, scilicet ari radice. Constantinus in Geoponicis laudaraphani succum, idem facit baccharum iuniperi itidem luccus, assa fetida in oleo dissoluta, succus baccharum lauri & succus vitis nigrae. compositas duas inunctiones ad id prestandum habuit Nicander. Prima fiebat pastillis in hunc modum paratis. Accipe duos ramulos abrotani, nasturtij pondus oboli, seminum dauci manipulum, quibus omnibus in mortario tritis cum oleo, vel adipe ceruino fiunt pastilli, quibus uti debent ij, qui timent a serpentibus. Altera inunctio componitur ex duobus serpentibus, per quos ferè omnes viperas intelligunt. Accipit autem duas viperas, medullam cerui drachmas triginta, vnguenti rosati libras tres, cum vncijs decem, olei oliuarum crudi lib. tres, cetæ vncias vndecim, quibus mixtis fiat vnguentum ad ignem, sed serpentes seorsum ebulliant, quoad caro ab ossibus separatur, ossibusque exemptis, atque capitibus & caudis per quatuor digitos obtruncatis, ex carneque ipsorum alijs medicamentis mixta paratur vnguentum quo inuncti poterunt vna cum serpentibus conuersari. Auicenna ad idem laudauit cerebrum leporis ex aceto & oleo dissolutum; styracem itidem ex oleo dissolutum, oleum folijs pini, aut baccis iuniperi alteratum. folia itidem viticis, abrotani, in oleo macerata, assa fetida, asphodeli radix trita ex oleo. ex compositis etiam commendauit, quod accepit florum pini p. i, radice mandragoræ p. ij, hyosciami albi sem. p. iij, tritis & ex oleo mixtis fit vng. atque etiam quod accipit baccharum iuniperi, p. ij, styracis gummi p. i, cum oleo tritis. Complura quoque medicamenta substrata prohibent, ne reptilia, serpentes, ac alia animalia venenosa accedant. Vnde mirabilis erit cautela a venenosis bestiis, quando sternitur in cubiculi circuitu, sisimbrium, santonicum, abrotanum, conyza, dictamnium, vitex, calaminta, echium, solanum, asphodelus, peucedanum, hypericum, polium, origanum, ruta sylvestris, serpillus, laurus, pulgium, melanthium, bitumenque. Aelianus scribit: in Atheniensium Thesmophorij Atticæ mulieres agni folia cubilibus substernebant, ut fugarentur serpentes. Quidam dicunt, quod si quis in ceruina pelle decumbat vel dormiat, nullus ad ipsum serpens accedet.

In lib. 4. sem. 6.
trac. 3. cap.

De praeser-

De præseruatione ab ijs affectibus, qui ex praua victus ratione excitantur, atque de huius artis prophylactica utilitate. Caput VII.

Iam tempus est, ut de tuenda valetudine agamus, quæ præseruat à morbis praua victus ratione concitatis, quorum ratio pertinet ad illos medicos, quos vulgus physicos vocat, quod nimirum versentur isti in causarum naturalium cognitione, ad illorum differentiam, qui causas extrinsecus venientes considerant, à quibus quidem modus præseruandi cuique satis patens est, ut profecto ab iniuriis, vulneribus, contusionibus, ossium luxationibus, fracturis & similibus; à quibus causis modus, quo homines seipsos tueantur, certissimus est, de qua quidem præseruatione, quod per se omnibus pateat, hic non agimus. Itaque de tuenda sanitate agemus, quæ per causas effectrices agitur, quas vulgus medicorum non naturales, & Gal. sanitatis conseruatrices consultius appellauit. Hæc sanè ars sanitatis conseruationem, seu incolumem sanitatem vsque ad vltimum vitæ finem promittit, non tamen vitam longiorem, ut perperam multis fuerat persuasum: siquidem si hoc esset, æternitas vitæ hominibus polliceretur, quod sanè non paritur rerum naturalium conditio; quoniam planè cognitum atque ab omnibus deprehensum est, omnia quæ nascuntur interitui esse obnoxia, atque hæc est miseranda hominis natura. Porro hæc profecto præseruandi ars corpus humanum ab omnibus morbis, quos praua viuendi ratio excitat vsque ad vltimum vitæ terminum tuctur, atque ita, ut absque morbis, vitam inculpata homines ducant. Quo certe nihil iucundius, in vita humana nihilque felicius esse existimamus, scilicet homines sanos viuere, veluti nihil miserius atque infelicius opposito dici, ij experiuntur, qui morbosam vitam ducere solent. A morbis igitur hæc methodus præseruandi homines defendit, neque permittit, eos ab ægritudinibus ante naturalem vitæ terminum interire, sed ex naturali solummodo affectu, quo (refrigescentibus, atque sicciscentibus corporibus) mors aduenit. In ipsis enim humido nativo (quo calor alitur) consumpto, atque idcirco calore resolutis, vita planè cessat, atque tetminatur. Nonnulli etiam reclamant aduersus artem hanc, quod non omnes qui ea vtuntur ad vltimum vitæ terminum perueniant, licet hanc religiosius in toto suæ vitæ cursu obseruarint, innumeri profecto sunt, qui ad vltimum senium non viuunt, sed vel in pueritia, vel in iuuentute, vel in ætate adulta suæ vitæ finem viderunt. Hinc variam esse mortalium vitæ periodum deprehensum est. Quam Aristoteles fieri ob variam elementorum permutationem voluit: Astrologi vero in syderum infortunatorum malos aspectus varietatē periodi vitæ referunt. Cæterum tamen non omnes, qui methodum tuendæ valetudinis seruauerunt, ad vltimum vitæ terminum perueniunt, scilicet interrupto ipsorum vitæ cursu, verum tamen certum cum sit, plerosque probam viuendi rationem seruant, & diu viuere, & absque morborum molestia viuere; non video, præseruandi ars quamobrem sit negligenda. Neque est, ut ei obijciant, quicquam certi ad hanc cognitionem facere non posse, quoniam viscerum interiorum neque temperamentorum, neque ipsarum virium quantitas vere cognoscatur, & deprehendi queat. Vnde Galenus merito, haud planè morborum exitus deprehendi quoque posse existimauit, atque propterea diuinum Hippocratem hoc in hunc modum scripsisse: Acutorum morborum non omnino certam esse prædictionem salutis & mortis. Quid itaque dicemus? an non corpora recte valentia, quouis modo interna viscera temperata habentia, recto vlu & obseruatione probe victus rationis, plurimum iuuabuntur? an non ex vitiosa victus ratione omnia læduntur? Itaque cum in confessio apud omnes habeatur, corpora cuiuscun-

*In li. art. medi.
cap. 85.*

*In 2. de Gen. &
inter.*

cuiuscunque temperamenti, & ætatis sint à victus ratione & iuuari & lèdi possent, quis dubitabit, usu, & obseruatione causarum effectricium, quas merito Galenus conseruatrices vocauit, sanitatem in omnibus posse conseruari, atque à morbis defendi? At rem ipsam hisce præmissis aggrediamur, & primum quid sit sanitatem tueri, & conseruare, via Methodica dicamus, scilicet non declinantes à Methodicorum dogmatis, qui omnes (vt in superioribus libris demonstratum est) sanitatem in probam meatuum symmetriam & constitutionem retulerunt: quoniam in eorundem meatuum symmetriam vitiatam, morbum quoque constituerunt. Dictum aliàs est, eos itidem vitium & symmetriam in meatibus omnibus cum externis tum internis considerasse. Vnde ex his facile erit, quid sit sanitatem tueri, & defendere, pronunciare. scilicet illa omnia, quæ probam meatuum naturalemque symmetriam conseruare apta nata erunt, effectricium sanitatis causarum genere comprehendere. At duplicem corporibus inesse valetudinem etiam nos supponere oportebit, scilicet vnâ perfectam, atque alteram aliquatenus à perfectione declinantem; quod & Galenus quoque supponendum voluit: hæc quidem à causis aliquatenus contrarijs conseruabitur, atque illa planè à similibus: Cæterum cum hæc valetudinis conseruatio, & perfecta & imperfecta causis ijs, quas vulgares medici non naturales vocant, vtique perficiatur, atque planè absoluitur, de ipsis, priusquam vltius progrediamur, agendum est, operaque à nobis danda erit, vt illas omnes cognoscamus.

De causis, quibus hominum sanitas tuetur.

Caput VIII.

SEx numero causas esse (quas non pauci res non naturales appellant, quæ necessario corpus nostrum alterant, & nisi opportune adhibentur in morbos etiam corpora prouehunt, & alij easdem conseruatrices dixerunt) omnibus planè constare putamus, scilicet eas, quæ ex aere ambiente considerantur, & quæ ex motu & quiete cum totius corporis, tum partium singularum: ex somno & uigilia, & ex his, quæ intro assumuntur, potissimumque ex cibo atque ex potu; Non minus & ex his, quæ excernuntur, & retinentur, atque demum ex passionibus animæ. Hæc vero velimus aut nolimus corpus necessario alterant. Aer quidem aut meatus laxando aut adstringendo, illud facit aer calidus, humidus, qui fit tenuis substantiæ, lucidæque, quique etiam sincerus sit, nulloque coinquinamento infectus. hoc vero qualitate frigidus siccus obscurus, vel humidus, crassus, & liginosus putrescibilique aliqua qualitate vitiat. Motus vero & moderatus & multo plus immoderatus, plurimum humores digerendo, meatus laxat. contra immoderata quies, ex somno itidem & uigilia, idem obseruatur, somnus enim multus aliquando laxat, utpotè à quo (plurimo calore intrus retracto) humores superflui digeruntur, & aliquando replet caput, partesque tumentes facit. moderatus & consuetus meatuum symmetriam iuuat. Vigiliarum vero proprium esse videtur, vt plurimum corpus ab ipsis resoluatur, quippè quod meatus exinde laxentur immoderatus: ex cibo & ex potu, multus replet, meatusque obstruit, & longe efficacius si etiam sit crassæ lentæque substantiæ; veluti paucus & attenuatus facultatis meatus laxos conseruat. idem qui calidus, atque humidus: contra frigidus, atque siccus. Idem de vino, dicendum cum sit itidem cibus, præsertimque merum, crassæ essentiae, multum, obstruit, tumentiamque facit, potissimumque à niue, aut glacie aut à gelida aqua refrigeratum; calidum vero, quantitate modicum meatus liberat, omniumque maxime essentiae tenuioris, atque ologophorum seu aquosum. si vero citra ordinem nedom in prandio atque in cœna, sed inter

inter utrumque copiosius vinum ingeratur, tumentia corpora adstrictaue reddat; hi quidem qui ita bibunt, coctionem corrumpunt, ex qua cruditates multæ cum vino venas ingressæ, meatibus officiunt. si verò ea quæ excernuntur, & retinentur in considerationem quoque veniant, retineri excrementa in corpore diu, meatus obstruere aptum natum est; eaque excerni debito tempore, atque debito modo, meatus peruios conseruat, veluti si excrementa immoderatus excernantur, immoderatus quoque meatus omnes laxabunt. Demum ex animæ passionibus, quædam ad adstrictum alterant, vt timor, tristitia, inuidia, quædam ad laxum vt gaudium. Atque tot sunt causæ sanitatem conseruantes, atque destruentes, conseruantes inquam quæ opportune & proba mensura exercentur, destruentes quæ inopportune & prauè corpus nostrum alterant.

An causæ conseruantes in corporibus meatuum symmetriam, symmetriam quoque partium similarium, atque organicarum conseruent. Cap. IX.

Dogmatici cum voluerint, sanitatem partium similarium esse calidi, frigidi, humidi & siccæ symmetriam, atque organicarum sanitatem itidem in similarium ipsarum compositione, numero, magnitudine figuraque consistere, fortasse aliqui dubitabunt, an causæ meatuum symmetriam, in qua sanitas consistit ex Methodicorum placitis conseruantes, etiam qualitatum quatuor in partibus similaribus conuenientiam symmetriamue, atque earundem similarium in organicis probam compositionem, numerum, magnitudinem atque figuram itidem conseruatæ aptæ sint, vel potius omnem earum partium cum similarium tum instrumentalium symmetriam, in qua sanitas consistit, vitiare atque peruertere queant. Si loquamur de perfecta sanitæ, quæ similibus conseruatur, quæso an non causæ ad hanc valetudinem tuendam, quæ in meatuum symmetria perfectissima est reposita, ex qua corpora per omnes meatus probissime transpirare dicuntur, erunt opportunissima, quæ hanc symmetriam conseruant? si ex aere incipiamus, profecto is erit temperate calidus atque humidus, substantiæ tenuis, atque puræ. hic enim aer simillimus est ijs corporibus recte valentibus temperamento; laxa enim corpora sunt temperate calida & humida, cuiusmodi sunt puerorum, in quorum valetudine tuenda vel etiam Dogmatici, vsum medicamentorum ciborumque temperate calefacientium atque humectantium obseruandum voluerunt, unde lac ad cibum in ipsis, balneaque aquæ dulcis comprobarunt. Quid igitur hæc possunt similarium partium probam temperiem vitiare? nequaquam, cum intemperies hæc cum totius tum partium debeat esse temperata, quæ idcirco & ipsa vsu temperate calidorum & humidorum conseruabitur, si verum est, quod eucratum seu temperatum corpus temperatis iuuetur, sicuti distemperatum à similibus læditur. quid de optimo cibo, de potu, de somno, & de vigilia moderatis dicemus? an non hæc etiam similarium partium probam intemperiem conseruabunt? aut potius in ijsdem similaribus cum temperiem, tum in organicis compositionem, numerum, vel magnitudinem uel figuram vitiabunt? Non certe uidetur. sicut etiam non faciet motus corporum temperatus, atque moderata quies. non minus quæ etiam excrementa temperate, & moderate si suo tempore excernantur probam partium intemperiem non lædent, neque morbum in partibus organicis ullo modo excitabunt. quemadmodum etiam hilaritas atque gaudium moderatum, meatuum quidem symmetriam conseruat, absque alterius partis læsione. Sedage, etiam istuc in imperfecta sanitæ uideamus quid agat. An inquam causæ

causæ conseruatrices huiusmodi imperfectam sanitatem, quæ posita est in symmetria nõ omnino perfecta, at vel ad laxum vel adstrictum quadatenus declinante conseruantes similiarium partium bonam intemperiem, & compositionē earundē probam, in organicis numerum, magnitudinem atque figuram itidem conseruabunt? Itaque supponemus symmetriam meatuum ad adstrictum paululum declinare, ex qua perfecta calor non fiat omnimoda transpiratio, & fuliginum tenuiorumq; excrementorū euacuatio. Hæc sanitas cū non similibus sed contrariis conseruetur, vsui nobis ad hanc conseruandā erunt conseruatrices causæ moderate laxantes. Itaque ex aere optimus erit, qui temperamento moderate sit calidus atq; humidus, substantiæ tenuis, lucidæq; An qui huiusce qualitatis atq; substantiæ erit, similiarium partium temperiem vitiabit? Esto quod hoc corpus conseruatum hepar calidum vel frigidum habeat; an temperate calidus, humidusque aer hoc temperamentum vitare aptus erit? nequaquam; siquidem non calidam hepatis lædet intemperiem, quoniam hæc vel erit temperata, vel intemperata. si temperatum erit hepar, ab aere temperato, perinde ac simili nedum non lædetur, at quinimo plurimum iuuabitur. si intemperate fuerit calidum, neque hoc ipsum lædet aer temperate calidus & humidus; quos inquam medicos atq; philosophos vnquam latuit, remissam caliditatem, intensam vehementemque hebetare, atq; emendare? experientia quotidiana nos hoc docet, quando aquæ vehementer calidæ, si aquam temperatam permiscuerimus, eam ipsam minus calidam reddemus. Itaque hepar summe calidum à temperata aeris caliditate non lædetur, sed iuuabitur, atq; non minus humiditate adiuuante calor hepatis intemperatus ad magis eucratum prouehetur. si vero hepar fuerit frigidum, nullo modo à caliditate temperata lædi potest, quando omnia temperamento intemperata, cuiusmodi frigida omnia sunt, à contrariis non lædantur sed iuuentur. Quare in meatuum symmetria quadatenus ad adstrictum declinante, sanitatem idcirco non perfectā sed à perfecta deficientem fouente, medicamenta, quæ sunt temperate calida atq; humida, quippe laxantia, neq; partium similiarium temperiem lædent, neque ex iisdem similiaribus in organicis siue instrumentariis vel compositionem vel numerum, vel magnitudinem, vel deniq; figuram vitare apta erunt. Idem & in symmetria meatuum quadatenus ad laxum accedente, quæ itidem facit sanitatem quadatenus deficientem, dicendum putamus. Namque in corpore hac ipsa gaudente sanitate, ad ipsius quippè sanitatem conseruandam vsus conueniet eorum, quæ modice adstringunt, quæ profectò frigida & sicca sunt terrenæ quadatenus substantiæ. esto etiam quod hoc corpus, priuatimque hepar calidioris sit temperamenti, quomodo huiusmodi intemperies hepatis (quæ cum non temperata sit contrariis ad eucratum reducitur) non iuuabitur? Nonne frigida caliditati contraria sunt? Neque est, quod aliquis dicat, in frigido corpore, & in viscere interno frigido rem aliter se habere: quando vsus frigidorum corporis totius atque hepatis frigiditatem augeat & proinde ea corpora ex Dogmaticorum doctrina lædat. Nos dicemus, nunquam corpus sanum, sed habens quadatenus meatus nimis laxos, vel vt par esset, maiores, amplioresque redditos, frigidi temperamenti iudicari debere, cum huiusmodi corpora, potius ad adstrictum quam ad laxum suapte natura (etenim frigiditatis adstrictio propria est) inclinare debeant. Quod si rursus dicatur, id fieri ex nimia laxitate meatuum oportere, quoniam laxitas meatuum est in causa, vt plurimum innati cum calidi tum humidi resoluatur, exindeque necessario corpora refrigescere; hoc & nos fatemur, fieri in corpore non sano, sed laxo morbo laborante, at in sano nequaquam ita calor & humor exolui potest, vt frigiditas in visceribus inducatur.

Quod

Quod ad præservandam sanitatem, cognitio symmetriæ naturalis meatuum sit necessaria, quantumque hæc laxitatis, vel adstrictionis habeat in variis cum ætatibus, tum temperamentis, tum habitibus, non esse negligendum. Cap. X.

PRiUSquam ad ipsam sanitatis præservationem ex Methodicorum placitis dicendam tractandamque descendamus, præstabit nos cognoscere, in omnibus ætatibus, temperamentis atque habitibus quantum in ea meatuum symmetria sit, aut laxi, aut adstricti, siquidem infantes plus alijs aliarum ætatum hominibus ad laxum inclinant, laxitatisque habent, & minus ipsis pueri, & post pueros iuvenes, ac post ipsos viri adultæ ætatis, atque senes. Corpora itidem temperamenti calidi & humidi, atque habitus mollis laxiores meatus habebunt, & densiores frigida, gracilia, sicca, duraque. Neque est propterea, ut cum Dogmaticis dicamus singulas ætates singulares in curatione habere indicationes, quâdoquidem cum Methodicis in omni præter naturam laxo corpore, cuiusvis sit ætatis, temperamenti, atque habitus, adstringendum esse dicemus, magis in pueris, minus in iuuenibus, minus in adultis, & senibus, quoniam hæc corpora, quasi laxo affectu laborantia, quæ plus laxi suapte natura habent, eo minus laxandum & plus adstringendum indicant. Vnde mirum non est, si ferè omnes medici recenter natorum puerulorum cutem, quod nimis laxi habeat, roborare studeant; Galenus sale conspergi voluit, Arabes inungendum oleo aliquo adstringente, cuiusmodi est, quod ex nucibus, & juglandibus fit, alij statim enixos repente in aquam frigidam mittunt, continuo ex ipsa extrahentes. Nonnulli etiam vino adstringente cutem lavant, quod non faciunt in pueris neque in alijs ætatibus, quod minus siquidem hæc corpora laxi habeant. Ita etiam minus est laxandum in corporibus calidis & humidis, habitus humidi, mollisque, contra plus in frigidis siccisque, habitus densi siue gracilis, & in obesis, quod plus adstricti iudem habeant, & minus laxi. Non tamen dicunt Methodici ex his colligi posse, ætates, habitus, temperamentaque habere proprias indicationes, quoniam neque ætas varia, neque varium temperamentum, neque habitus varius curationem mutabit, in omnibus enim laxo affectu vexatis, cuiusvis ætatis, temperamenti habitusque, perpetuo erit adstringendum, in quibusdam plus & in quibusdâ minus, ita ut hæc varietas medicamenti naturâ non evanescat, sed potius quantitate, seu efficaciam in agendo quandam, qua quædam plus adstringi, quædam minus debeant. Non est tamen huiusce varietatis ex ætate, temperamento, atque ex habitu cognitio inutilis, quando in conservanda sanitate cum perfecta, tum imperfecta declinantur à perfecta, huiusce rei consideratio videatur necessaria, ut his medicamentis, seu causis conservatricibus, vel plane similibus, quæ in perfecta usu veniunt conservanda, vel contrarijs in declinante, utramque opportune conservemus. siquidem (exempli gratia) in perfecta sanitate, in perfectissimâ scilicet meatuum symmetria constituta, quæ similibus conservatur, si pueri recenter nati, qui ceteris omnibus aliarum ætatum hominibus laxiorem habitum habent (si similia ex causis effectricibus præsidia ipsorum sanitatem conservant) opus habebunt medicamenti minus laxantibus, utpote quæ in temperamento modice sint & calida & humida; longe plus laxantia in iuuenibus atque adultis desiderantur, quod hæc corpora minus laxitatis habeant. Neque obstabit, ne hoc ita iudicari debeat, quod in pueris (quorum corpora suapte natura laxa sunt & mollia, unde copiosius distillantur atque euacuantur) adstrictus affectus maioris ab ipsorum natura laxa recessus sit nota, quia nimirum in ipsis affectus adstrictus

Q

adstrictus non nisi maxima à causa fieri potest; veluti affectus laxus in adultis & senibus vehementi itidem ex causa (quod hæc corpora quippiam adstricti suapte natura habeant) concitatur, idcirco minoris à natura recessus sit nota; atque ob id etiam minori adstrictorio medicamento opus hi habebunt. Huic dubitationi facile satisfactum iri putamus, si dixerimus, in pueris affectum adstrictum vehementiori à causa quam in adultis concitari & quidem hac ratione efficax magis laxatorium opportunius præstantiusque procul omni dubio esset adhibendum, & medici huiusmodi adhibere admouere debuisse, si huius ætatis natura, habitusque permitteret, non permittit tamen pueritiæ natura atque habitus valde laxus vsum medicamentorum valide laxantium, quod, ut recte à Galeno aliquando dictum est, puerorum corpora haberent ex se vnde euacuentur, quo Medici omnes in ipsis adstricto morbo vexatis abstinere solent à magnis laxatorijs cuiusmodi est, sanguinis euacuatio, sudorifica, medicamenta, valideque purgantia. In ætate vero iuuenili adutraque, licet ratione adstricti affectus, quod à minori causa hæc corpora adstricto morbo corripiantur, minora laxantia conuenirent, tamen, quoniam hæc corpora ferunt magna etiam laxatoria, medici adhibent efficaciora, quam in pueritia debeant, & possint, modo hæc morbi magnitudo indicet, atque vires commode ferant. Itaque ex his colligamus variarum ætatum, naturarum, habituumque cognitionem pro tuenda valetudine haud fore medicis inutilem.

An ex omnibus causis conseruatricibus, duæ tantum scilicet ciborum potuumque & aliorum continentia, atque corporum labores protuenda valetudine sufficiant. Cap. XI.

EThi cause sanitatem conseruantem sex numero esse omnes fateantur; visum tamen aliquibus fuit, ad duas solummodo posse sanitatis conseruationem referri, scilicet ad vitæ continentiam, atque ad exercitium; quod nimirum ex victus, veneris, somnique intemperantia, atque ex immoderata quiete, non minusque ex immoderatis laboribus, corporum sanitas vitietur, morbi que fiant. Verum per victus incontinentiam, nos non tantum ciborum, potuumque, veneris & somni vsum immoderatum intelligimus, at quin etiam ab ipsis immoderata quoque abstinencia, siquidem etiam ex ieiunijs corporum sanitas vitatur, non minusque ab immoderata veneris abstinencia. Quare ciborum, potuum, veneris, somnique cum immoderatus vsum, tum immoderata ab ipsis abstinencia, sanitatem peruertit. Non secus, quam à quiete immoderata, atque ab exercitijs immoderatis homines in morbos delabi soleant. Porro in hæc duplices causas omnem sanitatis conseruationem referri posse haud iniuria aliqui existimarunt. Cæterum ad victus continentiam possumus referre quoque excrementorum omnium excretionem moderatas, præsertimque fecum, & excrementorum per aluum atque lotij. Non minus & animæ quoque motuum continentiam. Vnde ad continentiam quæ facit ad valetudinem tuendam, & ad incontinentiam referre possumus cibum, potum, somnum, venerem, animæ affectus, deiectionem, atque iniectionem. An vero aer, qui yna est ex causis, quæ necessariò corpora alterant (velimus aut nolimus aere alteramur) ad continentiam reduci queat? Nequaquam: Vnde non duæ erunt causæ, sed tres, ad quas omnes aliæ conseruatrices reduci poterunt, quippè aer, continentia, atque exercitium. Quod verò pleurumque morbi fiant à ciborum, potuumque incontinentia, atque à laboribus,

Hippo-

Hippocrates in epidemijs ita dixit: sanitatis meditatio ciborum infatietas, ciborum impigritia. Alij vertunt, Professio tuenda sanitatis, non saturitas cibi, impigritas ad labores. & alij legentes ἀκοίλῃ τροφῇ καὶ ἀκνίλῃ πόνου verterūt continentiam & exercitationem, quæ fortasse idem sonant, quod nimirum ciborum infatietatem, atque impigritatem, continentiam in victu quis appellare queat. Credendum tamen fore existimauimus, ne continentia omnes causas, quas hoc nomine comprehendi diximus, comprehendēdas Hippocrates voluerit, at ciborum atque potuum solummodo continentiam, atque impigritatem ad labores, per quos exercitia intelligit. Neque sanè immeritò, quando sanitas licet alijs etiā a causis conseruatur, veruamen maxime omnium eius conseruationem pendere à ciborum potuumque temperantia, atque ab exercitijs constar. Verum nos continentiam victus comprehendimus, præter cibum & potum, somnum, venerem, mictionem, secumque deiectionem: atque proinde continentiam, atque incontinentiam, laborum moderationem, immoderationemque, ac aeris bonitatem, atque prauitatem tres genere causas conseruatrices statuimus, à quibus sanitas & conseruatur & vitatur. Quomodo autem hæ sanitatem conseruant, haud cognitu perdifficile est. Ex aere quomodo conseruetur sanitas & perfecta, & imperfecta, partim dictum est, & partim à nobis suo loco dicitur accuratius, namque perfectam sanitatem aërem conseruare diximus, qualitate calidum moderare atque humidum, & substantia puram, tenuique, non obscura sed mediocriter lucida: & imperfectam, quæ posita est in meatuum symmetria, aut ad adstrictum aliquāculum declinante, aut ad laxum, vel calidiori humidoque aere, lucido atque puro opus erit, scilicet ad symmetriam meatuum ad adstrictum paululum accedentem, conseruandum: & frigidum, non ita humidum, neque ita lucidum ad laxum itidem symmetria flectente. At de hac aeris alteratione alias, vt dictum est, sermonem habebimus, ex continentia vero atque incontinentia seruari sanitatem non perfectam dicimus, perfectam vero sola continentia seruari, quippè temperantia in cibo, potu, somno, venere, mictione atque in deiectione, his quidem singulis si homo cum moderatione vtatur, symmetria perfecta meatuum omnium illo modo vitari poterit. Imperfectam vero cum horum continentia, tam incontinentia apta est conseruare. Etenim imperfectam ob symmetriam (exempli gratia) ad adstrictum aliquo modo declinantem, ciborum parsimonia, & ipsorum tenuis substantia, attenuansque facultas, potusque parcior, substantiæ & facultatis attenuantis, somnus solito parcior, & minus parca deiectio, atque mictio copiosior (quod hæc omnia tumentia, obstructaque leuē, meatusque modice laxent) probè conseruare possunt: contra si ad laxum symmetria deflexerit, cibis paulo copiosior, frigidus, siccus & crassæ substantiæ, potus vberior, vini, meracioris, nigrioris crassiorisque substantiæ, somnus itidem copiosior, imminutio facum, atque vrinæ mixtio non copiosa sanitatem conseruabunt. Eodem modo de tertia causa erit dicendum, namque exercitationis temperantia ad perfectam valetudinem tuendam, maxime requiritur, atque ad imperfectam ad adstrictum accedentem, copiosiores labores vsu veniunt, & ad laxum inclinantem (quando quies atque otium adstrictum foueant) parciores, & moderatioresque. At nunc ex ijs singulis conseruatricibus causis parcius magis de sanitatis conseruatione sermonem instituamus, vt præsens de hac re susceptum negotium claudamus.

Quomodo ex singulis causis conseruatricibus sanitas in corporibus custodiatur, & primo quomodo ex aere.

Caput XII.

EX aere hoc negotium primo exequentes, dicimus aerem ipsum aut temperamenti calidi, aut frigidi, aut humidi aut sicci, aut in his qualitatibus temperati existere, aut cum ventis aut absque ventis, aut substantiæ puræ synceræ, aut impuræ, cuiusmodi est caliginosus, aut ex halitu alicuius stagni, vel paludis, aut è profundo specu, aut ex cloacis aut ex cadaveribus inhumatis putridis proficiscente coinquatus, aut nebulosus. Itaque aeris differentiis sic constitutis dicimus primo, aerem qualitate temperatum, purum, serenum omnibus corporibus ad tuendam sanitatem perfectam, cuiusvis ætatis, naturæ, habitusque esse vtilissimum. Ad imperfectam vero, quæ in symmetria ad adstrictum paululum ex quavis causa inclinante, aer temperate calidus humidusque erit opportunus, Frigidus vero & siccus si meatuum symmetria ad laxum inclinauerit, erit itidem expetendus, atque etiam obscurus, crassiusculus, veluti ad adstrictum symmetria inclinante, optimus erit purus, lucidus, nullo crassiore vapore infectus. caliginosus vero, nebulosus, atque crassus sanitate ad laxum inclinante erit itidem opportunus. Qui vero intense frigidus est, non ad conseruandam valetudinem ad laxum inclinantem, sed potius ad morbos laxos tollendos conueniet. Veluti itidem valde calidus pro morbis adstrictis tollendis magis, quam ad sanitatis in meatuum symmetria ad adstrictum, vti dictum est, inclinante, constitutæ conseruationem, conuenire dicitur. Pestilenti vero halitu vel ex stagnis, vel ex paludibus, vel ex specubus, vel ex alijs locis fetidis & putridis vitiatas, omnibus noxijs, pluuiosus vero, ventosus cum borealis, tum Austrinus ad morbos quidem adstrictos excitandos est peropportunus: Austrinus, qui calidus non temperateque humidus sit, caput replet, vnde Hippoc. dicebat: Austrini status caput grauant, sensusque heberant. contra boreales venti summe frigidi & siccis meatus claudentes, ac veluti comprimentes, catarrhos concitant, phlegmonesque & alios affectus, quæ fluxione humorum concitantur. Itaque diximus aerem in qualitatibus temperatum, in substantia purum, sincerum, lucidumque esse aptissimum ad tuendam valetudinem perfectam, quod symmetriæ meatuum exactissimæ, atque sanitati perfectæ sit maxime temperamento atque substantia similis. frigidum vero & siccum substantiæue crassæ, ad imperfectam sanitatem quæ in symmetria meatuum ad laxum quadatenus declinante consistit, quod temperamento atque substantia sit contrarius, esse vtile dictum est, contraque calidum & humidum, lucidum tenuemque defectuosæ sanitati conuenire deprehensum est, quæ ad adstrictum accedit. Cæterum non silentio prætereundum putamus, vt quamobrem sit, intelligamus quod cum Græci tum Arabes voluerint ad infantes statim enixos, ad ipsorum sanitatem conseruandam vsum adstringentium, corroborantiumque meatus esse perquam vtilem. Galenum alias meminimus voluisse illorum corpora sale conspergenda, ad cutis meatus laxiores quæ dantenus, vt fortius externis aeris iniurijs resistent, roborandos. Arabes inunctionem ex oleis adstringentibus magis laudarunt, Alij cutem vino adstringente lauare, alijque statim natos infantes in frigidam aquam tantillum immergere in consuetudine posuerunt. Quæ omnia ad cutem densandam facere instituerunt. Quæ consuetudo haud planè constat, an rationi conueniat, quando omnes fateantur sanitatem perfectam non contrarijs, at planè similibus conseruari. At adstringentia meatus, aut quouis modo cutem densantia, quæ vel frigida sunt in temperate vel adstringentia, vt sal, oleum de nucibus, aqua frigida, quomodo infantium

infantium puerorum sanitati perfectæ erunt similia & cum ipsa in exquisitissimâ meatuum omnium symmetria consistat, in corporeque molli, laxoque, calido atque humido. Vnde merito omnes ad illorum tuendam valetudinem collaudarunt balneum aquæ dulcis, quod hac ætate in familiari usu apud omnes absterices existit, atque victum qualitate temperatum, scilicet calidum atque humidum, cuiusmodi est lac, quod illis per plures menses solummodo fit nutrimentum. Verumenimvero veritas ita videtur cognoscenda, quod scilicet pueri sani gaudeant temperate calidis atque humidis, scilicet laxatorijs, quoniam hæc similia omnino sunt ipsorum sanitati perfectæ, quæ in exquisita meatuum symmetria posita est. Fortasse ipsorum sanitatem quadantenus ratione ætatis maxime humide & calidæ, habitusque maxime mollis & laxi non perfectam, sed quadantenus ad laxum declinantem, esse complures æstimantes, vsum adstringentium instituerunt. vel hoc erit, quod nos diximus aliàs, scilicet æratum, temperamentorum atque habituum varietatem haud parum facere ad rectum vsum eorum, quæ sanitatem conseruare apta nata sunt; siquidem in ijs corporibus, quæ quippiam vel ex ætate, vel ex temperamento, vel ex habitu, affectus laxi habent, minus, etsi adstricto etiam affectu vexentur, esse laxandum, & in ijs, quæ aliquid adstricti habent, ut sunt ætatis adultæ, temperamenti frigidi atque sicci, habitusque gracilis, sicci atque duri, magis esse laxandum. Pueri vero statim nati cum plurimum laxi habeant, mirum haud est, si Galenus atque alij medici grauissimi senserint, statim natos adstrictorio medicamento aliquo, ut ipsorum cutis laxior siccaretur, induraretur, atque ad temperamentum eucratum proueheretur, esse tractandos, atque postea esse vtendum balneis laxatorijs, quod temperamento similia sint ipsorum sanitati perfectæ. Pueri quidem statim in lucem editi defectuosa quasi sanitate gaudentes vsum adstringentium ea ipsa ex nimia scilicet laxitate ad temperatam seu eucratam contracta, pro sanitate conseruanda similia desiderant. atque hæc de tuenda sanitate ex aere. Nunc ad ea, quæ intro assumuntur declinemus.

Quomodo sanitas conseruari possit, usu eorum, quæ intro assumuntur, vsuque somni, veneris, atque animæ passionum. Cap. XIII.

SVpposita duplici sanitate, scilicet, perfectæ, atque imperfectæ nunc ad ipsius conseruationem ex ijs, quæ intro assumuntur, descendimus. Quod negocium haud erit cognitum difficile, si in primis, quæ intro assumuntur in corporibus, cibum, atque potum esse etiam supposuerimus, hæcque illud profectò præstare, ut Dogmatici etiam dicunt, aut succi bonitate, aut quantitate, aut qualitate posse, non minusque & ordine, temporeque, quo assumuntur. Quod itaque ad perfectam corporum sanitatem custodiendam spectat, illud primum statuemus, quod ad cibum itidem attinet, quemcumque optimi succi leuem, atque substantiæ tenuis esse deprehensum est, maxime sanitatis huius conseruationi fauere, optimumque idcirco futurum singulis corporibus, cuiusvis ætatis, temperamenti, atque habitus sint, omnes medici æque affirmant, si commoda quantitate, qualitate, & optimo ordine, opportunoque tempore exhibeatur. Itaque in primis cibi debent esse leues, tenues, atque optimi succi: facile quidem, qui huiusmodi sunt, a calore in nutrimentum vertuntur, optimumque generant sanguinem. Quorum sanè vltus optimam meatuum symmetriam nullo modo vitare vel euertere potest, præsertim si qualitate, quantitate, ordine temporeque opportune respondeant.

Qualitate

Qualitate inquam, cibus temperate calidus atque humidus esse oportebit. Etenim huiusmodi temperamenti qui est, simillimus itidem corporibus, quæ gaudent exquisita valetudine, ac vel etiam substantia molli; & leui. Cuiusmodi exempli gratia sunt lac, oua gallinarum recentia, ex carnibus hædinæ, vitulinæ, gallinarum iuuenum, caporum, turturum, perdicum, turdorum, phasianorum & similliam; Diximus, modo qualitate conuenienti exhibeatur, quia vti dictum est prædicti cibi & similes alij substantia molli humidaque temperate, atque temperamento calido & humido itidem temperato præditi similes sunt. Hi quidem probe nutriunt, facileque à natura concoquuntur, neque possunt, nisi illorum quantitas excesserit, meatus vel externos vel internos aliquo modo vitare. Recte adiunximus, modo quantitatem non excesserint conuenientem, quando etiam si cibus optimus sit, copiosior quam deceat capiatur, copiosiori sanguine quæ generat, poterit aliquo pacto in meatibus vitium inducere, vt nimirum multitudine sanguinis meatus angustiores reddantur. De horum verò ciborum quantitate non æque ab omnibus deliberatum est, siquidem alij sobrii cibum plane esse efficacissimam causam, qua valetudo maxime conservatur, voluerunt. siquidem ciborum copia præterquam quod plurimum faciat nutrimentum, & excrementorum copiam suggerat, qua morbi complures gigni possunt, etiam in corpore tumentiam, adstrictumque affectum copiosus cibus concitat. Hinc Hippocrates in epidemijis dixisse constat: præcipuum sanitatis studium esse cibis non satiari. Neque tamen recte facere illos putamus, qui nimis sobrio, parcòque victu viuunt, laudari autem illa ciborum quantitas, quæ corpora neque diu repleatur, neque nimis resoluantur, hoc quidem morbos laxos facit, illud adstrictum. sunt qui pluries in die cibum capiunt, & qui bis vel semel tantum hoc quidem non laudandum videtur, præsertimque in corporibus ad laxum inclinantibus, illi vero, qui ex consuetudine pluries capiunt, si bene concoquantur, non improbandi. etenim corpora robusta, plurimum innati calidi habentia, multo cibo gaudent, quæ vero inter robusta, & debilia media sunt, bis in die cibum capere possunt, tantumque per vices capere, quod probe concoquant, & seruat tempore concoctionis ipsum cibum assument, atque non citra ordinem, nimirum prius eos cibos, ubi ipsorum varietas aderit, ingerere debebunt, qui facilius coquuntur, tenuiorisque substantiæ sunt, & mollioris, & postea duriores concoctusque difficiliore esse assumendos. Huiusmodi itaque cibi apti sunt perfectam valetudinem tueri. idem de potibus dicendum, si vinum sit, illud sit mediocriter generosum, & quandoque pauciferum præstabit magis quantitate moderata, eaque proportionem ciborum quantitati congrua. Zithum etiam ex hordeo, vel ex tritico paratum eodem modo, quo uinum laudauimus, in moderata quidem copia conuenient. Caveantque intra cenam & prandium, ieiunoque maxime stomacho à copioso potu vini, vel Zithi, & similium potuum, quia coctionem ciborum maxime turbat, cruditatesque hic vltus multas suppetit. porro diximus huiusmodi cum cibus tum potibus sanitatem perfectam custodiri. Nunc quomodo inperfecta ipsidem conservanda sit, dicamus. Ad eam quæ ad adstrictum vergit (et si cibi optimi succi, leues, & tenues omnes conseruent), particulatim temperamenti calidi atque humidi, substantiæque tenuioris desiderantur, cuiusmodi sunt, oua gallinarum sorbilia, recentissimaque ex piscibus saxatiles, ex carnibus hædinæ, vitulinæ, gallinarum iuuenum, atque etiam gallorum iuuenum, maxime vero, columbarum, turturum & similium, ex ferculis vero, folia boraginis, buglossi, melissæ, asparagorum, fœniculi, maluarumque ex iure cocta, vel in aqua, & oleo amygdalino, vel olearum dulcissimo esitata. Iuuat hæc corpora vltus ciborum maxime parcus, & quandoque leuis inedia, cibusque temperamenti etiam calidi atque humidi esse debebunt. Contra, crassiores cibi, copiosiores, frigidiores

In Epid. lib. 4.
cap. 1.

diores vorati, apti sunt ad sanitatem (quæ ad laxum versa quadantenus videtur) conseruandam. De potu itidem, si vinum sit, corporibus ad laxum inclinantibus, substantiæ quadantenus crassior esse oportebit. cuiusmodi sunt nigra, & quæ aliquid austeri saporis habent, modo etiam ipsorum vsus moderatus vel paulo plenior sit. Contra ad adstrictum deflexis apta erunt tenuioris essentia, alba vel non colorata, cuiusvis austeritatis expertia, vel modicæ austeritatis; dulcia vero ad id vtilia erunt, modo in pauca quantitate ebibantur, sintque alba, & tenuioris substantiæ. Hæc de ijs, quæ intra assumuntur, nunc de somno, deuenire de quæ animi affectibus loquamur. Quod ad somnum pertinet, ad veni-rem, atque ad animi affectus sanitatem conseruantes, eamque particulatim, quæ perfecta est, illud in primis statuendum est, somnum quidem naturalem, qui est symptoma, fieri corporibus ab omni motu plane cessantibus actionum animalium, in qua profecto quiete in corporibus facultas naturalis efficacius agit, ad cibum attrahendum, retinendum, concoquendum, atque ad excrementa, quæ in coctione ciborum potuumque generantur, etiam excernenda, Quo factum est, ut somnus, qui noctu a cena fit (in quo dormientes primo in dextrum latus, & postea in sinistram decumbunt) quietus absque somnijs turbulentis, suavis, moderatus, vtpote qui durat, quoad in stomacho concoctio probe absoluitur, humores concoquendo, atque digerendo sanitatem maxime conseruare sit aptus; At nedum hæc hic somnus præstat, sed morbos etiam atque symptomata iam oborta sanat: vnde merito ab Hippocrate somnum in acutis morbis bonum esse, nobis traditum est, si febrem, vel dolorem, vel delirium sedat. In 2. aphor.

De quo ait etiam: ubi somnus delirium sedat, bonum, nimirum humores noxios concoquendo, atque digerendo. Qui vero in die fit, noxius est, caput enim vaporibus, humiditateque replet atque adstrictam passionem vel facit, vel auget. Vnde dicebat Hippocrates: interdum vigilare, noctu vero dormire oportet. hic itaque somnus nedum non conseruat sanitatem, at quinimo ipsam vitiat, atque euerit. Nocturnus verò bonus est, & vnæ ex præcipuis causis sanitatis conseruatricibus fit, sed tamen, ut dictum est, non omnis, sed moderatus solummodo: Immodicus enim à concoctione genitis extremis impedimento est ne excernantur, atque à calore ab intro foras non euocato (qui post somnum euocatur) ne tenuiora etiam digerantur, & per poros cutis exhalent: quæ euacuatio non fit, in dormientibus, quod habeant dormientes exteriora frigidiora: Vnde dicebat Hippoc. Vigilantem circa exteriora manifeste esse calidiorem, contra dormientem intus calidiorem, extra frigidiorē; igitur somnus prolixior, & immodicus caput replet humiditate, caloremque natuum obruit, quiescentibus enim sensibus (qui suo motu siccant humiditatem) augetur humiditas, atque ita, ut calorem ipsum (propter nimiam quietem per somnum longum, atque propter humiditatem nimiam suffocantem) extinguat. Porro colligimus ex ijs, somnum nocturnum moderatum maxime sanitatem conseruare, idemque & vigiliam, quæ in die fit, secundum consuetudinem præstare. Quæ noctu autem fit, immoderataque sanitatem vitiat: namque hæc in stomacho & in visceribus cruditates gignit, spiritusque immoderatus resoluit, à qua cum venæ crudo sanguine seu succo repleantur, meatus quidem obstruuntur. Venere quoque temperata sana corpora gaudent, quod nimirum temperata sint, calida humidaque, vnde femine abundant: immoderata vero venus corpora ad laxum mutat. Hilaritas quoque moderata maxime sanitatem diu incolumem seruat, veluti immoderata hilaritas, atque letitia ita ad laxum ducit, ut ab ea immodica, repentinaque quosdam maxime & laesos fuisse, & non raro interijisse constet. Itaque hæc omnia ad eam sanitatem, quæ perfecta est, tuendam aptissima sunt. Nunc quæ defectuosam etiam conseruandam, atque primo ad adstrictum quadantenus mutatam si de somno loquamur,

In 6. epid. sec. 4.

loquamur, is debet esse itidem optimus, nocturnus scilicet suavis iucundusque, sed longe breuior, utpote qui solummodo, quoad stomachi concoctio perfecta sit, duret, unde diurna vigilia huic negotio erit utilis, atque forte, quæ longior, unde in his somnus debet esse parcius, vigilia vberior, unde mirum non est, si hi, ut sanitatem conseruent, mane maturius surgant, & diu vigilent. Vbi vero ad laxum corpora inclinant, homines mane tardius expergisci debebunt, atque tardius itidem à lectulo resurgant oportet. Namque somnus longior replet, adstrictumque facit. Quare istis somnus longus, & vigilia brevis conueniet. Quibus conueniet etiam à venere abstinencia, quando venus laxet corpus, quæ tamen conueniet moderata corporibus ijs, quæ ad adstrictum versa sunt. De animi quoque affectibus, qui laxiore constant habitu, caueant ab immoderato gaudio, atque ab immoderata animi hilaritate, quoniam hæc laxum affectum augent, qui vero adstrictiore habitu præditi sunt, hilaritate & gaudio moderato maxime iuantur. contra, timor, tristitia, studium, ira & similes aliæ passiones faciunt, quando homines, si diu in his perseverauerint, in affectum adstrictum facile incident.

De sanitate conseruanda ex retentione atque excretionem excrementorum. Cap. XIV.

IN corporibus temperatis perfecta valetudine gaudentibus usus euacuationis excrementorum debet esse quoque moderatus, ut ipsorum quantitas respondeat ciborum atque potuum assumptorum quantitati, præsertimque si de alui deiectionibus atque de urina loquamur, ad seruandam in his sanitatem homines procurent solitam excrementorum euacuationem solito tempore, atque esse concocta excrementa oportebit, quæ si cruda sunt, cruditatis causa remouenda: si cibibus, vel potus fuerit nimius, ita ut, natura non recte ob id concoquat, diminuendus erit, & si fuerit id ex alia causa, ei (ut dictum est) erit prospiciendum. In hisque, ut summam dicam, procurandum erit, ne assumpta in corpus nimis contineantur, scilicet excrementa, quæ ab ipsorum generantur coctione, namque si immoderata horum fuerit retentio, plethoria & cachochymia fiet & corpus ad affectum adstrictum delabi necesse erit. quæ omnino, ut postea dicemus, erit tollenda: sed cauendum etiam erit, ne excrementorum euacuationes ita auergeantur, ut ad laxum itidem corpus deducant. atque hæc de perfecta sanitate nunc ad imperfectam venimus, & primo ad illam quæ ad adstrictum declinat. Ex hac itaque meatuum imperfecta symmetria, timendum omnino erit, si plurimum augeatur, ut ad complures morbos adstrictos homines prouehantur. Hanc vero symmetriam conseruabunt ea omnia præsidia, quæ omnes solitas euacuationes propter aliquam causam diminutas, in pristinum restituent, scilicet, si sæcum purgatio diminuta aut suppressa fuerit (quidam enim suapte natura per plures dies nihil egerunt, seu per ventrem excernunt) erit medicis præsidij restituentia. Alij parum mingunt, & raro, alij, quibus vomendi consuetudo fuerat, ubi cessarunt à vomendo, male se habuerunt: & in non paucis, qui ex consuetudine plurimum sudabant, sudores ipsi cessantes sanitatem vitare solent, non minus que menses soliti si defecerint in mulieribus, atque in viris solitæ hemorrhoides cessauerint: corpora in morbos delabi solent. Demum qui pernares soliti sunt multam pituitam excernere, si hæc purgatio itidem cessauerit in multos morbos adstrictos incident, in eosque præsertim, qui capitis partes vexare solent. cuius modi est, apoplexia, paralisis, uerrigo, surditas, tinnitus aurium, & similes alij affectus. Igitur si fæces tarde & in pauca quantitate expellantur, laxanda erit

erit aliud medicamentis tum intro inditis, tum exterius adhibitis. Intro inditis, aut per os, aut per aluum. Varia sunt, quæ (præter medicamenta purgatoria) aluum laxant, atque emolliunt, fecesque educunt; ex cibis complures sunt illud commode facientes, ut passum, vinum dulce, oleum dulce, cuiusmodi est amygdalinum, sesaminum, est & butyrum recentissimum ad laxandum ventrem sane, maxime utilis, sunt passulae quoque & persicæ copiosius deuoratae, & in vino dulci decoctæ cum multo saccharo, viles in usu etiam sunt ad laxandum per noctem sub dio caelesti rori exposita cum saccharo multo. Pruna quoque Damascena quæ dulcia sunt, nequiquamque austera, vel acida, in vino dulci decocta additoque saccharo: prunorum pulpa cocta editur, atque ius ipsum bibitur, antequam aliud cibi genus assumatur. ius quoque ex aqua paratum mercurialis, vel betæ, vel brassicæ, cum oleo dulci atque sale copiosius, scilicet ad libram epotum aluum commode laxat. Antiquis vsitatum fuit quam familiarius ius brassicæ ex aqua ita paratum: Accipiebant sexdecim fasciculos paruos cimarum brassicæ, & singulos scilicet vnum post alium in aqua feruente in lebetes supra ignem posito separatim imponentes, feruescenti paululum perimitebant, mox extrahebant. Etenim primum iniiciebant vnum fasciculum, quem, cum efferbuerit tribus vel quatuor ebullitionibus, extrahebant, atque alterum imponebant, quem itidem mox, cum paululum ebullierit, extrahebant, & mox tertium, deinceps quartum, atque sic alios singulos quoad ad sextidécimum deuenierint, huiusmodi ius expressum seu (ut vocant) brassicæ infusionem cum oleo & sale dabant, ad semilibram, & etiam ad libram. quod profecto ius, ut etiam apud nostros deprehensum est, maxime est laxatorium. Ex medicamentis apud nostros multa sunt (etsi à Methodicis ipsorum vsus, uti aliàs diximus, non fuerit laudatus) est quidem aloelora & preparata ex succo rosarum, vel ex infusione, vel ex succis cichoraceorum scilicet herbarum refrigerantium. Matronæ Genuenses, nobiles (etenim apud complures vsus est, ut ex semetipsis multa medicamenta parent, sibi ipsique, & ipsarum familiæ comparent) aloem parant ex cremore prisanæ hordeaceæ, eiusque vim anastomoticam seu igneam humiditate illa corrigunt, huiusce medicamenti usum possunt homines cum minori noxa exercere, statim ante cenam vel ante prandium eius drachmam, vel semidrachmam assumentes. aliqui statim ante prandium vel ante cenam floris casia Abissinæ (scilicet illius, quæ corticem rubrum habet; hanc Egyptij nigra maxime præferunt Abissinamque à calore illiusce gentis appellarunt) duas vel tres drachmas, aut duas drachmas cum vna pulpa tamarindorum, sunt qui semidrachmam rhubarbari ex passillis ad mouendam aluum, & etiam drachmam assument ante prandium per quatuor horas. Non desunt, qui ius foliorum senæ vel ex iure pulli, vel ex sero lactis, vel ex vino dulci paratum commendant. Alii alius probe obediens reddita est usu senæ itidem puluerizata, à semidrachma ad drachmam vsque, statim cum vel ad prandium vel ad cenam eunt, ex vino assumserint. sunt & passulae, & pruna decocto itidem senæ macerata vel decocta. Hæc pauca ex laxantibus ventrem nobis sufficient. Balani parantur ex melle, sale & aliquando addita hyerapicra, vel cum alio medicamento laxatorio, sed familiares sunt ex melle & sale parati. In pueris nostræ nutrices vtruntur ijs, quos ex lacte porcino parant. Addimus nos ex saccharo parari & in pueris, & in alijs omnibus valde utiles. Clysters etiam emollientes, qui parantur ex decocto maluarum, althææ, mercurialis, betæ, & similibus, cum oleo dulci, & sale; vel ex hydromele, oleo, atque sale. Exterius etiam vmbilicum & omnem ventrem butyro recenti inungunt, aut oleo amygdalino dulci recentissimo in pueris ut ventrem laxent. Nonnulli vmbilicum itidem ea causa inungunt oleo ex floribus ciclaminis parato, alij ex vnguento arthaneta in officinis vocato: idem præstabit infessio in balneum

R in balneum

habebimus. elici vero sudorem docuimus sicco calore laconici ex carbonibus accensis, vel lapillis ignitis intro inditis, aut fomento calorifico, aut aqua calida vel in vtre vel in vesica, vel in vasculo aut ligneo, aut æneo, aut testaceo posita, aut simili alio modo incalescenti. Qui vel hæmorrhagiam copiosam habere solent, vt puerorum complures consuecunt, debent non permittere vt ea euacuatio supprimatur, quæ si aliquando cessauerit, vel fomentis exterius laxatorijs calidis vel intra nares quibusdam inditis, illam denuo promouere debebunt. nonnulli scalpello venas intra nares positas, vt denuo hæmorrhagia restitatur, scarificant. De qua venarum scarificatione nos in libris de medicina Aegyptiorum scripsimus. Alij graminis spicas intus imponentes, venas aperiunt, sanguinemq; educunt, ad quam mouendam vacuationem spicæ graminis, quod gramen manne vocant, & graminis crucis sunt aptissima. Eodem modo omnis consueta euacuatio sanguinis vel ab hæmorrhoidibus vel ex vtero in mulieribus, si aliquando cessauerit, erit reuocanda, ijs præsertim medicamentis, quæ in præcedenti libro meminimus. His præmissis, aliud ad sanitatem ad adstrictum declinantem conseruandam adiungimus, quippè ex huiusmodi meatuum adstrictione, licet multa hæc adstrictio non sit, corpora tamen in plethoram, atque in Cacochimiam quandam incidere, quæ ni corrigatur, & tollatur homines in morbos adstrictos prolabi est necessarium. Itaque si ex illa symmetria meatuum ad adstrictum quadantenus versa, atque diu neglecta, in corporibus aut plethora, aut cacochimia contigerit, opera danda erit, vt vtraq; tollatur, quod ni fiat, procul dubio ita sanitas vitiabitur, vt in morbosam constitutionem corpora prouehi sit necesse. Plethora vero priuatim tollitur euacuatione. Etenim dicebat Hippocrates: Quicumque morbi ex repletione fiunt, curat euacuatio. Ad molliendam vero euacuationem complura præsidia sunt necessaria, primum sanguinis euacuatio, quæ sit aut vena, aut arteria secta, aut malleolorum scarificatione (quàm aliàs ex Galeno ostendimus vicarium esse auxilium venæ sectionis) aut cucurbitulis cum scarificatione appositis, aut menstruorum, aut hæmorrhoidarum prouocatione. Menstrua verò atque menses suppressi quibus medicamentis restituantur, reuocenturque & superius dictum est, & in libro xi. rursum accuratius dicitur. Hæmorrhoidasque prouocabimus & appositis hirudinibus (sanguisugis vulgo vocatis) aut medicamentis anasthomoticis idest aperientibus, vel rarefacientibus seu laxantibus quouis modo, à nobis aliàs memoriæ traditis. Secundo corpus Plethoricum inedia, seu abstinentia à cibo & potu euacuat, Quod complures non ignorantes, cum eos ciborum satietas, & inappetentia, cum grauitate corporis, tenuerit, continuo seipso releuant, tenuissimo victu per aliquot dies instituto atque ab ipsis sedulo obseruato. Hac ipsa ad prohibendos morbos, qui à repletionem fiunt, nihil esse præstantius, deprehensum est. Vnde merito Plinius dixit: Vtilissimam esse in cibis temperantiam: & Hippocrates, sanitatis studium esse præcipuum non satiari cibis, tradidit: Quo complures sanitatis conseruationi maxime studentes, nunquam ex prandio, vel ex cœna cibis saturati resurgunt. Balneum quoque naturale, scilicet aut sulphureum, aut bituminosum, & arte factum ex dulci aqua calida, humorem digerendo plethoram adimit, Sudoremque mouere in hisce corporibus etiam est vtilissimum. De quibus singulis in alio libro præsidij seorsum & accurate scripsimus. Exercitium vero esse aptissimum ad plethoram tollendam, aliàs demonstrauius: & quibus modis fieri etiam debeat, quæque eius differentia sint, atque quas homines repleti ab exercitijs vtilitates capiant satis diligenter indicauimus. Somnus itidem ab inedia, à balneo, ab exercitio, atque à sudore maxime corpus euacuat, atque laxat: siquidem ab illis cum humores in extremis partibus absumantur, in somno à calore intra reuocato humores in interioribus quoque corporis partibus existentes

R 2 absumantur:

In 2. aphor. 22.

Ex 2. aph. 17.

In lib. 18. hist.
nat. cap. 5.
In 6. epid. sect. 4.

De Medicina Methodica

absumentur: atque hæc sunt plethoram in corporibus minuenda, atque adimenda. Nunc, quæ cacochymiam, quæ est particularium humorum, excrementorumque plenitudo, minuunt, etiam dicamus. Hæc verò sunt quouis modo corpora purgantia, scilicet primo, per os deuorata, cathartica vel ea lenitoria (vt aiunt) vel eductoria seu attractoria sint, aut per vomitum purgantia, cuiusmodi est albus elleborus, stimi præparatum & similia. aut per ventrem, vt est scamoniū, colocynthis, & similia. Clysteribus etiam hæc purgatoria & similia in ventrem purgationis gratia induntur, quæ etiam mēstrua, hæmorrhoidas, atque vrinam mouent, cacochymia tollendæ remedio sunt. at cum de his omnibus in altero libro sufficienter scripserimus, idcirco nihil aliud in presentia merito attingimus. atque hæc est sanitatis, in meatuum quadantenus ad adstrictum symmetria declinante consistentis, conseruatio. Nunc quomodo in corporibus ad laxum declinantibus, eadem sanitas conseruetur, dicendum est: potro hæc corpora symmetriam meatuum habent nimis ad laxum accedentem, quod nimirum aut meatus cutis nimis laxos habeant, aut aliquem alium meatum ex externis vel internis quauis de causa ampliorem laxioremque redditum. Itaque hæc sanitas vitata vsu adstrictiorum medicamentorum restituitur. Vnde diximus plures olim in pueris statim enatis consueuisse ipsorum cutem densare, aut sale vel puluere rosarum, vel myrtillorum ipsorum cutē aspergentes, vel oleo vel vnguento adstringente ipsam inungentes, aut alio persimili auxilio videntes. Qui verò laxiorem ventrem habent, ex quo plurimum deiciant, vel meatus vrinarij laxiores itidem redditi sint, vnde vrina immoderate profluat, vel etiam vasa seminalia itidem habeant, quo semen quoque profuat copiosius cum venere & citra venere, adstrictorijs medicamentis opus habebunt. Qui facilius crebriusque vomitant, non minus quam ij, quibus, aut per nares, aut per os, aut per ventrem, aut per vrinam, vel per vterum vel ab hæmorrhoidibus sanguis aut immoderatius, aut crebrius emanat, eodem modo præsidij adstrictorijs tractandi sunt. Demum & quibus frequentius sudores quoque copiosi erumpunt, idem faciendum. Ex his omnibus causis corpora quouis modo ad laxum tendentia, si ipsorum sanitas conseruanda sit, opus habebunt præsidij adstringentibus, cibo potuque scilicet pleniori vtendum erit, quiete seu ocio somnoque largiori, pauca venere, & medicamentis quouis modo aut obstruentibus aut claudentibus, aut densantibus meatus, a Methodicis adstrictorijs vocatis. Atque hæc de corporum sanitate cum perfecta, tum imperfecta quippè ad adstrictum vel ad laxum declinante, ex ijs, quæ in corpus & retinentur, & excernuntur, conseruanda dicta sunt.

De sanitate conseruanda ex corporis motu, scilicet ab exercitijs. Cap. XV.

Corpora, quæ sanitate exquisita gaudent, ad eam conseruandam moderatis exercitijs vt opus habent, sic & moderata quiete; namque exercitia superfluentia excrementa in ambitu corporis digerunt: hæc sane maxime, vtilia sunt ad poros cutis expurgandos, atque laxandos. Diximus autem in exercitijs faciendis tria esse ad vnguem seruanda, scilicet, vt nunquam homines cruditatibus abundantes exerceantur, quoniam cruditates in venas rapiantur meatusque obstruant, atque exinde ad adstrictos morbos transitus fiat, ob idque etiam non conuenire exercitium nisi prius in stomacho & in hepate peracta sit concoctio. Itaque exercitatio adetunda non est nisi post excrementorum per ventrem & per vrinam factam euacuationem. Quo intelligitur, quamobrem Hippocrates dixerit labores

labores cibos præcedant: idest, exercitationem ante prandium vel ante cenam per paucas horas fieri oportere, quod tunc temporis perfecta sit concoctio, nullæque cruditates sint; quæ a calore exercitijs exercitato auctoque in venas atque in habitum corporis trahi possint. Tertio exercitij quoque quantitas seu mensura intelligi oportebit, scilicet quoad corpus intumescat, & color illi floridus appareat, motusque promptè, æqualiter, concinneque edatur, atque sudor cum calido vapore mixtus appareat, exercitationem leniter factam, non violentam, tandem esse continuandam: illicoque cessandum ab exercitatione, si contractior corporis moles videatur, si floridus color evanescat, atque non minus, si motus corporis promptitudo, æquabilitas, atque concinitas mutari ceperit. at cum hæc etiam aliàs meminimus, nihil aliud a nobis est dicendum. idemque de exercitiis differentijs: cum satis superque & de ijs singulis, in superiori libro scripserimus, inter genera exercitationum præcipue comprehendentes, ambulationem, cursum, saltum, pilæ ludum, frictions, gestationes, equitationes, uestiones, atque alias exercitationis species ad vsum medicinæ facientes. Cæterum his præmissis, iam de præseruatione illius sanitatis, quæ & ad adstrictum, & ad laxum declinat, agere incipimus. Ad illam enim omnes exercitationes, quæ quadantenus humores superfluentes digerendo atque siccando, meatus laxiores reddunt, conueniens cuiusmodi (exempli gratia) sunt frictions, multæ, molles, ad omnes partes corporis, maximeque eæ; quæ ex oleis laxatorijs fieri solent, actu calidis, cuiusmodi est chamemelinum, irinum, liliorum alborum, amygdalinum cum dulce tum amarum, atque etiam commune, quod adstrictionis sit expers. ambulationes lentæ, sed longo itinere factæ plurimum resoluunt, etiam si per loca plana fiant, longe plus digerunt, & laxant, quæ per loca inæqualia fiunt, montuosæque præferuntur: cursum adhuc magis: ex minoribus vero sunt, gestationes, equitationes, uestiones & similes aliæ, de quibus cum aliàs sufficienter egerimus, non est vt in præsentia iterum eadem repetamus. Quæ vero ex corporibus ad laxum declinant, quiete potius quam motu illis est opus, vel si exercitium conueniat, quam paucissimum esse debet, quo merito in pueris lactantibus æstimatum ab omnibus est, pro exercitio (quod ipsorum corpora maxime ad laxum accedant) satis esse leuem moderatumque motum, qui sit in ipsorum cunabulis. Quare qui ad laxum naturam, habitumque habent inclinantem, ab exercitijs se cauere debent, qui quietis, quæ motus vltus illis erit magis proficiuus. & hæc de sanitate conseruanda. Cæterum cum quidam affectus sint, qui cum morbi (quod non grauius lædant actiones neque animales, neque vitales neque naturales) dici non debeant, in habentibusque sanitatem imperfectam obseruentur, merito nos quoque duximus fore, vt de præseruandis a morbis etiam corporibus, quæ prædictis vexantur, sermonem haberemus. Quod eo etiam libentius faciemus, quod alij quoque dogmatici medici viri eruditissimi fecisse vili sint.

De sanitate in ijs corporibus conseruanda, quæ lassitudinibus laborant, & primo de methodo qua lassitudines sanari queant. Cap. XVI.

Solent nonnunquam corpora etiam sana, quibusdam affectibus leuipribus molestarì, qui si ipsi in morbos mutantur, vtile est, vt pro illorum quoque corporum conseruatione, quibusdam adhibitis prædijs, eos affectus tollamus, ex ijs vero frequenter occurrunt lassitudines, cruditates stomachi, horrores, rigores, refrigerationes, calores, sitis, atque corporum cum gracilitates, tum obefitates.

obesitates, quæ omnia corrigi in sanitatis tuendæ gratiam debebunt. Ceterum cum hi omnes affectus, corpora ad adstrictum vergere, seu ab adstricto vitiari denotent, eos si medicis præsidij abigere voluerimus, nihil aliud esse videbitur, quam iterum agere de meatuum symmetria ad adstrictum declinante, conseruanda. Primum autem à lassitudinibus principium faciemus: de quibus primum dicemus, quid sint, quotuplicesque & à quibus causis iuxta Methodicos fiant, atque exinde esse affectus adstrictos demonstrabimus. Lassitudinem vero esse dicimus caliditatem immodicam in musculis atque articulis ab immoderata exercitatione factam, eamque à febre differre, quod febris sit non musculorum & articulorum solummodo, sed totius corporis, si Galeno credendum; immoderata caliditas. Neque in dubiū a quopiam reuocandum putamus, ipsam profectò lassitudinem immodicam caliditatem in musculis articulisque esse, at si dixerimus esse caliditatem immoderatam cum dolore, seu cum tristi sensu, perfecte, ipsius essentiam definiuisse videbimur; Triplex autem est in lassitudinibus sensus, vtique putantibus, qui ijs laborant, vel conquassatum sibi videri aliquid, verberatumque vel tendi sibi vndequeque corporis molem, vel tanquam à multis quoties mouentur, vlcerebus corpora affici: quo triplicem omnes fecerunt lassitudinem, scilicet vnam à sensu seu à dolore vlceratiuo, vlceratiuam appellatam, alteram à tensione tensiuam, atque tertiam phlegmonodem, idest inflammatoriam. In vlceratiua densa & horrida (auctore Galeno) cutis apparet, & dolent veluti qui vlcera multa habent alij cute, alij etiam carne subterposita. in tensiua vero cum calore immodico tensionisque sensu molesto in musculis ac vel etiam in neruis, recte musculorum fibræ tendi perinde ac in conuulsis videntur. redditque huiusmodi lassitudo homines valde pigros atque ad motum ægros. Denique inflammatiua dicta est, quoniam ab ea ipsa homines lassati partes veluti contusas atque inflammatas sentiant. hæc inflammationi similis videtur, & propterea ex contractu dolent, atque partes læsæ calidiores apparent: Hæ à duplici causa excitari solent, plerumque à causa procatastica scilicet, aut ab exercitijs immoderatis, aut ex itinere, vel à simili alia causa. Nonnunquam absque causa procatastica, sunt scilicet ab humorum multitudine. Has vero lassitudines spontinas medici appellarunt, neque veras esse lassitudines non paucis visum est, cum hæc facillime in putridas febres mutentur, omniumque maxime, quæ inflammatoriæ dicuntur, namque hæc paucissimis vel etiam horis in febres vehementes mutantur, quibus ni cito sanguinis copiosa euacuatione occurratur, lassati magnum in vitæ discrimen labuntur. Itaque ex ijs lassitudo vlceratiua dicta ex cacochymia humorum tenuiorum acrium fit, aliquando salforum, & nonnunquam acidorum: tensiua vero ex plenitudine, atque inflammatoria ex vtraque causa vnâ coeuntibus originem habet. Lassitudinem vero à causa procatastica vel ab exercitijs vel ab itineribus, Galenus dicebat esse symptoma sanorum corporum. Methodicos hunc affectum adstrictum iudicauisse credendum est. siquidem & Dogmatici dixerunt in vlceratiua curæ dentam esse; Galenus apertissime hoc visus est confirmasse in 2. libro simplicium, cum hæc ibi scripta reliquerit: Quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur vero vacua spaciola non vtili & naturali humore (nam sic foret plethora siue repletio) sed tenui & acri, mordacique, proinde remedijs indigent duplicibus, tum ijs quæ siccitatem corporis cortigunt, tum ijs, quæ humorem acrem euacuant. Ceteras vero esse quoque adstrictos affectus, quippe tensiuam, inflammatiuamque vocatam, quis contendet, cum & in ipsis vacua spaciola siue meatus humore repleantur, meatusque in adstrictum manifesto illabantur. Quod ex medicamentorum facultate digerente euacuanteque humorem in musculorum articulorumque meatibus spaciolisue adstrictum facientem,

*In libro de caus.
morb cap. 2.*

*Gal. in 2. de sym.
pt. caus. cap. 4.*

*Gal. 2. in aphor.
com. 5.*

*Gal. in 3. de tuez.
sanit cap. 6.*

Cap. 25.

facientem, facile confirmatur, hæc enim medicamenta ideo lassitudines tollunt, quoniam digerendo vacuandoque humorem adstrictum facientem, laxant. Quid an non omnia medicamenta, quæ lassatis conueniunt, laxatoria sunt? Certe quidem, cum præcipua sint frictiones ex oleo dulci tepido, atque lauacra aquæ dulcis moderate calidæ, quæ nullo hæsitante quidem lassitudines tollere deprehensum est. sed age adeas tollendas, tanquam sanorum symptomata, quæ si negligantur, trahunt in febres & in grauiore morbos, veniamus; Dogmatici præmissa distinctione lassitudinum in eas, quæ à gymnasijs vel itineribus fiunt, atque in spontinas, illas solummodo leuioribus laxatorijs exterius adhibitis adimunt, & spontinas quæ in corporibus, in quibus humores redundant, excitantur etiam maioribus efficacioribus laxatorijs vtentes. ita vt præter frictiones ex oleis dulcibus laxatorijs, atque præter balnea aquæ dulcis moderate calida (quæ lassitudines à causa procatactica factas sufficienter posse sanare putant) etiam sanguinis euacuationem, atque purgationem adiunxerint. Vnde in tollendis lassitudinibus non spontinis (ita ipsarum causis indicantibus) frictionibus ex oleo, atque balneis dulcibus temperatis solummodo vtendum docent; & spontinas lassitudines in corporibus (vt dictum est) humoribus scarentibus obortas ita indicante ipsorum plethora vel cacoehymia tanquam causis, vt depellant, aliquando sanguinis vacuatione vel per venam sectam vel per malleorum scarificationem, aliquando purgatione & aliquando vtroque præsidio vtuntur. Quæ medendi varietas videtur apertissime indicari à varijs morborum causis, ex quo contra methodicos causas morborum curationem indicare: Methodici itaque quomodo absq; cognitione causarum, lassitudinibus mederi poterunt? Hi enim quascunque curantes lassitudines, primum à leuioribus laxatorijs externis exordiuntur (quod lassitudines omnes adstrictas passiones fecerint) curationem, scilicet mollibus frictionibus atque balneis temperatis, primum tentantes lassitudines digerere, quæ ni huic curationi cesserint, urgente magnitudine adstricti morbi, ad efficaciora laxantia descendunt, scilicet ad sanguinis missionem, raro tamen, vel nunquam ad purgantia vel per vomitum vel per ventrem cathartica vocata. At dicent Dogmatici non planè conuenire singulis lassatis huiusmodi Methodicorum curationem, quandoquidem in ijs lassitudinibus, quæ excitantur in corporibus intus multis humoribus scarentibus, si non tollantur vel non diminuuntur ex usu frictionum, inunctionum & balneorum dulcium, tutò non posse vel ad sanguinis vacuationem, vel ad humorum purgationem medicos descendere: etenim cruda excrementa à sanguinis facta euacuatione intra venas raperentur, & malum augerent, vel in periculosius mutarent. Crudis vero humoribus in corpore redundantibus non esse purgandum, humoresque purgatione non posse educi, stat in placitis ferè omnium medicorum. Quid itaque dicemus? lassitudines si fiant in ijs, qui abundant humoribus crudis, scilicet cruditatibus, necessario illud fieri, vel fusis ijs humoribus crudis redundantibus atque ad musculos, articulos, neruosque attractis. vel nullo modo ijsdem crudis humoribus ad partes laxatas attractis, & neque etiam alteratis, sed humoribus ad lassatas præ motu seu exercitio vel ab itinere longo atque immoderato partes, partium proximarum à calore attractis atque fusis. Vtroque modo lassitudines factæ, solis frictionibus, inunctionibus, vel balneis temperatis humores attractos atque fusos digerentibus, sanabuntur; aut si humor attractus vel ex cruditatibus existat, vel ex partibus vicinis proximisque, non crudus cum sit tenuis (scilicet à calore immodico maxime extenuatus ac fusus) necessario his præsidijs laxantibus digeretur. Atq; idcirco non erit opus sanguinis euacuatione vel purgatione ad tollendas eas lassitudines. Neque est, quod nobis obijciant, non semper in omnibus lassitudinibus, lenes friciones, inunctiones, balneaque conuenire, At quinimo in ijs, vbi humores

humores acres altius in corpore redundarint, quiete, somno, cibique per diem abstinentia, esse agendum, ab omni motu abstinendum esse, & postea pinguitur vinctos modiceque fricatos, modico cibo atque potu esse nutriendos, quibus lassitudinibus non cessantibus, ad efficaciora præsidia veniendum, scilicet ad euacuationem sanguinis vel purgationem, quæ præsidia conuenire aiunt, si corpora cruditatibus repleta non fuerint. Certe neque in ijs prædictis lassitudinibus videtur abstinendum à leuibus frictionibus ex oleo dulci factis, neque à balneis temperatis, præsertimque in vlceratis, quæ sunt ab humoribus tenuibus acris mor-
 dacibusque, quod laxatorijs ijs medicamentis humores fouentes lassitudinem digerantur, ipsorumque humiditate humorum acrimonia atque mordacitas corrigatur hebeteturque; similisque hæc videtur fuisse curatio, quam Hippocrates in pleuritide instituit, de qua ita habet: Lateris dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere, non abs re existit. Quæ
 veritatem & Galenus in huius loci commentario adhuc clarius expressit, ita enim inquit. Primo autem auxilio si dolor is vel sanari vel mitigari fomentis calidis, tentandum præcipit Hippocrates. Nempe fomenta calida cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficere, phlegmonesque sanguinem tum tenuare, tum per halitum digerere consueuerunt. Quæ si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, verum quoque & affectæ quæ minus distenduntur partes, mitius exinde & mansuetius dolebunt. Proinde ex his liquido apparet, Hippocratem omnium medicorum facile principem, medicinæque præcipuum auctorem, ab usu laxantium in principio pleuritidis non timuisse. Igitur neque Methodici timere debebunt, in lassitudinibus etiam spontinis tollendis, laxantium digentiumue medicamentorum usum. quibus præsidij ni diminuantur lassitudines (quod nimirum partes, quæ ex calore à prædictorum medicamentorum usu aucto plus humoris trahant, quam euaporet, scilicet cum quæ calefaciunt, suapte natura, ut quod vicinis continetur partibus digerunt, sic & quod redundat ex præpinquis trahunt) ad aliquam euacuationem accedunt, quod præceptum quoque est Galeni, qui in loco citato ita habet: Cum igitur fomenta calida dolorem non soluerint, corpus totum insigni aliqua vacuatione prouacuabis. Quare non improbanda videbitur lassitudinum curatio huiusmodi, quæ in lassitudinibus, quæ adstricti sunt affectus, primo usum minorum leuiorumque laxantium præsidiorum exercet, scilicet mollium frictionum, inunctionum, atque balneorum dulcium temperate calidorum, & postea, leuioribus laxatorijs propositis minime conferentibus, maiorum, efficaciorumque (cuiusmodi sunt euacuationes per sanguinis missionem, atque purgationes vel cathartics medicamentis, vel clysteribus subdutorijs factæ) ad usum descendunt. Observatio itaque causarum procacitarum, atque plethoriæ, vel cacochymiae ad sanandas lassitudines non videtur necessaria, cum non euariet curationem, sed solummodo laxantium efficaciam. quando in non spontinis leuiorum usus sufficiat, & in spontinis efficaciorum. Quæ etiam curatio eo modo constituta, non videtur omnibus lassitudinibus conuenire, siquidem in ijs, quæ ex immoderato vel exercitio, vel itinere sunt, quandoque etiam maiorum laxantium usus ad medendum ueniat, scilicet euacuationum, atque purgationum; quod eæ lassitudines non raro fiant in corporibus cacochymis vel repletis, in quibus cum mitioribus medicamentis corpora saluti minime restituantur, statim ad vacuationes vel ad purgationes descendendum est, quod hæc in grauissimos morbos mutari soleant, scilicet in febres ardentes, atque in viscerum phlegmones. Cuiusmodi fuerunt, quæ (auctore Hippocrate in epidemijs) in Sileno adolescentulo, qui in mendacium foro decumbebat, atque in Pythione in thaso decumbente, obseruatæ fuerunt, à quibus in ardentes acutasque febres, & in phlegmones interiorum viscerum, quibus breui interierunt, mutatæ fuerunt
 itaque

In 2. de vult. rat.
 in acut. 122. 1.

itaque cum etiam in non spontinis lassitudinibus, leuioribus remedijs inutiliter tentatis, ad sanguinis euacuationem veniendum sit, quis quaeso non fatebitur, eam curationem à Dogmaticis ex causarum indicatione institutam haud omnino conuenire, cum eas ex laboribus atque itineribus factas solummodo externis leuibufque laxatorijs curent, scilicet frictionibus ex oleo, atque balneis dulcibus temperate calidis. cum tamen in his quoque non raro, ijs medicamentis ni cedant (neque omnes lassitudines his medicamentis cedunt) ad sanguinis vacuationem & ad aliquam purgationem venire sit vtile. At his praemissis, figillatim de lassitudinum curatione est agendum.

De particulari curatione ad lassitudines persanandas, atque de medicamentis singulis ad eam curationem accommodatis. Cap. XVII.

QVod singulis lassitudinibus sanandis eadem laxatoria medicamenta conueniant, non est, vt nunc idem ex Methodicis longiori oratione demonstrare debeam, cum ex Galeno alijsque omnibus constet medicamenta ad illud commode praestandum singula debere esse temperate calida & humida, ideoque digerentia atque laxatoria. Cuiusmodi sunt frictiones ex oleo mollissimæ, tum balnea dulcia temperata, atque inunctiones ex oleis temperate calidis, laxatorijsque. Etenim hæc digerendo euacuant humorem simularium partium spaciola replentem, atque infarcientem, humiditateque easdem met partes similes siccitas restitunt (ab ijs profecto duabus causis, scilicet à repletis meatibus, atque siccatis partibus similibus præmulto calore ex motu exercitationis, vel itineris immoderati concitato omnem lassitudinem fieri, Dogmaticorum auctoritate constat) Itaque proba victus ratione instituta, nimirum, vt primo aer quo lassitudine vexati videntur, sit calidus, & humidus, si fieri potest, non obscurus, at medicocriter lucidus: cibus sit paucus, calidus quoque temperate atque humidus, succique optimi, cuiusmodi sunt oua gallinarum recentissima sorbilia, optimæ carnes, & similia; potus sit vinum pauciferum, cibus vero atque porus sit modicus sed (vt dictum iam est) optimus: somnus itidem sit temperatus, vel aliquanto longior, quoniam humores superfluentes digerit, corpusque recreat, quiete quoque agendum erit, quando ex motu lassitudines fiant, reliquaque his proportionem respondebunt. Quod pertinet ad medicamenta, conferunt frictiones ex oleo dulci temperate calido, scilicet mollissimæ, quæ admouebuntur volis manuum inunctis ex oleo aut communi dulcissimo, quod, vt Galenus notat, sit expertus cuiusvis adstrictionis, aut ex aliquo ex ijs, quæ dicemus, leuiter totum corpus fricantibus bisque in die poterunt fricari corpora lasa, quippe ante prandium atque ante cenam per duas horas, & postea inungere partes lasatas copiosiori oleo temperate calido, aut, vt dictum est, ex communi dulci, omni adstrictione prorsus destituta, aut chamæmelino, cui Galenus primum locum tribuere videtur. Namque vt Gal. ait: chamæmelum est lassitudini, vt si quod aliud conferat, opportunissimum. dolores mitigat, tensa remittit, & laxat, dura medicocriter mollit, congesta rarefacit. aut amygdalino dulci, aut anethino, aut quod est vel ex radicibus altheæ, vel cucumeris sylvestris paratum: Galenus pluribus in locis laudauit oleum, ipsumque lassitudinibus remedio esse affirmavit, ita, vt ipsas tollat, non minus quam frictiones ex oleo ad idem commendauerit. Igitur admouebuntur frictiones, & postea partes lasatæ perungentur oleo temperate calido, & postea fricata inunctaq; corpora per duas horas stragulis in lecto temperate calido cooperta

In 3. simpl. c. 10.

In 2. simpl. cap. 5. 10. 18. & 25.

cooperta manebunt. si vero fricata corpora balneum aquæ dulcis temperate calidum ingrediantur, in ipsoq; per duas horas maneant, adprime iuuabuntur. Dulcia enim lauacra aquæ temperate calida, perbelle humorem lassitudines fouentem digerendo, scilicet meatibus spaciolisue vacuis cutis rarefactis, laxatisque ijs lassitudinibus remedio sunt. Itaque poterunt solæ frictiones molles lassitudines tollere, aut additis inunctionibus ex oleis temperate calidis, aut tandem addito quoque balneo, in quo morentur adminus per horam, maneque & vesperi ante cibum. per tres horas hæc præsidia erūt admouenda. Ni vero lassitudines cesserint ijs medicamentis, de efficaciore medicamento erit cogitandum, vt quandoq; etiam mittatur sanguis aut per venam sectam, aut scarificatis malleolis, aut adhibitis cucurbitulis cum scarificatione, cutis partibus lassitudinem sentiētib; præstabit vero priusquam sanguis euacuetur, vt vel clysteribus vel alio laxatorio medicamento ex lenientibus vulgo vocatis alius subducatur, atq; laxetur.

De pseudolassitudine siccatoria vocata, scilicet de siccitate, squallore, gracilitateq; corporum tollenda. Cap. XVIII.

Pseudolassitudinem seu non veram appellant, quæ licet quadatenus lassitudinis similis sit, tamen nihil veræ lassitudinis habet, neque enim partes caliditate immoderata vexantur, neq; dolorem aliquem sentiunt, vel vlcerosum, vel tensuum, vel inflammatorium, sed solummodo siccitas seu ariditas atq; gracilitas in corporibus apparet. Hæc vero fit, cum muscoli supra modum siccantur, ita vt vestibus exutis corpus squalens, contractumq; appareat, atque ad motum pigrum. Aliqui dicunt huiusmodi siccitatem, seu siccatoriam vocatam lassitudinem fieri, vbi ab immoderatis laboribus, immoderatisue exercitationibus superfluitates corporum præsertimq; in partibus subcutaneis immoderatus digeruntur, euacuanturque; siquidem ab ipsis distenta corpora laxari deprehenditur, atq; nihil aliud fieri præter siccitatem. Cæterum non videtur verum, quod à nobis modo dictum est, in hac lassitudine scilicet corpora squalentia & contracta apparere, & in hanc affectionem venisse ab immoderatis exercitijs immoderatus digerentibus atque euacuantibus humiditates corporum; ita vt propter immoderatam euacuationem humiditatum partium carnosarum cutis eorumdem corporum siccetur, squalensque reddatur: quomodo sicca ac squalens cutis, quæ adstrictum affectum perpetuo denorat, immoderatam euacuationem, quæ morbus est profluens siue latus, significabit? vel melius quomodo ab immoderata euacuatione, quæ morbum laxum facit, siccam ac squalentem cutem fieri audebimus affirmare? Hippocrates huic difficultati satisfacere videtur, cum ita dixerit: omnis extenuatio laxat cutim, deinde distenditur. & Galenus in commento, ait: Vbi extenuatur propter consumptionem humiditatis partium carnosarum substantia carnosa, cutem laxari, perinde ac vtres euacuat & vesicæ laxantur, vbi vero nedum carnosæ substantiæ humiditas absorpta est, at quinimo etiam cutis substantia, tunc cutis quoq; distenditur, eo profecto modo, quo vtres & vesicæ etiam ipsarum euacuata consumptaque substantia, siccescunt, atque densantur. itaque si verum erit, corpora siccatoria lassitudine affecta, sicca, squalida & contracta conspici, verum quoque erit prægressam fuisse immodicam euacuationem & in substantia carnosâ cuti subiectâ, & in cute ipsâ, vnde siccata squalensq; reddita sit. At neq; hoc videtur rationi consentaneum quod in affectu laxo, cutis sit sicca & squalida, quando aliàs docuerimus potius eam mollem, humidamq; esse oportere, & mirum est, quod antiqui hunc affectum laxum morbum fecisse visi sint, quod sanè re ipsa ita esse cognoscitur, quod subsequatur immoderatam humiditatis vtilis euacuationem, vt in

In 6. epid. 3. tex.
29.

ut in hecicis fit, nam & in ipsis tandem immoderatus consumptis vsq; ad cutem ipsam humiditibus, cutis tenditur, siccescit, atque squalida fit, cuiusmodi in fronte illorum observatur. Caterum non inconuenit corpus aliquod intus laxo morbo vexari, cum eius cutis densa adstrictaq; fit, quod uti dictum est, in hecicis tabidis planè fit, qui cum interius patiantur morbum laxum, nimirum qui in continua vitium humiditatum consumptione atque euacuatione sint, qui etiam ex utrisque vestibus cutem habere deprehenduntur siccam, tensam & squalidam. hincq; est, quod medici Dogmatici ipsorum corpora, ut humefaciant & refrigerent, primum in balneum calidum & mox repente in frigidum iniiciunt; in calidum inquam, quod cutis adstricta aperiatur emollecat, ut humiditas per ipsius meatus & ad carnosam substantiam peruenire queat. Itaque meritò nos dicimus hanc lassitudinem, quæ immoderatam nedum superfluitatem sed quinetiam vitium humiditatum euacuationem subsequitur, esse morbum mixtum ex adstricto atque ex laxo, & quia magis vrget laxus affectus, ideo victu pleniore bonique succi opus erit; tum vino in potu, & quia meatus interni quippe in carnosam substantiam laxiores facti sunt, idcirco balnea & alia medicamenta debent esse quouis modo adstringentia, sed quia cutis adstricta, clausisq; eius meatibus, quæ adstringunt non possunt exterius ab obstructis meatibus cutis peruenire ad carnosam substantiam roborandam, ideo primum vtuntur balneis temperate calidis, & inunctionibus, quibus laxiores reddatur cutis meatus, & postea modice ipsis rarefactis, protinus, ut recte Galenus animaduertit, in frigidam aquam exilant, est necesse: At Galenus consulit, ut aqua balnei sit calidior, quæ sensim contrahat & calefaciat & quadatenus cutem roboret, ne immoderatus ipsa ex calido balneo laxetur, & postea ut in frigidam exilant est opus ad cohibendam laxitatem in carnosissimis partibus. Aetius hunc affectum omnino laxum fecit, idcirco omnino adstringendum cutem in ijs oportere, non tamen frigida aqua, sed calidiori adstringendum credidit. Galenus vero longe securius primo cutem moderate laxat, & mox frigida aqua per eos meatus ingressa carnosam substantiam immoderatus laxam cohibet, quod cutis laxo affectu non laboret, sed ipsius cutis siccitas & gracilitas adstrictus affectus sit, simili ferè modo diximus in libris de medicina Aegyptiorum, mulieres graciles pinguescere, nimirum vsu balnearum dulcium tepidorum, scilicet quod attractum ab ipsorum modico calore alimentum ad carnosas partes quadatenus cohibeatur, & densetur, neq; dissipetur, quod fit à balneis calidis omnino laxatorijs, plurimum digerentibus, quibus corpora & pingua & carnosam gracilescunt. Sane ijs patet, quomodo corporum siccitas gracilitasq; corrigatur, atque ea particula, quæ ob immodicam euacuationem humorum cum superfluentium, tum humiditatum quoque vitium ex immoderato labore contractam, haud probè medicamentis sublatam. Nunc superest, ut de obesitate etiam loquamur.

In 3. de sanit.
tuenda cap. 7.

De corporum obesitate corrigenda. Cap. XIX.

IN his, qui immodice obesi sunt, minuendum nutrimentum est, augendaq; corporis exhalatio. Vnde cibus potusque paucus, & tenuioris pauciorisque sanguinis, vel etsi multus sit, tamen in paucum nutrimentum vertatur, vinum vero semper paucum & aquosum erit, deprehensum etenim est, vini copiam haud minorem partem ad obesitatem faciendam habere: Quare in primis cibus potusq; minuendus est, laxitasque corporis augenda est. quo assidue alui deiectiones maxime in his desiderantur, vrinalesq; euacuationes, immoderateq; sanguinis hemorrhoides & menses assidue profluentes corpora emaciant, quæ ni sponte fiant arte hæc omnia procurentur. celeres exercitationes cuiusmodi est cursus, atque

S 2 copiosi

In li. 6 de sanit.
tuend. cap. 8.

copiosi sudores, euacuaciones quoq; per poros cutis insensibiles ex balneis naturalibus sulphureis, bituminosis, nitrosisq; aut ex dulci aqua calida paratis, chamæmeloq; vel anetho, vel ruta, vel origano, vel pulegio, althea, fænugreco & similibus alteratis. Frictiones item molles laxatoriæ ex oleis laxatorijs calidis. Quibus quidem omnibus sedulo admotis, obesitatem diminui non est mirum, cum obesitas morbus sit adstrictus, illa q̄ue omnia præsidia sint maxime laxatoria. Galenus quomodo quendam obesum ad mediocritatem carnis reduxerit, hunc in modum scripsit: Ipse namq; præpinguem quendam paruo tempore ad mediocritatem carnis reduxi, celeri primum cursu uti cogens, dein sudorem linteo vel molli admodum, vel admodum aspero detergens: ab his, vnguentis euaporantibus, quæ hodie acopa medici iuniores vocare solent, largissime perfricui: ac post cuiusmodi frictionem ad balneum produxi: à quo non protinus cibum dedi, sed quiescere interim iussim, aut etiam consuetum aliquod munus obire, rursus ad balneum secundo egi: postea ciborum multitudinem, qui parum nutrent, apposui, eo consilio, ut saturarent illi quidem, cæterum exiguum nutrimenti in totum corpus submitterent. Addunt obesitas conferre animi passiones, quando maiores, iræ, excandescentiæ, gaudia quoque in corpore augeant exhalationem, vtilisq; carnosarum partium humiditates absumant, sicuti etiam vigiliæ, nonnulli & carceres laudant, in quos si casu obesi inciderint propter aliquod facinus conijciantur & diu molestissimo animo maneat excarnes redduntur.

*Ad rigorem, horrorem frigiditatemque atque ad caliditatem
in corporibus corrigendam. Cap. XX.*

In 2. yporiston.
cap. 23.

In 1. de mæ. med.

BALNEA calida, cum naturalia, scilicet sulphurea, bituminosa, nitrosa, tum arte facta ex aqua dulci calida, alterata herbis calidis discussorijs, cuiusmodi est chamæmelum, anethum, ruta, fænugrecum, melilotus, pulegium, origanum, calaminta, & similes aliæ. tum inunctiones etiam maxime iuuant oleorum calidorum, nimirum laxantium, cuiusmodi est chamæmelinum, anethinum, rutaceum, laurinum, & quod paratur ex sinapi, & ex ebuli altheæque radicibus, & cucumeris sylvestris, & cyclaminis, & bryoniæ & similibus; Omniaq; quoq; vtilia erunt vnguenta acopa Græcis dicta. Nonnulli etiam ad rigores, horrores & ad frigiditates, præmissis frictionibus mollibus, illinunt dorsum aliquo oleo ex prædictis, præsertim in febribus periodicis, per duas horas ante accessionem, propinato simul medicamento aliquo laxatorio. Vnde Dioscorides commendauit, dari peros, smyrnij, petroselinij, hypposelinij, vel apij semina trita, ad geminas drachmas ex vino calido, vel exhibebat modicum laserpitij, scilicet grani milij magnitudine, cum pipere, thureque tritis ex vino, vel myrrham fabæ magnitudine cum pipere. Galenus illinebat partes refrigeratas oleo, in quo euphorbium fuerit dissolutum. Contra vero ad calorem & æstum caloris emendandum balnea itidem laxatoria, non potestate tamen calida, sed ea quæ ex aqua dulci temperate seu tepide calida sunt, & hinc est, quod nos aliàs demonstrauimus morbum tum calidum tum frigidum, quod vterq; adstrictus sit affectus, iisdem balneis (quod laxatoria sint) de pelli, eodem itidem modo quod iisdem inunctionibus laxatorijs, vterq; itidem morbus cum calidus tum frigidus tollatur. Vnde deprehensum fuisse à Methodicis, morbos calidos frigidos, humidos, atq; siccos non habere ad curationem instituendam propriam indicationem, cum hi singuli (quod sint adstricti) laxatorijs medicamentis tollantur.

Finis Libri Quarti.

PROSPE-

141

De Medicina Methodica

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE MEDICINA METHODICA LIBER QVINTVS.

Caput 1.



Vm superioribus libris dogmata, quibus Methodica medendi secta fovebatur, nos & proposuerimus, & de ipsis accurate disputauerimus, librumque etiam præmiserimus de Methodicorum prophylactica medicina, reliquum erit, ut caput laborem prosequentes, de morbis Methodica medicina tollendis agamus, de quibus (cum aliàs demonstrauerimus eos esse aut adstrictos aut laxos, aut ex adstricto laxoque mixtos) acturi, primum de adstrictis scribemus, secundo de laxis, atque tertio de mixtis ex adstricto & ex laxo. Nostrum etenim institutum est, totam medendi artem ex illiusce Methodicæ sectæ placitis docere. Nunc vero de adstrictis morbis acturi, à febribus exordiri libuit, quod hæ frequentius medicis occurrant, familiariusque in quouis anni tempore grassentur, atque homines cuiusvis naturæ, ætatis, regionis corripiant, non minusque etiam quod ipsarum non pauca maxime periculosa sint. Neminem propterea absque febre mori posse haud paucis persuasum est. Itaque de febrium curatione ex Methodicorum placitis nunc primum agemus. Verum Methodici veluti cum Dogmaticis in multis ad febrium, aliorumque morborum durationem esse noluerunt, ita in eorundem affectuum notitia assequenda vel nihil vel parum ab ipsis differentes fuerunt, præsertimque in febrium cognitione. in hoc tamen cum illis minime conuenerunt, quoniam (ut nuper etiam ex ipsorum sententia dictum est) febres plerasque ad adstrictos morbos referre non dubitarunt. Quod dogma sciimus Dogmaticos haud parum damnassee. Cæterum quâ ratione illud ipsis fuerit persuasum, nunc, quod aliàs dictum sit, libenter non repetimus, scilicet omnes febres esse adstrictos morbos dicendas. Quibus aliquando etiam laxis profluensue affectus coniungitur, cuiusmodi sunt ardentissimæ, colliquentes, hæcticæque tabidæ: in his enim præter adstrictum affectum, qui est calor igneus, aut in spiritibus (ut aiunt dogmatici) aut in humoribus, aut in partibus solidis accensus, adstrictusque, intra corpus vero ob vehementissimū calorem laxis quoque affectus sit, quippe ab immoderato calore arteriarumque osculis intro laxatis ac diffusis natiuo & humido & calore exhalante, de qua re posterius loquemur. Sed his præmissis nunc ad febres sermonem conuertimus, & priusquam ad curationem tractandam declinemus, eâ primum, quæ faciunt ad ipsarum notitiam, dicenda sunt, atque ea quoque, ubi opus fuerit, quæ faciunt itidem ad prognosim. Porro, quod pertinet ad cognitionem essentiæ seu naturæ febrium, illud vnum in primis, ut quid febris sit deprehendamus, supponi oportere, scilicet febrem Græcos *πυρεξίαν* dixisse, ἀπὸ τῆς πυρετῆος id est febricitato. Alij *πυρεξίαν*, id est, igneam dispositionem, quam ex latinis non pauci calorem igneum, extraneum, atque præternaturalem nominarunt. Vnde aliqui hunc affectum definientes, natui

caloris

*Hipp. in 6. epid.
sect. 5. tex. 31.
Gal. in 2. de cau.
morb. cap. 20.*

*Et in 1. aphorif.
com. 14. & 16.
Gal in 8. meth.
med. cap. 1.
In 6. epid. fec. 1.
com. 29.
Aucen.
Aucerrh. 5. collig.
cap. 3.*

caloris ad igneum conuerſionem, & alij immoderatam caliditatem in toto corpore diffuſam eſſe voluerunt. Addunt, quæ hominem & actionem lædat. Cæterum ſecundum Hippocratem, præclarosque alios medicos, & ſecundum etiam omnium hominum (Galeno auctore) opinionem, febris caliditas eſt præter naturam in totum animal ſparſa, aut ſaltem in plures partes, aut in nobiliores quidem accenſa, quæ vitales actiones maxime lædit. Arabes dixerunt eſſe calorem extraneum accenſum in corde, atque mediantibus ſpiritu aut ſanguine per arterias & venas in totum corpus procedentem, lædentemque actiones. Vel quod ipſa ſit calor compoſitus ex calore nativo atque ab extraneo, à corde ad totum corpus miſſus, actiones paſſionesque lædens, nonnullis viſum eſt. Ex his ſat erit, nos deprehendiſſe febrem calorem eſſe naturalem auctum ad immodicum ſeu ad igneum mutatum, in corde aut primo aut ex alijs partibus incaleſcatis accenſum, perque totum corpus diffuſum, hominem, actionesque diu lædentem. Febris verò complures habet differentias (loquimur de febribus quæ per ſe tales ſunt, de ſymptomaticis autem poſterius) ſiquidem ex calore febrili, quædam tactui acres & mordaces ſunt, quarum aliqua continuò tales tactui apparent, & in aliquibus non continuò, vel ſtatim, ſed poſtea mordacitas ſentitur. quædam miti benignoque calore corpus afficiunt, talesque tactui ſentiuntur: Alia cum multo calore, alia cum pauco, illæ ardentes, colliquantesque, hæ ſinocha dicuntur. Quædam humida & quædam ſicca, hæ ardentes hæctica marasmodes dictæ, illæ amphimerina & ſudorifica. Quædam etiam frigida nominantur, non quod frigida febris exiſtat, at quod, eſi intus egroti calore æſtuent, exterius aut non calidi, aut parum ſentiuntur, aut in quibus extremae partes altergent, & interna viuntur. Calide dicuntur ubi corpora omnino cum extra, tum intus calore exæſtuant, vt ardentes. Ex motu verò febres quædam celeres, ſcilicet quæ citò reſoluuntur, vt ephimera: quædam longæ; chronica dictæ, cuius modi ſunt amphimerina, & nonnulla ex tertianis ſpurij, quartana, quintana, ſeptimana, octana & nouana. Quædam ſeruunt ordinem, quædam inordinatae ſunt, vt erratica. quædam continua, quædam intermittentes, quædam ſyncera, quædam ſpuria, aliqua ſimplices, aliqua compoſita, alia benigna, & ſimplices, quæ ſignis ſecuriſſimis. quarto die (Hippocrate auctore) aut citius deſinunt. Alia malefica, quæ omnium deterrima ſunt, ſignis affligentes periculoſis, quarto iridem die aut citius interimentes. Aliquæ ex loco læſo nomen inueniunt, vt hepatica, ſplenica, peripneumonica dictæ, quas non ſimplices febres, ſed phlegmonum ſymptomata veteres appellarunt. Demum ex materia, quæ primo accenditur, triplici quoque eæ diſtinguuntur genere. etenim ipſarum aliqua, quæ in ſpiritibus accenduntur, ephimera atque diarrhica dictæ, quædam, quod partes ſolidas occupent, hæctica & habituales dictæ fuerunt & quæ in humoribus conſiſtunt, putridæ. longe pluribus febres interſtingui differentiis, haud ignoramus, at propoſitas perſpectas habuiſſe, præſenti negotio ſufficere. Neque enim noſtrum fuit inſtitutum, de ijs omnibus, quæ complures ſcripſerunt, prolixius agere.

De febris generatione. Cap. II.

Febris generationem duo perficiunt, ſcilicet materia, atque caloris effectus causa, illam ex dogmaticis ſpiritus, humores, atque ſolidas partes corporis dicimus: hanc quilibet calorem immoderatum faciens. Hippoc. in libris de morbis, ex humorum plenitudine, & à bile (quam febris nutrimentum vocat) vehementiorem febrem fieri ſcriptum reliquit. & in libro de locis in homine expreſſit.

*Tex. 17. 22. 23.
& 25.*

In tex. 38.

expressit, bilem & pituitam corpore conclusam, quæ quieverit & non refrigeratur, neque exeat, neque moueatur, neque aliud subeat (quod fortasse idem est ac si dixerit & obstructione non dilatam, seu non ventilatam) febrem accendere. Unde obstructionem atque prohibitam transpirationem febrium gignendarum causam fecisse videtur. quod sanè de putridis & de aliquibus diarrhijs, quæ sũt meatibus corporis obstructis Dogmatici concesserunt. Quæ Hippocratis opinio Methodicis, qui omnes febres ad adstrictum retulerunt, non parum fauere videtur. Ab humorum putredine febres omnes nasci, aliquibus ex antiquis fuerat persuasum. Quod si febrem, natiui caloris ad igneam conuersionem, & quadantenus eiusdem caloris natiui passionem esse dixerimus, à veritate haud erit alienum. Cuius quidem sententiæ fuit olim omnis ab Atheneo Chorus, cum quibus (exceptis ephemeris) Galenus consentiit. Asclepiades verò (ille inquam, qui tantopere antiquiorum medicinam damnauit, vt ausus fuerit, illorum rationem medendi, mortis meditationem appellare) febres à corpusculorum siue atomorum in corporibus statione, & vehementes ab eorundem obstructione fieri credidit. Post ipsum Galenus (quem in multis vel etiam vni Hippocrati haud immeritò nonnulli prætulerunt) satis aperte caloris febrilis accensionis causas ex peripateticorum dogmatis docuit. Cum dixerit: ex motu corporis, animique immoderato calorem accendi; aut ex putrefactione humorum, aut à rei calidæ vicinia; vel à pororum cutis constipatione; vel ab usu atque esu calidorum; aut denique ex multis horum simul concurrentibus. Motu corporis, animique calorem concitari philosophis, quos à concussa scilicet elici ignem non latuit, est maxime euidens. Corpus ab immoderato exercitio, aut à labore primum patitur quandam lassitudinem, quæ ni tollatur, in corpus extensa auctaque febrem incurrit; non secus atque ab ira, macore & studio immoderato, quæ animi itidem sunt motus, homines sæpius in febres labuntur. A putredine igneam quoque calorem concitari, stercora atque semina putrescentia nobis argumentò sunt: cum res putrefactæ calefaciant. Non minusque etiã inflammationes erysipelata, herpes, carbunculi, qui sunt putrescentium humorum effectus, in partibus corporis igneam calorem concitent. A calidorum vicinia corpora calefieri, quis ignorat? cum obseruetur ab omnibus in calore solis & in igne, vltis plurimam caliditatem excitari, & vnam partem corporis ex inflammatione calefactam toto denique corpori communicare calorem. A pororum vero, constipatione caloris effluuiò intercepto, atque calidarum fuliginum impedira, cchibitaque solita euacuatione, corpora incalefieri, neminem medicorum latet. Quo Galenus meritiò complures ex balneis aquæ marinæ atque aluminosæ (quoniam hæ adstrictione meatus cutis densant constipantque) in febres incidisse, scriptum reliquit. Ab usu itidem calidorum, quod in ijs, qui balneis sulphureis frequentius, aut immoderatus usu fuerunt, obseruatur calorem accendi febrilem, atque non minus ab esu calidorum, atque à calidis potibus veterum vinorum, cuique planè notum est. Etenim vehementer actium esus frequens aut immoderatus, vni quique meri antiqui immoderatus itidem potus, vsque adeo corpus totum aliquando calefaciunt, inflammantque, vt inde illos in febrem prolabi, non sit mirum. Eodem modo medicamenta vehementer calida, cuiusmodi sunt euphorbiũ, caluina, sulphur, & similia, quæ meritiò medici inflammantium venenorum genere comprehenderunt, calorem profectò febrilem accendunt, natiuumque calidum in igneam mutant. Porro, vt parcius magis ad quarundam febrium generationem descendamus, de diarrhijs vocatis, quæ Græcis quoque ephemeræ nominantur quod per diem nimirum finiantur, affirmamus, eas omnes à causis procatarticis immediatis, scilicet aut ab adstrictis, clausisue meatibus cutaneis, vel ex balneis facultate adstrictorijs, qualia sunt aquarum salinarum, aluminosarum,

In 1. de diff. feb. cap. 5.

In lib. de caus. morb. cap. 2.

In 2. de differ. feb. cap. 11.

prima die aliquam concoctionem præferunt, bonique coloris existunt. Auicenna dixit, si vrina prima die concocta appareat, & pulsus fuerit bonus ephemeram febrem iudicato. Quibus signis merito Gal. prima die hanc febrem cognosci posse statuit. Nunc ad curationem descendimus. Quæ per se non videtur necessaria, scilicet quia morbus salutaris est, & sponte vna die tollitur, neque ob id vlllo egere auxilio videtur. Quo de harum febrium (licet in alijs ad curationem scriperint accuratissime) curatione complures ne verbum quidem. Verum cum mutari vel in hecticas (etenim hecticæ siue scheticæ incipientes ab ephemeris non differunt) vel in putridas possint, & ea via hominibus perniciem inducere, merito ad eas quoque tollendas medicamenta inuenta sunt; cum vero calor febrilis, qui in spiritibus quippè in hepatis & cordis sanguine, & in animalibus spiritibus ceu in materia accensus, ac veluti intus adstrictus, sit relaxandus, & digerendus, ita vt totus exhalet, & resoluatur. Vnde facile cognoscitur diarrhiam esse adstrictam passionem, quæ idcirco pro curatione instituenda indicat vsum præsidiorum laxantium. Quo mirum non est, si omnes medici in hoc conuenerint, vt balnea aquæ dulcis, & inunctiones laxantium oleorum omnibus diarrhijs vexatis medeantur, Gal. dixit omnes balneo curari oportere, Quod genus auxilij si recte tractetur nedum his, at longe pluribus alijs febribus maxime conducet. Recte sanè exercentur in Aegypto, in Arabia, & in alijs orientis calidis regionibus, quod ibi ob aeris caliditatem & ijs maxime corpora vtantur, & habeant innumeras balnearum ædes magnifice constructas, vt nos scripsimus in libris de medicina Aegyptiorum, in quibus balnearum vsus diligentissime exercetur. Hic vsus antiquis nedum ad ephemeram, sed ad omnes alias febres fuit maxime cognitus. Ni vero balnea recte tractentur, omittenda erunt, nam plus damni quam commodi afferre possunt. Qui balneis vtuntur, cum aere calido solij, tum lauacro opus habent. Aqua lauacri calida digerit, & magis humectat, vnde corpora febre diarrhia vexata ex ira, tristitia, lassitudine, vigilijs, cura, cogitatione, humore & ab alijs similibus causis, debentur. Galeno plus in balneo aquæ temperato calidæ morari, vt corporum siccationem corrigant, Quod & Methodici ad quamcunque siccitatem tollendam faciunt, quippè arefactas partes corporis aqua calida humefacientes. Aurelianus ad siccitatem ariditatemque lingue aquam calidam exhibet. in ijs vero diarrhijs quæ a cutis meatuum constipatione & ab externarum partium inflammatione fiunt, veluti à bubone in inguine (quod maiori indigeant digestionem quippè adstrictis meatibus cutaneis, cohibitis vacuationibus, quod intus clausa maneat, quæ digeri fuerant solita) ac vel etiam ex bubonibus, quod adsit sanguinis copia, ex quo fluxio ad bubonem fouetur, ideo plus isti ex Galeno itidem in aere calido solij morari debebunt, ad maiorem digestionem, & postea ingredi balneum oportebit. Alterum præsidium, quod non minus balneis vtile ad hæc febres æstimatur, est olei calidi dulcis inunctio, ipsa enim laxat, ac digerit: consulit vero Gal. præmitti singularum partium corporis frictionem mollem oportere, quoad corpus incalescat, & postea inungi, vel simul & inungi, & fricari oportere dixit: nempe ex oleo tepido & multo adstantes mollibus manibus perfricare oportere febricitantes, eosque maxime qui ex lassitudine primo, & secundo ex cutis constipatione, atque demum ex bubone tali febre consticiantur. In ijs, qui lassitudinem passi sunt, adest quædam phlegmonosa affectio tum in musculis tum in articulis. Vnde merito olei tepidi inunctione copiosa est opus, quæ potest partes tensas relaxare, caloremque humiditate hebetare, scilicet eius acrimoniam, atque siccatos cum musculos tum articulos humectare. Hæcque duo præsidiorum genera efficaciter quæcumque ephemeram febrem tollent, quippè balneum aquæ dulcis temperatum & oleum dulce temperate calidum, cuiusmodi erit commune maturum, ac recens, amygdalinum dulce, irinum, chamæmelinum,

Gal. in 1. de diff.
feb. c. 7. & in 2.
de crisi cap. 13.
Loco citato.
In lib. 8. meth.
med.

Gal. 1. ad Glau.
cap. 3.

memelinum, lilinum, & aliud simile. At aliquis petet, quamobrem neque sanguinis vacuatio moliatur, neque purgans exhibeatur in ephemeris, cum hæc præsidia inter laxatoria primum locum obtineant? id non fit, quoniam hæc præsidia laxatoria magna sunt, ideoque febri ephemeræ, quæ morbus adstrictus magnus non est, non conueniunt. vnde minora sufficiunt laxatoria. Victus vero in omnibus diarrhijs optimi succi, facilis coctionis: qualitate calidus & humidus, quantitate modicus, maxime in ijs, quæ ex cutis adstrictione & ex bubone fiunt, quod, vt dictum est, in his digestionem concludarum fuliginum sit opus, veluti in diarrhijs, quæ fiunt, ex lassitudinibus, ira, tristitia, cogitatione, studio, amore, ac ex alijs similibus causis cibis non ita parcus requiritur, in quibus etiam vinum aquosum, modo caput non dolcat, neque tempora pulsentur concedetur.

De febrium putridarum cognitione. Cap. IV.

Gen. in 2. de diff.
feb. cap. 8.

Quod frequentius medicis putridæ febres occurrant, ac magnum facessant negotium, quia curatu difficiles, & periculosæ sunt, ideo de his accuratius nunc agemus. Febres putridas vocamus, cum quouis humore, & in qualibet parte corporis, putrescente corpus incalescit, ipsasque etiam ab ijs distinguimus, quæ inflammationem siue phlegmonem subsequuntur (symptomata partium inflammationum hæc febres medici appellant) exempli gratia, phreneticas à cerebro, pleuriticæ à pleura, peripneumonicas à pulmonibus, hepaticas ab hepate, splenicæ à splene inflammato vocarunt, atque ita de alijs dicendum. De quibus modo non agimus, at de illis solummodo quibus primario corpora incalescunt. Quæ hisce signis nobis innotescunt: Quorum primum erit, quod nulla putridarum fiat ex causa procatactica immediate, nam ephemerarum proprium esse, vt ab ijs causis fiant, diximus. Quare cum quis experit febricitare nulla antegressa causa externa, vt est solis ardor, refrigeratio, exercitium, labor, ira, & aliæ huiusmodi generis, profectò ea erit febris ex putridis. Quandoque vero & has quoque a procatacticis fieri contingit, medijs tamen humoribus copia vel qualitate facile putrescibilibus. Vnde non immediatè putridæ ab hisce causis fiunt, sed ephemeræ tantummodo. Putridarum calor acris ac mordax est, tactui maxime molestus, præcipueque in augmento & in statu, in principio vero obscure mordacitas apparet. Variatque hæc caloris acrimonia & mordacitas intensione ac remissione in varijs febribus, in biliosis acriori & mordaciori apparente, ac in pituitosis minus est mordacitatis, inæqualis quoque est putridæ calor. Quæ ex his cum rigore, nulla antegressa causa, fiunt: putridæ sunt, proprium nō minus putridarum videtur, vt pulsuum in principio compressio, quam Græci *θλιψις* vocant, fiat: quippè febre incipiente, pulsus paruus inæqualisque comprehenditur, ni fiat ob aliquem humorem os ventris vel mordicantem vel quouis modo afficientem. Signum proprium atque inseparabile putridarum esse medici faciunt, si in augmento febris pulsuum submissionis siue contractionis (systolem dicunt) velocitas obseruetur, systolis enim velocior redditur ob copiam fuliginum expurgandarum: Contra dyastolis, id est dilatio tardior; quare systolis velocior, dyastolisque tardior obseruata certum putridæ febris signum esse solet. Hinc collige quoque pulsus in hisce febribus esse inæquales. Vulgatumque est apud omnes, pulsus & calor inæqualitatem putridarum esse notam certam. Quibus etiam accedit, quod quies integra post declinationem non succedit, Quo putridæ ab ephemeris, quæ integram sinceramque quietem habent, differunt. Urinæ in hisce febribus, nunquam in principio magnum aut effatu dignum coctionis

etionis indicium preferunt; atque ita, ut in principio crudæ appareant, aut in ipsis (ni crudæ sint) debile coctionis rudimentum appareat. Hisceque indicijis putridæ febres quæ sunt, nobis innotescet. Harum vero quædam à principio ad finem usque perseverant, quas continuas medici vocant, & quædam non perpetuo, sed cum aliqua intermissione ægros affligunt, quas idcirco intermittentes appellant. Continuaræ verò dupliciter adhuc differunt, quando ipsarum quædam à principio ad finem usque vnam accessionem absque vlla remissione habere observentur, cuiusmodi febris genus Græcis synochos, latinis continens dicitur, Quo genere synochus atque causus siue ardens comprehenditur: illa etiam ex vario accensionis modo triplex est, Quandoque calor accensus à principio ad finem usque augetur, atque hanc Græci epacmaasticam, idest, augescentem vocant; altera à principio decrescit usque ad finem, decrescens & paracmaastica dicta, quæ statim summum vigorem habet: Demum tertia homotonos dicitur, quod à principio ad finem usque eundem caloris siue accensionis tonum seruet. Hæque omnes continentes dicuntur, quod vnica in singulis à principio ad finem per multos dies durans fiat accessio. Quo genere, ut diximus, & synochæ omnes & ardentes comprehenduntur. Quædam vero à principio quidem ad finem usque continuant, cum quibusdam tamen remissionibus. Quæ febris differentia Græcè *συνεχὴς*, idest continua dicitur, à priori quippè synochæ distincta, quoniam habet plures remissiones, & synochus vnica tantum absoluitur accessione, absque vlla remissione: sub hac febre tres comprehenduntur, quippè synocha non putrida, putrida, atque ardens, causos Græcis dicta. sub *synechi* nomine omnes continuæ, quæ nulla alia, quam humorum, à quibus sunt varietate, differentia interstinguuntur, alias quidem medici biliosas, quasdam pituitosas, atque alias atrabiliosas faciunt. Hæ omnes fouentur à putrido humore in venis paruis, ut Dogmatici dicunt, accenso, atque illæ in magnis venis propè cor & viscera. His adduntur intermittentes, quæ aut sunt tertianæ, quippè quæ alternis diebus mouentur, propter bilem (ut dicunt) extra venas, aut in toto corporis habitu, ut Gal. docuit, aut in prima corporis regione circa præcordia, putrescentem: aut quotidianæ ex pituita, quæ quotidie accessionem habet: aut quartanæ ab humore melancholico, quæ de quarto in quarto mouetur, vel quintanæ, septimanæ, octomanæ, atque nonanæ dictæ quæ ab humore crassiore sunt, aut demum Erraticæ seu inordinate dictæ. Atque tot sunt febres putridæ. His vero febres pestilentes addimus quod aut synochæ sint, aut continuæ, & quandoque (ut alijs visum est) intermittentes, quod tamen ab eruditis medicis receptum non est. Nunc ijs præmissis, easdem particulatim febres ex suis signis, atque ex causis cognoscamus, à continuis inchoantes.

De continuarum febrium cognitione. Cap. V.

Συνεχὴς & *συνεχὴς* differunt, licet à continuis febribus sint, quod *συνεχὴς*, idest, continens, vnam tantum à principio ad finem usque habeat accessionem, & *συνεχὴς* plures cum accessiones tum declinationes. Conueniunt tamen, quoniam in ijs omnibus ægroti nunquam (nisi prorsus finito morbo) à febre immunes fiant. In continentibus humor putrescit in magnis vasis, scilicet venis; & in continuis, in paruis & remotis à visceribus, sed agè de singulis particulatim agamus, atque in primis de synochæ, & de causo, idest de ardente, ac demum de continuis. Synochus itaque & causus non putredine, at humore, qui putrescit, differunt. Si quidem bilis flaua putrescens ardentem siue causum, & sanguis synocham concitat. Hanc febrem sanguinis etiam vocant, quod, ut Galenus docet, à sanguine

In 9. meth. med.
cap. 2.

In lib. 4. tract. 2.
 fen. 1. cap. 43.
 In 2. de crifib.
 cap. 12.

In 9. meth. med.
 cap. 3.

Gal. in 9. meth.
 cap. 4.
 Gal. 2. de diff.
 feb. cap. 9.
 Gal. 2. de crifib.
 cap. 6.
 Gal. 9. meth. c. 3.
 In 9. meth. med.
 cap. 4.

aut ebulliente aut putrescente fiat, ex ebulliente synocham non putridam nominant, quam merito plerique ephemeram plurium dierum faciunt, alij mediam inter putridam & non putridam & semiputridam vocant. ex putrescente vero putridam, & febrem sanguinis nominant, à quo sanguine putrido licet sanguis non fit, nominari posse eo modo quo à bile putrida, quæ vere bilis non est, biliosa dicitur, nonnullis visum est. Quomodo dari febrem sanguinis Auicenna contra Galenum demonstravit ex Hippocrate, qui in 6. epidem. febres quasdam *ἑφεμερὰς* idest valde rubentes dixit, quas Gal. in commento à sanguine fieri statuit, etsi alibi fieri febrem sanguinis, quæ ita pura & simplex sit, vt aliqua bilis signa in ipsa non eluceant, negauerit. Non, quia (vt alij interpretantur) in sanguine quod pingue est & tenue, in bilem vertatur: at bilis veluti naturam acquirat, vt acrimoniam & motum bilis habeat, cum ramen vere bilis non sit, sed sanguis putridus, à quo febris sanguinis sit cognominata: eo modo, quo ardens à putrida bile, quæ bilis quidem non est, est vocata. Vnde synochum ad febrem sanguinis pertinere colligunt ex eo, quod sanguis vel solus vel vnà cum alijs humoribus eiusce febris sit materia. Hic calore accensus synocham non putridam facit, atque putrescens putridam, synocha vero duplex obseruatur, quippè exquisita, qui à sanguine fit putrescente, quæque in sanguineis facile ob id accenditur, atque altera non verà seu non exquisita, nempe quæ fit vel à bile vel à pituita vel à melancholia vnà cum sanguine putrescente. De hac posterius agemus, nunc de exquisita & vera loquamur. Cuius sanè calor triplex est modus, Quædam enim ideo epacmaistica dicta est, quia à principio ad finem vsque perpetuo augetur, quod in hac ipsa sanguis copiosior fit, quam is, qui à calore febrili resoluitur, aut, vti alijs visum est, quia materia accensa est multa & accensione inepta, calorque debilis, qui perinde, vt ignis in lignis viridibus primo debiliter accenditur, & mox sensim augetur, ita sanguinem multum ac crassum principio debiliter accendit, quæ accensio postea sanguine magis disposito, in dies magis atque magis crescit. Altera statim principio summum vigorem assecuta, paulatim & paulatim ad finem vsque decrescit, quam paracmaisticam medici appellant. Paucus enim sanguis est, isque tenuior, atque calor fortis, qui ipsum vel etiam in principio valide accendit, ipsumque paulatim resoluit, non secus quam ignis in tenui combustibili, vti est gossipium, palea, fenum, & aliud simile, statim accensus omnem substantiam depascens, citò eius flamma accensila diminuitur, quoad extinguitur. Tertia est, quam homotonum vocant, ob id quod à principio ad finem vsque eundem calor tenorem seruet, quoniam in ipsa febre tantus fit sanguis qui calore dissipatur, quantus fit qui accenditur. Causa vero, qua synochæ concitantur, est meatuum cutis quos Græci *πορὰς* appellant, densatio vel adstrictio, vel à frigore, vel à rerum facultate adstringentium contractu, cuiusmodi sunt balnea valde frigida, aluminosaque, vel vasorum interiorum obstructions à copia sanguinis, vel à crassitie vel à lentore factæ. Quibus calor natiui impeditur transpiratio, sanguinis ventilatio, atque fuliginum solita excretio cohibetur. Quo ex his natiuo calore in igneum verso, primo feruet massa sanguinis & postea (auctore Galeno) putrescit. Vnde febres hæc promptius in temperatis sanguineisque corporibus bene carnosiss, boni habitus, multi sanguinis, accenduntur, atque in ætate iuuenili & in celi regione constitutioneque temperata, atque in verno tempore. Hæ febres hisce signis notis innotescunt. Synocha enim non putrida ebullitione quidem, non putrescentia sanguinis facta, febris apparet continua, vniformis, caloremque præferentem, vaporosum; symptomata quàm in putrida atque in causo mitiora habet. hæc quoque absque rigore inuadit, vt omnes continuæ facere solent. pulsus sunt vehementes, maximi, æquales; ac vrina non videtur multum mutata in colore & in

& in crassitie à naturali statu. Addidit Gal. ex Hippocrate in 6. epidem. ruborem in facie ac in alijs partibus obseruari: Vnde Hippocrates febres *ἑφευδγες*, idest valde rubentes vocat. Rhasis addidit, ruborem particulatim in facie & in oculis obseruari. respirationem difficilem, & cutem tactui veluti à dulci balneo excalefactam apparere; victum multi sanguinis antegressum, somnolentiamq; & prægressam corporis grauitatem, vrinamque & rubram & spissam mingi. Quidam recentiorum vocant hanc febrem inflatiuam, quippè quæ à sanguine ebulliente fit, adduntq; his signis, vrinæ esse ruffas, crassas, minime fetidas mēbro rū grauitatem, venarum plenitudinem, ruborem faciei & oculorū, dolorē frontis & temporū, ad somnos esse propensos, & in somno videre veluti lampadas & rubra phantasmata, vel picturas rubri coloris oculis ipsorum obuersari. Putridam vero synocham ex Galeno parum à non putrida differre constat. Caliditas in hac etiam febre, licet copiosa tactui videatur, mitis tamen & ipsa est ac magis vaporosa, minus molesta, quam quæ ex cæteris fit humoribus. Commune omnibus febribus à putrescente sanguine obortis est, vt Alexander quoque Trallianus expressit, quod continuo calor ad manum mitis apparet, nihilque rodentis habet: Veruntamen eo mordacior, ac magis molestus apparet, qui in non putrida est accensus. Pulsus itidē vehementes, maximi, at inæquales, ita vt systolis dyastole sit celerior, ægrique rubicundi, & pleni apparent; & vrinæ rubræ, crassæ, corporaque sanguinea, boni habitus, ac plethorica. Addunt, calorem non esse perpetuo à principio ad finem vsque in omnibus vniformem, quando, vt dictum est, in quibusdam prorsus à principio ad finem vsque sit vniformis, vnde febris homotona dicta est, in alijs perpetuo augeatur, idcirco epacmaistica vocata: atque demum in alijs perpetuo decrescat, quo febris paracmaistica itidem dicta est. Vrinæ videntur aliquantulum à statu naturali, mutata colore atque crassitie, pulsus inæqualiores esse, ita vt dyastole systolis longe celerior sit, propter excretionem, quæ fit, putridarum fuliginum. Quidam ex recentioribus addunt, vrinam rubram, crassam, liuidam ac fetidam obseruari, faciem rubram, sitim magnam, linguam siccam & asperam. Hancque terminari die septima & quandoque ad decimam octauam produci. atq; hæc est sufficiens synocharum febrium cognitio. Nunc ad causum, quæ ex Galeno ardens est, declinemus. causum, (vt aliquibus visum est) à caumate, idest ab incendio caloris dictum fuisse constat: quod ægrotis maximum cauma seu incendium inducat. Galenus per febrem ardentem, continuam intelligit à bile intra vasa putrescente factam; præsertimque vt ipse expressit, in venis ventris, iocinoris aut pulmonis. Duplex est, vna quæ continens est, synochaque biliola dici potest, quod vnicam à principio ad finem vsque accessionem habeat, altera verius synechis quàm synochus, quia habet plures accessiones, & remissiones, quæ tamen nunquam ad vacuitatem peruenit: At de hac posterius. Materia in qua ardens febris acceditur, quod duplex sit, quippè bilis, atque salsa pituita, duplicem ideo febrem facit, vnam ardentem exquisitam, quæ fit à bile flaua syncera in latioribus venis putrescente; atque altera nothā & spuriam dictā, quæ fit itidem non à bile syncera, at saltē pituita permista. Ardens febris plerumque solet concitari à causis procatarteticis, scilicet à solis vehemēti ardore, à liberaliori potu vini generosi, à longa siti, à cibis vehementer calefacientibus, à plurimo labore, venere, vigilijs cæterisque alijs causis, à quibus venæ (vt ait Hippocrates) exhauriuntur, exsiccanturque, quæ trahentes acres fluxiones præbent occasionem hæc febres gignendi. Signa, quibus ardens exquisita cognoscitur, sunt: primum, vt sine rigore inuadat, qui tamen in ipsa aliquando (Hippocrate auctore) critice superuenit. calor est exurens, quem ob id Hippoc. passim ignem vocauit, quod humor, ex quo fit, omnium sit calidissimus atq; siccissimus. Qui calor nunquā ad vacuitatē vel in febricitationem venit.

In epidem.
Rhasis in lib. de
uis. cap. 149.

In 2. de diff. feb.
cap. 9.

In lib. 12. cap. 3.

Arnaldus Villa
nouanus.

In 4. de vi& vas.
in acut. com. 14.
In 2. de diff. feb.
cap. 6.
In 1. epid. sect.
com. 40.

In 1. epid. sect. 7.
com. 73.
Gal in 4. de vi&.
rat. in ac. com. 13.

In 4. de vi& rat.
in acut. tex. 3.

In 4. aphor. 58.

Hippoc. in 4. de
vic. rat. in acut.
lib. 4.

In 4. de vic. rat.
in acut. com. 13.
¶ in 3. epid. sec.
3. com. 34.

venit. Lingua est arida, scabra, & valde nigra, ex immodico quippe calore & ex tota corporis affectione sicca. adest & animi fastidium, à bilioso humoris acrimonia vndique laceffente. sitis vehemens est inextinguibilisque siue clamosa. Ventris itidem fastidium siue morsus ab humoribus acrimonia laceffentibus, vnde si humores ad aluum confluant, deiectiones sunt liquidæ & pallidæ. Vigiliæ ad sunt à calidis siccisque vaporibus, à quibus interdum aberratio quoque mentis fit, membranas cerebri (meninges vocant) laceffentibus. Horum vero signorum duo sunt pathognomonica, siue istius febris maxime propria, quippè (vt Galenus etiam affirmat) sitis inextinguibilis, atque caliditas vrens: de quibus ita habet: Videtur ergo Hippoc. febrem ardentem assiduitate cognoscere sitis, calorisque exurentis. Ardens vero notha siue non exquisita, ab exquisita distinguitur, quia signa seu symptomata minus acuta & vehementia habet. Quæ ex Hippocrate sunt nuper dicta omnia, at minus acuta: & aluus soluta, sitis magna, lingua aspera, sicca, falsa, non ita nigra tamen, vrinæ defectus, vigiliae, atque alia. Continuae quoque febres ab iisdem causis concitantur, nempe ab aliquo humorum putrescentium in paruis venis, quippè vel à bile, vel à pituita, vel à melancholia. de quibus posterius agemus, priusquam de putridis intermittentibus sermonem absoluiamus.

De continuarum febrium prognostico. Cap. VI.

In 2. progn. lib.
56.

In 2. prognosti-
com.

Priusquam prædictarum febrium curationem aggrediamur, primum ipsarum prognosticum præmittimus; vt scilicet febres sanabiles (in quibus medici vsum remediorum exercere debent) cognoscamus, atque non minus medicamentis quæ non cedent, in quibus omnium merito medicaminum vsus interdicatur, ne cum dedecore & infamia medica ars exerceatur. Quare febres, quarum sanatio medicamentis sperari queat, nunc prodemus, & mox exitiales medicamentis non cedentes. Itaque febres à quibus nobiles corporis partes, aut non læduntur, aut leuiter quidem, & quas pauca eaque non vehementia subsecuta sunt symptomata, atque omnino carent malignitate, omnes securæ sunt, & ipsis mereri debemus. De quibus merito Hippoc. ait: Bona vero sunt, facile morbum ferre, bene spirare, dolore vindicatum esse, sputum facile extussire, corpus æqualiter calidum videri ac molle, siti non detineri, vrinas & deiectiones, somnos, sudores, singula intelligere bona, vt dictum est, succedere. & postea: Simplicissima enim febres & signis firmata securissimis quarto die aut citius desinunt. Contra vero vbi multa eaque vehementia vnà habent symptomata, cum graui nobilium partium læsione, cuiusmodi sunt dolores acuti capitis, auriumque; pectoris, pleuræ, diaphragmatis, oris ventriculi, cordis, hepatis, renum, vesicæ, vteri atque similibus partium, Vigiliæ itidem, deliria, eaque sæua, & ferina, cordis angores, syncope, mala respiratio, & vnà ex euntia excrementa praua, & similia. Quibus si symptomata accedant, quæ solent malignitatis esse propria, prorsus desperandum de salute erit. Hæc vero sunt omnia signa minime ex ratione morbi prodeuntia. Vt quando in maximo caloris interni incendio extrema cutis parum calet, extrema algent, si rigeant non critice, si non sitiant, & cibum abhorreant, si anxij sint, si morbum non sentiant, si excrementa colore & alijs morbi naturæ haud respondeant (Quo in hisce febribus vrinæ sanorum persimiles maxime detestantur, non minusque & pulsus) aut praua sint, veluti vrinæ nigrae, albæ, tenuissimæ ac aquosæ in delirantibus, crassæ, turbidæ non residentes, neque clarescentes, cum sedimentis crassis, nigris, item quæ cum dolore & acrimonia minguntur. Ventris colliquationes scetentes, quas Hippoc. lethales dixit, quippè

quippè deiectiones aquosas candidas, croceas, spumantes, pingues, glutinosas, nigras, liquidas, æruginosas, atque nigras, aut paucas cum torminibus, biliolas, adduntur stillæ sanguinis nigræ, sudores frigidi, leues in fronte tantum & clauiculis. Vomitus virulenti, malus decubitus, conuulsiones, tremores, palpitationes cordis, angores, delirare egros, & cum delirio floccos carpere, festucasque colligere, atque alia huiusmodi, quæ malignum morbum denotant, facere. Quibus si etiam spectentur, quæ virium languorem produnt, à medicamentis erit omnino abstinendum. de his Hippoc. in aphorismis: Si non videat vel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Vnde auctor prorrheticorum dixit: prælanguentium desipientias esse pessimas, vti Trasiunti. Quo meritò desipientias blandas, obscuras, tremulas, valde phreneticas vocauit. Idem ignorantiam, obliuionem, & aphoniam ex languore virium denotare Hippoc. statuit. & non minus conuulsiones singultusque subsequi esse exitiosum. & aphonias cum exolutione esse perniciosas Gal. in Sileno & Philini vxore affirmavit. & tremores etiam à phrenitide apparentes. corpusque apoplecticorum modo resolutum. Surditatem in acutis horroresque cum delirio, de quibus Hippoc. inquit: Horrebant & sub mortem delirabant; somnus neque dolorem neque delirium sedans, at quinimo vtrumque auget. Comam siue veterinosum somnum ab vehementi febre, vel phrenitide exitialem esse Gal. in epidemijs expressit. morbum item egros non sentire. Extrema algere si interna vrantur: His signis animalem facultatem prælangere quisque intelliget. Eodem modo & facultatis vitalis languor dignoscetur, si respiratio (auctore Galeno) sit rara & parua & frequens: de hac in Pythione ait: breuispirum ante mortem fuisse; Magnum vero & rarum spiritum paruum fieri & frequentem, exitiale esse in illo, qui in Dealcis horto decumbebat, obseruatum est. longe exitialius est frigidum ægros expirare, de quo Gal. ita habet. Maxima signa mortifera per cutem calidus vapor exiens post frigidum spiritum prius expiratione egressum. Quo in febribus exitialibus tria medici obseruant, quippè febrem vrentem, frigidam expirationem cum raritate, atque vaporem calidum ex cute exire; obscura respiratio itidem est exitialissima, quippè quæ maxime parua & frequens fit, phænomenam & sublimem (quod in ea narium pinnæ, scapulæ, & thorax palam moueantur) appellant. De qua auctor Coacorum prælagiorum dixit: pessimus autem & mortis prope iniquus, spiritus extendens, vrgens, & obscurus, stertorosa verò gutturi ebullitio, quam *κρηχνοφ*, Græci dicunt, & nostri rancicum, quasi spiritum rancidum, exitium in foribus proximum nunciat. inæqualis & luctuosa vocata respiratio non minus mala est, de qua Hippoc. ait: in acutis passionibus quæ cum febre sunt luctuosa suspiria, malum. Pulsus quoque languidissimus, tardissimus, ac rarissimus, pessimi sunt, post hos minimus, mollissimus, languidi vitalem vim maxime prælanguentem denotant. Deficientes autem, vermiculantes, & formicantes in foribus exitiū esse ostendunt. intermittentes spacio duorum pulsuum in omnibus exitiosi sunt, omniumque maxime ex Galeno in iuuenibus, in pueris vero & senibus non ita sunt timendi. Proximo anno in Iacobo Antonio Coruso patritio Patauino medici Viridarij præsidie, octuagenario pleuritico, & febre ardente vexato, pulsus fuerunt cum intermittentes, tum deficientes. qui tamen cito conualuit. Syncope itidem, & animi deliquium, cordis angores, tremores, atque palpitationes febres exitialis nature notant. Idem de naturali vi dicitur, quippè prælanguidam esse, si egroti maxime à cibis omnibus abhorreant. Hermocrates, vt ait Hippoc. quicquam gustare non valebat. Non siure, itidem in febribus æstuosis, exitiosum est, & præfertim cum antea sitierint. Auctor prorrheticorum ait: sitis, quæ non ex ratione in acutis morbis soluitur,

In li. 4. aph. 49.

In 1. prorr. tex. 8.

In 3. epidem.

In 4. aphor. 66.

Gal. in 1. prorrh.

com. 34.

In 2. aphorism.

In 3. epid. sect. 3.

tex. 3.

Hipp. in. 2. apho.

In 3. epidem.

Hipp. in aph. 6.

In 4. aphor. 46.

In 6. epid. sect. 3.

com. 74.

In 6. epid. sect. 4.

com. 30.

In lib. 2. sect. 2.

tex. 39.

Gal. in 3. epid.

sect. 3. com. 24.

In 6. aphor. 54.

Gal. in synopsis de

puls. cap. 7.

Gal. in 1. de præ-

sag. expulsib. 6. 4.

Gal. in 2. aphor.

com. 6.

In 2. prorrh. tex.

22.

- In 1. epid. sect. 2. rex. 75.* soluitur, mala est. de qua Hippocrates ait: Huc accessit ad cumulum aliud signū exitiosum, quod cum antea aestuassent, amplius non sitirent. Hoc fieri, aut quod facultas stomachi appetitrix extinguatur, aut quod delirantes non intelligant illud, quod patiuntur, aut ob utrumque Gal. fieri aliquando expressit. sitis etiam vehemens perseverans cum lingua exusta nigra in febribus est pessima, de qua Hippoc. in Phileseo: lingua inaruit, sitibundus erat. atrophiam quoque facultatis huius prælanguentis esse indicium Gal. sentijt. Vnde facies Hippocratica dicta, si intra biduū, aut triduum ita fiat, pessima est, in qua, ait Hippoc. nasus acutus est, caui oculi, tempora adstricta & collapsa, aures frigidae, contractæque, fibræ corū versæ, ite cutis circa frontē intenta ac arida, colorque totius viridis aut niger si appareat. Ex excretionib. quoque stillas sanguinis e naribus in febribus cōtinuis prælaguere expultricē denotare Gal. in prorrheticis statuit. quales in Sileno, Vxore Dromeadaī & in alijs observatæ fuerunt. Sudores itidē superueniētes febre non deficiente mali sunt. Copiosi, assiduique iu acuto morbo pessimi sunt, quod propter virium imbecillitatē ægros ad syncopen deducant. De his Hippoc. in Erasimo: Habebat hic febrem perpetuo cum sudore, & de phrenetico: Febris horrida copiosus sudor assiduus toto corpore. Pauci etiam in die decretorio exeuntes summam excernentis facultatis impotentiam (vt Gal. est auctor) denotant. Non minus perniciosi, qui cæperunt quidem, sed protinus cessauerunt. Pauci quoque (quos Græci ἐπίδρωτοι, nostri madores, siue desudationes appellant) plerumque circa frontem, cervicem, collum aut circa pectus vel circa manus & pedes exeuntes, haud procul abesse exitium indicant. Frigidi itidem exitiosi sunt, Quos Hippoc. in acutis morbis exitium prænunciare & in mitioribus longitudinem dixit. Cuiusmodi fuerunt observati ab Hippocrate in Philisco, Vxore Dromeadaī, Pithione & in alijs. idem denotant si non ex toto corpore exeant, at ex quibusdam tantum partibus, de quibus Hippocrates inquit: Sudabant quidem sed non ex toto corpore. postea: Paululum in fronte & claviculis exsudabant, sed nemo per totum corpus. hos retentricem prælanguere indicare Gal. voluit. Nihil iuantes quoque non boni sunt, at maxime exitiales, à quibus ægroi in deterius abeunt. Vnde auctor prorrh. ait: Flammans cum sudore facies, mala non sudare etiam in febribus, quarum proprii sudores videntur, quandoque malum censetur, & præsertim si morbus absque sudoribus iudicetur in die decretorio. Vnde Hippoc. de Hermocrate dixit: Decimoquarto à febre liber non sudavit. & postea: Vigesimo die iudicatus à febre liber, non sudavit. qui postea obiit. Vrinæ item copiosæ tenues non iuantes malæ, de quibus Hippoc. ait: Vrinæ multæ tenues nihilque decretorij quicquam vel boni. Nigræ semper prauæ, sed auctore Hippocrate in viris longè pessimæ, quæ si habeant nigrum sedimentum, nullos feruari posse Gal. in Sileni, Philisci que historia declaravit. Aquosæ tenues pessimæ, omniumque maxime in pueris delirantibus, ita vt neminem his conspectis conualuisse Gal. observaverit. Crassæ, turbidæ, non clarescentes, non residentes eodem modo perniciosæ sunt, quales in Vxore Dromeadaī moribunda, & in eo, qui calefcens cœnavit, atque in Hermocrate fuere conspectæ. Nigræ item in aquosas summe tenues mutatæ, quales Mulier apud frigidam aquam minxerat, maxime perniciosas esse Galenus iudicavit. Pingues non minus atque oleosæ, quod colliquationis sint indicium, prauæ æstimantur. Quæ si post nigras mingantur, pessimæ erunt, quales in Cizici muliere excretæ sunt. Paucae itidem urinæ cum dolore mordaces prauæ sunt, de quibus Hippoc. in Sileno: Die octavo urinas paucas reddebat cum dolore mordaces. Hasce in Guadagnina dilectissimæ vxore mea, ardenti febre ac mortali vexata, vidimus: & in alijs multis qui obierunt. Interceptas vero, siue omnino quæ resistunt, non minoris malignitatis esse Galenus sentijt. Eodem modo deiectiones prauæ sunt, aquosæ paucae glutinosæ,
- In 1. epid. sect. 2. rex. 75.*
- In 3. epid. sect. 3. comm. 44.*
- In 2. aphorism. com. 28.*
- In 3. prog.*
- In 3. prorrh. tex. 54.*
- Gal. in 1. prorrh. Hipp. in 4. aph. 56.*
- Gal. in 3. de sym. pt. caus. 6. 2. et in 4. aphor. 41.*
- In 1. prorrh. com. 1.*
- Gal. in 4. aphor. 37. 2. 42.*
- In 1. epid. sect. 2.*
- In 2. prorrh. com. 24.*
- In 3. epid. sect. 3. rex. 41. & 61.*
- In 4. aphor. 72.*
- In 1. de crisib. cap. 52.*
- Hipp. 4. aph. 70. & in 1. epid. sec. 1 rex. 26.*
- In hist. mulieris apud frig. aqua decumbentis.*
- Gal. in 4. de san. tuen. cap. 3.*
- In 3. epid. sect. 2. com. 4.*

glutinosa, candida, nigra, versicolores, subrocea, spumantes, meræ siue syn-
cere, biliosæ, pingues & maxime fetide. Auctor prorrheticorum ait: prauas esse
in sinceris desidentes, albas in phreniticis, biliosas crebras, dysentericas cum
» morfu & dolore. de quibus Hippoc. inquit: Alui turbata erant, biliosis, paucis,
» meris, tenuibus, mordacibusque, & frequenter desidebant. Auctor prorrhetico-
rum damnat impense rubras, Viridesque eruginosas pessimas esse, quod calor
magno incendio fiant, liuidasque non minus, quod natiui caloris refrigeratio-
nem notent. Nigras etiam Gal. ita damnauit vt plurimas in statu pestilenti se
obseruasse dixerit: Hippoc. versicolores dixit esse exitiales. liquidas colliquati-
uas maxime fetentes pestilentium febrium proprias esse deprehensum est, omni-
noque prauas & lethales Hippoc. in multis experientia didicit. Inscijs egrotis ex-
cretæ omnes male sunt, pessimæ vero quæ etiam suapte natura prauæ sunt. Nihil
item expuere si adsit phlegmone in partibus spirituosiss, summe crudum morbum
denotat. & in suppuratis, & phthisicis sputum suppressum est lethale: in suppuratis
biliosa excretio ex Hippocrate pessima lputa itidem candida, nigra, liuida, versi-
coloraque. Vomitus cum multi tum pauci non iuuantes, liuidi, nigri, virulenti,
porracei, versicolores, grauiterque fetentes. Et ex ijs, quæ ad cutim transmittun-
» tur, exanthemata parua, quæ non satis sunt excernendis morbis, quæque statim re-
» currunt, euanescentque. de quibus Hippoc. in epidemijs: tumores parui non sup-
» purantes & abscessus aut minores quàm prodesse queat, aut quidem maiores quam
ferre queat. in his colores liuentes atque nigri maxime damnantur. Atque hisce signis
iudicabis febres exitiales, in quibus ab usu medicamentorum erit abstinendum.

Hippoc. 2. prog.
in 1. prorrh. tex.
15.
In 1. epid. sect. 3.
tex. 25.
In 3. prorrh. tex.
35.
Gal. in 2. progn.
in 4. aphor.

In 3. epid. sect. 3.
tex. 57.
Gal. in 1. de crisi-
bus. cap. 18.
Gal. in li. de coss.
artis medica.
cap. 58.
In 2. progn.
In 1. epidem. 2.
tex. 54.
Hippo in 2. prog.
tex. 39.
In 1. epid. sect. 2.
tex. 38.
Hippo in 1. epid.
sect. 2. tex. 35.

De continentium febrium curatione. Cap. VII.

Febribus continentibus quippè synochis, & ardentibus, vnicus conducit curan-
di scopus, scilicet, vt adstrictus affectus, tollatur quippè meatuum vel inter-
norum, vel extimorum adstrictio, siue clausio, sine qua causa fieri hæc putridas
febres non posse ex Dogmaticis etiam alias demonstrauius, atque vt calor ac-
census itidem tollatur, qui ex Methodicis medicamentis actu temperate calidis
& humidis digeritur, atque resoluitur. Igitur cum hæc febris vel synocha, vel
ardens vocata, sit passio adstricta meatuum præcipue cutis clausorum, vel à frigi-
ditate, vel à rebus adstringentibus, vel à siccitate: aut venarum meatuum itidem
à sanguinis copia, aut crassitie aut lentore obstructorum, laxatorijs, vt tollatur
» præsidij est opus. De quibus Celsus ita habet: nam si adstrictum est, ducenda
» alius est: mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. in hoc genere morbo-
» rum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus, corpus
» in lumine habuisse, imperasse famem sitim, vigiliam prodest. Vtile est etiam du-
» cere in balneum: prius dimittere in solium, tum vngere, iterum ad solium redire:
» multaque aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida,
» miscere, vti cibarius, & serius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo. Itaque
cum in curandis febribus ijs laxatorijs præsidij sit opus, eaque vt ex Celso audi-
uimus plura sint, quippe sanguinis vacuatio, purgatio, vomitio, vrinæ euacuatio,
sudoris prouocatio, balnea, inunctiones, victusque ratio itidem laxatoria à no-
bis præscribenda. videndum erit qualia ex ijs ad synochum tollendam conueniãt.
in primis cum hæc febris morbus adstrictus & magnus sit, meritò laxatoria etiam
magna vocata, cuiusmodi est, missio sanguinis, purgatio, erunt pro curatione op-
portuna, de quibus omnibus, agemus post institutam victus rationem itidem la-
xatoriam. In qua primo aer sit purus, lucidus, temperate calidus, non valde ca-
lidus, ne febrilem calorem augeat, non frigidus ne prohibeat calidarum per poros
cutis

In lib. 3. c. 6.

*In 10. met. med.
cap. 8.*

*In 6. epid. sect. 5.
sex. 27.*

In libro de diff.

cutis fuliginum exhalationem. Neque est (quod multi faciunt) ut locus in quo habitant ægroti assidue aqua frigida aspersa, aut substratis vitium capreolis, aut rubi, summatibus, aut lentisci ramis, aut alijs virentibus herbis, ad frigus alteretur, namque frigidus aer adstrictum affectum auget, cum vel etiam, ut Galenus docet, denset cogatque cutim, atque putridorum humorum effluxum transpirare prohibeat. unde ijs febribus vexatos probè linteis coopertos probeque ne extrinsecus ab aeris frigidityte lædantur, munitos decumbere oportet. omnem que refrigerationem, vel etiam que flabellis fit, effugere debent, vtiliusque erit, si calorem magis quam frigus patiantur. & qui hæc obseruant citius sanantur, contra, qui frigidityte aeris oblectantur, eaque liberalius vtuntur, diutius ægrotant, nimirum quod tarde & non ita promptè calor febrilis exhalet & digeratur. A calore enim excretiones humorum, ac exhalationes febrilis caloris fieri, & à frigore prohiberi omnes medici nouerunt. Vnde Hippocrates dixit: Refrigeratio, que in ventre sunt, durat. Cæterum si aer plus iuxto calidior, ac maxime æstuosus fuerit cuiusmodi aliquando per dies caniculares sentitur, aliquantulum nimia eius caliditas erit corrigenda; quando immoderate æstuosus augere humorum quoque corruptionem, queat. Quo pestilentem febrem à sola caliditate aeris immodica excitari posse Galen. quandoque affirmavit. Hinc Gariopontus medicus antiquus in lib. 6. de febrib. cap. 2. de cubiculo ait: Nam lucidus nimis & cadus relaxat corpus, frigidus & obscurus constringit, mediocriter ex his temperatus mulcet, oblectat & temperat. Fugiant febre vexati animi passionibus: cibo vtantur tenuissimo, simplici, si febris celerrimo motu moueatur, mediocri, in quibus febris prolixior siue longior futura, conijcitur. In illis cibis erit potestate moderate refrigerans, dabitur tamen actu calidus, ni caliditas febrilis fuerit maxime æstuosa, in qua temperatus, aut aliquantulum refrigeratus erit propinandus, qui etiam potestate actuque sit humidus. complures Ægyptiorum vexati febribus ne dum Methodicorum diarrito vtuntur (quam victus tenuitatem haud omnes Methodici seruant) sed quinimo longe pluribus diebus nihil aliud cibi assumunt, quam syrupos quosdam ex aqua cum saccharo. At in assuetis pleniori cibo hec victus ratio, vtilis non est. Quare vsque ad morbi declinationem sufficet tenuissimus eibus bis in die datus qualis erit exijs, qui in usu sunt, apud Iralos medicos, panis tritus in iure parui pulli macro sine sale oxalidis folijs, aut funco, aut acido citri vel limonis alterato, paratus cum lacte seminum melonum modicoque sacchari candidi, atque aquæ rosaceæ. aut ptisanæ hordeaceæ liquidus cremor addito lacte seminum melonum, saccharo candido, atque aquæ rosaceæ, modico. aut modicum panis in aqua frigida loti addito modico acido citri aut limonis, si vehemens adsit caloris æstus. aut ferculū etiam paratum ex cucurbita, vel ex herbis frigidis quippè lactuca, intybo, portulaca, malua cum modico viridiū foliorum fænicali actu tamen moderate calidum dabitur. Non omittam cibos in hisce febribus apud, Arabes, Ægyptios atque alias Orientis nationes frequentatos. Quorum vnus est, triticearum fursurum cremor, quem vt parent, accipiunt fursurum partes crassiores, quaterue aqua pura abluunt, aquam abijcientes nouissimamque affundentes, quam cum fursurum expresso quo ad crassescat decoquant, quod iusculum medico sacch. candidi atque aquæ rosaceæ addito calidum exhibent. hoc enim nutrit, refrigerat, infarctus tollit, lenitque. alter cibus est, quem ex fermento parant, eius accipientes exempli gratia nucis quantitatem, aqua macerant, dissoluntque; & addito saccharo decoquant, & vbi effebuerit aqua rosacea addita calidum exhibent. Alium ex lacte amygdalarum dulcium parant, eius lactis libram ex iure pulli extracti, capientes, quem. cum modico panis percoctum cum lacte seminum melonum, calidum propinant. Alij amygdalas dulces optimas capiunt, detractoque cortice contusasque per cribrum transmittunt, ac veluti

ac veluti in crassiore farinam redigunt (quam arrira lauz vocant) ex aqua le-
uiter decoquunt, & additis saccharo & aqua rosacea exhibent. Alij Infusum
Mastahalep vocatum parant (exempli gratia) ex seminum melonis, cucurbitæ,
cucumeris an. vnc. ij. liquiritiæ vnc. j. sem. faniculorum, portulacæ, endiuia, mal-
uæ, oxalidis an. vnc. ij. contundunt omnia, lac ex aqua exprimunt, modice ebul-
liunt, & addito saccharo offerunt hoc quidē nutrit, & tenuiorem bilem per vrinam
purgat. Hicque erit opportunus cibus ad hasce febres continentes quæ celeri
motu mouentur, siue, quæ ultra diem septimum non protrahuntur. In ijs vero,
quas longiori tempore finitum iri coniectura assequimur, & in ijs, qui plu-
ri alimento sunt assueti, poterit addi oui recentissimi luteum ex iure pulli con-
quassatum, aut modicum carnis pulli confusi, vel carniū affatarum iuris ex-
pressi. Potus itidem erit vel aqua cocta simplex vel ex hordeo, addito acidi citri,
vel limonis modico atq; saccharo vel cum iulep acetoso, aut iulep è tamarindis
puratum. Antiqui dabant oxycratum, quod est potus (exempli gratia) para-
tus ex libra aquæ, & ex geminis vncijs aceti albi, addito saccharo. atque hæc est
victus ratio in hisce febribus seruanda. Qua instituta, videndum erit an aluus
laxa sit, quod ni sit, oportebit laxantem clysterem adhibere, aut corpore multis
redundante excrementis, dabunt secunda die (si tamen morbus acutissimus non
sit) syropum rosatum laxatiuum ad vnc. iij., ex largiori serolactis caprilli, aut
pulpa cassiæ fistulæ. Abissinæ diète, quippè rubri corticis, ad vnc. j. s. cum saccharo
candido, vel in bolis aut in potione ex iure aliquo stillatitio faciã; aut dabitur in-
fusum ex semuncia pulpe tamarindorum cum mannæ electæ vnc. iij. aut ex com-
positis elect. lenitiuum ad vnc. j. s. vel in bolis vel in potione; vel si febris celeri-
tas cogat, premittetis clysterem emollitorium qui parabitur ex libra decocti seu
iuris maluarum, altheæ, violarum, bliti, fursurum, aut ex hydromele, & ex oleo
dulci vel amygdalino vel violaceo ad vncias quatuor cū sacchari rubri vncia &
semis, alij addunt salis drachmam. & hoc erit vnun ex præsidijs laxatorijs quo
primum opus est ad harum febrium curationem. Alterum vero omnium sine du-
bio ad hasce febres laxatorium præcipuum ac maximum est, euacuatio sangui-
nis, per venam sectam. Non tamen, vt Dogmatici voluerunt vsque ad animi
deliquium Methodicis educendum videtur, quod omnis animi defectio sit peri-
culosa, & virtus prælangueat, nisi corpus fuerit valde robustum. in robustis vili-
tas est, quod primum in contrarium statum agitur corpus celerrime ex animi
defectu refrigeratum, & in huiusmodi corporibus, vt Gal. scribit, necessario super-
uenit alui detectio, non nunquã etiã bilis vomitio, & toto corpore madores su-
doresue excipiuntur. Hoc verò fit calore natiuo intus ad cor ipsum retracto,
qui si robustus sit, intro vnitus augetur & postea erumpit ad omnes partes corpo-
ris, atque eas quoque ideo vacationes molitur, quod scilicet sublata plenitudine,
qua natura grauabatur, & exinde robustior facta natura cõtra residuū insurgit, at-
que illud quod expulsiõni est aptum, per varia loca expellit, igitur euacuatione
sanguinis ad animi deliquium facta per se naturæ robor dimittitur, & prælanguet
natura, ex accidenti tamen (quod tantum in robustis locum habet) calor intus
retractus, ac vnitus aliquod roboris exinde nactus mox extra erumpens, vtiles
euacuationes præstare solet. Hoc tamen in robustissimis, & raro etiã tentan-
dum. In debilibus vero nunquam, etenim natura debilis ab immodico sangui-
ne euacuato plurimum patitur, & prælanguior exinde facta, quicquam boni
aduersus morbum agere non potest. Quare vbi virtus permiserit tuto statim se-
canda erit vena dextri cubiti interna in corporeque si fuerit plenitudo ac vires etiã
permittant sanguinis libra educetur, atque ex altero brachio die altera etiã
sanguinis convenientem quantitatem euacuabimus. Qua repetita euacuatione
sanguinis hac ætate plures nationes in his febribus vtiliter vtuntur. plus enim

Gal. 10. meth. c. 9

Gal. in 9. meth.
med. c. 5. cap.
4. & in 1. ad
Glanc. cap. 13.

In 9. meth. c. 4.

Gal in 3. de rem
per. cap. ultimo,

In 1. aphor. 23.

In 4. de vi& nat. mens. tex. 19.

Gal. in 2. aphor. com. 17.

In 2. aph. com. 17.

laxat plurimum venarum quam vnus sectio seu apertio. In synocha cum putrida tum non putrida omnes conueniunt, quod statim sanguis mitti debeat. De Cautione verò seu ardente febre non pauci dubitarunt, an sanguinis euacuatio conueniat, quod non sanguis sed bilis flaua abundet, ideo ad animi defectum sanguinem vacuari nullo modo permittunt. Quod tamen genus praesidij Galenus & in maximis inflammationibus, & in adurentibus febribus ac vehementissimis doloribus semper maximi fecit. Nam (vt ait) & in ardentibus febribus si vsque ad animi defectionem sanguis mittatur, statim totius corporis habitus refrigeratur, & febris extinguitur, & plurimis etiam aluius citatur, & sudores emanant, & quidam eorum ex his sanitati sunt restituti, alij adiuti plurimum, vehementiam ægritudinis absciderunt. Cæterum vti dictum est (licet in robustis corporibus, aliquando ex sententia euenerit) Methodicis, ac alijs etiam rationalium medicorum non paucis consultius visum est, ad animi defectionem, vt voluit Galenus, non esse faciendam sanguinis educationem, sed eius quantitatem, ex morbi magnitudine & viribus metiri debere. Hippoc. dixit: In acutis morbis sanguine detrahes, si vehemens morbus videatur, florueritque ætas ægrotantis & virium adfuerit robur. Methodici concedunt mittendi sanguinis scopos esse magnitudinem morbi, quod sanguinis missionem fecerint, vnum ex maximis laxatorijs, vt Gal. quoque in hoc loco expressit, atque virium robur, neque florentem ætatem scopum necessarium esse admittunt, cum à morbi essentia hoc praesidium in omnibus indicetur, à viribus vero permittitur. quare & ipsi magnitudinem morbi, id est, vti dicunt, stricturæ magnitudinem perpetuo sanguinis missionem indicare, licet etiam nulla affuerit sanguinis plenitudo & hoc est verissimum & vtilissimum in omnibus hisce febribus & phlegmonibus internis (quos affectus Hippocratem tantummodo hoc loco intellexisse si complures animaduertisset) iam diu cessasset ea inuicilis controuersia demittendi sanguinis scopis vel à magnitudine morbi vel à plenitudine (quæ etiam inter celebres medicos nunc inutiliter agitur) indicandis. ex Methodicis verò conuenit in febre etiam ardente sanguinis euacuatio, quia hæc febris morbus & adstrictus & magnus est, idcirco merito sanguinis euacuatio tanquam laxatorium magnum indicatur. Aegyptij Arabes atque aliae nationes in pueris, & corporibus albidioribus tenui sanguine abundantibus scarificatione crurum sanguine vtilissime demunt. Quod genus euacuationis, veluti hac ætate Italici medicis omnino est ignotum, ita antiquis omnibus fuit notissimum, & maxime familiare, de quo praesidio, qui plura scire desiderant, legant nostros libros de medicina Aegyptiorum proximis annis euulgatos. Alij cucurbitulis cum scarificatione familiarius ad vacuandum sanguinem vtuntur, quam euacuationem nos non leuiter damnandam putamus, omniumque maxime cum Hippoc. & Galeno in plethoricis corporibus. Vnde præmittendam esse vniuersalem prius, quàm moliatur sanguinis euacuatio adhibitis cucurbitulis per venam sectam, aut per scarificationem crurum antiquorum modo factam, iudicauimus (quando hoc praesidium euacuatorium Gal. vicarium fecerit sectionis veng, minimeque cucurbitulas) & hæc de sanguinis vacuatione. De qua cum actum sit, restat, vt medicamenta modo proponamus, & primum illa quæ per interiora assumuntur, & postea illa, quæ exterius adhibentur. Quæ interiora assumuntur, si à simplicibus exordiri voluerimus, ex Dogmaticis fuerunt aqua simplex, psyllium, santalum rubrum, parietaria, fructus berberis, vua immatura, fructus mali citri, aurantij, limonis, herbæ omnes cicoraceæ, vti oxalis, intybus, fucus, endiuija, semina refrigerantia; Quæ qualitate frigida, vti Dogmaticis videtur, his febribus aduersantur. Quod pertinet ad aquæ vsus, complures familiares sunt, scilicet, aqua simplex, & cruda & cocta, cum sacch. & acido citri vel limonis vel aqua hordei, aqua panis dicta, aqua anguriæ elmaoi Aegyptijs dictæ, aqua lactis

lactis siue ferum atque aqua carnis & stillatitiæ omnes ex refrigerantibus, herbis paratæ: sed age de aqua simplici plurimi ab antiquis ad harum febrium curationem æstimata loquamur, sanè ad hæc febres extinguendas præsidia omnium efficacissima antiquitas nouit, scilicet sanguinis euacuationem, copiosam, & nonnunquam ad animi deliquium factam: atque aquæ fontanæ frigide largum potum, de illo nuper egimus, de hoc modo agendum est: de quo præsidio hæc intelligenda sunt: primum qualis hæc aqua, & cuius facultatis sit, & quomodo hisce febribus medeatur, quibus præsertim danda sit. demum quid ex Methodicis de eius usu sit dicendum. Per aquam ad hæc febres vtilem intelligimus fontanam & fluuialem actu frigidam, Cuius facultas per se est refrigerans, ex accidenti tamen calefacit, neque instrenue, vt Hippocrates, Gal. alij nouerunt, nimirum percussio calore, intus densatis meatibus cutis si large cuti affundatur. Optima tribus sensibus dignoscitur, quippè gustu, quod scilicet ita simplex sit, vt nullam qualitatem gustui inferat apiaque siue insipida appareat, visuque lucida, clara, atque odoratu, quod cuiusuis odoris est expertus. Dioscorides dixit, optimam esse dulcem, nullius qualitatis participem, & quæ ne minimo quidem tempore in hypochondrijs moratur, & quæ facili via fertur, & citra molestiam, nec inflationes creat, & minime computrescit. Huiusmodi est Nili fluminis aqua, qua claresceta vtuntur Aegyptij, quæ etsi largius bibatur nihil fluctuat, sed citissimo tempore aut per ventrem, aut per vrinam, aut per sudorem exit. de hac nos in libris de medicina Aegyptiorum scripsimus. Optima itaque hæc est, cuiusmodi etiam est optimorum fontium. Quæ epota citò viscera permeat, ad vrinam fertur, vel si æstas sit ad cutem, vnde sudores excitantur. Quæ caloris incendium contemperat, ita vt iecoris caliditatem maxime corrigat. Vnde mirum non sit illiusce assiduo usu complura corpora calida & sicca biliosa, macra, optimum habitum contraxisse, cuiusmodi Aegyptiorum corpora esse videntur, quæ cum ex cælo summe calido & sicco, biliosa, macra & squalida esse debuerint, aquæ Nili fluminis assiduo usu ad bonum habitum permurantur (proptereaque populus Aegypti credidit eam aquam sanguinem in corporibus generare) vt pingues atque carnosius euadant. Vnde merito Rationales medici hisce febribus vehementer calidis conuenire voluerunt, quod ipsarum calorem frigiditate extinguat, atque putridum non minus humorem vel per vomitum vel per ventrem vel per velicam vel per cutim expellat. Ab aqua itaque potu refrigeratione solidarum partium animalis natura roborata, prætenuatos iam humores aggreditur, putridosque (vt dictum est) vel per vomitum vel per ventrem vel alio modo expellit. Galen. complures ardentissimis febribus hoc remedio sanatos vidit, & quendam iuuenem meminit in feruoribus sub canicula ex ira febricitatem, qui cum prima accessione duas heminas aquæ bibisset, statim vomuit flauissimam bilem, & paulo post eandem per ventrem deiecit. Hanc vero dandam ad saturitatem cum Græci tum Arabes voluerunt, in his potissimum febribus, quæ maximæ, vehementissimæque sunt, in robustis corporibus assuetisque potus aquæ, nulla existente in visceribus vel obstructione, vel phlegmone, aut imbecillitate, apparentibusque coctionis signis. Methodicos & ipsos eiusdem frigida aquæ potum, nedum ad hæc febres quando sunt vehementes, sed ad omnes alias etiam vbi calor æstuosissimus ægrotos vexat, dandam minime contendisse, putamus. At quomodo istuc? cum omnem febrem morbum adstrictum fecerint, & aquam frigidam medicamentum adstrictum, quomodo igitur adstrictis affectibus auxilio esse poterit? Eos non latuit febris naturæ igneæ aduersissimam esse aquam sua frigiditate. Vnde Petronas medicus frigidam ad ægrotantis arbitrium dabat. Appollonius vero atque Dexippus. Hippocratis auditores neutiquam aquam propinabant, quod in affectu adstricto, frigidum densando meatus, ac refrigerando augeat strictionem & co-

Gal. in 9. meth. med. cap. 5.

Gal. in 1. simpl. In 5. aph. 21. & 25. In 1. simpl. cap. In 3. de temp. c. 4. & ultimo. Gal. in 1. simpl. cap. 5. In 5. de ma. medica cap. 9.

In 9. meth. c. 16.

Galen. in 1. de vi&rat. in acut. com. 43.

In lib. de Veteri
medicina tex.
33.

Loco citato in li.
de vitæ rat.

In 5. aphorif. 21.
cap. 25.

In 3. de temp.
cap. 5.

In 10. meth. me-
dendi cap. 5.

tionem impediendo, curationem (cum nihil sit aliud curatio ex Hippocrate quã concoctio) retardet. Vnde merito Galenus quoque, qui tantopere frigida aque vsum ad hæc febres commendauit, non negauit frigidam aquam densare meatus, caloris febrilis resolutionem retardare, crudosque humores refrigeratione seruare, seu ipsorum augere cruditatem. Hinc Methodici sæpius ad calorem sitimque corrigendam non frigidam sed calidam aquam dabant, ex quo negabant in omnibus febribus frigidam exhibendam, quod cum sit crassarum partium, diu in hypochondrijs maneat, meatuum abstructionem augeat, atque humores crudescere faciat, quod nihil quidem est aliud, quam morbum causamque augere. Quo pacto itaque utilis esse poterit? Eo sanè modo, quo Hippocrates scribit frigidam large affusam, caloris reuocationem faciendo atque eo modo calfaciendo, distensionibus, doloribus articularum, podagricis alijsq; morbis mederi. Sed nec latet (ait Galenus) qua ratione illud accadat, siquidem stipata clausaque corporis summa facie, repercussus, refractusque fit calor eius, qui à profundo ascendit, qui quidè simul propter distatus inopiã est acruatus, simul propter frigidi circumstantis violentiam in altum recedit, simul ex succis illic habitis nutritur, quippè, vbi collectus nutritusque calor ad summa corporis violentius ruit, fit quidem caloris repercussus. Vnde (vt ait Hippocrates) calor intus auctus & roboratus erumpens ad partes extimas, humores valenter digerit ac resoluit. Non dissimili argumento credendum aquam frigidam large epotam, primo stomachum refrigerare & partes proximas, meatus densare, calorem repellere in altum, qui vnitus, & copia auctus humoribusque istis habitis enutritus, & roboratus, humores putrescentes concoquit, valentius digerit, ac erumpens ad habitum corporis, simul cum aqua attenuata, fundit, ad cutem eisdemque humores vehit, vnde sudores fiunt, vel ad ventrem natura humores propellit, vel vomitu reiecit, vt in quodam iuvene, à Galeno, obseruatum fuit, qui ab epota aqua cum per vomitum, tum per aluum flauissimam bilem reiecit. Galenus alia ratione (vt etiam dictum est) credidit, aquam frigidam large epotam hæc febres sanare, quippè refrigeratione solidarum partium animalis naturam roboratam, præternatos humores aggredi, vilesque ad nutrimentum ad se attrahere, & putridos inutiles excernere. Neque immerito refrigeratione roboratur, cum à stomacho refrigerato frigiditate communicata alijs partibus, natura, quæ calore immodico veluti egrotabat, eodem calore sublato subleuatur. Quod si ita esset, profecto aqua frigida non tantum synochis & ardentibus vehementibus, ac omnibus quidem alijs mederetur, quod in omnibus epota refrigeret, & communicata frigiditate per partem post partem solidis partibus, natura roboretur, quæ roborata valentius concoquendo digerendoque humores, febres tolleret. At ne vel èt Gal. consulit, in ijs, quæ non vehementes æstuosæ sunt, frigidam esse dandam, cum in alijs omnibus, quæ maxime ardentes ac æstuosæ non sunt, epota frigida aqua maxime lædat, obstructa, humorumque cruditatem augendo, quo merito in ijs ab omnibus damnatur. Verum Methodicis alia fortasse ratione fieri fuit persuasum, quippe internis meatibus ex immodico calore febrili nimium diffusis atque laxatis (quod per hosce meatus plurimum natiui caloris exhalet, effluat, ac dissipetur naturamque breui extinctum iri in intelligatur) ab aque frigiditate densatis natura nimio caloris effluuio, prælanguens colligitur, reparatur, atque suo robori restituitur, ex quo robore aucta, humores noxios concoquit, extenuat & inutiles excernit, & febrilem calorem digerit resoluitque. Atque hæc ratio est, qua frigidam aquam febribus mederi ij voluerunt, ab ea profecto non dissimilis, qua ex Hippocrate eandem large affusam partibus dolentibus, inflammatis & conuulsis mederi diximus, scilicet reuocatione caloris: quod alia coniectura etiam, confirmamus, quippe quod hæc, faciat large epota perinde, ac large extimis

extimis partibus affusa, atque in robustis & non debilibus esse affundendam; quia in debilibus corporibus calorē non augeat, sed extinguit, de qua re Gal. in 5. aphorif. 2. ita habet: Nam aquae frigidae occurfus aut vincit natium calorē, aut colligit: vincit quidem, cum debilis fuerit: colligit autem cum fortis, ipsum continens ac diffusi prohibens: Idem praeceptum itidem est, de frigida in hisce febribus danda, quod nimirum robustis & non debilibus exhibeatur, quod itidem in illis per antiparistafim calor colligatur, atque in his quippe debilibus vincatur ac extinguatur. Vnde colligitur hoc genus praesidij non in omnibus quidem febribus vtile esse, sed in ijs solūmodo, quae habent calorem vehementissimū & stuosissimū; atque in locis calidissimis, & in aestate summe calida, quia talibus febribus (quae, quod habeant essentia caloris, qua sunt intra corpus ab obstructis meatibus veluti clausam & adstrictam, merito adstricti morbi sunt) etiam laxis & profluens affectus copulatur, qui fit, vbi febrilis calor vsque adeo auctus est, vt meatus internos arteriarum scilicet venarumque nimis diffusos & amplos reddat. Per quos effluuiū caloris nimium exhalante, natura profluente affectu extinguitur: quare merito cum mixtus sit affectus ex adstricto & laxo, laxoque vrgentiori occurrentes aquam frigidam febricitantibus exhibendam Methodici voluerunt. In Aegypto & in alijs orientis locis hoc genus remedij infrequenti est vsu. Quibus in locis perpetuo, in calidissimis & maxime aestuosis hisce febribus ad aquae frigidae potum largiorem, magna cum vtilitate, confugiunt. Galenus expressit solūmodo in febribus exhibendam, quae praeter modum calidae atque aestuosae sunt. Itaque in vehementer aestuosis in summo aestatis calore, in corporibus aëstuetis, & robustis quippe iuuenibus, nullam partem debilem habentibus, nullo phlegmone in visceribus existente, nulla item obstructione insigni aqua frigida large propinanda erit. Contra in non praetermodum calidis, in frigidoque aere non dabimus, neque in debilibus, neque aliquam partium internarum inbecillitatem habentibus, neque in obstructis, vel in morbo omnino crudo. In his quidem magna incommoda (Galeno auctore) inducit, ita vt alijs ita gula laxa sit, vt vix deglutire potuerint, alijs ventriculus vt vix postea concoqueret, alijs os ventriculi maxime laeditur, alijs iecur, aut colon, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes, aut viscera: alij ex ipsa epora in difficultatem spirandi inciderunt, alij in conuulsionem & tremorem, atque alij alijs affectibus ob aquae potum tentantur. Hinc Methodici actu non frigidam exhibendam in febribus, quae non sunt admodum aestuosae voluerunt. Quod & Hippoc. quandoque docuit. Itaque cum haec febres non sunt admodum aestuosae, ex quo non habeant laxum affectum coniunctum ab actu frigidis cauendum erit. qui si calida abhorreant saltem non actu frigida potui erunt danda. Itaque his aërotis dabitur vel aqua simplex cocta, aut hordeacea tepida cum iulep de pulpa tamarindorum, vel ex acido citri parato. vel in potu dabitur aqua stillatoria ex oxalide vel, boragine, vel endiuia, vel taraxaco cum saccharo, vel iulep aliquo ex praedictis. Hippocrates vero varias portiones ad febres in libris de morbis recensuit, quas apud ipsum quisque legere poterit. Recentiorum Dogmaticorum aliqui potum ad easdem parant, ex sacchari libra, succi granatorum acidorum vnc. viij. aceti albi vnc. iij. atque aquae communis lib. iij. omnia miscentes simul. Alij accipiunt aquae coctae lib. vij. sacch. lib. ij. aceti albi vnc. vi. dissoluta saccharo potum parant, exhibent singulo mane ad semilibram calidum. Alij alium potum aërotis haud inuocundum parant, itidem accipientes sacchari, rosati, buglossati, boraginati an. vnc. i. s. dissolunt in aquae oxalidis, buglossi atque endiuiae an. libra media, percollatae aquae addentes syr. de pomis, de citri acido, de oxisacchara an. vnc. ij. huius exhibent ad vnc. iij. atque haec sunt portiones ad febres, Dogmaticis familiares, quarum vsus est, singulo mane ad semilibram à qua egri panis conteguntur, vt sudent; de qua etiam

In 1. ad Glau.
cap. 13.

In libro de locis
in homine tex.
39.

In lib. 6. tex. 29.

etiam sæpius in die ipsis concedunt, sed in pauca quantitate ad sitim molestissimam restinguendam. qui illas valde frigidas potant, nedum à siti & à calore liberantur, at quinimo paulo post, plus sitiunt, atque magis æstuant calore. In ijs vero, quæ præter modum calidæ & æstuosæ sunt, dantur etiam à Methodicis actu frigidæ potiones, ea ratione qua aquam dari illis diximus. In febribus his non vehementer æstuosis decocta, atque aquæ stillatitiæ rerum facultate frigidarum actu calidæ propinantur, cuiusmodi sunt, quæ ex endiuia cichoreo, funco, oxalide, portulaca, malua, & similibus parantur: dantur inquam ad vncias quatuor cum sacch. vel cum syrupo violato vel acetoso, vel de acido citri in aurora actu calidæ. Nonnulli pro secreto habent, exhibere singulo mane helxinæ Dioscoridis, idest parietariæ decoctum, ad vnc. iiij. ex sacch. vel succum ad vnc. ij. ex sacch. Aegyptij exhibent magna cum vtilitate lac calidum, expressum è seminibus melonis, anguriæ, cucumeris, cucurbitæ, endiuia oxalidis, maluæ, altheæ, portulacæ, cum seminibus etiam fæniculi, ex aqua stillatitia & sacch. candido. conterunt in mortario, & ex iure pulli exprimunt & cum modico sacch. candidi exhibent ad vncias quatuor in aurora calidum; Aliqui Aegyptiorum in vehementissimis æstuosissimisque febribus exhibent mane mucaginis psyllij ex aqua rosacea actu calida ad vnc. iiij. quæ si etiam malignitatem sapiunt, semina quoque psyllij optima recentia terquaterque ex aqua lota, cum rosacea aqua exhibent, ad drachmas duas, tanta cum vtilitate, vt aliquando sudorem moueant, & plerumque bilem porraceam æruginosamque virulentam per aluum non sine admiratione, educant. sed de hoc medicamento accurate scripsimus, in libris de medicina Aegyptiorum secundæ editionis. Itaque propositis alterantibus medicamentis intro assumendis, restat, vt de laxatorijs purgantibus agamus. Hæc cum duplicis sint differentię quædam vere laxantia ventrem, & quædam vere purgantia, de laxantibus nunc agimus, quæ vsum habent, si aluus adstricta fuerit. hæc sunt aut clysteres lenitorijs, quos superius meminimus, qui alternis diebus si aluus fuerit adstricta iniicietur, quod si aluus fuerit fluida cū ab his tū ab alijs omnibus laxatorijs abstinendum erit. Post Clysteres sunt ea, quæ per os assumuntur, vt est pulpa cassiæ abissinæ dictæ ad vnc. i. s. pulpa tamarindorum, manna mastichina ex aqua stillatitia dissoluta ad vnc. iiij. & alia quæ alijs meminimus. Ex antiquis Hippocrates dabat lac asinum coctum ad libras tres vel quatuor. Cuius vsum antiquis fuit valde familiaris. Dioscorides dixit, asinum, bubulum & equinum ad ventrem mouendum esse idoneum, at serum lactis (ait) esse longe potentius ad purgationes: Quod lactis loco Galenus quoque exhibebat, & meritò cum lac febricitantibus dare malum sit, in quibus multis de causis videtur suspectum, etsi coctum minus videatur. Aegyptij & Arabes parant syrupum ex granatis dulcibus & ex saccharo laxatiuum (qui dici satis non potest, quam sit iocundus & vtilis) ad hæc febres. Nonnulli in aluo adstrictis clysteriorum loco exhibent bolum statim ante cibum, ex pulpa cassiæ fistulæ trium drachmarum pondere, aut dant bolum ex floribus cassiæ recentibus extractæ & optimæ pulpæ tamarindorum an. vnc. ij. atque ex saccharo. syrupus etiam violatus solutiuus ex stillatitia aqua aut ex sacch. ad vnc. ij. Atque hæc de laxatorijs lenientibus: De purgatorijs Methodici non admodum solliciti in febribus fuerunt, raro purgantia vel nunquam exhibebant, quod hæc stomachum subuertant, appetitum destruant, coctionem turbent, neque commode purgent, neque (vti illis visum est) humorem particulatim facientem obstructionem inuoluitum, at illum qui in partibus corporis patentioribus existit, cuius purgatio non tollit febrem, à quorum sententia Hippocrates etiam haud disensisse visus est, cum in febribus vel nunquam vel non nisi post decimam quartam diem exhibendum purgans medicamentum voluerit. Paucissimis quidem medicamentis

In 4. de viſt. rat.
acut. rex. 109.
In 7. epid. Hipp.
In 2. de meth. me.
dica. cap. 62.

mentis Hippocratem in medendis egrorum fuisse contentum cuique patebit, qui
egros descriptos ab ipso in libris epidemicis attentius obseruauerit. Et in co-
ctione magis quam purgatione febribus medebatur. & in hoc parum ab ipso di-
screparunt Methodici, cum & ipsi coctione ac digestionem, apertionesque me-
tuum, siue rarefactione fuerint contenti. Quam curationem ad vnguentum Hip-
pocrates expressisse visus est, cum dixerit: Corpus quieti permittere, vngere &
equaliter contegere oportet, nullamque aquam bibendam & pessantem cre-
rem vesperi sorbendum dabis, ventrem ab initio clysteris dices, sed medicamen-
ta purgantia non admovebis, nempe si ventrem moueris vrina non statim abi-
tur, febrisque citra tum sudorem, tum indicationem in longum protrahes re-
pus. Et merito sane purgantium non licet tunc exerceri vsum, quod humores
crudi sint, neque educi commode queant, & purgantia coctionem impediunt,
que est precipuum quoddam quo febres resoluiuntur. Itaque purgantium loco
Methodici clysteribus laxatorijs vtebantur omnino ab e ductorijs abstinentes pos-
set tamen si occasio fuerit alui adstrictæ, vltus laxatoriorum emollientium. Ve-
perius dictum est vtilitatem præbere, exijsque ea admitti debebunt, quæ gustui
haud sunt planè iniucunda. atque hæc sunt medicamenta quæ interius assumpta
synochis atque ardentibus medentur. Nunc de externis, quorum vltus non mi-
nus vtilis quam sit, internorum, intelligitur. Methodici huic curatione primas
dabant partes, namque post aliquot dies præmissa sanguinis vacuatione, ventris
laxatione ad balnea, ad epithemata, ad inunctiones, fomenta & ad similia acce-
debant. E balneis dulcia tepida idest moderate calida infrequenti habuerunt vltus,
& merito, cum meatus laxent, rarefaciant, aperiantque, & putridos humores di-
gerant atque euacuent: qua via scilicet digesta materia calida, ab humiditate ca-
loris incendio heberato, corpus refrigerant. Quare corpora immergunt in aqua
dulci temperate calida post primos dies, quippe post morbi principium, vnde
cum Dogmaticis conueniunt, qui & ipsi incepta coctione, scilicet vbi coctionis
signa videri ceperint, balnea instituunt. Conducit etiam in acie solij calida affu-
quantis per egros morari, quoad fiat aliqua, humorum digestio. Vtebantur
etiam non minori cum commodo inunctionibus calidis ad vniuersum corpus ex
oleis laxantibus, rarefacientibus, digerentibusque, quale est chamæmelinum (sed
eo propter acutum & in suauem odorem non ita facile vtebantur) amygdalinum,
irinum, hydreleum, commune dulcissimum, & quod ex floribus cyclaminis pa-
ratur. Particularibus quoque balneis in folem & ad caput, & ad pectus, & ad hy-
pochondria, ad renes, atque ad alias partes corporis vtebantur. Ad caput, ad
frontem, atque ad tempora spongas ex aqua calida expressas apponebant. Hip-
pocrates in aphorismis inquit: Multa aqua calida capiti super iuncta febrem sol-
uit. At & ex aquis quoque, vel ex succis conuenient, quæ ex herbis facilius tri-
gidis parantur. attamen non frigida hæc sed actu calida erant adhibenda. Hinc
videtur maxime damnandus vltus oxymethodiorum vocatorum medicamentorum,
epithematum, atque aliorum actu frigidorum quæ fronte temporibus, aut pecto-
ri admoeri solent. & præsertim etiam si in his febribus caput doleat, neque
etiam in principio hæc medicamenta actu frigida his conferre possunt, cum mea-
tus actuali frigiditate densent, exindeque vapores, humoresque ad caput ascen-
dentes intra contineantur, copiaque & qualitate molesta (quod non habeant
exhalationem per poros cutis) augeantur. Quibus quidem rationibus medica-
mentorum actu frigidorum partibus extremis admoendorum vltus ideo Me-
thodici minime laudant. Hæc enim medicamenta oxymethodina, vel epythe-
mata actu frigida vel ad caput, vel ad thoracem, vel ad hypochondria, vel ad
alias corporis partes applicata, affectum adstrictum vi scilicet meatus densante re-
pellenteque (prohibitaque nimirum exhalatione per poros cutis) conduplicare

In 4 de vlt. rat.
in acut. tex. 44.

Gal. in 11 meth.
med cap. 9.
Alex Trall. lib.
12. cap. 3.

In li. 7 aph. 42.

Aurelianus posteritati tradidit. Quod præceptum non minus etiam alij medici Dogmatici eruditius seruare studuerunt. Quare cum cataplasmata, tum oxyrhodyna, tum epithemata calida adhibenda erunt, vt poris cutis ex temperata caliditate rarefactis, humores digerantur, & calor præternaturalis exhalet. Itaque parant epithemata (exempli gratia) accipiendo, aquæ stillatiæ boraginis, hordeaceæ, endiuivæ vel alterius similis, non calidæ facultatis, herbæ an. vnc. iij. santalorum omnium tenuissimæ puluerizatorum an. scrup. i. Croci gr. v. Aceti albi, vel vini aromatici vnc. i. Adhibent ex linea petia imbura ad thoracem, ad hepar vel ad aliam partem temperate calida: fouent lecur tepido vnguento santalino, vel rolato, cum modico aceti vel croci. item oleo violato lacti mixto modice calido vtuntur ad Thoracem, hepar, renisque. Methodici vnum habuerunt in frequenti, vsu, quippè ad hypochondria fomenta laxantia, aut ex decocto, altheæ, maluarum, chamæmeli, seminis lini, fænugreci & aliorum similitum aut exhydreleo calido, aut ex oleis laxantibus digerentibusq; parata. Quod genus remedij Gal. reprehendit, sed an recte fecerit, in primo libro consideramus. Hoc tamen Hippocr. non damnavit, qui in lib. de vict. in acut. ita scripsit: Super præcordium vero lini semen linteo illitum imposito. obseruando vero ne horrescat æger dum apponitur: sit autem summè tepidum aqua & oleo coctum quid an non hoc est laxatorium fomentum? Quare medicamenta exterius adhibenda laxantia esse oportet, quippè, vt meatus aperiant, & putridos calidosque humores digerant. Vnde non abre à recentioribus cognitum est, viuos columbos, pullos gallinæos, accatellos medio disectos statim raso capiti, pectori, hypochondrijs, plantisque pedum appositos, plurimum febricitantibus auxiliari, quod tepido calore rarefaciente calorem igneum foras attrahant, atq; ipsum digerant. Haftenus egimus de curatione synocharum siue continentium febrü, quæ à sanguinis atque bilis putredine excitantur. Nunc superesset de iisdem agendū, quæ aut à pituitoso aut melencholico humore vnâ cum sanguine putrescente fiunt. Quæ cum materia ex qua fiunt, atque curatione à continuis differre non videantur, Merito harum curationem vnâ cum continuarum curatione tractabimus, de qua nunc restat, vt loquamur.

De febrium continuarum curatione. Cap. VIII.

Continentes ex pituita aut ex melancholia in magnis vasis putrescente fieri, ratio expostulat, atque hæc à continuis pituitosis melancholicisque parum vel nihil differre. Quæ cum fient quandoque ex bile, quandoque ex pituita, & quandoque ex melancholia, ideo triplicis ex materia differentiæ sunt, putrescunt vero hi humores in venis remotis à corde quo à continentibus prædictis differunt, quoniâ hæc à materia in magnis vasis propè cor putrescente oboriuntur, hinc vnâ tantū habent accessione, & illæ plures. Cæterū continuæ febres medicis innotescunt, primo quod hæc & ipsæ perinde ac continentes, nisi ex toto sublata, ad in febricitationem non perueniunt, habent vero plures accessiones, atque remissiones; Notæque aderunt putredinis, præsertimque à calore febrili, à pulsu, & ab excrementis, siquidem in ijs febribus, & caloris febrilis, & pulsus ea apparet inæqualitas, quam alias putridarum febrium propriam esse, diximus; excrementa cruda itidem apparere deprehenditur. Notæ biliosæ febris, quam ardentem quoque vocant, s. exquisitæ sunt, eadem quæ in tertianis, apparêt hoc excepto quod absq; rigore fiant, nulla quidem ipsarum, donec ex toto resoluatur, ad in febricitationem venit, plures tamen & accessiones & remissiones habet. Calor plurimus mordax, intensusque, alternis diebus mouetur, lingua licca squalida aliquando nigra,

nigræ, sitis ingens, pulsus magni veloces, frequentesque sunt, urinae subruffæ, ut plurimum in corporibus calidis atque siccis accenduntur, ac ut summatim dicamus, propè signis omnibus ad causum siue ad continentem biliosa accedit. Pituitosa, vel ex eo innotescit, quod non alternis diebus accessionem at porius singulis habeat, calorque est similis ei, qui fumoso igni comparatur, quippè humidus est, & vaporosus, ob idque non intensus, neque multum acris percipitur; nam ut Gal. expressit: caliditas quidem est cum aliquali acredine, quæ non statim admodum manu sed postea innotescit. Non multum sitiunt, neque sitis est intensa. lingua & vniuersum corpus humidum, ac laxum, apparet excrementa pituitosa sunt, & urinae principio tenues & mox crassæ, sed quandoque etiam à principio crassæ, pituitosæ, albæ, cum sedimentis crassis obseruantur. Pulsus minores, molles non raro sopor accedit, animique deliquium (pituita cruda os stomachi opprimente) quandoque aciditas in stomacho, si pituita acida sit, capitis & totius corporis grauitas. Hæ febres excitantur familiarius in pueris, infantibus, senibus, ociosam vitam ducentibus, crapulis, ebrietatibusque incumbentibus, longioresque biliosis existunt, & non minoris periculi. In Melancolica vero calor est effica & multus, ita, ut plurimum digerendo naturam exoluat, pulsus magnus, celer frequens inæqualisque; Urinae principio albæ, tenues, aquosæ, in augmento coloratiores atque in statu quandoque nigræ & crassæ obseruantur. Plerumque lienis dolor vel tumor concomitatur, color corporis nigricans, aut liuens. Quare continua febris cum biliosa, tum pituitosa, tum melancholica ita cognoscitur. Rarò pituitosæ & melancholicæ fiunt, quæ perpetuo summum periculum minantur, frequentius biliosa, vulgatur non tamen exquisita, quod hæc rarò obseruetur, at plerumque spuria & notha vocata, quæ mixtione fit bilis cum pituita & quandoque cum atra bile, cognoscitur signis mixtam ex ijs humoribus affectionem notantibus. Fit iisdem succis vel humoribus obstruentibus venas arteriales non magnas cordi vicinas, at minores & longinquas: vel ex cutis meatuum densatione ex quo morbum esse adstrictum facile intelligitur, à quo profecto laxantia præsidia ad curationem, indicari videntur, in biliosa quidem quo magis exquisita erit, eo leuioribus laxantibus erit opus, efficacioribus vero, in spuria, & in pituitosa: omniumque efficacissima illa esse oportebit, in febre melancholica. In biliosa exquisita, eadem erunt opportuna remedia, quæ ad causum nuperissime meminimus, in notha vero ac spuria efficaciora (ut dictum est) laxantia esse debebunt, quod humor crassior, sit & lentus. Itaque in primis quod ad victus rationem pertinet, aer erit clarus, non frigidus, cibus paulo plenior si febris futura prolixior, si brevis ex celeri motu coniiciatur, saterit, parcus, qualem ad synochum & ad causum præscripsimus. pro potu aqua hordei cum pauxillo cinnamomi, & quandoque concedatur vinum ogligophoron, corporibusque præsertim debilioribus flatibus ac stomachi fluctuationibus vexatis modo capitis dolor non adfit, neque futuri delirij signum neque (si Galeno credimus) vbi phlegmone substerit in visceribus, neque si febris insignem habuerit malignitatem. In corpore vel ex temperamento, vel ex victu prægresso, excrementis multis redundantante medicamentum per ventrem laxatorium, ex lenitorijs vocatis prima die exhibeto, vel in potione, vel in bolis, cuiusmodi erit, quod accipit floris cassiæ 3. x. spec. hyeræ. s. Gal. 3. i. vel accipe elect. len. 3. xij. cum hyeræ drachma. aut syr. ros. solutiu vnc. iij. electuarij len. vnc. i. cum decoct. flor. & fruct. cordisacta potione, vel mannam cum melle rosaceo solutiuo. At longe libentius Methodici laxatoriorum purgantium loco, clysteres instituunt, & laxatorios & irritatorios. quibus aluus subducatur. Ab his vero medicamentis laxata aluo (vel per vomitum, si eo humor inclinauerit, leni vomitorio adhibito) secabitur vena in altero die dextri cubiti, modo aliquis dolor vel tumor regionem splenis non

X 2 occupaue-

In 1 ad Glau. 7

Galen in 2. epid. sect. 1. com. 7.

In 4. de uict. rat.
ad acut. tex. 44.

occupauerit, iecoraria, vel communis vocata, & sanguis ea quantitas euacuabitur quam vires, & corporis plenitudo permiserit, vnum etenim ex maximis laxatorijs quibus affectus adstricti cum febre maxime iuuantur, venæ sectio est. si corpus sit robustum, sanguineque multo abundans, ex sinistro brachio erit repetenda euacuatio in altera die, vel crura in ijs more antiquorum scarificabuntur, atque copiosius ad libram fere (modo vires permiserint) sanguis educetur. Discant, qui hanc ignorant, modum quo fieri debeat, in nostris libris de medicina Aegyptiorum. hoc genus laxatorij præsidij, euacuat quantum uis copiose, & vnâ à visceribus & à capite reuellit, vnde apud multas nationes ad sanguinem in mulieribus, præsertim si menstrua purgatione defecerint) in pueris, eunuchis, atque omnibus corporibus albidioribus, vt expressit Galenus, & tenuioris sanguinis. hoc genus præsidij est in vsu familiarissimo contra in corporibus durioribus, crassioris sanguinis, crurum scarificatione longe præstabit venæ sectio. His præmissis auxilijs in principio morbi, concoctioni humorum erit incumbendum, Quare auctore Hippocrate corpus quieti permittere, vngere, & æqualiter contegere oportet. Interim non damnanda, quæ huius ætatis medici Dogmatici ad concoctionem adiuuandam affectant, quippè decocta, ex ijs simplicibus parata, quæ vim habent tollendi obstructions, nempe quadatenus extenuando humores, detergendo, atque meatus aperiendo. Itaque singulo mane in aurora dabitur calidam hanc potionem. Accipe oxymellis simplicis, vel syr. acetosi simplicis vnc. i. de boragine, vel de cichoreo, vel de agrimonio vnc. s. decocti borag. funci, agrimonij, radices petroselinij, oxalidis, endiuia vnc. iij. Miscce. Vel in iure pulli sine sale ex prædictis herbis decoctum paratum cum modico saccharo exhibebis. Ad hypochondria verò, fomenta laxantia, & inunctiones adhiberi maxime erit, vtile, quod ijs partibus, in quibus focus putredinis existit, laxatis rarefactisque, facile humores tenuiores exhalent, & digerantur: fomentum parabitur ex decocto meliori chamæmeli, altheæ, fenugreci, vel lini, vel (vt ait Hippoc.) ex feminibus lini decoctis in oleo & aqua contusis atque apposis, quod si, vt Dogmatici consulunt, pura laxantia videbuntur, suspecta, aliquidque roboris addere voluerimus præsertimque hypochondrio dextro addemus modicum rosarum, vel absinthij, vel spicæ indicæ, vel celticæ, vel iris radices, tunc ad vtrumque præcordium calidum huiusmodi generis fomentum poterit adhiberi. Poterunt itidem lanam mollem ex oleis calidis dulcibus, scilicet communis, vel chamæmelino, vel amygdalino, vel irino, vel lilino, vel ex floribus cyclaminis parato, imbutam adhibere. Clysteribus mollibus, si aluus fuerit adstricta opus erit, saltem alternis diebus. In accessionibus vtiliter thoraci adhibebuntur tepida epythemata ex aquis vel ex decoctis digerentibus laxantibusque, cuiusmodi erit, ex maluæ, altheæ, endiuia, boraginis eupatorij, aqua & ad penetrationem modicum aceti addendum erit. Quibus præmissis, singulis diebus frictiones molles, leues linteis calidis ad omnes partes corporis adhibebuntur deorsum versus incipiendo à cruribus, mox ad coxendices, tertio ad dorsum, atque, demum ad brachia, & mox ex calido oleo amygdalino recenti omnes partes cutis fouendæ erunt. vel fricabuntur vniuersæ cutis partes (vt dictum est) manibus inunctis oleo amygdalino, vel ex chamæmelino, vel irino vel lilino, aut præmissis frictionibus, inungentur partes prædictæ corporis volis manuum inunctis ex calida inunctione; quæ paratur ex olei amygdalini, decocti chamæmelini an. vnc. ij. nitri 3. i. s. bulliant, quoad aqua vel decoctum absumatur. Si humores inclinarint ad cutem (apparentibus coctionis signis) sudorifica mane propinabis calida, præmissa cum frictione tum inunctione prædicta calida. & ægrotum stragulis calidis cooperies. Pro sudorificis poteris propinare nostræ aquæ alexipharmacæ vnc. ij, vel quod accipit, foliorum calaminthæ florum chamæmeli an. p. ij,

p. ij, radicis chinæ 3. i. s, bulliant in lib. tribus aquæ quo ad medietas absumatur, & mane calidum detur: quo medicamento vti poterunt, quo ad morbus resolua-
tur, si vero ad vrinam inclinauerit humor (quod ex copiosiori vrina conijcitur,
acriorique) vreticis erit opus, at mixtis ijs, quæ calida & frigida facultate præ-
dita sunt. Cuiusmodi erunt, quæ parantur exempli causa ex semin. melonum
cucurbitæ an. vnc. iiii, liquiritiæ dulcis vnc. i, seminum feniculorum, apil an. 3. iiii,
omnibus confusis, lac ex iure pulli parui radice petroselini alterato, expressum,
cum modico sacchari candidi calidum exhibetur; vel ius calidum pulli parui sine
sale radice petroselini, vel apii, vel asparagorum alteratum propinabitur. At si
morbus perseverauerit & ad ventrem humores inclinarint laxatorio medicamen-
to per ventrem opus erit, quale erit (quod tamen non dabitur nisi post diem de-
cimam quartâ, & crudo existente morbo) quod accipit rhabarbari electi 3. i. s, aga-
rici troch. scrup. iiii, spicæ cinnamomi an. scrup. s. in decocto florû & fruct. cordia-
lium infusus per noctem, expressioni additur mannæ electæ vnc. ii. vel sy. rosari so-
luti vnc. iiii. aut aliud simile, cum decocto flor. & fruct. cor. misceto & calidum
propinato. aut accipe floris cassiæ n. extractæ vnc. i, electuarii de succo rosarum,
diapheniconis an. 3. ii. Misce fiat boli. aut rhabarbari pul. 3. i. s, agarici th. scrup.
i. cū electuarii len. 3. i. fiant boli. Balnea apparētibus signis coctionis calida ex
potabili aqua parata erunt accomodatissima, si semel indie febricitantes iis com-
mode vtiuntur. Atque hisce præsiidiis febris continua biliosa spuria tollitur; iisdē
sanè & pirituosa & melancolica, sed longe efficacioribus, quæ nos accurate di-
cemus, vbi de febris quotidianæ, & quartanæ agemus curatione, hæc eadem &
semitertianæ quam hemitritæum vocant, erunt vtilia, de qua fortasse post inter-
mittentium sermonem aliquid particulatim dicemus.

De pestilentis febris cognitione atque curatione.

Caput IX.

DE pestilenti febre, à peste distincta (dari enim pestilentem à peste distinctam
voluit Galenus) acturi, exinde pestilentem seu pestiferam vocatam dice-
mus quod ita cum peste malignitate conveniat, ut perinde ac pestis plerosque
interimar, ac epidemici non minus plerumque grassetur. licet quandoque non
integram regionem, non provinciam, at civitatem, oppidum, vel locum quen-
dam inuadat. Galen. diuisit morbos in populariter grassantes, omnibus commu-
nes, quos Græci epidemicos uocant; in eos, qui sparsim in uno eodemque loco
non omnes, sed aliquos inuadunt, sporadicos Græcis dictos, atque in proprios
quorundam locorum, quos itidem endimios uocant; Romæ propria uidetur fe-
bris semitertiana; Cayri Ægypti morbus Demelmaoi dictus, Alexandriæ febres
pestilentes Augusto mense, Totius Ægypti henni carnolæ, elephantiales cum
Arabum tum Græcorum. Definiunt medici pestilentem febrem esse eam, quæ à
putredine fit inuadente regionem cordis, ab alijsque putridis ipsam distingui
aiunt, quod in his neque humores cordis, neque spiritus, neque substantia, pu-
trefcat, sed tantummodo illiusce, uisceris humores à putridis halitibus poni in
calefacto esse, nequaquamque ipsos (uti in pestilente fit) computrescere. Hincq;
pestilentem ab alijs febribus differre per intensiorem ac excellentiorem putredi-
nem. Auctor diffinitionum medicarum pestilentem uocauit, quæ cum multa
caliditate firim inextinguibilem inuehit, bilis omnis generis vomitus habet, fe-
ridasque alui excretiones, ac virulentas, ut paludium graueolentis sunt urinas-
que multas habet tetri odoris, pulsus paruos, obscurosque inducit. Hac de-
finitione non ueram, at ardentem pestilentem expressisse uisus est. & Galen. in
lib. de

In 3. de prasaga.
expulsib cap. 4.

In 1. de vi&rat.
in acut. com. 9.
In 1. epid. sect. 1.
comm. 1.

In 3. epid. sect. 3.
com. 20. & 58.

Gaf. in 6. epid.
sect. 1. com. 29.

Hieronymus Fracastorius in 2. de morb. contag. cap. 3.

D. Aut. Altim. in libro de pestilente febre c. 6. In li. de statibus et Gal. in 1. epid. sect. 1. comm. Gal. in li. de progn. expulsi. c. 6. Et in 1. de diff. feb. cap. 4. In 2. de nat. humana comm. 4. Gal. in 1. de diff. feb. cap. 4.

Hier. Fracastorius contra Morb. tantum in lib. 2. de morb. contag. cap. 3.

In 3. epidem. 3. comm. 9.

In 2. de aliment. facul. cap. 6. In li. de cib. boni & vitio c. 1. Gal. in 1. de tep. cap. 9. Et in 3. epidem. sect. 3. comm. 22. Avic. in 4. metheorum cap.

lib. de Theriaca ad pisonem, ipsam venenum inspiratum vocat, veram & epidemicam intelligens. Quidam ex recentioribus, hanc febrem sordidam ac profundam putrefactionis esse voluerunt, quo ab alijs putridis distinguatur, eo quod ea non sint profundae, sed superficialis putredinis. Quod perinde est, ac si dicant cum Galeno, hasce febres simpliciter putridas dici, & pestilentem excellentioris esse putredinis. Haec duplex est, vera & non vera, hanc rectius malignam, seu maleficam, seu mali moris medici multi appellant, Quae erit vel synocha, vel causus, vel semitertiana, vel lipiria, vel epiala, de quarum curatione haecenus egimus. Exquisita & vera id proprij habet, vt ab aere infecto originem trahat, & nunquam ab interna causa proueniat; Quod ex Hippocrate colligi videtur. Neque immerito cum aer vitiatum ad cor primo attractum ipsum coinquinet, & vitiet, ipsiusque aut contenta insigni putredine aut substantiam inficiat. Vnde pestilentis febris praecipuam ac maximam causam esse aeris putridi inspirationem cognitum est. Nonnulli ex Galeno existimarunt aerem non simplici qualitate, at tota quidem substantia infectum pestiferam febrem facere. Quod tamen Gal. negare videtur, cum ab immodica etiam aeris caliditate, ipso auctore tanta excitari queat putredo, qua status pestilens fiat, cuiusmodi fuit quae olim Athenienses inuasit, de qua Thucydides historicus ita habet: Sed in tugurijs suffocantibus aestatis tempore habitantium corpora corruptione laborabant. Neque etiam negandum aliquam febrem pestilentem a causa quidem interna, quippe insigni ab humorum corruptione fieri, & etiam epidemicam, cum habeat causam communem scilicet, vel aerem infectum, vel vitiosum victum antegressum, Qualem ex cara annona homines comedere coguntur. Itaque huius febris causa erit, ita insignis & excellens putredo vt & cordis contenta, & substantiam putredine afficiat, licet nonnulli recentiorum illud acriter contenderint neque concedere voluerint in pestilentibus febribus cordis substantiam vel contenta putrescere, sed tantummodo humores pati profundam & sordidam putrefactionem, cuius opinionis auctor fuit Doctissimus Hieronymus Fracastorius. Accedit ad febrem pestilentem faciendam humorum magna aptitudo ad putrescendum, aut ex celo aut ex victu, qua humores insigniter putrescunt. Quam causam esse pestis, pestilentisque febris, & non cordis & contentorum putrefactionem, coijcitur; Cordis vero & substantiam & contenta, a vaporibus putridis infici, non tamen necessario putrescere, eo argumento intelligitur, quoniam cor nobilissimum membrum tantam putredinem viuens non sustineret, sed continuo homo extingueretur. Hincque est, quod Galen. in ea pestilentia, in qua inflammationes (vt Hippocrates est auctor) eryspipelataeque in summe putridos & horrendos abscessus murabantur qui omnes interimebant) a flaua bile in maligniori ea tempestate genita, habente aptitudinem ad vehementer putrescendum, causam habuisse voluit, cum alias eadem bilis, non tamen ita summe putris reddita, sacros ignes fecerit, qui tamen lethales nunquam fuerunt. Ex quo humores valde putrescibiles non parum ad pestiferarum febrium generationem faciunt, qui non tantum ab aere vel putrido vel putridis vaporibus infecto, sed etiam multo facilius a cibis & potibus plurimum humidis, vel corruptis vel semiputridis, illam ad putrescendum aptitudinem nanciscuntur. Vnde cucumeres, quod succum praemulta humiditate facile putrescibilem in corporibus gignant, ad cibos frequentatos malignos pestilentesque febres facere, & a cibis semiputridis vel corruptis aliquando pestilentiam sublecutam, Galenus est auctor. Viri eruditi negant causam huiusce febris esse occultam, at ipsam in humorum insigni putredine consistere. Addunt vnam quoque ex externis causis, calidam atque humidam aeris constitutionem per multos menses perseverantem. Calor vero extraneus humorum putredinis est auctor. Etenim putredinis materia humiditas est, & faciens putredinem calor extraneus

traneus siue præternaturalis. Quo animaduersum est, ventos austrinos orientales occidentalesque (quod aërem plurima humiditate repleant, & calefaciant) si diu perflauerint, febres pestilentes inducere; Addimus idem facere omnia, quibus aeris ne dum temperamentum sed tota substantia coinquinata putrescit, & veluti in venenum exitiale mutatur, qui aer infectus per inspirationem attractus pestiferum morbum creat. Cuiusmodi sunt vapores à paludibus, stagnis, speluncisque corrupti in aërem delati. In Alexandria Ægypti quotannis mense Julio Augustoque à lacus cuiusdam proximi, aqua (quo tempore paucissima est nondum Nilo flumine inundante) putrescente, putridisque ex vaporibus exinde à ventis in illiusce aërem delatis, innumeri febribus pestilentibus pereunt. Quod mali in ciuitate augetur, ab aqua in subteraneis locis (tota enim ea ciuitas columnis fundata est, & in fundamentis est peruia) qua vtuntur ad victum ob prædictam causam, scilicet quod paucissima sit, & ab æstuoso æstatis calore putrescat, atque ab ipsa etiam putridi vapores quod in aërem ferantur. Colligimus itaque veram ac exquisitam febrem pestilentem fieri ab aere vel putrido, vel putridos vapores ac venenatos ad cor inuehente, spiritus humores atque substantiam cordis inficiente. Ex quo ephimeram pestilentem, quæ spiritibus infectis, putridam, quæ humoribus, atque hecticam, vbi ipsamet cordis substantia infecta est dari medici voluerunt, alij ephimeram pestilentem dari negant. Neque pestilentes febres quartum genus febrium esse, vt quibusdam visum est, eruditi concedunt, quod hæc omnes genere putridarum comprehendantur. Hæcque differre à putridis voluit Galenus excellentiori tantummodo putredinis gradu. Dari etiam pestilentes non veras, & non exquisitas, quæ non ab aere excitantur, at ab interna causa, vel sit obstructio, vel meatuum constipatio, vel humores facile putrescibiles, ex cibis, potuque vitiato geniti, aut venenum epotum multis visum est. In his non primario regio cordis inficitur, at aliunde ei communicato vitio, quippe à foco accensæ putredinis quandoque synochæ, ardentes, atque continue aucto gradu putredinis in pestilentes mutantur: quod sæpius culpa medicorum male in principijs iplas curantium, multis euenisse sæpe vidimus. At tempus nunc ex postulat, vt signa prodamus, quibus pestilentes febres cognoscuntur, loquimur nunc de veris, quando malignarum in propriè dictarum pestilentium signa superius proposuerimus. Galenus Dogmaticorum omnium postunum Hippocratem facile princeps, ait: in hisce febribus calorem exterius mitem esse, minimeque mordacem percipi in toto corpore (ipso thorace excepto in quo acrimonia obseruatur) Quod signum clarius in 6. epidem. expressit, ex Thucydide dicens: & exterius quidem tangenti corpus neque valde calidum erat, & postea Peste affectos neque calidos & perurentes apparuisse. Frequentiusque parua tubercula in dorso & in alijs partibus efflorescunt, hac nostra ætate maculæ ad cutem erumpunt pulicum morsibus per similes quas punctículas vel petechias vulgus appellat. Vrinæ item esse aut turbatas, aut aquosas, aut colore sedimentisque sanorum vrinis per similes, in quibus aut nullum sublimamentum est, aut subliuidum araneorum telis in modum lanæ congestum. Aluius colliquata excernit, biliosa, flaua, vel ruffa, spumosa, liquida pinguis, maximeque fetentia, & plerumque perinde atque oui luteum in iure conuassatum colore apparent. In quadam pestilentia Gal. in hisce deiectionibus obseruauit, primo flaua profuuisse, mox ruffa colliquamenta, atque demum nigra veluti sex sanguinis. In his quoque febribus expiratio fetet, ac in ore aliquid coloris pestilentis, scilicet cryspelatis, aut herpetis, apparet, oculi flammei, atque calidi sunt, cibum abhorrent, siti ingenti atstinguntur, frigidaque expetunt. Paulus Aegineta addidit, bilis vomitus, præcordiorum intentiones, labores, largos sudores, extrema frigida, alui profuua biliosa, tenuia, flatulenta, vrinas aquosas, tenues, biliosas, nigras,

Galien princ. libri de Theriaca ad Pisonem. Gal. in 1. de diff. feb. cap. 4.

In 6. epid. sect. 6. comm. 29.

In 3. de pr. sag. expulsib. cap. 4.

Sec. 1. com. 29.

In lib. 2. cap. 36.

In lib. 4. fen. 1.
cap. 4. cap. 2.
In lib. 4. fen. 1.
cap. 4. cap. 2.

In lib. 4. fen. 1.
cap. 180. & in
lib. x. ad Almas.
cap. xvi.

Gal in 3. de pr.
far. ex pulsibus
cap. 4.

nigras, in quibus mala subsidencia, & suspensa pessima cernuntur, stillas sanguinis narium, in pectore ardorem, linguam retorridam, siticulosam, vigilas, deliria, conuulsiones violentas, itemque alia multa praua. Auicenna vero scribit hanc febrem exterius esse quietam, intrus turbantem, plerumque necantem, in qua interius vexatur caliditas, & inflammatio fortis, respirationem esse magnam, breuem & plerumque fetidam, vehementer eos sitire, cum prærida lingua, aliquando ad esse nauseam, cibos abhorrere, & oris ventriculi dolorem sentire, splenem magnam esse ægrotos esse vehementer anxios, & in quos, aliquando adesse rissim aridam, virium casum, syncopem, delirium, hypochondriorum tensiones, vigilas, corporis relaxationem, & quandoque bothor sub albidam & rubram, obseruari, pulsusque frequentes, paruos, & in nocte maiores; quandoque ægroti instantur hydropicorum modo, ventres fluxus cholera & aliorum humorum deiectionis lenis apparet, fetida, in qua aliquid colliquationis cernitur: Urinæ sunt aquosæ, & nigra, sudant fetido sudore, incidunt in syncopem & in extremorum refrigerationem; conuulsiones, sunt, & lethargici euadunt. Nonnunquam ægrotantes non sentiunt morbum, neque calore ex æstuant, & calor ipsorum tepidus sentitur, neque in pulsibus & in urinis apparet multa alteratio, & mutatio a statu naturali: vnde & medici complures an febricitent ægroti, dubitant. In multis expirationis est fetida, & hæc signa obseruantur, putredine vel etiam cordis substantiam inficiente. Rhasis ait: Febrem exterius esse lentam & tepidam, intrus clausam, expirationem, & alia excrementa ferere, adesse magnam angustiam, sitim vehementem, spiritumque densum. Quæ signa in hisce febribus vel etiam recentiores medici ad ungulam obseruauerunt, quippe in ipsis exterius calorem tepidum obseruari, intrusque percipi caloris incedium, ita, ut ægroti ne vel etiam tenuissima linteamina ferre queant, qui licet exterius parum calidi videantur, plurimum tamen intrus anxii, & inquieti obseruantur, ex quo recte Arabes hæc febres dixerunt, exterius esse quietas, atque interius turbantes. Symptomata verò omnia maiora & sæuiora, quam pro febris magnitudinis ratione, apparent; dolores capitis scilicet vigilas, deliria, lingua sicca, & aliquando nigra, cum siti intensa, & saepe, nullus ciborum potusque desiderium, adeoque fluxus per ventrem colliquariuis, apparet, in quo liquida, lenia, aut nigra, aut syncere biliosa cum vehementi calore exeunt, plerumque fetida est exspiratio; oris aphtæ, id est vlceræ lordida & aliquando nigra in ore sunt, pulsusque prælanguidi apparent, qui quandoque sine ratione cadunt, hoc vnum est ex signis valde proprijs harum febrium, quæ talia apparent, licet ægroti ante cibis probis fuerint contenti. hæcque signa particulatim obseruantur, ubi putredine cordis contenta coarctata sunt. Cum vero eiusdem visceris substantia itidem idem virium contraxerit, ægroti morbum non sentiunt, ita, ut se febricitare, ignorent; quod æqualis calor febrilis sit, vniformisque, & nullas habeat accessiones, & hecticorum modo febris fiat, pulsus quoque, & urinæ parum vel nihilo a statu naturali mutatae agnoscuntur. Ratio horum signorum est, quod ab intensa illa putredine infectis spiritibus, humoribus, aut substantia cordis, omnes facultates debilitentur, potissimumque virales, vnde pulsus sine causa concidunt, languidi & summe labefacti sentiuntur, respiratio frequens debilisque sit, atque ferè continuo ad syncopem inclinant. Cerebro vero communicata lesione, animalis facultas vitatur, & merito sanè, cum spiritibus cordis vitatis, ad cerebrumque delatis, homines minime recte discurrant, memoria non valeant, non recte imagineantur, ac non minus motrix facultas labascit. Hinc sunt corruptæ imaginationes, & ægri redduntur veluti insensati, atque ita obliuiosi, ut quandoque propriorum nominum complures in peste, quod Thucydides tradidit, fuerint obliuisci, hinc etiam externis sensibus

læsis egroti non sentiunt seipfos maligno morbo laborare, atque ita vt potius putent non egrotare, sed recte valere: ad motum segnes ac veluti semimortui apparent, quod spiritus ex corde delati ad cerebrum, obscuri crassi, ac putridi sint. Hac eadem de causa naturalis quoque facultas prelanguet, eiusque actiones idcirco admodum læse apparent, præsertimque in coctrice, in excretriceque, vnde excrementa cruda, færidaque caloris defectu redduntur; & præsertim deiectiones quæ fetidissimæ & colliquatæ excernuntur: quæ deiectiones febrium pestilentium sunt propriæ maculæ item, tubercula, sudoresque non boni sed mali quomodo apparent. Quidam dicunt, putredine contenta cordis viriante, hæc particulatim obseruari, scilicet ægros magis cognoscere seu sentire se febricitare; pulsusque minus debiles, quam in hætica pestilente videri. operationes vero sensuum, atque intellectus intus extraque ita lædi, vt phrenitici videantur, calorem itidem circa hypochondria percipi, magnam fieri respirationem, & expirationem, instar ignis calidam. vrinas mingi turbatas, valde crassas; maculas multas in dorso erumpere, virtutem non ita statim concidere. Vbi vero etiam cordis substantiam putredo occupauerit, fieri hæticam pestilentem, quam ægri non sentiunt, neque se febrile cognoscunt, recteque se valere putant, omnesque extrinsecas exinde operationes secundum naturam videri, ita vt & pulsus & vrinæ sanorum similes videantur: apparent tamen quandoque tenues, liuidæ atque fetidæ. Quædam alia in his quoque obseruantur; quidam enim collum erigere nequeunt, oculi turbidi, apparent toruus aspectus, vultus Hippocraticus, & absque pudore decumbunt, licet mulieres alioquin honestissimæ sint, coram omnibus culcitram, lintheaque leuantes pudenda detegunt; nigre extuberant in cute maculæ, & post mortem, insignis macula nigra circa dorsum, veluti si quis ex alto ceciderit cernitur. Hæcque signa sunt, quibus febres pestilentes dignoscuntur. Vbi vero proxime dicta signa illuxerint, prorsus desperandum, & ob id a medicamentis erit abstinendum in ea vero, quæ putrida pestilens est (licet maiori ex parte intereant) si virtus consistat, ægroti ad oblata bene se habeant, recte respirent, atque alia recte respondeant, supposita spe salutis curationem aggredi oportebit. In qua cum morbus sit itidem adstrictus, merito (vt Dogmatici etiam sentiunt) studendum esse corporis apertioni, atque siccationi humiditatum superfluentium. Quod hæc omnia laxantia sunt, quare nulla alia opinio erit, habenda quam de corpore laxando vt humores summe putridi intus suscepti exhalent, digerantur, atque euacuentur. Gal. dixit corpora siccanda, atque meatus aperiendos, perinde ac dicat, corpus esse laxandum, cum siccare tollere excrementa nihil sit aliud, quam corpus laxare. Dogmatici putant lummam curationis esse siccationem, & Methodici meatuum adstrictorum laxationem, quod per ipsos laxatos putridus humor ex halet, at vtumque facere est vtilius, quod, nihil profecto erit quam corpus putridis humoribus veluti tumens, laxare. Itaque in victus ratione, de qua primum agimus cibus sit, qualem in febribus continentibus expressum fecimus, hoc addito propter insignem putredinem, quod facultate sit siccus licet actu humidus & calidus exhibeatur. vnde iuscula alterabuntur, oxalida, acido citri, vel limonis aut vino granatorum, dulci aut fructibus berberis maturis, & similibus, at quum in continentibus, præstabit, vt cibus plenior aliquantulum sit, propter virium languorem, & oportebit eius modicum, sed sæpe exhiberi; idem de potu dicendum, scilicet conuenire actu calidum & humidum sed potestate siccum, quare aquæ stillatitiæ ex oxalida, ex rosis vel ex succo granatorum subacidorum actu calidæ epotæ ipsos iuuant. Non minusque cum succo citri, vel limonis, infusum itidem berberorum maturorum cum saccharo, vtiliter propinabitur, aut syrupus ex acido citri, aut iulep acetosus vel de tamarindis. Vinum non perpetuo negandum, ogligophorum quando tenue odoratum vires recreet,

Y vrinamque

Gal in 3. de pre-
sag expulsib. c. 4.
Gal. in historia
Heropiti.

In 1 de diff. feb.
cap 4.

Galen. in 1. ad
Glauc. cap. 14.

vrinamque moueat. Nullis vero dandum, si humores omnino crudi sint, cum febre incendente, si vigilie adsint, vel vehemens capitis dolor, delirijue signum, aut si vnà subit aliqua interni visceris phlegmone, vel in hepate, vel in renibus, vel in pulmonibus, vel in ventriculo, vel in intestinis, quia omnibus inflammationibus est inimicum. In aere degat claro, mediocriter lucido, odoribus alterato, æstate poterimus suffire locum, ex aceto & aqua rosacea, in qua santalum rubrum, rosa, xiloloe camphora & modicum caryophyllorum efferbuerit, & hyeme poterimus in vino albo aromatico, aceto & in aqua rosacea & in aqua de floribus cytri, ebullire, caryophylla, santalum flauum, xiloloem, iuniperum, cinnamomum, & modicum assæ fetidæ, vel horum loco, poterimus parare pastyllos cyphoides vocatos, ac carbonibus accensis ipsos superponere, vel massam ad idē parabimus, quæ recipit, benzuini, myrrhæ vngulatæ styracis, camphoræ, ladaassæ fetidæ opobalsami, an. 3. i, xilobalsami, rosarum, caryophyllorum, xiloloes, cinnamomi, an. scrup. i. s; ex opobalsamo occidentali misce & ad ignem fiat trochisci, ex quibus super accensos carbonēs alperis fiat suffumigium. Ægroti animi passiones fugiant, hilaresque sint, vt vapores venenosi prompte exhalare queant. Hac instituta victus ratione, si aluus fuerit adstricta, ipsa laxabitur, & præsertim in corpore cacochymo, aliquo pharmaco lenitorio, quod excrementa, quæ sunt (vt aiunt) in primis vijs, educat, cuiusmodi erit, quod in potione parabitur ex syrapi rosati solutiui vnc. iij, electuarij. len. vnc. i, cum aqua oxalidis stillaritia in qua semuncia pulpæ tamarindorum fuerit per noctem macerata, & flores simul boraginis, violarum buglosique aut in bolis dabitur quod recipit floris cassiæ Abissinæ nouiter extractæ 3. x, pulpæ tamarindorum 3. ij, sem. citri puluerizatorum 3. i: Ab alijs purgantibus medicamentis abstinendum, quod in principio humores crudos agitent, & plerumque moueant, ipsos ad nobiles partes qui tunc temporis medicamentis non cedunt, stomachumque & naturalem eius facultatem labefactant, atque vires prosternunt, ideo ab his est omnino cauendum. Quæ si aliquando aliquibus profuerint, id etienit, quia turgentes fuerunt humores atque hoc etiam non nisi in robustissimis corporibus, sit vsus clysteriorum emollientium si aluus adstricta fuerit, longe laxatorijs medicamentis erit vtilior. Itaque laxata aluo lenitorio pharmaco, ad vacuationem sanguinis declinandum. primo secta vena interna dextri cubiti in ea copia mittatur, quam vires permittent, & in altera die, si corpus sanguine abundauerit & vires permiserint, ex altero brachio euacuatio sanguinis erit repetenda, in pueris & in viris mulieribusque albidioribus sanguis mittendus itidem erit copiosius cruribus scarificatis, ex qua scarificatione, facta sanguinis euacuatio in pestilentibus febribus est vtilissima, quia cum ipsa quantum sanguinis volumus, euacuamus, siue violentia, & sine virium (quod à longinquis partibus educatur) magna iactura & quod maxime in hisce febribus videtur desiderandum, quoniam ex ea euacuatione à supernis partibus ad infernas fiat reuulsio: Vnde mirum non est, si nos sæpius in hisce ægrotis vigiliam, vel dolorem capitis vel delirium vel surditatem, vel aliud symptomata simile continuo sublatum uiderimus, præsertimque si copiosa fuerit euacuatio. De hac Oribasius ita scripsit: Et sanè dum pestilentia uehemens Asiam deprehendisset, multosq; perdidisset, meque etiam morbus attigisset, secunda morbi die remissione febris facta crus scarificauimus duasque fere sanguinis libras detraxi, hacque de causa periculum vitauimus. In pueris & infantibus in quibus vnà cum pestilenti febre uel exanthemata, uel uariolæ apparuerint, perpetuo summam utilitatem ab hac euacuatione subsecutam uidimus. Quæ Aegyptij, Arabesque nullum utiliū præsidium in hisce febribus esse longa experientia, cognouerunt. Quandoq; uero in prædictis corporibus non inutiliter sanguis educetur abhibitis cum scarificatione cucurbitulis cruribus, lumbis.

In lib. 7. c. 20.

lumbis, atque scapulis cum profunda scarificatione, ut sanguis etiam crassus commode educatur: non, ut pessime aliqui faciunt, qui vix epidermide scarificata sanguinem tenuiorem educunt, intus commoto crassiori, minimeque educto. Quomodo eruditi medici cucurbitulas, ad vacuanda corpora merito damnarunt. & Galenus dixit, in plethoricis corporibus esse noxias. sed profundioribus scarificationibus poterunt cucurbitulæ loco scarificationis crurum, quandoque substitui. Corpore laxato, aut per clysteres aut per medicamenta, tum maxime per euacuationem sanguinis, medicamenta cum interna tum externa iisdem vexatis febribus laxatoria erunt adhibenda; ex internis, ea sunt (siue simplicia siue composita sint) quæ Græci alexipharmaca, latinis antidota, dixerunt, quorum omnium usus ad sanandas hasce pestilentes febres est necessarius: hæc vero duplicis sunt differentię, quippe quæ vel manifestis qualitatibus conueniunt, vel tota quidem substantia alterando, aut venenum ipsum vacuando, hæc autem calida sunt & tenuioris essentię, qua penetrant, & digerunt venenum, illa proprietate quadam (ut aiunt) totius substantię, ad se virus trahendo iuuant. Recentiores addunt siccantia, quippe quæ vehementer siccando putredinem ac virus ipsum consumunt, cuiusmodi esse quidam voluerunt terram lemniam, bolus armenius, samiam terram, melitā, tocaiensem, corallium, margaritam smaragdum, vnicornu, lapidem bezaarticum, & similia. Dogmatici manifestis qualitatibus alterando veneno ex præcellenti putredine facto occurrere (aiunt) frigida & sicca medicamenta tenuioris essentię, cuiusmodi est acidum citri, limonis, tamarindorum pulpa, oxalis, rosa, berberis fructus, granatorumque acidorum succus, taraxaci, funciq, & radices heptaphylli, siue tormentillæ, bistortæ & similia. Totius vero substantię proprietate valent lapis bezaar, vnicornu, ac veletiam (ut nos putamus) bolus armenius, terra lemnia, theriacaque ex compositis. licet etiam his adiuncta sit siccandi facultas præualida, qua non minus iuuant, quam proprietate substantię cor ac naturam roborant, siccante vero facultate putridum humorem resoluunt. Quæ vero non alterando, sed euacuando febribus pestilentibus resistunt, sunt vel quæ intus assumpta virus digerunt, & euacuant, uti est radix myrrhidis, gentianæ, angelicæ, petasites, carlinæ, Zedoariæ, phu, Cyperi Babilonici, pentaphylli, succisæ: scorzonæræ, & scordium dictamnium, triphyllum bituminosum, galega, beronica, carduus sanctus, calendula atque scabiosa. Quæ omnia sunt calida, sicca, discussoria, cuiusmodi quodque est ex succis laserpitium, opobalsamum, oleumque è calchanto. Quare per os dandum aliquod ex prædictis, præsertimque eorum, quæ cum proprietate totius substantię, siccante ac vel etiam vacuante facultate laxant, ut est terra lemnia, bolus armenius, terra tocaiensis, margarita, smaragdus, saphyrus, os de corde cerui, lapis bezaar, sed inter omnia, si possit haberi laudatur, cornu monocerotis, vnicornu dictum, vel ut diximus quæ vnâ roborando euacuant virus, uti sunt, aquæ stillatiuæ, aut succi ex oxalide, melissa, scorzonera, taraxaco, surdeo, galega, scabiosa, trifolio bituminoso, carduo sancto, pentaphyllo, petasite, succisæ, atque melissa. Quorum vel succi exhibentur calidi mane ante cibum per horas quatuor cum saccharo aut modico Theriacæ vel Mithridatij, ad uncias duas & aliquando ad quatuor. ut (exempli gratia) accipe aquæ scorzonæræ, cardui benedicti, scordij, tormentillæ an. vnc. i. Theriacę antiquæ 3. i. Misce, & calidum exhibeat, postea pannis contegantur, ut sudent, aut succi foliorum galegæ, vel radices petasites, vel chamædrios, vel scorzonæræ vel angelicæ, vel calaminthæ vel alterius prædictarum plantarum, unc. i. s. dabitur cum olei de calchanto, semi obolo: aut exhibebitis radicem ad drachmam & etiam ad duas radices dictamni albi, aut angelicæ, aut petasites, aut myrrhidis, aut zedoariæ, aut gentianæ, aut lemnium citri, ex uino albo tenui aromatico calido supradicto

Gal. in 5. simpl.
cap. 18.

modo, aut vnicorni, vel lapidis bezaartici, gr. iiii, vel smaragdi ex serapione, vel Hyacinthi grana octo, ex aquæ stillatitiæ scordij vel calaminthæ, vel scorzone-
ræ vel alterius supradictorum, vnc. iiii, vel ex uino vel exhibebitis terræ lemniz
aut boli armeni, aut terræ sammig, aut tocaiensis 3. i, ex vino si febris permiserit
aut ex aliqua supradictarū aquarum. At vt composita etiam medicamenta attin-
gamus vtilissima est nostra aqua alexipharmaca dicta, si calida ad vnciam vel
ad sex qui vnciam vel ad duas exhibeatur. Cuius quidem in fine huius capitis
descriptionem publicabimus. Aut dabitis Theriacæ antiquæ, vel Mithridatij,
aut antidoti è sanguinibus Galeni, vel Apollonij muris, vel diafscordij, vel Moi-
bani, antidoti drachmam ex vino vel ex aliqua supra dictarum aquarum & ab
epotis sudor procurabitur: aut ad sudorem mouendum dabitur decoctum, quod
accipit fol. calaminthæ, scordij, oxalidis, melisse boraginis florum violarum, bu-
glossi, boraginis an. p. i, radices chinæ minutim incisæ, angelicæ, tormentillæ,
cinnamomi s. citri an. scrup. i. Macerentur per diem in aquæ mellissæ oxalidis an.
lib. i. bulliant ad consumptionem medietatis, & percolatum decoctum ad semi
libram calidum propinato. Hæc & alia omnia alexipharmaca medicamenta (uel
simplicia uel composita sint) calida exhibeto ab actu & frigidis planè abstinend-
um erit qui densent meatus & intus calorem, putredinemque claudant, atque
hinc error illorum comprehenditur, qui in pestilentibus febribus aquam frigidam
copiosius exhibent, qua nihil magis noxium est, ea etenim solummodo concedi-
tur, ubi pestilens ardens fuerit, in eaque intensissimus atque æstuosissimus calor
extiterit, ex quo intus nimium laxatis meatibus naturalis calor plurimum resol-
uatur, uiresq; dissoluantur. Quo in casu vt prohibeatur caloris resolutio densan-
do internos meatus frigidam aquam aliquando exhibere, uel stillatitiam, uel fon-
tanam cogimur, aut succum granatorum acidorum, uel infusum pulpæ tamarin-
dorum, uel berberis fructuum, uel aquam rosaceam ad vnc. vi. in qua febre æstuo-
sa usus terræ lemniz, boli armenij, margaritarum, & aliorum similium adstringen-
tium medicamentorum utilis erit. Vnum restat de medicamentis internis dicen-
dam, quippè semper modicum in potu, in cibis, & quouis alio modo, uel terræ
lemniz uel boli armenij, uel terræ tocaiensis, uel terræ melitz esse exhibendum;
mane uero medicamenta, ad finiendam per sudorem febrem esse exhibenda, quæ
longe efficacius agent, si cum externis medicamentis uim sudorificam adauxeri-
mus. Vnum non omittendum de usu in hisce febribus, boli armenij, terræ lem-
niz, sammiz, & succi granatorum acidorum, fructuum berberis, tamarindo-
rum atque aliorum similium adstrictoriæ facultatis non expertum. Quippè ipso-
rum usum uel non sint (uti quibusdam fuit persuasum) adstringentia, uel modi-
ce adstringant, nullo pacto esse incommodum, tamen habent aliquid (ut di-
ctum est) adstrictionis, quoniam tantum abest, ut & Galenus etiam docuit
quod ea modica adstrictione uasorum adstrictionem siue obstructionem augere
queant, ut magis exinde propter amplitudinem meatuum interni meatus robo-
rati, facilius à facultate detergente, deobstruantur. Quam rationem longa ex-
perientia ubique locorum facta comprobauit, quod ab illorum medicamentorum
usu ne dum unquam aliqui læsi sint, at quinimo omnes plurimum fuerint iuuati,
ex quo illorum usus familiaris apud omnes mundi nationes, in hisce febribus,
maxime inualuit. At tempus est, ut ad externa quoque accedamus medicamen-
ta, in quibus cognoscendis, illud unum animaduertitur, scilicet Dogmatico-
rum medicamenta, eadem profecto esse, cum ijs, quæ Methodicis fuisse cognita.
Etenim inter externa (quæ sunt frictiones, inunctiones calidæ laxantes spiracula
meatuum cutis, & quæ cordis, iecorisque regioni adhiberi solent, epithemata,
fomenta, balnea cucurbitulasque cutem calefacientia, laxantia, detergentia, atq;
aperientia primas partes habent, quod corpus diffilari faciant fulginesq; putridæ
commode

*Mentanus, Vero-
nensis in traç.
de feb. pest. cap.
In 5. lib. simpl.
cap. 17.*

commode exhalent, & expurgentur, vel quæ etiam sudorem moueant. Hinc Ruffus & Auicenna in hisce febribus calorem ab intro exterius trahendum voluerunt. Præsertim vbi hypochondriorum tensio aliqua fuerit, calor exterius tepidus, non multus, extrema frigida sint, frequens respiratio, imaginationesque offendentes, quæ incipientis inflammationis (vt quibusdam placuit) sint indicia, vel (quod magis credendum) hæc fiant ab insigni putredine, perinde ac veneno calorem extinguente, aut suffocante, id vnum aliqui notant, scilicet morbum intus adstrictum; esse ex quo merito calorem exterius trahere medici debent, quippè medicamentis calfactorijs, quam attrahunt ad cutim, humores fuliginesque digerunt, meatus aperiunt, atque corpus transpirabile reddunt. Ad quam rem in primis occurrit inunctio Ruffi, Quam aliàs parari diximus (exempli gratia) ex decocti vel aquæ chamæmeli vnc. iij, olei amygdal. amararum, vnc. ij, niri optimi 3. ij, bulliant, quoad aqua vel decoctum absumatur, qua inunctione præmissis frictionibus leuibus vniuersum corpus illinitur, & antidoto aliquo deuorato, in ægrotis pânis coopertis sudor procuratur. hæc erit vtilissima in omnibus febribus pestilentibus, & maxime si in ipsis exantemata apparuerint, vel puncticulæ vulgo dictæ, vel variolæ si bis vel semel in die ante cibum per horas tres fiant hæc inunctio calida. Dictum est alias in pueris variolis laborantibus nihil vtilius esse, quam corpus totum calida hac illi niri inunctione. Ad huc vsum probantur quoque cucurbitulæ ad trahendam materiam præinsigni putredine veluti venenatam ad cutim, sed cum modica scarificatione vtiliores erunt, quod nedum attrahant ad cutim sed quinetiam euacuent, ideoque laxent. Commendantur inunctiones quedam alexipharmacæ, si regio cordis, pulsus, manuum carpis, atque tempora ipsis calidis illinantur bis vel ter in die, cuiusmodi sunt, quæ ex oleo de scorpionibus cum Matthioli, tum serenissimorum Magnis Ducis Florentiæ, & Ducis Ferrariæ (auctore Brasauola) tum oleum etiam Carauitæ Cardani. Vulgaris est, at non parum vtilis cordis regionem ter aut quater indie illini ex inunctione, quæ recipit olei rosati, aut vnguenti rosati, aut santalini vnc. i, specierum cord. temp. vnc. i. Theriacæ antiquæ scrup. i. s. croci gr. v. cū ceræ & acetimodico fiat vnguentum. Nunquam probare potui in hisce febribus vsum vesicantium vulgo dictorum medicamentorum, quod calorem febrilem augeant, vigilas dolore, quem concitant, inducant, & deliria, concoctionem impediant. non minusque & motui humorum critico, impedimento sint, cum incertus sit locus ad quem siue per quem crisis est futura. demum nihil vtilitatis ex ipsorum vsum sperandum videtur, cum difficillimum sit negotium, vesicantium occasione, vt humores ad loca, ad quæ natura nunquam vel rarissime expellit, attrahantur. Adde crudis existentibus humoribus ipsos quidem medicamentis neutiquam moueri & educi posse, potissimumque à parte aliqua inflammata. Balnea aquæ dulcis, mediocriter calida essent opportuna, & multo vtilia si ægroti ijs facile vti possent, qui cum præ imbecillitate in lectulo decumbant, & impotentes ad ipsa sint, merito à medicis particularia instituuntur scilicet ad thoracem, ad hepar, ad hypochondriaque. hæc poterunt parari ex aquis melissæ, rosatæ, borag. oxalidis, scorzonere, endiuia, funci, taraxaci, calendulæ, cum speciebus cordialibus, rosis santalis xyloaloe, camphora, & croco cuiusmodi erit, quod paratur ex aquarum specierum cord. temp. santalorum omnium, xiloaloes, rosarum an. scrup. i, croci gr. v. tenuiss. tritis mistisque fit epithema. At cum superius commendauerimus tanquam medicamentum alexipharmacum, quod & proprietate totius substantiæ corroboret, humore me sum putridum digerat & percutim ipsum exhalare faciat, vel per sudorem, euacuet restat, vt & ipsius descriptionem expressam faciamus. Quæ hæc erit.

Ex pulpe

℞. pulpe tamarindorum recentium vnc. vi.

Succi acetosæ		Fumarie	
Granatorum acidorum		Cichorij odorati	
Limoniorum		Scorzoneræ	
Citrium malorum		Rodicum pentaphylli	
Foliorum funci		Caryophyllatæ	
Endiuæ		Aristologiæ longæ	
Scorzoneræ		Eryngij	
Cichorij	an. vnc. v.	Myrrhidis	
Taraxaci		Scorzoneræ	
Boragh.		Angelicæ	
Rutæ caprarie		Phu maioris	
Rosarum		Zedoariæ	
Spinæ albæ		Gentianæ	an. 3. iij
Echij		Petasites rad.	
		Tormentillæ	
Foliorum fraxini		Morsus diaboli -	
Trifolij bituminosi		Bistortæ	
Agrimoni		Vince toxici	
Betonicæ		Chinæ radices	
Melissæ		Ligni Indi	
Cardiacæ		Santalorum omnium	
Cardui sancti	an. vnc. iij	Xilobalsami	
Chamedrios		Cinnamomi	
Scordij		Caryophyllorum	
Calaminthæ montanæ		Corticum citri	
Pulegij		Seminum citri	
Scabiosæ			
Aceti albi acerrimi lib. ii.		Terræ sigillatæ	
Vini aromatici vnc. xij		Sammia	an. 3. iij
Florum borag.		Tocaiensis	
Buglossi		Boli armeni	
Violarum	an. m. ij		
Rosarum			
Rorismarini			
Mali citri			

Terrantur, & in phiala vitrea clausa maneant succis permista, & soli per quinque dies exponantur, & mox bulliant in balneo Mariæ; Dosis est ab vncia vna ad geminas, datur calida & aliquando cum scrup. Theriacæ Antiquæ. Vnum restat intelligendum quippe vbi fluor alui colliquatiuus adsit, quid agendum. Hoc ipsum quidem, scilicet vbi ita immoderate aluus profluet, vt vires exoluantur corpusque ledat esse cohibendum clysteribus atque alijs adstrictorijs, tunc enim morbus hic est mixtus ex adstricto atque ex laxo, & cum latus vrgentior sit id ei adstrictorijs occurrendum erit. si vero fluor sit moderatus, neque corpus ledum in vsu laxatoriorum ad febrem pestilentem (quæ est morbus adstrictus) exponendam, persistendum erit. Sed iam expeditis continuis febribus tempus est ad intermittentes declinamus.

Finis Libri Quinti.

PROSPE

De Medicina Methodica

175

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER SEXTVS.

*De febrium intermittentium cognitione, & curatione,
& primum de medicamentis ad tertianas.*

Caput 1.

Intermittētes febres medici vocant, quæ à vigore integritatē habent, ad illarum differentiam, quæ licet à vigore remissionem habeant, nunquam tamen ad integritatem veniūt. Etenim in altera die scilicet remissionis, alteram habent accessionem, has Gal. semitertianas (scilicet in quibus alternis diebus accessio renouatur, febre nunquam ad integritatem veniente) vocare solet, etsi ignorare videatur unde hoc nomen inuenerint. Nonnulli duplices tertianas, quippe quod duæ ex tertianis in simul sint, quarum vna die altera accedit, atque in altera altera. Alij tertianam quotidianā complicatam esse statuunt. Quod genus febris hemitriteum Græci vocarunt. Ab his excipiuntur semitertianæ, quæ sunt ex humorum putredine in pulmonibus, vel ex vlcere vel denique ex vomica interna. hæ enim febres tanquam symptomata eos affectus concomitantur. Nos vero de ijs febribus agimus, quæ sunt ex putredine in partibus naturalibus. At ad tertianas redeamus, quæ aut exquisitæ sunt, aut non exquisitæ, quas medici spurias & nothas vocant, vt potè, quæ à mitione bilis cum pituita vel melancholia causam habeant. & rursus simplices, & complicatæ aliquando fiunt: Nunc de exquisitis, simplicibusque agamus. Quarum signa sunt, vt ipsarum accessio alternis diebus egrotos siue de tertio in tertium (ut aiunt) inuadat; & non excedat spacium horarum duodecim, ita ut ante horam duodecimam egroti omnino febre liberentur, paucioribusq; paroxysmis hæc febris finitur. Inuadit autem cum rigore magno, ac ueluti à re quapiam carnem pungente, quem medicī punctorium rigorem uocant. à quo plurimus calor isque multum acris sentitur, qui ut plurimum per sudorem, uel per uomitum biliosum, uel utroque modo terminatur, pulsus in principio sunt tardi, parui, rari, ac debiles, in uigore magni, ueloces, frequentes absque inæqualitate (febrili excepta in qua systolis dyastoli celerior obseruatur, propter fuliginum euacuationem) Vrinæ subruffæ sunt, & tenues. Plarunq; hæ febres fiunt in estate, in regione celoq; calidiori & sicco, in corporibus calidis & siccis bile flaua abundantibus. Generantur à bile in parte corporis extra uenas (ut dogmatici aiunt) suscepta intarcta adstrictaq; putrescente. Quæ si recte tractentur periculo carent, breuesque sunt atque mites. Gal. tertianam exquisitam citò iudicari, & non esse lethalem tradidit; ruffioreq; existente urina, neque suspensione aliqua, neque nebula in primo circuitu appa- rente, ad septem circuitus fore producendam docuit, atque ipsam, si principio subruffa uel subflaua urina sit, mediocriq; spectetur substantia, & paulo post, uel

*Galen in 1. epid.
sect. 1. com. 29.*

*In 4. aph. Hippo.
com. 43.*

*Gal. 1. ad Glauc.
cap. de signis ter-
tianarum.
Ggl. in 4. aphor.
43.
Gal. in 4. aphor.
49.*

*Gal in 4. aph. 49
& in 1. de diff.
feb. 3.*

*Galen. in 1. ad
Glauc cap. 8.
In 1. epid. sect. 3.
comm. 8.
In 2. de crissib.
cap. 3.*

vel albam nebulam vel suspensionem optimam habeat, non ultra quantum circuitum productum iri. Contra ni recte tractentur, mutari sapius in continuas, ardentes, malignas, colliquatiuas, hecticas tabidasque & plerunque redduntur insanabiles. Quales Galenus obseruauit ex calidorum balneorum vfu, ex quo ad tabidas mutatas fuisse affirmauit. His præmissis in febre hac, quæ iridem morbus adstrictus est, laxantibus opus est præsidij, cuiusmodi est aluum laxatorio medicamento vel clisteribus laxans, sanguinem vacuare, vrinam, sudoremque mouere, inunctiones, balneaque instituere. victum tenuem, actu humidum, calidumque & exiguum præscribere. pro potu aqua hordeacea est opportuna cum saccharo aut cum iulep, aut cum succo limonum, & saccharo. vel aqua stillaritia ex cichoreo, vel endiuiâ, vel funco, vel ex alijs similibus: à vino omnino abstinentum. cibis bis in die quietis, semel in die accessionis longius ab inuasioue & vigore cremor ptisanæ cum lacte sem. melonum erit opportunus. Maisthaleb Ægyptiorum, illis maxime vsui erit: qui recipit seminum melonum vnc. iij, cucurbitæ anguriæ liquiritiæ rosæ an. vnc. i, anisorum vnc. ij, omnibus confusis cum aqua rosacea lac extrahitur, & cum saccharo calidum datur. aut qui recipit, seminum melonum vnc. iij, papauer. alborum portulacæ, endiuiâ, lactuca, maluarum, an. vnc. i, anisorum vel feniculorum vnc. ij, confusis supradicto modo lac expressum cum saccharo calidum datur; vel furfurum triticeorum itidem expressum decoctum cum aqua rosacea & saccharo candido. vel iusculum, quod ex fermento ab Ægyptijs parari superius docuimus. vel panem tritum in iure pulli coctum, aut ferculum ex blito, malua, endiuiâ, portulaca uel ex alijs similibus herbis. Quandoq; ipsis conceduntur carnes pulli gallinacæ iunioris, vel vtriusq. Gal. testes gallorum paruorum, vel alæ tantum, aut phasianorum aut gallinarum paruorum: aliquando oua sorbilia, & nonnunquâ pisces saxatiles: apparentibus signis coctionis vinum etiam conceditur tenue ogligophorum idest aquosum: Quiescant ægroti ab animi passionibus, & in aere lucido, in caliditate temperato mancant. Hac victus ratione instituta, ad laxantia præsidia descendimus; cum in hac febre adstrictus humor, calorque febrilis sit digerendus & exhalandus. primum itaque aluus laxabitur medicamento leniter laxatorio. Cuiusmodi erit si exhibeatur mannæ electæ in sero lactis dissolutæ ad uncias quatuor, & postea ægroti super bibant, feri lactis capilli ex succo limonis claresfacti libras duas. vel laxabitur venter cassia cathartica Abissina vocata, vel cum saccharo deuorata ad unciam & semis, vel ex stillaritia aliqua aqua vel ex sero supradicto dissoluta. vel exhibeatur syrupus rosatus laxatiuus ad vnc. iij. ex supradicto sero in quo semuntia pulpæ tamarindorum fuerit per noctem infusa; vel cassia dabitur, cum pulpa tamarindorum. Post alteram diem, vbi ex hac febre natura plurimum graueretur, & multa copia bilis in venis cū sanguine contineatur, secta vena iecoraria dextri cubiti sanguis mittatur copia moderata, vel in pueris & in mulieribus scarificatis cruribus, aut cucurbitulis cū scarificatione spatulis adhibitis, ac longe præstabit sanguinē vacuari aut vena secta, aut cruribus scarificatis; cucurbitulæ enim in plethoricis corporibus ex Galeno damnantur, qui eas tutò non adhiberi docuit, ni prius totum corpus fuerit euacuatum. A sanguinis vacuatione singulo mane, quoad signa coctionis appareant, dabitur syrupus violatus simplex, cum acetofo simplici; vel rosatus simplex cum acetofo, vel de acido citri vel de oxalide vel de endiuiâ, vel de funco cum aquis stillaritijs, vel decocto maluarum, violarum, boraginis, funci, oxalidis, agrimonij, & radicis petroselinii. hic exempli gratia parabitur in hunc modum. R. syrupi ex acido citri vnc. i. de boragine vnc. 5. aquæ stillaritiæ borag. acetosæ, agrimonij an. vnc. i. vel decocti, acetosæ borag. funci, vnc. iij. Misce pro syr. actu calido exhibendo. Verum pro aliqua alia molienda vacuatione, humoris inclinatio erit attendenda, nam si humor ad stomachum

Stomachum inclinarit, quod ex nausea & uomitu intelligitur, aut aqua tepida cum modico syrui acetosi vomitus irritabitur, vel hydraleo, aut decocto maluarum, sem. lini, fenugraei, hordei; vel aqua tepida, in qua radix dulcis glycyrrhyze, & paucillum sem. feniculorum ebullierit, copiosius hausta, aut mouebitur vomitus aqua tepida cum syrupo acetoso aut iure pulli macro cum syrupo itidem acetoso. si vero ad vrinam humor inclinauerit, quod ex vrina copiosiori, aut acriori intelligitur, diareticis erit opus. Galenus dabat decoctum, apij, anethi, feniculi, at si illud mixtum erit cum lacte seminum melonum, cucumeris, endiuiae, maluae, erit longe vtilius. sed opportunum erit decoctum quod ita paratur: Accipe seminum melonum cucumeris an. vnc. ij, sem. maluae, altheae, endiuiae, portulacae, ligni dulcis siue liquiritiae optimae rasae & tritae, sem. feniculorum, an. 3. ij, contendantur, & ex aqua hordeacea lac extrahatur, quod calidum dabitur ab vncijs tribus ad sex cum saccharo. Si candido vero ad sudorem corpus itidem fuerit promptum, sudorificis vtetur, proinde dabimus cremorem ptisanae hordeaceae in qua ebullierit pugillus calaminthae, vel decoctum dabitur, quod accipit hordei mundi vnc. i, calaminthae montanae p. ij, radice chinae, arundinis siccae minutim incisae an. 3. is. macerata per noctem bulliant in libris tribus aquae ad consumpt. medietatis: & decoctum datur mane calidum & stragulis calidis egroti probe conteguntur vt sudent, non omisis externis cum frictionibus tum inunctionibus calidis, quas paulo post dicemus. Si ad ventrem humor delabatur, iisdem vtetur medicamentis leuiter subductorijs, quae superius meminimus. Quare purgatio iisdem medicamentis laxatorijs erit repetenda: ab electiua attractorijs vero omnino abstinendum erit. optimum medicamentum erit, quod recipit syrui rosati solutiui unc. iij, manne electae unc. i. feri lactis caprilli. q. s. fiat potio. & post aegrotus super bibat feri lactis praedicti libras duas. Gal. dabat absinthium, cuius ulus propter ingratum saporem apud nos obsoleuit. Atque haec de internis medicamentis. Nunc externa attingamus, quae sunt balnea ex aqua dulci, epithemata inunctionesque ex dulci oleo calido. Balnea ex dulci aqua temperate calida utilissima sunt, cum rarefaciant poros cutis, atque bilem digerendo euacuent, meatusque clausos aperiant. Quorum ulus cum in multis Italiae locis obsoleuerit, in orientis locis, maximeque in Aegypto, in Arabia & in Syria hac etate illa sunt in frequenti usu, ideo complures eorum loco epithemata, quae particularia veluti balnea sunt, omnes affectant, scilicet ex aqua hordeacea, fluuiatili, vel stillatitia endiuiae, funci, maluae, oxalidis, boraginis & similia, temperate calida, & spongijs uel lintreis imbutis ad thoracem & ad hypochondria appositis; quandoque ad penetrationem modicum additur croci, uel aceti, & quandoque santalum rubrum roseaeque tenuissime tritae adduntur. Nonnulli ad iccoris regionem succum calidum endiuiae, uel cichorei, uel funci, uel maluarum cum modico aceti epithematis modo adhibent. ex oleo etiam dulci calido, uel communi uel chamamelino, uel amygdalino dulci, lenibus praemissis frictionibus, totum corpus summa cum utilitate illinunt, quod ipsum laxet meatus; & per eos humorem digerat. Aegyptij cum balnea tum inunctiones & in his & in alijs putridis febribus frequentant. Pro speciali medicamento exhibent singulo mane calidam potionem, quae accipit succi granatorum acidorum, dulcium an. unc. ij, aquae endiuiae unc. iij. uel aquam stillatitiam ex acido limonum cum saccharo ad unc. iij calidam uel mahastaleb potio, quae paratur ex seminibus frigidis maioribus liquiritia, anisorumque seminibus confusis atque ex ipsis expresso lacte quod cum saccharo calidum datur.

Gal. in 5. simpl.

*De Curatione febris tertiana notha siue non exquisita.**Caput. II.**Gal. in 4. aph. 43**In 1. epid. sect. 3. com. 21.**Galen. in 1. ad Glauco.**Viñ. Trineauel.*

Febrem tertianam notham, spuriam & non exquisitam vocant, quæ fit ex bilis mixtione cum pituita extra uenas putrescente. Duplex est, quædam simplex & quædam composita ex duabus vel tribus simplicibus, aut ex quotidiana continua, & ex tertiana intermittente. in hac quidem quotidie accessiones fiunt, una quotidianæ respondens, atque tertianæ altera. hanc hæmitriteum vocant, & semitertianam. Simplicis quoque quædam ad quotidianam accedit, quippè ubi maior pituitæ quam bilis portio putrescit, & quædam ad tertianam, ubi contra bilis pituitæ copia præualuerit. Hæmitriteus vero siue semitertiana, à tertiana duplici distinguitur, eo quia tertiana duplex sæuis, malignisque symptomatibus caret, & in semitertiana sæua ac maligna apparent, unde Gal. merito hanc inter morbos acutos & periculosos recensuit. Cognoscitur tertiana notha primum à rigore, quo inuadit, obtusiore, quam in exquisitis tertianis, non punctorio, scilicet bilis acrimonia ab humido pituitæ obtusa, longiorque est siue prolixior. Aliquando absque rigore, horrore, frigore, sed cum calore tantum inuadit, quippè ubi pituita satis concocta nulla molesta qualitate extrauenata sensibiles partes afficit, & quod habeant paucam pituitam bili mixtam, cuius calore hebescit pituitæ frigiditas, usque adeo, ut nullam molestiam inducendo, statim accendatur, atque putrescat. subsequitur calor neque multus, neque admodum acutus, qui diuturnius prolixiusque ægros tenet, Quo accessio longior fit, ut ne dum intra spacium horarum duodecim (quod de exquisitis dictum est) febris soluetur, sed ad horas usque triginta & quandoque plures accessio producat. Hinc tertium signum ab accessionum numero depromitur, etenim hæ febres non septem circuitibus terminantur, sed longe pluribus, ut quandoque sex mensibus quasdam perdurasse, à multis fuerit observatum. Hinc etiam tarde signa coctionis apparent: Cætera alia signa exquisitarum tertianarum observantur, sed aliquantulum à pituitæ præsentia mutata, ita ut sitis minus intensa sit, minus acuti capitis dolores & calor febrilis minus acris quoque obseruetur. Addunt alij his corporis grauitatem, dolorem vertebrarum, ventriculi inflationem, oris ventriculi fastidium, orisque amarorem, & similia. Fiunt hæ febres obstructis musculis aut totius corporis (ut quibusdam visum est) præsertim circa thoracem & dorsum, aut obstructionibus factis in cavitatibus partium hypochondrij contentarum, cuiusmodi est stomachus, hepar, lien, pancreas, omentum, diaphragma & similes alię partes. Neque est, quod quidam obijciant ex putredine in obstructis viscerum cavitatibus contenta febres non intermittentes, at continuas fieri, ut in suppuratis & in hydropicis apparet, quia scilicet putridus humor in cavitatibus viscerum continetur, ideoque febres continuas fieri, quæ tamen fiunt, quod humor putridus accensusque in his cavitatibus thoracis vel abdominis contentus, multus sit, quam ut una die digeri possit, sed ubi paucus fuerit, ita ut per diem unum digeri à calore febrili queat, fiet febris non continua sed intermittens. Quare his cavitatibus uel musculis obstructis & ob id in ipsis putrescente humore misto ex bile & pituita & quandoque cum modico melancholiæ tertiana notha fit. Quæ ni citò tollatur, minatur lienis obstructionem, tumorem, cachexiam; uel in continuam mutatur samme periculosa. Hæc uero febris & ipsa cum sit morbus adstrictus, pro instituenda curatione, laxantium præstidiorum (quæ quot, qualiaque sint superius diximus) usus erit planè conueniens. Huiusmodi facultatis erit etiam uictus ratio, quæ primo sic instituetur, ut cibis quantitate sit modicus; qualitate, qui humectet, extenuet, detergat, ut est prîsana hordeacea.

hordeacea, vel iusculum è fursuribus, vel panis in iure pulli parui feniculi folijs, vel petroselinij, vel apij alterato. Gal. dabat ptisanam cum pipere, aut hisopo, aut origano coctam; ouorum lutea forbilia, carnes pullorum, gallinaceorum paruorum, vel aucularum montanarum vel perdicum, aut fercula ex folijs feniculi, boraginis, cerofolij, petroselini parata in eodem iure. Antiqui in simplici tertiana alternis diebus tantummodo cibum dabant, quem tenuem victum complures cominode non ferunt, proinde rectius, bis in die quietis modicus tantum dabitur, & semel in die accessione; à vino verò abstinendum erit, quoad præcesserint totius corporis euacuationes, & aliquod coctionis signum, illuxerit, aer sit ad caliditatem declinans, & clarus, ut tumentia laxet. Quod primum ex laxantibus occurrit, est, ut adstricta aluus laxatorio pharmaco aut clystere laxetur, statim in principio complura excrementa in stomacho, & in primis (ut aiunt) vijs contenta facile pharmaco laxatorio subducuntur vel etià crudo exstante morbo, quod hæc excrementa sanitatis tempore genita, & nondum purrefacta (quæ ob id Dogmatici cruda dicere non debebunt) medicamentis cedant. Quare cassiæ florem ad 3. x. cum drachma specierum hyeræ simplicis Galeni, vel cum 3. ij. electuarij diapheniconis, in bolis cum saccharo vel in portione dabitur; aut syrups rosati solutui vnc. iij. electuarij len. vnc. i. cum decoct. flor. & fruct. cum sena potio parabitur. vel mannæ electæ vnc. ij. s. mellis rosati solutui vnc. ij. cum decocto supradicto, vel aliqua ex stillatitijs aquis fiet potio, aut dantur pilularum de hyera. s. scrup. iij. & superbibent syrups rosati solutui ad vnc. iij. ex aliqua stillatitia aqua conuenienti dissoluti. Clysteres molles alio adstricta alternis saltem diebus injiciuntur parati ex decocto maluarum, althææ, mercurialis, betæ, fursurum triticeorum, vel ex hydromele ad lib. i. cum olei dulcis vnc. iij. mellis rosati simpl. vnc. ij. & salis 3j. aluo laxata, & præmissa hac alui euacuatione, sanguis secta vena iecoraria dextri, vel sinistri brachij si in lienis regione dolor, vel tumor adfuerit, quantum vires permiserint, euacuabitur, quod si corpus etiam plethoricum fuerit, in altera die ex altero brachio eadem sanguinis euacuatio ad maiorem corporis laxationem faciendam repetetur; in mulieribus verò pueris & corporibus delicatioribus mittatur sanguis ex cruribus scarificatis, præsertimque in mulieribus, si suppressi fuerint menses. In corpore autem nigriore sanguine crasso abundante præstabit vena secta sanguinem mittere: & si in mulieribus suppressi fuerint menses, secta pedis dextri saphena, copiosius sanguis, viribus constantibus, mittatur: Sunt qui saluatella (vulgo dicta) vena in sinistra manu secta, repetant sanguinis euacuationem. Euacuatione vero laxato corpore, coctioni incumbendum erit medicamentis tum internis, tum externis: ex internis conuenit oxymel simplex, mel rosaceum simplex, syr. acetosus simplex de boragine, de agrimonio, de absinthio, cum decocto ex folijs betonicæ, agrimonij, chamedrios, boraginis, buglossi, rad. apij, petroselini & aliorum similium parato; hæc enim humorem crassum extenuant, detergunt, & ab infarctu liberant. eodem tempore exterius os ventriculi fouendum calido oleo dulci, aut amygdalino, aut chamæmelino aut simili alio, & lien itidem ex fomento calido fouebitur, vel ex oleo chamæmelino, amygdalino dulci, aut communi dulci, aut de capparibus, aut de floribus cycliminis, aut similibus, quæ habent vim rarefaciendi, laxandi, emolliendi, digerendi atque meatus aperiendi. Vtile erit fomentum calidum ex decocto, foliorum & radicum althææ, sem. lini, fanugreci, meliloti, florum chamæmeli & similium paratum ex spongia, vel ex vena sinistra hypochondrio adhibitum. Horum omnium prædictorum vsus erit, quoad signa coctionis apparuerint (scilicet, vbi vrinæ crassiores, melioris coloris cū æquali contento leui albo apparuerint) atq; etià postea, quod digerant humorem febrem fouentem. Verum vrinis magis concoctis conspectis, vtile erit,

humorem putridum purgari per vomitum, si ad stomachum humor inclinaret, quod ex nausea & ex vomitu facile intelligitur. Gal. à cibo vomitum laudauit, multosque solo vomitu sanatos vidit. Cæterum etiam ante cibum prouocabitur vel ex hydromelle cum syrupo acetoso, aut cum oximellite, vel oxycrato, id est aqua calida cum modico aceti copiosius epota, & paulo post aqua reiecta, digitis aut pēna in ore indita, concitato vomitu. Vbi vero humor in stomacho pituitosus, crassus, & lentus fuerit, dabitur ex iure pulli oxymel (exempli gratia) & iuris pulli, in quo liquiritia dulcis, & modicum seminum fœniculorum ebullierint lib. iij, oxymellitis vnc. iij. Misce & calidum propinato. vel exhibeatur aceti scyllini vnc. is. vel solum, vel cum libra iuris pulli parui gallinacei. Sed ab his vomitorijs ex Scylla consultius abstinendum in debilioribus erit, quod ipsis plurimum stomachus, atque ab eo coctio lædatur. Si vero non ad uomitum, neque ad urinam, sed ad uentrem humor relabatur, catharticis pharmacis opus erit. Qualia in portione erunt si exhibeatur mellis ros. sol. vnc. ij, mannę electę vnc. ij, cum decocto flor. & fruct. cord. cum sena, aut mellis ros. sol. vnc. ij, syr. ros. soluti vnc. ij. vel syr. depolipodio vnc. iij, cum prædicto decocto uel in bolis dabitur calisæ uel electuarij len. unc. i, diapheniconis unc. iij. uel pilularum de tribus cum rhabbaro scrup. iij, Agarici th. optimi 3. i, cum succo rosarum misce, & fiat bolus: sed consultius erit, ut cū Methodicis à catharticis abstineamus, & horum lococlysteres & simplices laxatorios, & purgatorios instituere ne stomachus lædatur atque ab eo concoctio. His uero ni febris tollatur, ad ea medicamenta, quæ humorem extrauenatum, accessionem facientem, febremque fouentem, uel per insensibilem euacuationem, uel per sudorem digerunt ueniendum erit. Quorum medicamentorum usus, ueluti apud antiquos olim maxime fuit familiaris (quod efficaciter hæc & alias febres resoluat) ita nunc fere ex toto obsoleuit. Dabant quidem antiqui medicamentum uel simplex uel compositum, & facultatis humorem extenuantis, detergentis, atque digerentis per duas horas ante futuram accessionem, ut humorem à uenis extra excretum, accessionem facientem, priusquam febris reaccenderetur, digererent & resoluere, atque ita febrem planè finirent. Ut uero hoc efficaciter facere possent, præter medicamentum discussoriū, sudorificumque, quod per os dabant, etiam eodem tempore premixtis lenibus frictionibus, inungebant, alij totum corpus, alij omnes dorsi partes, alij præcordia ex aliquo oleorum laxantium, & digerentium, ut humor extrauenatus efficacius cum medicamento intro forasque agente resoluatur. Itaque primum interna medicamenta humorem extrauenatum digerentia proponam, & mox externa. Ex internis uero simplicibus, Diosc. triphylli asphaltites semen tenuissimè tritū ex uino albo calido, uel ex decocto chamedris, ad drachmam, & geminā quoque per duas horas ante futurā accessionem exhibendū uoluit. pentaphyllum idē præstare, non minus atque semen hyperici, constat. succū hyperici aliqui calidum ex uino albo epotum aromatico efficacissimum esse cognouerunt, smyrnij item semen; calaminthamque Gal. comendauit, quod discussoria sit, & sudorem moueat; chamæmelum quoque eodem modo febrem digerere discutereque, apertum esse affirmauit: Quo ab Aegyptijs sapientissimis olim chamæmelum Soli quondam fuisse consecratum, constat. omniumque febrium unicuique remedium itidem fuisse, compertum est. Saxiphragiæ item radicis succum ex uino albo calidum epotum eodem modo omnibus febribus remedio esse, Diosc. testatum reliquit. Chamedrios foliorum decoctum, uel puluerem efficaciter hæc febres resolvere experientia eodem modo compertum est, tantęque efficacię ad hæc, atque ad alias tardas febres finiendas chamedrim esse plures cognouerunt, ut apud nonnullos & pro singulari secreto habeatur, & febrifuga exinde fuerit chamedris appellata. Polygoni succum calidum epotum illo modo febres sanare

Aggregator

In 7. simpl. cap.
de calamintha.
In 3. lib. simpl.
cap. 10.

In 3. de mē.
dica cap. de Sa-
xiphragia.

Aggregator Lugdunensis tradidit, & Constantinus Africanus, violarum pulverem ad semunciam ex aqua stillatitia epotam hisce febribus efficaciter remedio esse scriptum reliquit. Verbasco radix & eius succus idem efficaciter præstat per aliquot dies epotus, non minus quam hipposelini itidem semen ad drachmas duas ex vino albo assumptum. Radix aristolochiæ eodem modo ex vino. Ruta ex vino itidem epota est ex efficacissimis medicamentis etiam ad quotidianas & ad quartanas febres discutiendas. Agaricus eodem modo cum vino aromatico assumptus, efficaciter idem valet. ipsum namque ante accessionem epotum rigores resolvere Diosc. affirmavit. Piper nõ minus tritum ex vino potum ad scrup. ij. vel ad drachmam idem facit. Rhaponticum antiqui omnes eodem modo assumptum plurimum laudant, cuius defectu, cum parvo errore substituitur optimũ rhabarbarum. ex gummis, silphium fabæ magnitudine cera inuolutum deuoratur, & postea vinum calidum album superbibitur ad vncias quatuor, quod medicamentum nedum ad hæc febres, sed ad alias his longe difficiliore tollendas meritò maxime commendatur, quia vnum est ex efficacissimis discussorijs; hoc vero nihil est aliud, quàm assaferida optima officinarum. Myrrha quoque ad idem fabæ magnitudine cum piperis obolo ex vino vtiliter datur, à nonnullis & opoponax gummi eodem modo laudatur, longe plura simplicia medicamenta ab antiquis & à recentioribus ad idem probantur. Atque hæc (cæteris præstantiora quod sint, ipsisque certo medici fidere queant) nobis ad tertianas nothas resoluendas sufficient. Nunc composita supersunt, ex quibus Gal. diatrion piperum comendauit, diacalamintho, silphiumque & castoreum mista. Diosc. myrrham cum pipere ex vino, & silphium cum pipere & thure ex vino: hydropoton sudorificum, compositio est: ꝑ. cimeos, myrrhæ, anisofum, croci, hyosciami albi, opij an. 3. ij, chamedrios, apij, petroselini, sem. mandragoræ, thuris an. 3. i, tritis ex melle parantur pastilli, qui dantur fabæ magnitudine ex vino ante accessionem per duas horas. Nicol. Alexandrinus Rubeam febrilem vocatam ad idem commendauit, eodem modo epotam, quæ accipit, myrrhæ, thuris, anisofum, acori, iridis, ameos, baccharum lauri, croci orientalis, sem. petroselini, apij, mandragoræ an. 3. i. ex melle fit elect. quod datur ante accessionem fabæ magnitudine ex vino albo calido. Est & Ranacea Antonij Musæ (auctore Galieno) ad diurnas febres, atque ad omnes, quæ circuitu infestant finiendas. Const. Africanus compositum, rubricam dictum, & rosatum eodem modo fabæ magnitudine ante accessionem exhibendum proposuit, hæc etiam accipit, rosarum rubearum 3. iij sem. melonum, radice liquoritiæ, dragaganthi, succi liquoritiam an. 3. ij, semina citrioli 3. i. croci scrup. is. tritis ex melle pastilli fiunt: Et illa itidem paratur ex opii 3. iij croci, anisofum, cardamomi, styracis, hyosciami albi, baccarum lauri an. 3. i, tritis itidem ex melle elect. paretur, datur vero fabæ magnitudine (vt superius diximus) ante accessionem. Nonnulli ex recentioribus, rubeam trochiscatam dant ex vino fabæ itidem magnitudine, quæ fit, ex abrotani montani, saluix partibus æqualibus & tritis ex vino pastilli parantur. Alii ex pessimum habent medicamentum ad febrem sudore finiendam, quod accipit milii decorticati vnc. ij, bulliat quoad grana aperiantur & collati huius decocti calidi dabant vnc. v. cum vini albi aromatici vnc. ij. ante accessionem per duas horas; Quod efficaciter sudorem mouebat. Quod vero nos longa experientia vtilissimum esse cognouimus est, decoctum, quod paratur ex foliorum calaminthæ montanæ, p. ij, lini Indi raspati, radice harundinis, chinæ minutim incisæ, an. scrup. iij, iridis radice albæ siccæ tenuissimæ tritæ 3. i, omnia macerata per diem in lib. i. i. aque communis, ebulliant ad consumptionem medietatis, & collatum, datur ad vnc. iiii cum vini albi aromatici vnc. ii. addimus theriacam antiquam, atq; mythridatium fabæ magnitudine ex vino albo aromatico calido epotum.

Diosc. Aet.

In 3. de mæ medica.

Gal. in altero de Dynamidjs.

In lib. 7 de cõp. med. loc cap 5.

Arnaldus Villanovanus in li. 4. de morb. cap 19. Aggreg. Lugdunensis.

eporum, quæ est singulare remedium, non ad hæc tantum, at ad omnes intermittentes, si declinante morbo exhibeantur, quo epoto medicamēto cooperiuntur ægroti stragulis calidis & per exterius frictionibus & medicamentis externis calidis sudorifica medicamenti adiuvetur operatio. longe enim efficacius internum medicamentum humorem digerit, si externo etiam medicamento, vel discussorio, vel sudorifico coadiuvetur. Quare & externa digerentia & resoluentia (quorum quædam tanti momenti sunt, ut febrem, absque interni medicamenti auxilio, resoluant) nunc sunt addenda, in quibus dicendis à simplicibus exordium præmissa partis fricandæ & inungendæ notitia, quæ à partis cognitione, in qua est putredinis focus intelligitur, de qua parte admodum à medicis (ut nuper diximus) controuersum est. Dioscorides quandoque extrema inungenda voluit, & aliquando (ubi sudor mouendus sit) vniuersum corpus. Gal. item, ubi sudor mouendus, totum corpus inungendum præcepit, nonnunquam vero tantum hypochondria, vnde ait: ad febres oleum chamæmelinum hypochondrijs esse gratissimum, Quod maxime extollunt Methodici, cum in febre tertiana focus hypochondria. Quod & Galenus voluisse visus est, cum in febre tertiana focus ad partes quæ in hypochondrijs sunt, adhibendos præceperit. Quod item Oribasius, Aëtius, Stephanus Atheniensis, & alij non pauci obseruauerunt. Alij dorsi partes, quippè scapulas, spinamque illini oportere, voluerunt. Hæc vero (de parte inungenda) discrepantia exinde venit, quia varij varias partes esse putarunt, in quibus humor putrescat, ac febris focus consistat. Quidam, Galenum secuti dixerunt musculos esse locum putredinis, quod ipsorum substantia, rara & mollis aptissima sit, ut humidorem sibi recipiat, tum obstruat, ibique humor putrescat, & facile digeratur. Vnde dixerunt in febribus intermittentibus humorem à venis expulsum, in solidiores circumstantes partes, quæ in habitum vniuersi corporis digestæ sunt, recipi, ibique putrescere, vnde isti merito totum corpus fricandum, inungendumque voluerunt, quod aiunt cognosci à lassitudine totius corporis, dolore, grauitate, rigore, vel frigore totum corpus quatiente. Alij tantummodo in musculis dorsi, nempe scapularum, spinæ ac lumborum locum putredinis esse ex eo comprehenderunt, quod ibi rigor, dolor & lassitudo primum innotescat. Accedit etiam, ut hæc veritas firmetur, Hippocratem, quia partes dorsi posteriores, frigidiores sunt anterioribus, ob id rigores, horrores & lassitudines in ijs, quam in anterioribus, primum incipere & manifestius obseruari, dixisse. ex quo etiam fit, ut humores in posterioribus partibus putrescentes (quod hæc, ut dictum est, sint frigidiores) debilius digerantur, & resoluantur, quam qui anteriores musculos calidiores obstruunt, in quibus propter calorem copiosorem, efficaciorumque citius digeruntur. Vnde merito partes eæ posteriores dorsi perfricandæ sunt, inungendæque, ut calor augeatur, & facilius humores ibi putrescentes digerantur: hinc apud veterum medicorum complures vsus inualuit, perfricandi solummodo & inungendi partes dorsi. Alij vero voluerunt partes in quibus est putredo, & putredinis focus, cavitates esse partium hypochondrijs contentarum, quippè aut stomachi, aut mesenterii, aut pancreas, aut lienis, aut iecoris, aut aliarum proximarum partium. hinc focus, & inunctiones præcordijs adhibendas plerique voluerunt. Hæc vero partes hypochondriorum habere focum putredinis, in ipsisque esse obstructions, quod ex tumore, tensione, doloreque partis facile cognoscitur. veluti locum putredinis esse circa diaphragma, vel cor, vel pulmones, vel thoracem, à respiratione difficili, ruffi, & grauitate circa illas partes obseruata, comprehenditur. Quibus perspectis consulumus vniuersum corpus esse perfricandum & inungendum, scilicet partes omnes dorsi, stomachum, lienem, & hypochondria eoque magis, si in ipsis grauitas, tensio, vel tumor, vel dolor obseruetur. Aliqui extremas partes frontem

In 2. yporiston.
cap. 21.

In eodem li. c. 25
In 7. simpl. c. de
calaminta & in
lib. de facili par-
uabil cap. 4.

In lib. 3. simpl.
cap. 10.

In 1. ad Glauc.
cap.

In 5. lib. aphor.
69. & in 2. epid.
3. tex. 24. & in
6. epid. 3. tex. 17.

frontem & tempora illinenda, non quod ibi sit humor putridus, sed ut humor à loco affecto diuertatur, voluerunt. Sed ad simplicia medicamenta, quibus uti debebunt medici, cognoscenda, redeamus. Diosc. costum cōmendauit, & spumā nitri, piperque tritum, semen viticis tritum ex oleo calido toti corpori cum perfricatione illitum. Aëtius ex Nichepso medico chamæmeli florem ex calido oleo illitū à capite ad pedes vsq; ad mouēdum sudorē extulit, quod inunctum ex eo corpus, stragulis calidis coopertum copiosum sudorem fundat. at oleum ex floribus chamæmeli paratum erit ad id aptissimum. Nitrum item atque eius spumam, baccas lauri ex oleo, vel ipsarum oleum, & smyrnij semen, piceumque ex oleo esse efficax ad finiendam cum sudore febrem Gal. expressit. oleum item ex calaminta, ex cyclamino, & cucumere syluestri, ex bryoniæ radice, & alia similia olea, quæ vim habent laxandi digerendique, erunt accommodatissima. Ex compositis autem est, quod accipit oleum ex cinnamomo, chamæmelinum (exempli gratia) ad vnc. ij, nitri 3. ij, aceti albi vnc. i, foliorum lauri minutim incisorum p. ij: bulliant simul quoad absumat acetum, & calido totum corpus illinito, & æger cooperiatur stragulis. commendatur à Galeno vnguentum Gleucinum & a Constantino Africano oleum in quo semen sinapis, piper, ruta, & radix cucumeris syluestris ebullierit.

In 3. de med. fac.
cil. parab. c. 34.

In 7. de compo-
sitione generis

De febris quartana curatione Cap. III.

Febris quartana dicta est à quartanario circuitu, quo inuadit, scilicet quod de quarto in quartum diem accedat: Duplex est, exquisita vna, quæ fit à melancholico humore extra venas putrescente, qui humor est fex sanguinis, quippe eius pars crassa, terrena frigida & sicca. Hanc febrem aliquando fieri ab atra bile Gal. dixit, quod (ut alibi docuit) melancholia putrescens fiat atra bilis. hæc plerumque fit in autumno, in cælo frigido & sicco, in inæquali aeris constitutione vigente, in qua modo calor, modo frigus sentitur. Nam (Hippocrate auctore) ubi eadem die modo calor, modo frigus in aere sit morbos autumnales expectare oportet, eo quia calor in corporibus resoluat tenuiorem humorem, & frigus intus crassum cohibeat. In ætate declinante, ab annis triginta quinque, ad quadragimum quintum plerisque hanc febrem fieri visum est. Quæ febris aliquando simplex, idest vna, aliquando duplex, & aliquando triplex obseruatur, & quandoque etiam alijs febribus, aut intermittentibus, aut continuis complicatur. Altera est non exquisita, notha & spuria dicta, scilicet quæ ab atra bile putrescente itidem extra venas fit, sed hæc atra bilis non est melancholia putrescens, sed ea, quæ à flaua bile vsta fit. Vnde hæc febris non in frigidis, sed in calidioribus corporibus excitatur. ex quo merito aliqui ipsam inter calidos morbos recentuerunt. quod cum calore ingenti & siti ferè inextinguibili appareat. Signa exquisitæ primum perspecta nos habere oportet, quæ partim ab ijs, quæ præter naturam, & partim ab ijs, quæ secundum naturam sunt, desumuntur. Hæc sunt ætas declinans, temperamentum melancholicum, tempus autumnus, regio frigida & sicca, inæqualisque aeris constitutio. Ex ijs vero, quæ præter naturam sunt, primum signum ex rigore desumitur, Hic est non punctorius, sed ostocopedes, idest (ut ait Stephanus Atheniensis) quo ossa lassitudine afficiuntur, quippe ipsis grauatis ac veluti compressis ab huiusce succi grauitate. Galenus non esse valde acutum expressit, eisque hunc rigorem similem fecit, qui maxime frigescent. Hippocrates dixit, in ijs corpus ita frigesceat, ut ægre frigus depelli queat. Aliqui ex recentioribus hunc non rigorem appellant, at magnum tremorem in principio accessionis cum frigore, ut ossa frangi & à carne veluti discindi videantur. Alij non

Gal. in 2. de diff.
feb. cap. 5.

In 1. aph. com. 1.
Hippoc. in lib. de
nat. hominis in
fine.

In 2. de crisib.
cap. 5.
In 2. de diff. feb.
cap. 5.
Arnald. Villanovanus in li. 4.
cap. 27.

Holl. in 2. de
morb. inter.

In lib. 2. de diff.
feb. cap. 5.

Gal. in 1. de cri-
sis cap. 5.

In lib. 2.

In 1. epid. sec. 3.
tex. 2. et in tex 7
In li. de spis. c. 5
In 1. de diff. feb.
cap. 5.

In lib. 5. contro-
uer. medic. c. 25.

Gal. in 1. prorrh.
com. 4. & in 2.
de viis. var. in
acut. com. 30.
In 3. prognos.
com. 39.

non rigorem sed frigus dixerunt, ipsumque multum penetrare, quoad ossa ab ipso pertundi videantur. Hic vero tractu temporis rigori similis euadit, quippe melancholico humore à calore extenuato. Post rigorem calor subsequitur in principio neque multus neque acris, quod tunc succus frigidus sit, & siccus, in vigore multus ac admodum efficax, propter accensi humoris substantiam, terrenam crassam & densam, ut alijs febrium caloribus hic in discutiendo merito plurimum præferatur, unde mirum non est, si multos affectus, alioquin grauissimos & sanatu difficilimos quartana febre sanari, à multis proditum sit. Gal. hunc calorem non esse in principio multum sed paulatim augeri, veluti ignis in rebus frigidis & siccis accenditur. In his pulsus in principio accessionis est rarus, tardus ac veluti interceptus, siue etiam (uti Serapioni visum est) intercisus, in statu celer, frequens, habens inæqualitatem, quæ est omnium febrium propria, manifestiorem; ideo Galenus ait communem omnium febrium inæqualitatem in vna applicatione attrahere in quartana esse euentissimam, scilicet quod pulsus dilatatio, dyastolis dicta, tardior, quam in febribus tertianis fiat. In declinatione vero, si febris adhuc vestigium permaneat, pulsus est tardior, coque potissimum, qui est secundum naturam. Urina in principio albæ, tenues, aquosæ, sunt in augmento crassiores, & coloratiores, atque in statu crassæ & quandoque nigre, scilicet quibus critice aliquando quartanæ finiuntur. Hæc febris inter alias ad periclitam peruenit infebrecitationem, quæ non raro cum sudore fit, ac non in principio, sed postea, humore crasso à calore extenuato, in multis in statu & in declinatione erumpunt sudores copiosissimi, quia humor à calore efficaci maxime extenuatur, atque digeritur. At in nothiis quartanis, quæ fiunt à calidis humoribus vltis, ac putrefactis longe copiosiores sudores, quam in exquisitis, erumpere solent. In hoc affectu quandoque lien, & quandoque hepar in tumorem attolluntur, quo hæc duo membra male affecta ad quartanarum generationem maxime concurrere merito medici complures voluerunt. Alij his addunt corporis scum vel nigrum colorem, qui melancholicorum proprius videtur. Ex accessione vero quartana cognoscitur quod de quarto in quartum moueatur, at hæc (Petrus) auctore aliquando producit ultra quartum diem. Hippocrates senex diuinus, quartanos, quintanos, septimanos atque nonanos dari in his circuitibus didicit. Auicenna quintanos, septimanos. Gal. hos dari quidem non negauit, aliorum sententia, ac nullos horum circuituum vidisse sapius affirmavit, nullos inquam certos, ordinem seruantes, sed confusos, atque inordinatos, ab errore potius externo, quam à firma certaue causa procedentes. Ex recentioribus Franc. Valefius vir eruditus, hos dari circuitus contra Galenum, cum Auicenna statuit, quos omnes ad quartanarum genus refert, à melancholicoque humore pauco quidem, ac substantia crassissimo, fieri credidit, qui quod tardissime præ crassitie discutiatur, ideo hæc periodos ipsum producere. Quos sane circuitus siue accessiones distinctas ac certas dari, complures recentiorum, ac vel etiam nos cognouimus. colligimus hos aut dari specie distinctos (quod Hippoc. scriptum reliquit, & Galenus negauit) vel non specie distinctos, ut Arabes voluerunt, qui ad quartanarum genus hos retulerunt. ex quibus dicamus quartanam febrem exquisitam (de qua nunc agimus) moueri de quarto in quartum alii vero circuitus, quippe quintani, septimani, octomani, & nonani spuria siue nothæ quartanæ erunt. At age de spuria quoque loquamur. Hanc (dictum est) febrem esse ab atra bile aliorum humorum coniunctione facta, extra venas putrescente. Atram bilem fieri aliquando à flaua bile & à melancholico succo, Galenus docuit. à qua putrescente quartanam etiam febrem concitari expressum quoque reliquit. Arabes voluerunt crassam quoque pituitam vltam ad atram accedere, ac idcirco quartanam febrem facere. Signa quartanæ nothæ, ab ijs, quæ secundum

secundum naturam sunt, deprompta existunt, ætas vîgens, regio calida & sicca, ætas sicca & admodum calida, corporaque succis biliotis scatentia. & ab ijs, quæ præter naturam sunt, primum est rigor (quo hæc febris inuadit) acutus similis tertianis, absque vîlo sensu frigoris, neque ossium apparet dolorifica illa lassitudo, quæ exquisitæ quartanæ est propria. Calor acrior est, ac maior in principio obseruatur, accessio breuior, quæ plerunque in sudorem terminatur: pulsus in principio accessionis, & in declinatione non ita tardus & rarus. Vrinæ in principio coloratiores apparent, breuiori tempore hæc febris finitur, sitiunt ægrotantes maxime in hac febre veluti in exquisita, vel nihil vel parum. Quartana febris oîum est longissima facilima & securissima. Hac ipsa laborâtes magno morbo non capi, & cōplures morbos sanatu difficiles resolui compertum est. Gal. ait: longa quartanam morbum comitalem discutere, sed lienosis esse valde incommo- dam, compluresque ipsorum exinde factos hydropicos mortuos se vidisse tradidit. Senibus, & præsertim debilibus lethalem esse, neminem medicorum latet, quia humor melancholicus, atraque bilis omnium humorum sit pessimus, & ad coquendum tardissimus, ac difficillimus, qui propter temperamentum siccum & frigidum & substantiam crassam & densam, efficaci calore eget vt extenuetur, & coquatur; in senibus vero cum concoctrix facultas & expultrix langueat, ideo a quartana & ab alijs omnibus affectibus ab eodem succo obortis, senes maxime patiuntur, senes vero cum lienis tumore, ipsa breui tempore ad exitum prouehit. His præmissis ad curationem declinemus, quæ profecto efficacioribus laxantibus perficitur, quippe quod affectus adstrictus ab humore crasso & terreno fouetur, ideo fortioribus opus esse medicamentis etiam Dogmatici sentiunt, scilicet quæ incendant, extenuent ac concoquant. At Methodici vere laxantibus hunc humorem superari posse existimant, scilicet calidis & humidis, quod humectatione hic humor atque calore egeat, vt coquatur. Quod dogma complures etiam rationalium medicorum secuti, ad hunc coquendum & purandum humorem, primum humectantibus opus esse cognouerunt (quando ipsius substantia humectata facile extenuetur à calore digeraturque) Quod vero pertinet ad victus rationem, aer primum sit candidus clarus: ægrotus hilaris sit, & abstineat ab ijs animi passionibus, quæ cum mæore, timore, ac tristitia sunt, quod hæc adstrictum affectu foueant, neque humorem, fuliginesque exhalare per cutis meatus permittant. Experientia tamen obseruatum est, in robustis corporibus timorem vehementem repentine obortum multos plurimum iuuissè, & nonnullos omnino sanauissè. Nos quoque meminimus, cum hac febre aliquando vexaremur, repentino nobis oborto ex inimicis inuadentibus nos timore, maiori ex parte eam febrem fuisse imminutam. sed quomodo istuc? cum timores adstrictum affectum augeant, meatus claudendo & calorem intus repellendo, calor enim cum sanguine ad viscera recurrit, extimeque partes ob id exangues, & adstrictæ remanent. At quemadmodum alias fuit demonstratum, aquam frigidam large affusam reuocatione, vt expressit Hippocrates, caloris plurimum calefacere, ita de timore vehementi dicendum, quippe ab ipso calorem intus pelli, quem vnicum atque auctum, postea ad partes, in quibus humor putridus melancholicus est, erumpentem, ipsum efficaciter extenuare, cōcoquere, & digerere, quod non nisi in corporibus robustis fieri potest, etenim in debilibus calor, nedum augetur, at quinimo extinguitur. Cibus erit mediocris, optimi succi, facilis alterationis, bis in die quietis cibum capiant, & semel in die accessionis, aut ante accessionem per quatuor horas, aut in febris declinatione. carnes opportuna in cibis erunt pullorum gallinaceorum paruorum, vel phasianorum, vel turdorum, vel perdicum, vel aliarum auium montanarum. Item carnes vitulinae hædinæque, atque oua gallinarum recentia forbilia erunt vilia. Ab aqua in potu abstinendum, vinum erit album, tenue,

A a medium

Hipp. in 6. epid.

sect. 3. tex. 4.

Hipp. in 6. epid.

sect. 6. tex. 7.

In 1. epid. sec. 3. com. 4.

Iam ab alijs
multis præcipit

C. 1. 1. 1. 1.

medium inter ogligophoram, & vinosum generosumue. Incipienda curatio est, à medicamentis lenitorijs, vt alius laxetur, excrementisque exoneretur. In exquisita quartana dabimus cassiam cum diacatholicon, vel syrupum de polipodio laxatiuum ad vnc. iij, cum aliquo conuenienti decocto, vel dabimus, diacatholiconis vnc. ii. dissoluti ex decocto. florum & fruct. cord. in spuria vero & notha, que à calidioribus humoribus foueatur, exhibent in portione sy. ros. solutiui vel mannae electæ vnc. iij, cum sero lactis caprilli, vel floris cassiæ nouiter extractæ 3. x. confect. hamec. 3. ij, fiant boli. Methodicis verò quibusdam visum est, ab his potius abstinendum, & quod stomachum auertant, & humores melancholici laxatorij educi nequeant. Accedit, quod cathartici eo humore sæpe commoto febris augeatur, ac non raro ex simplici duplex, atque ex duplici continua euadat. Sed tamen hæc incommoda sequerentur vsus catharticorum, non autem lenientium vocatorum, quare & ijs vtendum atque clysteribus mollibus, quibus aluo laxata, sanguis in corporibus aptis vacuandus erit. Galenus ait, secta vena sinistri cubiti, aut interna, aut media, mittendum esse sanguinem, modo sit niger & crassus, qui si flauus & tenuis fuerit, ab eius euacuatione abstinendum erit. Notæ sunt ad mittendum sanguinem, si corpus sanguine abundauerit, si facile sit, venasque turgidas habeat, non ex flatu, sed ex sanguine; si suppressi fuerint menses, ex vena Poplitis vel ex saphena pedis euacuabitur; eodem modo si hemorrhoides interceptæ itidem fuerint, præstabit sanguisugis adhibitis sanguinem educere. Non expectandum febris augmentum, pro mittendo sanguine, vt alij faciunt, sed statim ipso principio (auctore Galeno) mittendus erit. non in die paroxysmi, & non in ipsius principio, at in præcedenti die illud est faciendum. Nonnulli postea saluatellam vocatam venam etiam aperiunt, repetuntq; sanguinis euacuationem. Gal. tamen splenicæ illius venæ & paruorum istiusmodi venarum sectionem sæpe irridet. laxato quoque corpore ex sanguinis euacuatione, concoctorijs medicamentis prorsus incumbendum. Quidam illud præstare nituntur prius medicamentis humorem siccum, crassum, & frigidum humectantibus, temperateque calefactorijs, humectatione enim aptior redditur is succus, vt à calore coquatur, à temperato vero calore paulatim coquitur, cum valenter calidis humidum hauriatur, terrestriorque ac minus naturæ, medicamentisque cedens reddatur humor, posteaque humectato humore laudant incidentium, subtiliantiumue atque aperientium vsus. Itaque primum ex syrups commendatur qui recipit syrupi de pomis, de succo boraginis, de lupulis, an. vnc. 5. cum decocto boraginis, buglossi, lupulorum, altheæ, passullarum enucleatarum. vnc. iij. à quibus per dies quinque vel plures assumptis, poterimus alium exhibere, qui recipit, vel oxymellis simpl. vnc. 5. syrupi de epythymo vnc. 5. cum decocto fumi terræ, melilæ, chamedrios, pulegij, epythymi, passullarum sine nucleis vnc. iij. Videtur loco syruporum vtilior vsus iusculi pulli gallinacei parui, in quo ebullierit borago, lupulus, fucus, asplenium, radix petroselinæ, liquiritia dulcis, pulegium, & passullæ enucleatæ, ad semilibram calidi epoti singulo mane in aurora. Corpore fluído reddito vel his vel alijs, purgationi incumbendum erit, vomitorijs, si ad stomachum humores inclinauerint, vel per aluum, per quem locum promptius hic humor (auctore Hippocrate) expurgatur. De vomitu complures à cena faciendum voluerunt, quod humor mistus cibo facilius euacuetur, vel quod ex cibo humor humidior & fluxilior reddatur. Galen. vomitionem moliri oportere in die præcedente accessionem consulit. Ita enim habet de hoc: Die eodem, quæ accessionem præcedit, vomitum à cena commouei, postridie mane cremorem ab sinthij exhibui, tum duabus horis ante accessionem theriacam, idque tam feliciter, vt non amplius accessio fedierit. Non vacuatur tamen vomitu materia febris coniuncta, sed antecedens, nisi in stomacho sit sedes humoris putridi: vomitus verò solet

*In lib. de curat.
per sang. missio.*

In 4. aphorif. 9.

solet esse magni adiuventi, quod, ut plurimum, copia succi melancholici in stomacho ad concitandam appetentiam contineatur. At si vomitu fuerit opus, ventris utendum erit, quæ humorem melancholicum laxando educant. At consultius laxatorijs catharticijs prætermisiss, complures etiam Dogmaticorum coctione sola agendum esse putant. quod si purgandum sit, coctionem omnino esse expectandam, quæ observata, ad id præstandum hoc utile erit apozema, quod accipit florum borag, buglossæ, violarum, fumi terræ an. p. ij, foliorum senæ, epithymi, polipodii, an. 3. ij, radices ellebori nigri 3. i. cinnamoni minutim incisi, Caryophyllorum, carpobalsami an. scrup. i. ligni dulcis derafi & contusi, passullarum sine nucleis an. vnc. 5. hæc in lib. i. aquæ ebulliant, quoad tertia pars absumatur, & colatum calidum ad vnc. v. propinatur, in ipso dissoluta vncia mannæ calabræ vel hæc omnia per noctem in vino albo calido infusa maneant, & percolatum infusum calidum exhibeatur cum prædicta manna ad 3. x. aut dabuntur boli parati ex confect. hamec 3. iij, diacatholiconij 3. vi, vel ex syrapi ros. solutiui. vnc. iij, electuarij len. 3. vi. confect. hamec 3. ij, cum decocto flor. & fruct. cord. facta portione, aut pilularum cochiarum elleboro nigro præparatarum scrup. iij, mastichinarum scrup. 15. fiant pilulæ. In quartana notha medicamenta debent esse eiusmodi facultatis, ut vstos humores contemperent, & euacuent. Vnde decocta & infusa parabuntur, ex boragine, buglosso, funco, endiuia, hordeo, passullis, melissa. ex purgantibus, conueniet sena, epithymus, fumus terræ, elleborus niger, quibus per noctem in sero lactis maceratis, expressum cum cassia, vel mânia vel syr. rosato solutiui, vel cum sero lactis, calidum dabitur; cum autem hæc febris à corporis vacuatione, purgationeque antegressa concoctione seu præparatione, non fuerit sublata, consulimus, ut per aliquid temporis à purgantibus atque ab alijs omnibus medicamentis, quæ plurimum agitant, quartanarij abstineant, solumque coctioni humoris incumbant, ita ut mane ius galli iuuenis assumentes alteratum althea, boragine, buglosso, melissa, funco, fumaria, petroselinii radice, agrimonio, passullis, glycyrrhyza, bibant calidum; foueant os ventriculi, lienem, & totum sinistram hypochondrii aliquo ex oleis concoctionem iuuantibus, digerentibusque, cuiusmodi est, oleum chamæmelinum, amygdalinum, viles etiani erunt lenes ad totum corpus frictiones cum inunctione calida olei chamæmelini aut amygdalini dulcis. Quibus addenda optima victus ratio, & in cibo & in potu, tum in aere, tum in excrementis reiiciendis per omnes meatus corporis, sed præsertim per aluum, quam laxam esse perpetuo oportebit, quæ si sponte fluens sit, clysteribus mollioribus inditis, vel passullis in vino dulci vel in iure pulli decoctis cum saccharo sapius assumptis, vel ex decocto mercurialis, altheæ, beræ, blyti, maluarum ac similium herbarum laxantium parato, atque calido epoto, atque in hac simili curatione perseverandum erit, quoad symptomata & febris aliquatenus declinare ceperint, quo tempore ad vsum illorum medicamentorum cum interiorum tum exteriorum, quæ humorem digerunt totiusque corporis meatus laxant febremque omnino finiunt, declinandum erit. Ex internis, quæ per duas horas ante accessionem calida exhibentur cum totius corporis leni frictione & calida inunctione posterius dicenda, Dioscoridi radices plantaginis ex vino potas, pro discussorio laudauit & heliotropiū maius scorpiurum dictum. Alexander Trallianus credidit plurimum quartanarios iuuare posse cimices lectulorum quatuor vel septem fabarum cavitatibus clausos deuoratos. Non minus & Glycyrrizam ad 3. ij tritam ex aquæ hæmina ante accessionem epotam, semen item hyperici ex vino, libanotidisque radicem ex dimidia vini hæmina, item bituminis 3. i. castorei scrup. 5. per duas horas ante accessionem. Galenus à vomitu post cenam facto, crastino mane exhibito cremore absinthij, & ante accessionem theriaca ex vino, multos sanatos fuisse, scribit.

Aa 2 Piper

An 2. yporist. cap. 22.

In 1. ad Glanc.

In 3. de alim fa-
culi.

In 1. ad Glau-
In li de Ther ad
Piso. cap. 28.

Piper item tritum quotidie mane bibendum dabit, atque etiam elleborum album scilicet in casu difficilimo, sed ab hoc ne dixerim medicamento, sed lethali vene-
no abstinendum esse duxerim, cum ipsius vsus hac ætate sit admodum suspectus. la-
serpitium siue succum Cyrenaicum (quem assam fetidam officinarum esse alias
demonstrauimus) ex vino ante accessionem plurimum cõtulit, dabitur vero fabæ
magnitudine. Arabes serum quoque lactis extollunt, quod fortasse, vt Galen-
docet, nõ sit expers facultatis calidæ, sed ipsius vsus cõuenit quartanis a calidiori-
bus succis obortis. Const. Africanus in exquisita & in longissima laudauit petro-
leum, Ysaac radicem Caryophyllaræ ad 3. i. ex aqua vitæ, gentianæ item radi-
cis 3. i. ex vino. Archigenes bitumen Iudaicum, trifolium bituminosum, hederæ
folia, castoreum atque scorpiurum. Villanouanus pro secreto habuit exhibere
taxibarbasti radicem ex vino per duas horas ante accessionem, & non minus
etiam os de corde cerui ad drachmam, itidẽ ex vino alterato dictamno Cretico
salua, chamedri atque chamæpithi, & myrrham ex succo absinthij ad scrup. ij.
castorei etiam, & bituminis, an. scrup. ij, ex vino. Hollerius ranarum viridium
decoctum ante accessionem commendauit, quod tamen vi potius venefica, quam
vi aliqua occulta (vt recte Iacotius in scolijs sentijt) illud præstare credidimus.
ligni Indii decoctum dilutum, atque eiusdem ligni tenuissime triti 3. i. ex vino aro-
matico calido non parum multis profuisse deprehensum est. Nonnulli assarum de-
coctum ex melle, sed in morbo crudo geminabit febrem, veluti in declinante, quod
albi ellebori modo purget per vomitum, eam omnino tollet: decoctum item
cardui benedicti, ac vel etiam ellebori nigri, summe iuuat. Dantur quoque stu-
bij præparati, gr. iij, vel vinum maluatium in quo per diem infusum manserit.
Nos vero addimus oleum de chalcantro album & clarum ad scrup. i. ex vini albi
aromatici vnc. iij. Galenus ex compositis diatrion pipereon, diaspoliticon, Ther-
riacam magnam, Andromachi apparentibus signis cõtionis cõmendauit. Est &
medicamentum Tralliani, quod accipit opoponacis, opij, castorei, seminum ale-
terci an. scrup. iij, tritis ex melle fiunt pastilli, datur ad scrup. ij. ex vino aroma-
tico ante accessionem. est & Aetij medicamentum, quo utebatur eodem modo
quod accipit piperis longi, myrrhæ, opij, castorei an. 3. i. tritis ex melle parant
pastilli, dosis est scrup. 5. ante accessionem ex hydromelle, & Haly Abbas habuit
hoc familiare medicamentum quod accipit piperis albi, nigri, longi, an. 3. x.
xilobalsami 3. x, Zinziberis, apij, cassiæ, lignæ, assani, rasseni an. 3. i. ex melle pa-
rantur pastilli, datur 3. i. ex vino calido supradicto modo. Ysaac dabit Theriacæ
antiquæ 3. i. ex vino alterato menta, & mentastro, aut Theriacæ 3. ij. cum aqua
chamedrios vnc. iij, per horam ante accessionem. Aliqui mithridatium, aureanti-
que Alexandrinam ex vino eodem modo atque eadem dosi exhibendam lauda-
runt. est & Hollerij medicamentum, quod paratur ex cinnamomi 3. ij, piperis 3. ij,
croci, myrrhæ, styracis, sagapeni, 3. 5. benzoini 3. iij, rad. gentianæ 3. ij, tritis ex
melle depurato fit electuarium, cuius dosis est ad scrup. ii. ex aqua stillatitia feni-
culi & apij calida. Nonnulli exhibent Theriacæ antiquæ 3. i. 5. succi menta de-
purati 3. i. vini albi odorati vnc. 15. & datur calidum. Atque hæc sunt interna
medicamenta quæ exhiberi debent ante accessionem per duas horas, quibus exter-
na quoque sunt addenda, nam deuoratis ijs medicamentis, externis quoque est
opus, vt ipsorum digerens & discussoria facultas augeatur, debent quidem cor-
pora ægrotantium calido vnguento vel oleo inungi, præmissis lenibus frictioni-
bus, vt de eorundem medicamentorum vsu ad tertianas nothas quoq; diximus.
Itaque easdem illas inunctiones quartanarijs quoque conducere dicimus quas
ad tertianas meminimus. Ex antiquis Const. Africanus ad sudorem mouendum
utebatur vnguento marciato dicto, quandoque calido petroleo inungendum cor-
pus, priuatimq; dorsi & spinæ partes inungendas voluit; balnea quoq; sulphurea
calida

calida commendantur, si ante accessionem immergantur ægroti & maneant, quoad febris accesserit atque declinarit. Recentiores laudarunt scapulas, brachia, spinamque ante accessionem inungi oportere oleo calido, vel chamæmelino, vel de cucumeri agresti, vel ex eo, quod paratur ex succi rutæ vnc. ij. olei scorpionum vnc. iij, vini aromatici vnc. iij, ferueant, quoad succus absumatur, & calido inungantur partes prædictæ: aliud ad idem. R. cinnamomi, piperis an. scrup. ij, trita hæc in pergito spinæ præunctæ oleo chamæmelino. Alij ægrotos iubent ante accessionem ingredi balneum ex aqua dulci, in qua serpillus, pulegium, salvia, rosmarinum, chamæmelum, & similes aliæ herbæ digerentes ebullierint. Vnguentum item Nestoris Anglici laudatur, quo per horam ante febrem apud ignem vngatur spina dorsus vsque ad ancham, crura, splen, vmbilicus, venter, renes, volæ, manus & pedis sinistri, à qua inunctione, æger statim collocatur in lectulo & stragulis cooperitur, & ei datur aliquod ex antidotis prædictis discussorijs. Paratur vero illud vnguentum ex succi abrotani, rutæ, arthemisiæ an. 3. i. olei communis 3. ij, olei laurini vnc. i, bulliant quoad succus absumatur. Aliud. R. succi chamedrios maioris, matricariæ, axungia porcina, olei communis an. vnc. 15. bulliant ad succorum consumptionem, & postea adde thuris pul. mastiches an. 3. i, ceræ salis communis an. vnc. iij. fiat vnguentum. Aliud Arnaldi Villanouani. Recipe castorei, Theriacæ antiquæ. an. scrup. iij, myrrhæ, olei laurini, an. scrup. iij, moschi, ambasis an. scrup. i, mellis despumati lib. 5. misce, fiat vnguentum, quo illinantur tempora frontis, pulsus, nates, stomachus, vola manus sinistræ, & planta pedis sinistri. additur cuiusdam Galli medici secretum. R. farinæ triticeæ cribratæ, thuris masculi an. vnc. ij, cum succo menthæ, fiat emplastrum, quod exceptum linea petiæ calidum ante accessionem adhibeatur spinæ dorsus vsq; ad caudam, & quoad sponte decidat, teneatur. Quod singulare esse ad longam quartanam compertum est. Ægyptij pro secreto habent, clysterem paratum ex decocti maioranæ, lib. 1. olei laurini vnc. iij simul mistis. quo sanè & in alijs multis & in me ipso olim quartana vexato summa cum vtilitate vsus sum. & nonnullos tribus solummodo hisce clysteribus vsos sanatos fuisse vidimus.

De quotidiana febris curatione.

Cap. IV.

Quotidianam & amphimerinam Medici vocant, quæ à pituita extra uenas putrescente fit, & continuam, eadem intra uenas putrescente. Pituita vero multiplex est, vna acida, ab acido sapore dicta, altera vitrea à vitreo calore atque crassitie itidem vocata, vnde acida est crassior, hæc fit à forti frigidityte, ex quo omnium pituitarum est frigidissima, qua homines famelici redduntur: tertia est falsa, quam Arabes a mixta bile pituita falsam reddi dixerunt, nos vero & à putredine & à calore plurimo humidum absumente fieri credimus. Demum omnium micissima est dulcis, utpotè quæ & à minori frigidityte fit, & ad nutritionem est utilis, quippè quæ maiori à caloris alteratione in sanguinem mutatur, atque ab hac se exquisita quotidiana, & ab alijs notha & spuria vocata. Signa quotidiana sunt, in primis, quod inuadit absque rigore, sed potius cum extremarum partium refrigeratione, quandoque cum horrore; at spuria quidem, minimeque exquisita (scilicet quæ aut ab ipsa putrefactione pituita aciori reddita, fit, vel à falsa, aut ab acida) calor ægre inualefcit, ac diuturnior est, vnde tardum habet augmentum, quia calor perinde atque ignis in lignis viridibus tarde accenditur, ita & calor febrilis in pituita qualitas caloris est, ut sit similis ei, qui fumoso igni comparatur, ita ut calor sit fumosus vapor multo ac inequali permistus. Vnde Hippocrit ait manui mitem esse, acrimoniam scilicet humiditate obrundente, & paulatim

Gal. in 2. de diff. feb. cap. 2.

In 6. epidem. 1. tex. 29.

In 1. ad Glau.
cap. 7.

Gal. 2. epidem. 1.
com. 7.
in lib. de urin.
cap. 5.
Gal. ad Glau.
cap. 7.

In 5. lib. simpl.

paulatim augescens: Gal. dixit, calorem quidem esse cum quadam acrimonia, quæ non statim manu admota, sed postea innotescit. Paulus vero ait, hunc calorem neq; egros adurere, neque cogere ipsos, vt plurimum & crebro respirent, neque sitim intensam illis concitat; at quinimo ipsa levis est, pituita humiditate ventriculæ humectante, & humoris caliditate ab humiditate multa obruta. Vnde Galenus merito dixit hos & linguam, & totum corpus valde humidum habere. Vomitu & per aluum excernuntur pituitosa & cruda, aquosaque. Urinæ in principio tenues, albæ, aut crassæ, turbidæ; si pituita per urinam excernatur, vnde crassæ morbo plerunque concocto mingi solent. at in morbo quoque crudo non raro (vt Gal. docet) multitudine crudorū humorum in toto corpore abundantū, crassæ & turbidæ excerni solent. Pulsus sunt quartanarum multo minores quā sint pulsus tertianarū. Accessio plerunque noctu & vesperi quā interdiu (quod eo tempore pituitosus humor familiarius moueatur) inuadit. Vnde Hippoc. per nocturnas amphimerinas intelligit. Durat accessio plerunque ad horas decem & octo, & plures etiam, a qua non omnino a febre immunes ægroti remanent, cum quædam vestigia febris in ipsis relinquatur, vnde quotidianam vere intermittentem non dari, multis est persuasum. Galenus non nisi paucas ad integritatem venire affirmavit. Paulus omnino negat aliquam venire ad integritatem. Quod rectius Auicenna inquit quotidianæ dimissionem non esse mundam. In sudorem non erumpunt primis accessionibus, sed postea humoris crassitie a calore extenuata, & qui sunt in principio a pituitæ copia symptomaticæ apparent. Siquidem solummodo progressu temporis, deterfa pituita, sublatiisque obstructionibus, sudores a natura excerni solent. corpus eorum (Paulo auctore) albicat. grauitatem capitis & totius corporis Arabes addunt, soporem in principio accessionis, frigoris inæqualitatem partium extremarum, animi deliquium, syncopen stomachicam, vitio quippè ventriculi refrigerati a crudis succis obortant. Raro enim hæc febres absque oris ventriculi læsione fieri, etiam Galen. expressit. Fiunt vero hæc febres familiaris in pueris, in infantibus, in senibus, vitamque ociosam agentibus, crapulis, ebrietatibus, vsuique dulcium balneorum indulgentibus, in hyeme, in cælo constitutioneque frigida & humida. Hæc signa exquisitæ amphimerinæ sunt: nocte vero febris ex acida pituita oborta, præter dicta hæc sunt: perpetuo cum calore rigent, nam hic humor (quod raro totus putrescat) epialam facit, urinæ tenues sunt albæque; in stomacho acidæ pituitæ sensus dolor, & acidæ eructiones sunt, horrere magis quā frigere febricitantes obseruantur, & in ea febre quæ a vitrea pituita fit, sensus in ea parte, cui adhærescit, intensæ frigiditatis sentitur. & quæ a falsa fit, habet urinas tenues, & rufas, in ore est salicedo, adest pruritus in corpore, sitis intensa est, sudor in declinatione accessionis (quæ potius cum horrore, quā cum frigore inuadit) apparet. Quotidiana longissima est, ac non sine periculo, eoque periculosior, si vna cum syncope fiat. In hac febre illud quod præcipue indicat, est morbus adstrictus, in meatibus corporis obstructis, clausisque constitutus, qui pituitoso humore fouetur; Vnde merito non leuiter laxandum erit. Cæterum si hic humor non valde multus sit, coctioni, & digestionem erit incumbendum, cum (vt & Galenus animaduertit) pituita dulcis non egeat purgatione, at concoctione, vt in sanguinem vertatur, ac ubi ipsius multitudo redundarit, profecto minuenda erit, vt residuum naturæ valentius concoquere queat, ideo inter laxantia præsidia illud primo occurrere faciendum, quippè vt aut vomitu, aut clysteribus laxatorijs, vel cum irritantibus expultricem paratis pituita expurgetur, illaque potissimum subducatur, quæ nondum computruit, in primis quidem vijs inherescens, vomitu purgabit hydromel copiosius & calidum, cum oxymellite epotum, aut aqua communis decocta cum seminibus feniculorum, & liquiritiæ, aut hydromel dilutum cum cortice bus raphani

raphani ebullitum, ad lib. iij cum vncijs duabus vel tribus oxymelliti, vel syrapi acetosi, & hoc ante cenam vel ante prandium fiet. Ni ad vomitum fuerit pro pensio, parentur clysteres ex decocto mercurialis, maluarum, altheæ, chamæmilæ, centaury minoris sem. fenugræci, lini, feniculorum, fursurum, & similium, atque ex oleo dulci vel chamæmelino, vel cum modico rutacei vel laurini, addito melle rosaceo simplici, atque sale, vel addatur, elect. de hyera vnc. iij, diapheniconis vnc. ij, aut aliquod aliud simile medicamentum phlegmagogum. Huiusmodi clysteres facilius vtiliusque pituitam per aluum purgabunt. Quibus aluum meatibus ad stomachum intestinaque pertingentibus laxatis, ad alterum ex laxatorijs præfidijs declinandum, quippe ad sanguinis euacuationem, quem audacter euacuabimus, si præsertim vehemens fuerit febris, vrinaque coloratio res fuerint, atque omnium maxime corpore plethorico existente. Arabes in calida celi constitutione dextri cubiti scindunt iecorariam, ac in frigida, sinistri, modicum educentes. tertio coquendus est humor, eius crassities extenuanda, & detergendus, meatusque omnes ab infarctu, & clausu liberandi, quod vt assequamur, singulo mane dabitur pulvis chamedrios ex vino albo ad 3. ij, vel gentianæ radicis drachma, aut piper tritum ad semidrachmam ex aqua stillatitia betonicæ, vel foliorum betonicæ pulvis ad 3. ij ex vino, uel ex aqua; agrimonij itidem aut eupatorij, aut origani, aut calaminthæ, aut thymi aut mentæ, aut absinthij, aut radicis acori, vel iridis optimæ siccæ ex vino dabitur ad 3. i, sed longe præstabit, vt ex aliquibus istorum in aqua paratur decoctum, & exhibeatur cum melle, vel saccharo, aut cum oxymellite, melle rosaceo, vel syrupo de menta, vel de corticibus citri, vel de duabus radicibus; ex omnibus vero præstabit, quod accipit oxymellis simpl. mellis ros. simpl. syrapi de menta an. vnc. 5. decocti (ex chamedrios betonicæ, apij, borag. succ. an. p. i, radicis iridis siccæ, gentianæ an. scrup. 15.) in libra aquæ parati vnc. iij. posteaquam hisce concoctorijs per multos dies ægrotus fuerit vsus, & vrinae crassiores appareant, poterimus adhuc magis laxare ventrem clystere phlegmagogo cum laxatorijs parato, à pharmacisque abstinendum, quando maxime illis suspecta esse debeant, propter stomachum, qui in hisce febribus perpetuo in omnibus labefactatus est. Dogmatici vero clementer purgantia in his exhibent, e quibus optimum erit, quod accipit agarici th. 3. 15. zinzib. scrup. 5. per noctem in vino albo aromatico infusi, expressioni addēdo diacartami vel diapheniconis an. 3. 15. syrapi de absinthio vel de menta vnc. 5. Auienna dabat, quod accipit mastiches, zinzib. turpeti an. 3. i, sacchari albi 3. i, ex vino. vel pilularum elephanginarum, de hyera simplici, assaiet an. scrup. ij, vel pilularum de hyera Gal. scrup. iij, agarici th. 3. i, mastiches, rosarum, cinnamomi, galangæ an. gr. vi, saccharique in vino albo dissoluti, 3. i, quibus fit medicamentum pro duabus vicibus. Rhafis dabat turpeti optimi pul. 3. x, mastiches, zinziberis an. 3. i, sacchari omnium pondus. dosi à scrup. iij ad 3. ii. Alij ex recentioribus dant, agarici, turbit. an. scrup. i. spicæ, salis gemmæ an. gr. v. zinzib. scrup. 5. infundunt in vino & expresso addunt mānæ calabræ vnc. i. Alii exhibent diarurbit ad scrup. iij vel ad 3. ii. Nonnulli commendant claretum Arnaldi, traqueamque, & alij syrupum, cuius semunciam vtiliter exhibent ante accessionem per duas horas, quod parant accipiendo polypodij quercini 3. iij, f. feniculi 3. 15. turbit, esulæ, agarici an. 3. iij, pruna damascena num. xxv, macerata in lib. aquæ ebulliunt, quoad tertia pars absumatur, & cum saccharo fit syrupus. laxato bis vel pluries corpore laxatorijs medicamentis, ad alia laxantia declinandum, quæ humorem facientem paroxysmum digerunt, & resoluunt, quæ (vt de quartanis dictum est) dantur ante accessionem per duas horas, adiunctis frictionibus lenibus ad vniuersum corpus, eo modo quo in quartanis faciendum diximus, scilicet cum calidis inunctionibus, quæ omnia ad quartanam à nobis præscripta, quotidianæ

In lib. 8. simpl.

In lib. 12. cap. 7.
In lib. 4. c. 88.

In lib. 5. de mat.
med.

tidianæ etiam conuenient. Itaque ex medicamentis internis primum commendatur, chamedrios folia trita ex vino albo ad 3.ii. epota ante accessiōem per duas horas, de quo medicamento merito Galen. dixit: calidum esse & siccum, tenuis essentiæ, quo lien colliquat, vrinam & menses mouet, crassitudinemque humorum incidit. Trallianus ait: dato chamedrios decoctum iis, quos quotidiana febris, circuitusque affligit, vrinæ multas ducit & leuat. Ætius chamedrios decoctum assidue epotum quotidianam soluere tradidit. Ius quoque galli veteris cum sale vel salsamento in ventrem eius loco interaneorum reposito erit vtilissimum. De quo Serenus ait: Febribus aut longis galli noua iura vetusti subueniunt. Dioscorides commendauit vinum melitites, de quo ait: Melitites datur in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt, namque aluum emollit, vrinam cit, stomachum expurgat. Datur non minori cum vtilitate, agarici th. 3. i. ex vino, vel piper tritum, gentianæ radix, aristolochia ad 3. i. ex melicrato, iris itidem ex vino ad 3. ii. & castoreum ad scrup. ii. ex decocto calaminthæ; assa item fetida ad scrup. 15. Aliqui sinapi triti 3. ii. ex hydromelite dabant. ex compositis Trallianus dabat fabæ magnitudine perunctis ex oleo & pipere medicamentum, quod accipit, styracis, gummi, iridis, myrrhæ an. 3. iiii. opoponacis, piperis, assæ fetidæ, opii, an. 3. i. ex melle fiant pastilli: Apud Ætium atque alios complura composita leguntur ad quotidianam resoluendam. Vtilissime datur Theriacæ, Mithridatii, an. scrup. ii. ex vino. item confectio diatrion pipereon, vel diacalam intham aut Auream Alexandrinam ex vino albo ad 3. i. Alii dant ante accessiōem vnc. iii. medicamenti, quod paratur ex zinzib. origani, ameos, an. 3. iii. coriani præparati 3. iiii. rosarum calaminthæ an. 3. iiii. pastullarum vnc. i. coquantur in lib. v. aquæ ad consumpt. medietatis, & expressum datur cum saccharo calidum. Medicamentum, quo non frustra vsi sæpe fuimus, quod datur ad 3. i. ex vino albo calido ante accessiōem, accipit rad. gentianæ, agarici, rhabbarbari, aristolochiæ rotundæ, zedonriæ an. 3. i. caryophyllorum, piperis, croci an. scrup. ii. tritis ex melle fiunt pastilli: Item vinum, quod paratur ex origani, pulegii, chamedrios an. p. ii. cinnamomi, iridis radicis tritæ, calami od. galangæ an. 3. i. caryophyllorum, zinzib. piperis an. scrup. i. Vini albi tenuis aromatici, bulliant, quoad tertia pars absumatur, dosis erit semuncia ante accessiōem, additis supradictis calidis frictio nibus & inunctionibus, sudorificorum item vsus ante accessiōem ex radice chinæ calamintha Guaiaco, smilace aspera, milio & aliis similibus, erit vtilissimus, si per aliquot dies exerceatur. Ex externis, oleum chamæmelinum, ex calaminthæ, costinum, rutaceum, ex castoreo, sinapi, cum modico piperis triti. & omnia medicamenta, quæ ad quartanas fuere à nobis præscripta, erunt vtilia. Non est omittendus in toto febris tempore vsus eorum, quæ os ventriculi calefaciunt, cuiusmodi sunt, olea, vel unguenta parata ex oleo nardino, chamæmelino, de menta, amygdalino, de nuce myristica, & ex aliis facultate similibus. atque ex medicamentis aromaticis, cuiusmodi sunt, cinnamomum, menta, caryophylla, nux myristica, piper, carpobalsamum, lignum aloes, & similia. Item fomenta ex iisdem in uino aromatico parata, atque particulatim ex foliis althææ, mentæ, chamæmelo, fenugreco, betonica, & similibus. Ad hypochondria item, si tentia fuerint, inunctiones digerentes & laxantes conuenient, & præsertim ad finistram hypochondrium, atque ad uentrem. ex oleo chamæmelino, anethino, irino, amygdalino, de capparibus & similibus parata, item fomenta ex chamæmelo, pulegio, althææ foliis, caulibusque, & ex radice cyclaminis, iridis, bryoniæ, & ex seminibus maluarum, althææ, lini. fenugreci, feniculorum, ligustici & similibus in aqua parata, uel cum uini albi modico. His omnibus addenda est uicinaratio accommodata in omnibus sex rebus non naturalibus, aer primum diligenter deus est clarus, calidus, qui non sit ualde humidus, bene egroti dormiant, vigilas

deuient, quod augeant & cruditates. & punitam; caueant ab animi passionibus; & praesertim à tristitia, mœrore, timore, quod hæc affectum adstrictum augeant. singulis diebus semel, vel bis cibum capiant, per horas quatuor ante futuram accessionem, quantitate exiguum, ne stomachus grauetur, qualitate calidum, optimi succi & multi alimenti, quod in hisce febribus longis, vires manu tenendæ sint. oua sobilia recentia sunt optima, carnes pullorum gallinaceorum iuuenum, hædi, vituli lactentis, auium montanarum, scilicet, perdicum, phasianorum, turdorum, turturum & similibus. à vino tantummodo abstinebunt, quoad signa coctionis illuxerint, eritque album ogligophorum, odoratum, vel vini loco aqua cum corianis, vel cinnamomo decocta, aut aqua pulli, velius stillaticium ex gallinaceo pullo paratum.

De hæcticarum febrium curatione. Cap. V.

Hæctica febris (vt superius dictum est) tertium genus febrium existit, in cordis substantia constitutum. Quæ febris fit, vbi calor febrilis cordis substantiam inuaserit, atque coeperit consumere humorem in uenis & in arterijs futurum nutrimentum, primique hæc hæcticarum febrium est ordinis, scheticaque Galeno dicta est. Hæctica vero febris confirmata dicitur, vbi calor nedum corporis solidas partes occupauerit, at aliquid quoque vitium humiditatum consumperit. Itaque tres hæcticæ species obseruantur, quarum prima schetica dicitur, ea quippe, in qua calor solida occupauit, & humiditatem in uenis, & in arterijs absumere coepit; altera est, vbi eò humiditatis consumptio venerit, vt ros illè, qui veluti com meatus quidam & futurum alimentum spacijs inanibus corporis concipitur, absumitur: Tertia vbi consumptio & tabes eò aucta fit, vt carnum pinguem substantiam feruidus calor consumat, fibrarumque & aliarum solidarum partium humiditatem; atque hæc vera est tabes, & marasmus postea dicitur vbi tota humiditas sit consumpta, summaque corporis scilicet ariditas appareat, quæ est insanabilis. Fit quidem hæctica febris plarunqu ex ardentibus & colliquatiuis febribus. Quæ colliquatio aliquando paulatim fit, vt in vera hæctica marasmo, & quandoque repente, vt in morbis acutis, exitialibusque, in quibus medici triduo obseruant (vt Hippocrates est auctor) faciem excarnem vulgo hoppocraticam appellatam. Aliquando colliquatio fit per apparentes euacuationes, scilicet per vrinam, vel per deiectiones. illas febres Galenus vocauit oleagineas, quod in ipsis vrinæ oleagineæ & pingues excernantur, quandoque per aluum rufa, crassiuscula, pingua, viscosa, fetidaque excernuntur. Quam excretionem cacoithiam notare, & pestilentis febris signum esse inseparabile, superius à nobis demonstratum est. Quandoque hæc colliquatio non apparet euident, vtpotè quæ fit per insensibilem mearum cutis transpirationem, vt in hæctica & marasmo. Aliquando ab ephemeris incipiunt, & aliquando etiam (quod tamen raro contingit) per se ac sponte à tristitia, aut à mœrore, aut à labore, aut à vigilijs, aut ab amore, aut inedia, aut ex similibus causis. Quædam sunt simplices, quædam complicatæ cum phlegmone, vel cum erysipellate alicuius membri præcipui, scilicet vel ventriculi, vel hepatis, vel renum, vel vteri, vel ieiuni, & coli, intestinorum, aut cum vlcere alicuius prædictorum membrorum, maximeque pulmonis, quem affectum Græci phthoem & phrthysim vocarunt, aut cum tumore, aut denique cum aliqua putridarum febrium. Nos de simplicibus nunc agimus. Quarum signa sunt hæc, quippè pulsus primo durus siccatione arteriarum, debilis ex vitalis facultatis debilitate, frequens ob intemperiem cordis calidam & siccam, quandoque velocior, & frequentior, urgente

Bb quidem

In 8. meth. med.
cap. 1.

In 1. prog. tex.

In 6. epid. sect. 1.
com. 28.

quidem necessitate, uti à cibo, quo tempore hecticus calor non aliter effervescit quam calx viua, si aquam vel simile quoddam superfundas. unde medici in hecticis mutant horas prandij & cenæ, & observant, an pulsus velocior frequentiorque reddatur, quod si fiat, hectica confirmata certum esse signum intelligunt, observant itidem calorem febrilem tunc auctum, perinde ac febris accessio fiat. Qui calor toto alio tempore æqualis apparet, sine ullo dolore, sine vlla inæqualitate, atque ita, ut ægri se febricitare non sentiant, modo hectica alijs affectibus non sit complicata, præsertimque febri putridæ (quod si sit, calor inæqualis sentitur, & ægri aperte intelligunt se febre detineri) oculi item in hecticis excavantur, nasus acuitur, tempora collabuntur, cutis squalescit, à cibo (uti dictum est) augetur calor, & pulsus, pedes quandoque intumescunt, calor manifestior (etsi in ipsis maior reuera non sit) apparet in volis manuum, & in plantis pedum, videtur inquam manifestior, quod volæ manuum, & plantæ pedum alijs partibus corporis temperatioribus sint, ideo ad omnem mutationis siue alterationis sensum sentiendum aptiores redduntur. Primi ordinis hectica febris (schematica potius quam hectica dicta) sanatu facilima est, veluti cognitu est difficilis, secunda cum difficultate sanatur, atque tertia est insanabilis. Indicant curationem in hac febre calor adstrictus in substantia cordis vel in partibus solidis, qui ob id balneis rarefacientibus, digerentibus, ac inunctionibus eiusdem facultatis laxandum esse indicat, scilicet ut calor is exhalet, & digeratur, postea verò in secunda tertiaque hectica febris specie duplex est affectus, scilicet mixtus ex adstricto atque ex laxo, adstrictus calor est in substantia solidarum partium susceptus, laxus verò est nimia consumptio siue resolutio humidi, ab inurente calore facta, qui affectus (uti dictum est) colliquatio dicitur, in quo substantia humida corporis liquatur, profuit & euacuatur, unde medici vel etiam Dogmatici huic affectui tanquam urgentiori occurrere (altero non neglecto) coguntur. Pro victus ratione instituenda, in primis aer sit temperate calidus ambiens scilicet (quando frigidus, licet inspiratione ad cor refrigerandum attractus videatur utilis, attamen ad cor non nisi temperatus pervenit, cum in via à calore frigiditas ipsius corrigatur) quod si ipse vehementer frigidus, qualis hyemalis esse solet, ad cor hecticorum perveniret, non esset utilis, siquidem caloris febrilis in cordis substantiam suscepti ac adstricti (desatis eiusdem substantiæ cordis, incallescet à frigiditate ipsius aeris, meatibus) adstrictus affectus & augetur, & prohiberetur, quò minus idem calor febrilis occupans substantiam cordis, digeretur & reloueretur. Eadem profecto ratione, qua Gal. damnauit ambientem vehementer frigidum, quod meatus cutis constipet, & vaporum exhalationem prohibeat: Vnde non nisi toto corpore bene coopertos hecticos uti illo aere medici concedunt. Cibi sint humidi succique temperati & in hectica confirmata non facultate calidi, & faciles concoctu, uti est lac humanum, caprillum, asininum, cremor ptisanæ hordeaceæ, halica, cremor seminum frigidorum, scilicet, melonis, cucumeris, cucurbitæ, anguriæ, maluarum, althææ, portulacæ, endiuia, & similia. testes gallinacei, perdices, auiculæ montanæ, caroque cancrorum fluuiatilium ad ipsos in cibo commendatur à Dioscoride. Recentiores adiuxerunt testudinum carnem, ex qua (cum difficilis coctionis sit, & crasse substantiæ) elixata in aqua contusum parant; sed utilius est, si ius ex carne decocta, cum ptisanæ cremore exhibeatur. ex piscibus, saxatiles; ranæ, lucius, scarus, trocta & similes ad usum recipi debent, panis item in aqua hordei coctus cum succo granatorum dulcium conuenit; Potus sit vinum album, aut clarum oligophorum: vel aqua hordei, vel ius pulvæ gallinacæ parvæ, portulacæ, funco & hordeo alteratum. somnus & vigilia sit mediocris, fugiant omnes animi passionēs, hilaresque sint, & bene de salute sperent. Victus vero præscripta ratione, ad hecticarum febrium curationem descendimus.

Gal. in libro 5.
Amp.

Gal. in 10. meth.
cap. 8.

secundum, & cum triplicem esse hanc febrem dixerimus, quippe primam esse diarrhœis siue ephemeris simillimam, quam scheticam rectius dici quam hecticam statuimus (in hac calor febrilis substantiam cordis inuasit, nondum tamen humiditatem ipsius consumpsit) alteram, in qua calor febrilis humiditatum quippiam consumpsit; atque tertiam, in qua omnes humiditates exhaustæ sunt, & ariditas exinde corporis apparet, quam tabem & marasimum idcirco medici nominarunt. Hæc veluti est omnino incurabilis (licet in hecticam vulgo senectutis, quam senium Philippus vocabat, possit mutari) quippe sublato calore febrili balneis aquæ dulcis, lacte asinino, inunctionibusque tepidis, remanet ariditas, in qua ægroti vitam longius producant, dico per dies & menses. De huius quidem curatione, nihil est proponendum, solo enim prognostico debent medici esse contenti, ne medica ars infametur. De schetica verò dicta, aliter dicendum; hæc profecto sola curam certam admittit quandoquidem ipsa si cognoscatur, facillime ephemerarum remedijs tollatur. sunt itaque ephemerarum præsidijs Scheticæ febres tollendæ. De his verò nunc agimus, quæ medij sunt ordinis, in quibus calor in cordis substantia adstrictus digerendus est, & humiditatum consumptio, quæ affectus est profluens, prohibenda, ijs, quæ caloris efficaciam obtundunt, & quæ densando cogunt humiditates non dissolui. Consumpta verò humiditas erit restituenda, humectantibus cum medicamentis, tum omnium maxime cibis. In primis ex medicamentis internis ea eligenda erunt, quæ cum medicamentis tum alimenta sunt: cuiusmodi est lac humanum, caprinum, vel asininum, hoc minus cum nutriat, plus refrigerat, ac refrigerando densat meatus, prohibetque caloris effluuium, humiditateque caloris ignei efficaciam hebetat; caprinum efficacius nutrit, & calorem hebetat, humanumque magis nutrit, & promptius consumptam humiditatem restaurat, caloremque item compescit, atque hebetat. lac fugitur vtilius ex fæminarum papillis: caprillum, & asininum itidem, ni ægroti abhorreant, ita exugere eos oporteret. quod si abhorreant, poterunt primum semel in die, manè quippe ante cibum spacio quatuor horarum, cum saccharo statim emunctum actu calidum ad quatuor uncias bibere & mox vsque ad sex itidem uncias ascendere. Qui è papillis sugunt, dosim seruare nequeunt, Aliqui perinde ac pueri lactentes sæpius in die lac exuentes sibi sanitatem procurant; præter lac sunt alia humectantia, & caloris vim colligantem hebetantia, vti est ptisanæ hordeaceæ cremor, halica, cremor seminum melonis, cucumeris, cucurbitæ, anguriæ, maluarum, altheæ, sesami, portulacæ, endiuizæ & similia ex iure pulli hordeo mundo alterato. panis sæpius aqua hordeacea lorus ijs vtiliter datur. Item ius ex carne cancrorum fluuiatilium, testudinumque nemorosarum, & cochlearum, ex hordeacea aqua paratum. Hæc fuere quoque antiquis nota, & summopere commendata, non minus quam à recentioribus quoque factum sit; neque immerito, cum hæc plurimum & vt medicamenta & vt nutrimenta humectent, pinguique humiditate calorem, quo minus liqueatur, hebetent, ac quadam etiam refrigeratione quadantenus densando ipsum itidem calorem diminuunt, prohibeantque non minus humidi substantifici effluuium. Alius si fuerit adstricta laxanda erit, cum lacte asinino cocto ad libras quatuor cum saccharo exhibito, aut cum lenibus clysteribus, vnde clysteres admovebuntur ex lacte caprillo vel bubulo, vel asinino cum saccharo & oleo violato, vel ex butyro recenti, cum decocto maluarum, altheæ dissoluto, & cum oleo violato parati. vel ex cremore itidem ptisanæ hordeaceæ cum prædicto oleo & saccharo parabitur. De externis medicamentis, balnea conueniunt ex aqua dulci, aut ex aqua alterata althea, malua, violis vel alijs similibus: In Ægypto ex lacte asinino & camelino, vel equino balnea tepida instituunt pro magnatibus. epithemata itidem atque inunctiones commendantur. Ex balneis tepida

Bb 2 conueniunt,

En 5. aphorism.

conueniunt, atque frigida, illa humectant solidas partes, fuligines fumidaque excrementa digerunt, corpusque recte transpirabile reddunt, & remissa caliditate, etiam calorem intensum heberant. hæc refrigerant, cutim densant, virtutem, calorem (reuocatione caloris vt docet Hippoc.) augeudo, roborant. sed non in excarnibus corporibus, & valde prælanguidis tutum erit admodum frigidis vti balneis, quando, nedum (vti Gal. quoque sentit) hæc calorem augebunt, sed quinimo prælanguidum extinguunt. in robustis vero erunt vtilissima. sed quod valde frigida crassarum sint partium & ob id partes penitus inuadere nequeunt, ob id præmittunt balneum tepidum in tina, in quam aqua tepida plenam quatuor homines, lintei, quo hæctici obuoluti sunt, capitibus manibus apprehensis, & lectulo exceptos ægrotos, immergunt toto corpore (capite excepto) eosque detinebunt, quoad carnes extumescunt, quos tunc ex tina aque tepidæ eductos, in alteram aquæ frigidæ repente operarij reponent, in qua ægroti ad virtutis tolerantiam manebunt, vel per quadrantem horæ, vel per medietatem, modo (vti dictum est vires ferant. exemplique ægroti, in lectulo calido sunt reponendi, totiusque corporis partes leniter spongia molli, vel molli linteo deterfæ, oleo violaceo tepido, vel communi dulci, vel nenupharino inungentur, à quibus præmissis per horam postea prandium ægroti assument; Robusti bis in die, scilicet mane & vesperti, ante cibum hisce balneis vtentur, semel vero debiles. Nonnulli non vehementer frigida balnea, sed leuissima frigiditatis vtiliora & magis tuta esse volunt, ideoque primum ægrotos in balneum temperate calidum ducunt, & mox in leuiter frigidum, ita vt tepidum potius sit, siue leuiusculè frigidum. Ægyptij & Arabes vti solent balneis ex aqua fluminis Nili, ex lacte camelino, velequino, vel asinino vel caprino. epithemata item thoraci, hepati, ventriculo, renibus ex lacte oleoque violato, rosatoque tepido, aut ex succo lactuce, funci, endiuie, portulacæ, poligoni, lenticulæ palustris, nenupharis, & similibus, cum modico lactis, & croci ad penetrationem. Ad easdem partes & ad omnes quidæ cutaneas, bis, terque in die affectant vsum inunctionum tepidarum ex oleo violato, nenupharino, communi, atque ex seminibus frigidis paratum.

De symptomatibus febrim, quæ in ipsis curationem expetunt, & primum de eorum curatione, quæ adstrictorum morborum genere comprehenduntur. atque primum de medicamentis ad dolorem capitis stomachi atq; ventris. Cap. VI.

EX affectibus, qui solent vnà cum febribus complicari, quidam sunt actiones læsæ, quidam excrementorum euacuatorumque excessus, atque alij, qualitates corporis mutatae. Hi sunt, veluti colores mutati, frigiditates, caliditates, scabrities & similes alij. veluti in excrementorum euacuatorumque excessu, sunt omnes tum suppressæ euacuationes, tum immoderatus fluxus; ad actiones vero læsas pertinent, somnus, vigilia, dolor, syncope, & similes alij affectus. Horum vero affectuum, cum quidam ad adstrictum & quidam ad laxum referantur, in presentia de adstrictis agemus, qui sunt, exempli gratia, dolores capitis, stomachi, & ventris, somnus, frigiditas, rigor, tussis, cibi fastidium, caninus appetitus, linguæ scabrities, nigritiesque, nausea, singultus, inquietudo, aluus, atque vrina suppressa. De laxis verò (qui itidem sunt: Vigiliæ, syncope, sanguinis euacuationes immoderatae, sudores, vomitus, alui profluuium, vrinaeque itidem profluuium) posterius sermonem habebimus. Nunc verò ad adstrictos venimus, & primum ad dolorem capitis demulcendum, descendimus. solent fre-

quentius

quentius febricitantes capitis dolore vexari, qui ni criticus sit, nimirum quod ab eo aliqua crisis futura prænoscatur, omnino tollendus erit, nam perseverans præter magnam quam affert molestiam, minatur vigiliam, delirium, phrenitum, lyncopenque. caput verò dolere Galenus docet, aut ob aliquam inflammationem, aut ob humores crudos in capite coaceruatos, aut ob spiritum aliquem flatulentum, aut ob sanguinis copiam, aut ob bilem mordacem, aut ob aliquam obstructionem, aut denique ob aliquod qualitatum temperamentum. Inflammationem capitis notat febris, atque delirium perpetuum: si cum pulsu dolor fiat, substantiam membranofam esse inflammatam indicatur. ob plenitudinem verò humorum, dolor erit cum capitis gravitate: si humores crudi sint, caput absque febre & calore dolebit: si à sanguine, tota facies rubescet, intumescetque, venæque rubræ ac sanguine turgentes apparent: si à bile, dolor est cum acrimonia atque calore: si verò dolor fuerit distensivus absque gravitate, flatuum erit inditium, calidorumque & acrium, si itidem dolor cum morfu fiat. cum gravitate verò in aliqua capitis parte dolor inhaerens obstructionem significat, absque gravitate verò tensione & morfu à temperamento aliquo dolorem fieri nobis innotescit. Caterum etsi dolores ab hisce causis fiant, tamen caput in febricitantibus ab humoribus, vel vaporibus calidis distendentibus aut mordentibus plerumque dolet. Itaque ad illos curandos clysteres maxime conducent laxatorii, vel quadatenus irritantes. eoque facilius iuvabunt, si feces retentæ fuerint. laxatorijs verò clysteribus (vulgo communibus dictis) scilicet ex decocto maluarum, violarum, altheæ, fursurum triticeorum, oleo violaceo, atque saccharo rubro, cum modico salis paratis utendum erit, qui si etiam modicum cassiæ catharticæ, scilicet ad vnciam illius pulpæ, vel ex melle rosaceo, vnc. iij, vel ex compositis vnciam electuarij lenitivi recipient, erunt longe efficaciores. solent etiam parari ex cremore ptisanæ hordeacæ, cum oleo & reliquis nuper dictis. balani etiam ex melle & ex sale erunt accommodati. Aluo subducta erunt utiles frictiones ad crura, brachia atque ad dorsum deorsum versus factæ; ubi verò vires permiserint, modicum sanguinis quoque erit euacuandum, aut scarificationis cruribus more antiquorum, aut dorso & occipiti cucurbitulis cum scarificatione adhibitis, aut hirudinibus apposis hæmorrhoidibus, quæ vel etiam non minus post aures venis erunt affigendæ, non semel sed bis, ter atque pluries. vtilissimum erit si secta vena frontis sanguis vacuabitur. Nihil profecto vtilius in dolore capitis, qui morbus est adstrictus, quam vti etiam maioribus laxatorijs cum internis tum externis, pro internis hæc sufficient. & pro externis hæc itidem maximè erunt conuenientia: stillicidia nimirum ad suturam coronalem ex aqua tepida dulci fluuiatili, aut ex decocto maluarum, altheæ, fenugræci & similibus. solent vero medici vsurpare medicamenta pro externis capitis partibus fouendis, actu facultateque laxantia: cuiusmodi omnia sunt, quæ facultate calida atque humida valent, ut oleum dulce tepidum, amygdalinum, irinum, aquæque stillatitiæ, vel decocta ex althea, chamæmelo, ex fenugræco, meliloto, & similibus. Alij verò plus laudant, laxantia quæ solummodo actu sunt, minimeque facultate, ne calefaciendo adstrictum affectum calidum augeant. huiusmodi sunt omnia medicamenta quæ frigida sunt atque humida, si modicè ab igne incalescant, & temperatè calida adhibeantur; talia sunt, oxyrrhodina ex oleo rosaceo, violato, nenupharino, ex succisque polygoni, maluarum, endiuivæ, rosarum, nenupharis & similibus herbarum, aut aquæ stillatitiæ ex iisdem paratæ, vel etiam fluuiatiles simplices modicè incalescunt. hæc sunt laxantia non calida, sed refrigerantia, ex quibus & oxyrrhodina, addito modico aceti, & epithemata ad dolorem capitis à Dogmaticis comparantur. Itaque ad hunc usum laudatur oxyrrhodinum quod ex oleo dulci tepido & modico aceti paratur, frontique & temporibus adhibetur, aut quod accipit olei violati

In 6 apl. com. 10

violati vnc. ij, chamæmelini vnc. i, aceti vnc. 5. mixtum tepidum apponito. Aliud. Accipiunt olei dulcis, communis amygdalini, è seminibus lini, lactis humani partes æquales, cum modico itidem aceti. vel quod accipit olei rosati, violati, lactis muliebris an. partem vnā, aceti partem mediam, vel croci, gr. quinque. Auicenna recte cum Methodicis sentijt, scilicet in doloribus capiti in febre, esse abstinendum à stypticis & à valde frigidis, siquidem ex illorum vsu timeret ne inde humores, aut vapores, qui digeri resoluique debebunt, intus compingantur & crassescant. ideoque Methodici, plus nocuenti ab vsu repellentium quàm iuuamenti esse timendum putarunt & meritò sanè, cum humor atque vapor dolorem faciens sit digerendus atque exhalandus; at de hac re posterius nos accuratius. Nonnulli derafo capite, perseverante dolore, scincipiti fomentum adhibēt tepidum ex decocto chamæmeli, althæe, maluarum, fenugræci, radicis iridis, rosarumque paratum. Celsus rosas aceto maceratas fascia inuoluit. & Dioscorides rosas eadem in vino decoctas calidas adhibet. atque hæc ad capitis dolorem in febribus. Ad stomachi verò dolorem, si principio febris fiat, vomitus erit prouocandus cum iure pulli vel aqua calida cum syrupo acetoso, vel cum aceto, & postea inungendum erit os stomachi oleo amygdalino, chamæmelino rosaceoque mixtis, aut fomentum adhibendum erit ex decocto chamæmeli, absinthij, rosarum, althæe, fenugræci & betonicæ, ni fuerit in febris principio (namque hoc tempore à medicamentis abstinere oportet, quod dolor ex motu humoris fiat, satisque erunt, quæ dicta sunt adhiberi) si verò diu alijs quoque à principio temporibus perseverauerit, adhibebis vinum album, in quo rosa, althæa, & fenugræcum fuerit decoctum. si venter doluerit, obseruandum erit an alius sit adstricta, quæ si ita erit, clisteribus laxatorijs communibus laxabitur, vel si dolores fuerint tensiui, cum oleis & decoctis resoluentibus, vt (exempli gratia) si accipiat, foliorum althæe, maluarum, mercurialis, betæ, fursurum triticeorum an. p. ij, sem. fenugræci lini an. vnc. iij, bulliant in duabus libris aquæ ad consumpt. tertiæ partis, postea accipe huius decocti lib. 1. olei dulcis cōmunis, vel eius loco olei violati vnc. iij, sacchari rubri vnc. ii. vbi vero tensio obseruatur cum dolore, in decocto adderetur chamæmelum, anethum, semina feniculi, anisorum, linique & oleum chamæmelinum, vel anethinū, & si adhuc perseverauerit, addito electuario de hyera, ad semunciam. si vero dolor fuerit cum acrimonia, parabis clysterem ex lacte caprillo, vel ex hydromelle, vel ex cremore ptisanæ hordeacæ cum iure capitis castrati, addendo vel cassiæ, vel electuarij lenitiui 3. i. vel aliud simile, quo humores acres per aluum educantur. fomenta quoque super ventrem calida imponentur ex decocto chamæmilæ, althææ, maluarum, meliloti, fenugræci, aut (si status copia adfuerit) etiam foliorum rutæ. & hæc de doloribus in febribus, qui aliquando ad se magnitudine trahunt curationem.

De medicamentis, quæ faciunt ad somnum in febribus tollendum, ad rigorem, & frigiditatem, ad tussim, ad cibi fastidium, bulimon, appetitum caninum, sitim atque lingua asperitatem. Cap. VII.

DE somno, qui in febribus sepe cum molestia obseruatur, nunc agimus. Ipsum verò somnum Aristoteles sensus quodammodo immobilitatem & quasi vinculum esse voluit, cuius relaxatio & solutio sit vigilia. Galenus hanc animæ diffusionem facit, atque illum, quippè somnum, comprehensionem. Methodici præternaturalem somnum adstrictum affectum fecerunt, pressuramq; in cerebro esse

esse voluerunt, quod nimirum vel vapores vel humores inibi adstricti hunc affectum constituent; à qua sententia neque Peripatetici dissentire visi sunt, qui de somno disputantes dixerunt, ipsum esse sensitiue facultatis veluti imbecillitatem ab alimenti exhalatione factam, quippe calore innato (quem animam vocant) à copia vaporum ascendentium veluti refrigerato, atque consopito, seu presso. vnde à cibis, & ab ebrietatibus somnos fieri profundos & diurnos, obseruamus. Humidum quidem exhalatione ad cerebrum subuectum, eiusque frigiditate (frigidioris enim temperamenti hoc viscus esse omnes receperunt) incrassatum vias & loca eiusdemprehendit, impeditque, quo minus calor ad extimas corporis partes, iisdem vijs veluti clausis, dimoueri queat. Quo adstrictus, ac veluti humiditate illa pressus, inibi consopitus, perinde atque immobilis manere cogitur, quoad eam humiditatem extenuarit, atque resoluert. Eodem itidem modo inquit Aristoteles somnum præternaturalem ab humoribus & vaporibus ad cerebrum sublati, in febribus concitari. hinc Galenus humiditatem somni propriam esse statuit, vigiliarumque siccitatem. frigiditatem verò fatuitatis potius atque insensibilitatis, veluti deliriorum causa propria calor itidem æstimatur. Veruntamen Galenus cum vigiliarum tres causas esse docuerit, scilicet, caliditatem, siccitatem, atque dolorem, frigiditatem ac humiditatem somni causam constituisse, haud dubium est. à quo Methodici non dissensisse visi sunt, somnum scilicet præternaturalem, vijs in cerebro ab humore densatis, pressuram facientes. Etenim frigiditatis proprium est densare. Quare aut à refrigeratione meatus cerebri densante, aut ab humiditate obstruente, aut ab vtraque causa cum somnus in febribus fiat, propterea in eius curatione, scilicet ad inducendam vigiliam, laxatorijs præditijs (quippe quæ sunt calida & humida) erit opus, atque quodam modo calorem innatum augescensibus (cum calore humidum digeratur, meatusque aperiantur) nempe exinde vijs cerebri, meatibusue laxatis & apertis. Ex quo amplos meatus habentes pauci somni, angustos atque exiles, prolixioris, & multi esse, Aristoteles scriptum reliquit. Cæterum his præmissis ad medicamenta nunc descendimus, quibus somnolenti homines ad vigiliam reuocantur. Itaque ad istud præstandum, complura vtilia sunt, primumque ex ijs erit, strepitus, clamorque magnus, acutusque olfactus, quippe ex acerrimo aceto, in quo semina nigellæ trita fuerint macerata aut thymus, vel pulegium, vel origanum decoctum sit. Quibus si ad vigiliam egroti reuocentur, procuranda erunt sternutamenta, pluma, aut palea, aut folijs mari, vel ptarmicæ detritis, in naresque inditis, vel his non promouentibus sternutamentum, efficaciora indantur in nares, huiusmodi sunt, piper tenuissime tritum, aut sinapi, aut elleborus albus itidem tritus, aut staphydis agria aut aliud simile. Post hæc adhuc perseverante somno fronti, capitiq; pilis derafo oxyrrhodū in ex oleo irino, rutaceoque calido cum modico aceti, vel sinapi ex aceto albo leuigatum petia linea exceptum calidum imponendum erit, vel castoreum eodem modo ex oleo leuigatum, vel ex aceto albo; radix item peucedani trita vel assa fætida itidem ex calido aceto. Nonnulli rutam viridem contritam ex melle & nitri modico calidam imponunt. Eodem tempore frictiones dolorosæ moliendæ erunt, atque artuum ligaturæ itidem cum dolore. Dolor item qui fit euulsione pilorum barbæ, atque pudendorum valde est efficax ad excitandos à somno somnolentos. Ni his etiam à somno reuocentur, vtendum erit rubefacientibus atque vlcérantibus medicamentis, non solum in cruribus atque brachijs, at quinimo etiam in capite adhibitis. hæc parantur aut ex sinapi, aut ex euphorbio, aut ex allio, aut thapsia, aut clematide vrente, scilicet eius folijs tritis, aut ex radicibus ranunculi itidem tritis ex aceto scillino leuigatis. His addimus stillicidium ex aqua, in qua ebullierint radices iridis, vel acori, vel peucedoni, vel ciclamini, vel chamæmelum, ruta

In lib. de somno
& vigilia.

In 3. de causis
pulsus cap.

In lib. de som. &
vig.

atque serpillum. stillicidium ad futuram coronalem calidum ex alto decidat
 atque hisce medicamentis somnus depelleretur. Sed iam ad immodicam perfrectio-
 nem atq; rigore, qui in febricitantibus fieri solet, veniamus cum plurimum mo-
 lestiæ febricitantibus esse soleat, scilicet in principiis accessionum, quo tempo-
 re calor intus retrahitur, extimæque corporis partes idcirco algent. In his ante
 accessionem egroti cooperiuntur calidissimis stragulis; sed prius aliquod decoctum
 ex discussorijs, cuiusmodi est, quod paratur ex calamintha chamedri, origano,
 pulegio atque ex similibus: perfrectant vniuersum corpus, maximè verò dorsum,
 quod inungunt calidis oleis, pipere puluerizato, aut costo, aut ruta, aut pyretro,
 aut castoreo, aut alio simili medicamento calido puluerizato, ipsis in oleis cali-
 dis macerato vel decocto; oleum erit chamæmelinum, vel rutaceum, vel lauri-
 num, vel irinum, vel his simile. Ad tussim verò quæ sepius vnâ cum accessio-
 nibus excitari solet, quæque plerunque fit à frigiditate in principio comprimen-
 te, aliquamque ad pectus faciente distillationem. hanc lenient omnia dulcia,
 cum intus assumpta, tum exterius; scilicet pectori adhibita, saccharum violatum
 atque rosatum ore contentum liquefcens descendensque solet tussim maximè leni-
 re, radix item liquiritiæ contusa & in iuleb violato macerata si dentibus melle
 tractetur idem faciet. lambitium itidem vulgo dictum, erit ad id opportunum,
 quod accipiet (exempli gratia) syrupi acetosi, violati, deliquiritiæ, de sarsaparilla
 singulorum partes æquales, vel etiam simplex syrupus acetosus, vel de liquiritiâ
 sepius egroti ipsos lambentes plurimum iuuantur, quod leniat pectus, facili-
 tetque humorem ad extussendum. erunt itidem viles inunctiones calidæ ex oleo
 amygdalino, dulci, butyro recenti, aut ex adipe gallinæo calido ad pectoris par-
 tes. hæc quidem tussim maxime lenire poterunt, in principio febris excitata, quæ
 postea à calore febrili in statu aucto solet resolui. Plures etiam cibi fastidium
 patiuntur, ut cibos ferè omnes abhorreant. quod symptoma plurimum neg-
 cij facit, ad vires manutenendas, plures deprehendimus mori potius voluisse,
 quàm quicquam cibi vel potus degustare voluerint. Solet verò potissimum à duobus
 causis in febricitantibus dissolui appetentia ciborum, scilicet vel ab humoribus
 vitiosis, quos imbibit ventriculus, aut à virtutis imbecillitate plerunque
 caliditatem præternaturalem ventriculi subsecuta. Præstabit igitur in primis
 uocare appetitum, ijs profecto cibis, quibus aliàs homines magna cum volup-
 tate vescerantur, licet non hi haud planè boni succi sint, neutiquamque febris,
 quæ ipsius causis conuenire videatur, de quo & Hippocrates dicebat: paulo post
 sed suauioribus ac potius, meliori quidem ac ingrato præferendus. Vnde in notis
 nullis appetitu ferè omnino destitutis, appetentia cæpisse visa est aut ab aliquo
 pisce vel saxatili vel marino, aut quandoque etiam à sarda salita degustata, idcirco
 quæ lactucam decoctam in acetarij, vel radices cichorei itidem decoctas, aut bo-
 raginem medici ferè omnes ægrotis ad excitandum appetitum concedere solent.
 & aliquibus capparos salitos decoctos, ex oleo, aceto saleque conditos, non pau-
 cisque ferculum ex brassica, aut ex attriplice, aut ex lupulorum, aut ex maluarum
 asparagis conceditur. Aliquando ægroti appetitum excitantur ab esu aucula-
 rum montanarum assatarum. maxime etiam faciunt succi acidi, austerique ac-
 citrium, limonium, cytonium, atque granatum, horum profecto fructuum succos
 plurimum facit in cibis ad restituendum seu mouendum appetitum. fructus etiam
 decocti cum saccharo & exhibiti idem faciunt, cuiusmodi sunt varia pyrorum
 genera, poma quædam, & mala cytonia. dantur etiam cerasa acida saccharo co-
 dicta. & vt summum dicam, omnia quæcunque uel iucundo odore uel grato
 sapore sunt à stomacho maxime expetita. si his minime appetitus redeat, uomitus
 stomachus à prauis humoribus erit purgandus, uel clysteribus, uel aliquo etiam
 medicamento

medicamento (quod stomachus non abhorreat) aliud erit subducenda, omniumque maxime si antea ipsa fuerit adstricta. Aptum uero medicamentum erit (quod natura haud in multis abhorret) ius ex cimis brassicæ laxatorium, aut ius betæ uel mercurialis, cum oleo dulci, & sale copiosius epotum ante prandium, aut serum lactis caprilli ad libras, uel cum melle, uel cum saccharo epotum; cassiæ pulpa cum tamarindorum etiampulpa in parua quantitate ante prandium, uel ante cenam, multis haud est ingrata, cuiusmodi erit si accipiet cassiæ nempe extractæ drachmas tres uel quatuor, pulpæ tamarindorum per cribrum extractæ drachmas duas: sunt etiam passulæ decoctæ in iure pulli uel in uino dulci, aut pruna damascena itidem in uino dulci decoctæ, cum multo saccharo assumptæ, ipsorumque uino dulci itidem epoto antequam aliud cibum assumatur. Rhabarbarum ad semi drachmam aut ex uino epotum aut quouis alio modo assumptum erit medicamentum aptissimum. Longe plura habent studiosi quibus pro istâ causa uti poterunt. Exterius etiam conuenient ad stomachum oleorum moderate calidorum inunctiones, cuiusmodi erit, chamæmelinum, de mentha, permixto amygdalino dulci. Quandoque febricitantes ingenti fame consistantur, multos noui maximeque ex pueris qui cibis nunquam satiari (et si multum accepissent) uidebantur, quæ passio non uidetur bulimus (qui affectus sit laxus, unde coguntur medici cibos pleniore exhibere, & qui non ita facile resoluantur) sed pertinere ad appetitum caninum. Nam bulimum intelligunt affectum laxum, in quo assumptus cibum usque adeo facile a calore coquitur & digeritur, ut corpus maxime resoluatur, unde cibi illis pleniore, non ita facile alterabiles a medicis exhibebantur. At appetitus caninus (immodicam ciborum quantitatem, uel qualitatem quandam pro causa habens) medicamentis incidentibus deterforijsque opus habebit, atque postea uomitum cientibus, quippe laxatorijs. huiusmodi sunt dulcia, pinguia, & omnia alia ex largiore oleo præparata. si his non cesserit affectus, salamenta omnia erunt aptissima, quippe, quæ crassum humorem detergendo stomachum purgabunt, a quo his appetitus uitari solet. ut ad se consilium curationis etiam trahat. In febribus aliquando fouetur, ut ait Galenus) a caliditate & siccitate partium internarum, aliquando a præsentia calidorum humorum, scilicet biliosorum, aut a phlegmone erysipelaceo. utcumque sit, hic affectus adstrictus est. quandoque uero habet etiam laxum affectum coniunctum, nimirum ubi ab intensissimo calore nimium in corporibus humiditas dissoluitur, ut in febribus synochis, ardentibusque maxime æstuosis, in quibus frigidam aquæ potionem conuenire, alias a nobis etiam ex Methodicorum placitis demonstratum est. itaque ad consuetam sitim in febribus extinguendam, aut compescendam conuenit aqua dulcis actu, temperate calida, aut saltem tepida, similiterque ex aquis stillatarijs, eque omnes, quæ ex herbis potestate frigidis proliciuntur, actu tamen quæ (ut dictum est) calidæ exhibentur. actu uero frigidæ nedum sitim (ea excepta, quæ habet etiam laxum affectum coniunctum, scilicet ubi præ ingenti caloris actu humiditas corporis partium solidarum immoderate dissoluatur, in quibus sanè frigidæ magis quàm calidæ sitim restringere aptæ sunt) compescunt, at quinimo eam actuali frigiditate meatuum dentante calorē uel humore ipsam fouent, quo minus exhalet, & resoluatur prohibendo, augebunt. Itaque portiones actu temperate calidæ esse debebunt, & humidæ, quæ humidum habent pingue (quia partibus diu inest, longiusque durat, quam aptiores. hinc iura pingua ex carne uel vitulina, uel hœdina uel ex gallina cœis pullis paruis, sine sale parata aptissima sunt, ut sitim compescant. Nonnulli exhibent, ut etiam meminimus, aquam coctam hordei ex saccharo cum modico acido

Paul. in 2. libro
cap. 52.

Cc vel

vel citri, vel limonis, vel aceti (vnde apud antiquos oxicratum fuit in usu) scilicet ad penetrationem. Alij miscent aque iuleb rosatum vel violatum, aut conseruas aliquas (cuiusmodi est quod saccharum rosatum, vel violatum uel boraginatum, vocant) maceratas in aqua & postea colant & exhibent. Aegyptij Arabesq; parant ad sitim restinguendam ex aqua Nili fluminis, saccharo & modico succi limonis potum gustui iucundissimum, quem sarbet appellant. in malignis febribus pestilentibusque fructus berberis maturos siccatos in aqua macerant per plures horas, mox aquam percolant, additoque saccharo in ea quantitate, qua aciditas berberorum maximè refringatur, seruant ad potum. Nos in ijs locis aliquando febre vexati pestilente, quantum suauitatis iucunditatisque habeat huiusmodi potus, summa cum voluptate degustauimus. Nonnulli ad sitim demulcendam in ore tenent saccharum candidum vel rosatum, vel violatum, alij radicem glizyriæ recentem, alij folia lactucæ, alij semina lactucæ deuorant, siue melius lac ex ipsis expressum, ex aliqua aqua stillatitia aut ex simplici fontana bibunt. alij semina cucumeris ad sitim demulcendam ore continent. Paulus commendat pilulam in ore contentam, quæ paratur ex seminum cucumeris domestici 3. viij. tragaganthæ 3. iij, ex tragagantha albumine oui recentis dissoluta feminibusque tritis simul permistis, pilulæ parantur, quæ in umbra siccantur. Archigenes salem Indicum, (quo nomine saccharum nostrum intelligit) ore detentum, atque fabæ magnitudine deuoratum commendauit. eadem ferè faciunt ad linguam siccam & squalidam, quam humectabimus aut hydreleo ex oleo dulcissimo, vel aqua tepida in qua decoctum sit semen lini, vel cytoniorum, vel altheæ, vel malug, vel radices itidem altheæ. mox abluta lingua, sæpius detergenda erit panno lineo aspero, vel cochleari argento. Aurelianus ait linguam spongia aqua calida imbuta esse abstergendam & humectandam. Celsus ex penicillo è carpto aqua calida imbuta fouet linguam, mox vngit melle, & rosaceo oleo. in usu est apud iuniores sæpius linguam illiniri mucagine à seminibus cytoniorum, altheæ, aut psyllij maceratis in aqua dulci, expressa, sed age medicamenta alia prosequamur, quæ faciunt ad reliquos adstrictos affectus primo ab icterico calore principium facientes.

De medicamentis ad ictericum calorem, ad inquietudinem, ad nauseam, ad singultum, ad aluum atque ad urinam adstrictum. Cap. VIII.

IN febribus corpora egrotantium sæpe calore flauo, & aliquando nigro vitiantur, quem affectum alij morbum regium, alij icterum, & alij arcuatum appellant: fit verò hæc passio ubi bilis aut melancholicus humor sanguini mixtus in cutem erumpit, ipsamque suo colore inficit. Erumpit verò aliquando, cum non aut recipiatur in propria vasa, aut cum per proprios ductus viasue commode non expurgatur, quod aut vijs ab humoribus obstructis, aut propter aliquam vel inflammationem, vel tumorem in hepate, vel in liene constitutum, fieri solet. Aliquando autem in febribus natura critice noxium humorem ad eum expellente efficitur, qui à priore distinguitur, quoniam in critica icteritia urinae non sunt ictericorum modo coloratæ, croceo quippè colore tingentes, neque feces albæ deijciuntur, neque hypochondria tensa sunt. De quo affectu agimus nunc, qui etsi critice in corporibus fiat, tamen cum vel propter crassitiem vel lentorem biliosi humoris diu dureret, neque citò resoluatur, videtur quadantenus ad ipsius curationem medicum mouere. de illo, qui fit ex causa morbifica alijs

agemus

agemus, nunc de illius curatione agentes, dicimus, laxantia per exterius maxime conuenire, quæ internos meatus rarefaciant, humorem extenuent, detergant, sudoremque moueant: prouocato enim sudore planè in cute color ictericus digeritur. Oculis conueniunt fots ex aqua temperate calida vel simplici, vel in qua ebullierit chamæmelum, vel althææ folia, vel radix, vel semen lini, & fænugræci. balnea aquæ dulcis calida erunt aptissima; addimus nos sudorifica omnia tum interna tum maxime externa, præsertim si sudor calore humido moueatur. hoc quidem præsidio hic affectus planè, citoque finitur. Aliquando febricitantes inquieti & anxij redduntur vsque adeo, vt ipsis medici succurrere debeant; si id fiat, quod ab æstuoso vel à maligno calore nimium spiritus resoluantur, virtusque ita collabatur vt passio laxa fiat, & idoneis cibus illis erit occurrendum, & quandoque concedendo vinum ogligophoron odoratum, ni adfuerint, quæ prohibeant. hinc medici vsum aliquando in ipsis refrigerantium meatusque densantium laudarunt. de his verò paulo post, cum de syncopes curatione sermonem instituerimus, agemus. nunc ad eam inquietationem, quæ adstrictus est affectus, nimirum quæ à læso stomacho aut à cibus, aut ab humore os eius tenente fit. etenim quandoque cibus intempestiuus, aut tardius assumptus inquietationem facit, cui occurrimus cibum idoneum debito tempore exhibentes, vel si quam par sit multus exhibitus eum faciat affectum, minuendus erit. vbi verò ab humore os stomachi vexante fiat, cuius symptomatis signum erit nausea, vomitus medicamentis laxatorijs scilicet decocto althææ, fænugræci ex aqua dulci parato copiose exhibito actu calido seu tepido mouendus erit. ad id etiam iura parui pulli gallinæci aquosi maxime conuenient, vel ex carne hædina aut vitulina parata. Clysteres etiam erunt viles, quibus venter moueatur, aut cassia, cum tamarindo ad geminas drachmas assumpta cum saccharo idem præstabit, aut syrupus rosaceus soluens ad geminam vnciam. Quibus etiam medicamentis nauseabundi vti debebunt. singultus quoque, qui adstrictus itidem est affectus, quippè, qui vel ab humoris copia vel molesta qualitate fit, iisdem medicamentis tollitur, scilicet si fieri potest, vt vomitu humor expurgetur, hoc erit ex præcipuis præsidijs ad hunc affectum tollendum. decocta item ex aqua in qua malua, aut althæa, fucus ebullierint, erunt vtilia, vel his vtiliora iura pingua gallinarum paruorum vel carnis hædina, vel vitulina absque sale æstimanda erunt; aliquando etiam hydrelæm calidum ex oleo dulci amygdalino plurimum conducit epotum. Ad aluum verò adstrictam conuenient iura pingua tum carniū tum pisciū, non minus decoctum ex passulis, prunis, lebe- stenis, maluarum folijs, mercurialis, betæ, & similia. aut gemina drachmæ vel tres floris cassiæ cum saccharo candido vel cum pulpa tamarindorum ad drachmas itidem duas cum saccharo. non minus vtile erit serum lactis ad libras tres cum cochleare mellis, vel cum syrupi rosati laxatiui duabus vncijs; clysteres cæteris alijs præsidijs laxatorijs merito præferuntur, quod nedum stomachum offendant, at quinimo ipsum vel etiam ab humoribus grauatum subleuent. ad hoc sunt accommodatissimi, qui parantur ex decocto maluarum, althææ, betæ, mercurialis, fænugræci, ad libram, & ex oleo dulci communi, aut amygdalino, vel chamæmelino ad vncias quatuor, ex saccharoque rubro vel ex melle ad vnc. ii. cum sale trito ad geminas drachmas: his addimus balanos (vulgus vocat suppositoria) quæ verò ex ipsis ad hunc vsum conuenient, sunt radix betæ vel althææ vel maluæ, vel cucumeris syluestris sub cineribus incalescens, oleo illita cum modico salis, atque indita: vel conficiuntur ex melle cocto cum sale, vel nitro. quod si efficaciores desiderentur, poterit permisceri melli modicum laxatorij purgantis, vt (exempli gratia) si acceperimus mellis vnc. ij, salis 3. i. trochiscorum alhandal vel scamoniij, vel elaterij, vel agarici, vel centauri minoris puluerizati,

Cc 2 vel

vel turpeti, vel hermodactiloni, vel similibus scrup. ij. Ad suppressam vero urinam utimur internis atque externis medicamentis. ex internis datur aqua radicum eryngij stillatitia, vel fabarum, vel radicum anonidis ad uncias quatuor, aut ex vino albo dantur semina erysimi ad geminas drachmas, tenuissime trita. longe plura in quarto libro ad hoc propositum facientia scripsimus, atque in xi scripturi sumus. Ex internis sunt balnea aquae dulcis temperate calidae, in qua ebullierit malua, althea, chamamelum, perdicium, vel fots ex iisdem parati, atque inferius scilicet pubi, totoque abdomini adhibiti: inunctiones ex oleo amygdalino dulci, irino, lilino, atque omnium maxime chamamelino, & ex eo quod ex scorpionibus paratur, maxime vsui erunt. frigunt nonnulli in sartagine ex oleo chamamelino, vel amygdalino dulci folia perdicij, vel flores chamameli, & calidos imponunt. Non spernendus erit quoque vsus lactis seminum melonis, cucumeris, altheae, maluarum, atque portulacae, hoc enim lac solet mouere urinam. sed qui plura desiderant, ad vndecimum librum remittimus. Quandoque urina cum ardore & mordicatione exit, summa profecto cum egrotantium molestia, cui medebitur decoctum maluarum vel altheae, vel fructuum solani vel carij calidum ad uncias quatuor ante cibum epotum cum saccharo candido, vel decoctum glyzirizae recentis cum saccharo candido dabitur, si vero exhibetur flos cassiae catharticae (Abissinae vocatae, nimirum eius, quae corticem rubrum habet, haec enim ceteris ad hosce affectus praeferrere merito debet) ad unciam cum semidrachma succi glyzirizae, & saccharo candido, plurimum commodi illis afferemus. At his symptomatis febrium consideratis, quae genere adstrictorum affectuum comprehenduntur, restat, ut illorum quoque symptomata & cognoscamus, & tollamus, quae ad laxum referuntur.

De medicamentis, ad vigiliam, ad sincopen, atque ad haemorrhagiam sanguinis. Cap. IX.

DE vigilia praeternaturali in febricitantibus compescenda nunc quoque agimus, quam in primis, cum somno soporivae, qui adstrictus affectus est, sit contraria, merito laxum affectum esse dicemus, neque hoc profecto iniuria, esse videatur & a dolore, & a calore concitari, non tamen perseverat, nisi capitis humidum plurimum absumatur, unde medici omnes dixerunt, vigiliarum siccitatem, atque somni humiditatem esse propriam, quasi hic ab humiditate, & vigilia a siccitate semper fiat. Itaque medicamenta ad somnum excitandum adstricti generis esse oportebit. Cuiusmodi sunt potestate frigida, meatus densantia & repleantia, actu tamen tepida adhibenda erunt, nimirum, ut a calore citius actuentur, intusque vehantur. De internis vero, quae ad conciliandum somnum per os assumuntur, sunt aquae stillatae lactucae, solani, portulacae, fuscis aizoi, & similibus, quae dantur actu moderate calidae ab uncis duabus ad uncias quatuor. sunt etiam emulsiones seminum, melonis, cucumeris, cucurbitae, portulacae, lactucae, endiviae, sed omnium maxime seminum papaverum alborum, hoc medicamentum est admodum familiare, exhibetur lac ex aqua hordeacea aut ex iure pulli aquoso ad uncias quatuor, a cena post horam, vel paulo post, efficacius erit, si ex aqua lactucae vel solani lac seminum papaverum alborum exhibeatur. Aegyptij & Arabes fuere in usu medicamentorum somniferorum admodum audaces, siquidem dabant per os opium erui magnitudine quantitate vel per se solum a cena, vel ex aqua lactucae. alij myrrham ex eadem aqua, ad fabae magnitudinem, dissolutam exhibent. Alij hoc compositum habuerunt satis familiare, scilicet, quod accipit, meconij 3. i. styracis, myrrhae an. itidem 3. i. ex melle massam conficiunt, dantque trium cruorum magnitudinem.

rudinem dormituris. Verum enim verò ab horum usu, modo necessitas summa non urgeat, abstinendum erit, quoniam, ut recte Aurelianus animaduertit, ex horum quidem usu homines vigilēs facile ad lethargicum somnum deducuntur. Vnde mitiorum usus erit perpetuo obseruandus, nimirum quo ad somnum naturalem aegroti reducantur. Ex externis accommodatissimum erit aquae dulcis fluuiatilis tepida ex alto cadentis ad futuram coronalem stillicidium. hoc solo praesidio scimus multos vigilēs in somnum naturalem fuisse restitutos. addimus vulgo oxyrrhodina vocata, quae parantur ex aquis vel succis portulacae, rosarum, lactucae,unci, semperuiui, solani, & similibus. & ex oleis, vel rosaceo, vel violaceo, vel nenupharino, vel ex seminibus papauerum alborum, cum modico aceti, vel succi citri vel limonis ad penetrationem. (exempli gratia) parabitur oxyrrhodinum, ex aquae rosaceae, succi lactucae an. vnc. i. olei rosati ꝑnc. ii. aceti albi unc. 5. Misce, & tepidum fronti, & temporibus linea petia excipuleone uocato in oleo nenupharino dissoluto, tepido. hoc erit etiam valde uti-
le. Accipe olei de sem. papauer. alborum unc. 15. unguenti populeonis unc. i. ouorum albumina duo ex aqua prius conquassata & despumata, lactis muliebris unc. 5. Misce & tepidum fronti, & temporibus adhibeto. sonus aquae ex alto cadentis, atque illius murmur somnum conciliare solet. lotiones item ad pedes post cenam erunt utiles ex aqua dulci tepida, in qua chamamelum, lactucae folia, uitis germina, uel capita papauer. alborum ebullierint. si insuper eadem hora propinaueris lac seminum papauer. alborum ex aqua lactucae (uti nuper dictum est) efficacius, atque tutius somnum procurabis. Verum aliquando uigilia est morbus adstrictus, utpotè cum à sanguine, vel à bile in capite uel à calidis uaporibus ab infernis partibus delatis uigiles redduntur, quae uigilia comitem habebit delirium, quo adstrictus esse morbus dignoscetur. unde ad eam tollendam sanguinis uacuatio à cruribus scarificatis, uel ab haemorrhoidibus adhibitis hirudinibus, aut dorso & collo adhibitis cucurbitulis cum scarificatione, & tandem etiam sanguine à uenis capitis euacuato, scilicet à uenis post aures appositis hyrudinibus, aut à uena frontis, sed de hac ipsa in postremo libro agemus. At ad sincopen nunc accedimus, quae omnium consensu est preceptum virium omnium lapsus praesertimque uitalium, *ἐν λυοῖς* est leue animi deliquit, *ἀπὸ λυχίας*, & *λεπομίας*, malus & grauius, non tamen quod ad sudorem usque accedat, hoc enim syncopes est proprium, atque etiam refrigeratio. siquidem in ijs, qui syncopen tenentur, nullus ferè pulsus, atque respiratio apparet, omnisque sensus & motus sublati est, in facie pallor, extrema algent, & sudant, seu madent, in ipsisque ipsissima mortis imago conspicitur. Fit uero hic affectus eo toto immo-deratus profluente in quo uires subsistunt, uel sit calor innatus insitusque, uel humor primogenius solidarum partium cordis. itaque à quocunque calidum innatum, humoremque substantificum primigenium exolente dissipante exolenteque syncope causam habebit. Ipothymiam dicunt fieri, ubi spiritus uitales quocumque modo, uel dissipatione, uel suffocatione, uel corruptione, uel alteratione (ut humidum à solidis partibus (facultate usque adeo extincta, ut partes proprium extremarum partes, ferè extincto aut retracto calore, algent, extinctaque partium solidarum facultate centricae, humido profluente, sudant, madentue. Quis uero erit, qui syncopen haud laxum morbum esse fateatur? Neque est, quod innu-merae sint (ut dogmatici docent) occasiones, à quibus corpora in syncopen labun-
tur, tamen natura essentiae istius affectus tota laxa est, à qua praesidia adstrin-
gentia, densantia seu cohibentia dicta maxime indicantur, nimirum ut prohi-
beatur,

Gal. 1. ad Glau.
cap. 14.

beat, quo minus totus calor nativus exhalet, atque profluat, simulque & calidum innatum. Vnde frigida aqua asperguntur syncope detenti. nares ipsorum comprehenduntur, ipsisque naribus odorata offerunt, ut acetum rosarum, aqua stillatitia rosarum, myrtus, atque alij odores roborantes, vinum aromaticum olfactu recreat vires, si verò aperte hunc affectum subsecutum esse profluuium vel sanguinis vel excrementorum cognoscatur, cohibere illas fluxiones simul debemus. præterea vinculis dolorosis deligamus artus, perfricamus asperis pannis, aliquando vinum odoratum cum aqua concedimus, vel bucellam panis in eo tinctam offerimus, vel eandem succo granatorum acidorum imbutam si immodica inedia præcesserit. dandum & vinum erit (modo non sit quod prohibeat, scilicet, aut vehemens adsit capitis dolor, aut viscus fuerit aliquod inflammatum, aut mentem turbans aliquis affectus, vel febris ardens adprime maligna sit) & iuscula pingua pullorum gallinaceorum copiosius erunt offerenda, vel cremor ptisanæ, vel hydromeli. Macellarius Campi sancti Petri cum in quadagesimæ hebdomada sancta duos integros dies ieiunasset, in syncopen exitalem incidit, ad quem accersitus, cum os clausum dentibus teneret, instrumento ferro ore aperto, cum nihil aliud adesset, paulatim vinum aromaticum deglutendum dabatur, & mox ius pulli gallinacei, quod cum multis vicibus copiosum illi fuisset exhibitum, confertim vomitu excitato vomuit complura, quæ omnino & calore & substantia viscum Damascenum æmulabantur, quo statim conualuit. itaque primo incipiente syncope, frigida aspergenda, præsertim si modicum sanguinis vel excrementorum profluuium sequatur, aut caloris æstus, aut longiorem moram in calido balneo, vel ex immodica vel ira, vel gaudio vel risu fiat. odorata erunt offerenda, nares tractandæ, & postea artus deligandi, fricandique erunt etiam asperis pannis, ad hoc, ut calor retractus attrahatur, si enim suapte natura fortis sit intus roboratus ad extimas erumpit, si debilis verò sit, unde timor sit, ne extinguatur, frictionibus, & ligaturis & huiusmodi alijs erit attrahendus ad extimas partes. At de horum affectuum curatione alias accuratius tractabimus.

*De profluio sanguinis, de sudore, de vomitu, ventrisque fluxu
atque de vrina immoderatus profluente, cohibendis. Cap. X.*

SI sanguis profluat vel ex naribus, vel ex ore, vel ex vesica, vel ex ventre vel ex hæmorrhoidibus, vel denique ex utero, videndum erit, si critice exeat, vel symptomatice: critice ipsum emanare cognoscimus, ubi iam concocto morbo apparuerit, scilicet iam conspectis signis coctionis in vrinis atque in alijs excrementis, à quo febris aut omnino tollitur, aut maxima ex parte, symptomaticæ levantur, quam (licet immodica videatur sanguinis euacuatio) egrotante facile ferunt. Nos alias in nobismetipsis sanguinis hæmorrhagiam ex ore in qua ultra quinque libras sanguinis profluxerat, criticam fuisse febremque quartanam, quæ multos menses perdurauerat, iudicasse, eo argumento cognouimus, quoniam facile eam tulimus, atque molestissima siti, à qua antea semper exarsimus, fuimus liberati, vnàque & febris postea ex toto sublata fuerit. itaque si critica fluxio sit, erit permittenda, quinimo si imperfecta videatur, eam nos augere oportebit prædijs laxatorijs, scilicet, aut lauacris, aut suffitibus laxatorijs. Vbi verò sanguis immoderatus emanauerit, in morbo crudo, à quo neque morbus alleviatur, ægerrimeque ægrotus eam vacationem, tulerit, ne in syncopen corpus

corpus delabatur, statim medicamentis adstrictorijs fluxio erit cohibenda. extrema valide ligantur, aqua frigida cum aceto misto aspergatur frons & tota facies, fronti temporibusque densantia emplastra adhibeantur, cataplasmata scilicet ex bolo armenio, vel ex sanguine draconis, vel ex gypso, & ex albumine oui, vel cum succo plâtaginis, equiseti, rubi, mali granaci, aut cum similibus alijs. de his verò singulis morbis profluëtibz laxiusve posterius accurate acturi sumus, scilicet posteaquam curationem singulorum omnium morborum adstrictorum absoluerimus. Pauca ad hæc eadem symptomata nobis hic dixisse sat erit, quando ibi ex professo de iisdem accuratius denuo acturi simus. Eodem itidem modo immoderati sudores, maximeque non ex natura, sed ex vi morbi erumpentes, adstrictorijs opus habent. Quomodo verò & sudores & aliæ singulæ excretiones criticæ, idest, iuuantes, deprehendantur à symptomaticis distinctæ, nos in libris de prælagenda vita & morte ægotantium abhinc annos plures euulgatis, satis congrue tradidimus. Itaque ad sudores cohibendos, cutis meatus (vt & Gal. docet) erunt adstringendi. In ipsis itaque erunt leuanda operimenta, aereque frigido ægroti erunt recreandi, somnus multus hoc negotium iuuabit, puluereque rerum adstringentium scilicet myrti, rosarum, equiseti, corticum granatorum, & similibus corpus aspergatur, vel facies posca frigida itidem aspergenda, vel frigida aqua. cibus siccusque humidus sit oportet, & vinum nigrum adstringens si morbus ipsum permittat. Ad vomitum verò assiduam, ex quo sæpius ægroti cibum vllum continere nequeunt, iisdem adstringentibus cum per os deuoratis, tum exterius stomacho admotis vtendum erit. quæ ex simplicibus erunt fomenta ex vino nigro austero spongia excepta atque apposita & maxime si vinum fuerit alteratū, gallis tritis vel acacia orientali, vel hypocistide, vel balaustio, vel rosis, vel abinthio, vel similibus alijs. cataplasmatibus modo apposita efficax est pulpa cytonij, in aceto decocta, cum puluere acaciæ, balaustiorum, mastiches, vel gummi Arabici dabitur et per os mica panis tosta, vino nigro austero imbuta, vel ex vino granatorum, vel ex succo cytoniorum. iuuabit itidem efficaciter, si acaciæ orientalis, vel hypocistidis, vel mespili immaturi siccati puluerizati, vel myrtillorum drachma trita ex vino ante cibum per aliquot horas exhibeatur. Quomodo verò venter laxus & profluens cohibeatur, & vrinæ profluuium itidem tollatur, posterius (vt dictum est) docebimus. Ad aluum cohibendam eadem vtilia erunt, quæ & vomitum cohibere firmareque apta nata sunt, externa toti ventri admovebuntur, clysteres adstringentes ex decocto foliorum, vel florum, vel succi acaciæ Egyptiæ, vel rubi, vel balaustiorum, vel gallarum, vel nucum cypressi, aut equiseti, aut prunorum syluestrium, vel aliorum similibus adstringentium, & ex succis conueniet succus plantaginis, vel equiseti, vel menthæ, vel similibus. & ex oleis, rosaceum omphacinum, myrtinum atque melinum. Ad vrinam verò profluentem firmandam sudor copiosus ad diuertendam materiam à vesica erit maxime opportunus: præterea, præter epithemata, cataplasmataque & vnguenta cum refrigerantia tum adstringentia, maxime opportunus erit vsus aquæ ferratæ, atque illius in qua ebullierint folia plantaginis, solani, equiseti, rubi, poligoni, & fructus adstringentes, cuiusmodi sunt rhibes, oxiacanthæ, pruna item syluestria, pyra syluestria, mespilus saronia siccus, setoniaque immaturus & similes alij fructus adstringentes.

In lib. 7. cap. 2.
In 1. ad Glanc.
cap. 14.

De dolore

De dolore oris ventriculi, quem cardiagliam Græci vocant, quod symptoma solet esse familiare in febribus biliosis intermittentibus, potissimumq; in tertianis atque semitertianis. Caput XI.

Solet in febribus tertianis, ac semitertianis vocatis familiariter dolor in ore ventriculi excitari, vel angor quidam cum anxietate, nausea, & vomitu bilioforum acrium excrementorum; a quo ægroti subleuantur. & plerunque fit, ut accessiones hoc symptomate inuadant, & nunquam finiantur, nisi multa copia eorundem acrium bilioforum excrementorum fuerit per vomitum excreta & quandoque etiam per ventrem. Quo apparet hunc affectum (quem cardiagliam Græci appellarunt) cum cholera vocata passione maximè conuenire. de quo affectu accuratius agemus in ultimo libro in capite de cholera. Fit cardiaglia (ut dictū est) familiariter in febribus tertianis & semitertianis, quæ in æstius calidioribus vagantur. Quarum proprium hoc symptoma esse videtur, quod nimirum humores febrem facientes ad stomachum è venoso genere confluant, atque criticam excretionem faciant, febrisque accessionem finiant. De hoc affectu pauca hic obiter perstrinximus, quod accuratius à nobis agendum sit in ultimo libro istius operis, in quo de morborum mixtorum ex laxo & ex adstricto curatione sermonem instituemus. Hoc vnum dicemus, hunc affectum maiori ex parte esse adstrictum, licet aliquando simul etiam in ipso laxa passio ita vrgeat, ut & in magnos angores & fastidia, & in sincopen etiam exitialem non raro ægroti labantur. Omnes quidem medici principio laxatorijs vtuntur, vomitorijsque præsertim, ut vomitiones faciliorentur. Vnde alij exhibent aquam simplicem calidam, aut hordeaceam, aut cum althea, vel fenugreco decoctam; aliquando modicum vel acetum vel syrupi acetosi permiscentes. Alij ius pulli parui sine sale cum syrupo acetofo, & alij hydrelæum calidum, alijque oleum dulce calidum vel amygdalinum propinant, exterius etiam ad cardiogmum compescendum inungunt os ventriculi oleo amygdalino, aut chamæmelino, aut rofaceo calido. & plerique stomachum laxari, quam adstringi oportere ad facilitandam humoris excretionem merito existimarunt.

Finis Libri Sexti.

PROSPER

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER SEPTIMVS.

De phlegmonis internis adstrictorum morborum genere comprehensio esse agendum, & primum partes corporis, quæ solent eo morbo tentari, in medium afferuntur. Cap. I.



LX morbis adstrictis, post febres, phlegmonæ succedunt tractandæ, cum ipsas etiam adstrictos affectus esse neminem lateat. Ab internis verò exordiemur, de quibus in hoc libro agemus, & postea de externis. Sed priusquam singularum partium inflammationum curationem tractemus, quædam vniuersalia primum considerabimus, maximè ad inflammationum, phlegmonumue notitiâ facientia. primû (quod plurimum ad propositum nostrum nostrumque ad institutum faciet) nos particularim omnium partium inflammationum notitiam medicinæ studiosis trademus. Quam profecto cognitionem pauci vel nulli hactenus exacte tradidisse visi sunt, præsertimque earum, quæ in partibus sensus experibus fieri solent. nulli (vt animaduertimus) de his exacte scripserunt. Præstabit tamen prius quam rem hanc parcius complectamur, vt in primis partes omnes nostri corporis quæ inflammarî solent, probè cognoscamus: & postea, quid sit phlegmone, quoruplex sit, & à quibus causis oboriatur, dicamus. atque terrio de signis, quibus interna viscera inflammata nobis innotescunt, accuratius agamus. Quibus præmissis, de singularum inflammationum curatione sermone habebimus. Nunc ad partes corporis cognoscendas accedamus, quæ phlegmonis deprehendi, & vexari solent. Quarum, vt à capite exordiamur, prima erit cerebrum, eiusque membranæ, quæ sæpius inflammationibus peruaduntur, cuiusmodi est phrenitis, & lethargus; aurium quoque internæ partes & oris maximeq; glandulæ siue tonsillæ vocatæ, sæpe phlegmone vexari solent, non minus quam gula, guttur, cordis pericardium, pulmones, pleura membrana, muscoli intercostales, dicti, diaphragma, stomachus, eiusque os, pancreas, mesenterium, seu meseræum, & mesocolon, omentum siue epiploon, peritonæum, hepar, lien, vena porta, vena caua, & reliquæ venæ, & arteriæ; intestina quoque, quorum ileon vocatum exitiali phlegmoni est obnoxium; uasa vretera, renes, vesica, atq; uterus. sæpe itidem phlegmone vexari solent. Phlegmonum verò quædam proprijs nominibus uocantur, ut phrenitis, lethargus; angina, pleuritis; peripneumonia: quædam à partibus inflammatis dicuntur, ut aurium inflammatio, faucium, uulæ, tonsillarum, œsophagidiaphragmatis, musculorum intercostalium, pleuræ membranæ. (unde Græcis pleuritis) stomachi, hepatis atque aliarum nuperime dictarum partium. sed hisce propositis, nunc ad ipsarum inflammationum cognitionem descendamus. Itaque in primis quid sit phlegmone inflammatione

Dd

matione dicemus, quotuplicisque sit differentiæ, tertio ipsarum generationis notitiam complectemur, atque demum de ijs dignoscendis accurate agemus.

Quid phlegmone sit, & quibus differentijs interstinguatur, quomodoque generetur. Cap. II.

*Gal in 1. prog.
com. 27.
In 1. ad Glauc.
cap. 15.*

*Galen in lib. 13.
meth. med. c. 1.
Galen. in 2. ad
Glauc. cap. 1.*

*Gal. in de diffi-
cult. resp. cap. 5.*

*Galen. 13. meth.
cap. 2.
cap. 9.*

*In li de iniqua-
li intemp. cap. 3.*

EX affectibus nostri corporis, quem Græci φλεγμονήν, Latini inflammationem appellarunt, esse affectum calidum & siccum, quo qui uexantur, ueluti peruri, succendi, ignisque ab antiquioribus medicis proditum sit non est, medicorum qui ignoret. Phlegmonē autem (inquit Galenus) id est inflammationes, à ueteribus uocabantur, quæ sunt ueluti phlogoseis, id est inflamina uel incensiones: à iunioribus autem non omnes, neq; enim herpetas, neq; erysipelatas neq; tale aliquid inflammationibus annumerant, sed uni tantum affectui ex calidis, qui fit cum tumore duro, atque dolore pulsaili, hoc nomen accommodant, ex quibus per inflammatioem, duplicem affectum antiquos intellexisse constat, scilicet unum calidum & siccum morbum absque ullo humore concitatum, quem Græci φλογωσεν appellarunt, qui nihil aliud erit, quam simplex intemperies ignea, qua partes corporis ueluti peruri, atque igniri uidentur: atque alterum esse eundem affectum cum humoris præsentia, quem proprie Græci phlegmonen merito dixerunt, huncque ab altero quippè à phlogosi distingui, quod cum tumore, doloreque pulsatorio fiat: atque hæc est prima inflammationis differentia, secundum quam, hanc quidem humidam, hanc verò siccam esse contingit, humidam quidem, quæ ex calida fluxione membrum occupante contingit: siccam verò, quando nullo humore influente calor naturalis ignescit. Hanc etiam ueluti alicuius partis quandam particularem febrem esse deprehenditur, morbusque est plane simplex, atque immaterialis. Phlegmonē verò & ipsa calidus quidem affectus est, cum tumore atque dolore, aliquando pulsatorio, non tamen semper, vel ipsa tumor est, calidus, dolorosus. Hæc verò phlegmonē, quod ex humoris fluxione fiant, varijs quoque ex humorum varietate differentijs mutuo interstinguuntur, quando aliæ ex simplici puroque sanguine fiant, quæ idcirco proprie sunt, & simpliciter phlegmonæ dicuntur, ab alijs sanguineæ itidem ab humore vocatæ: aliæ biliosæ, ut vera cum phrenitis, tum pleuritis est: aliæque ut herpetes, erysipelata. Quædam verò ex sanguine impense calido & crasso fiunt, quas carbunculos medici appellant. quædam verò non ex simplici sanguine, at alijs humoribus mixto generantur. & phlegmonæ vocantur ab humore, qui sanguini mixtus fuerit, unde si ex sanguine cum bilis mixtione inflammatio excitecur, phlegmonē, siue inflammatio erysipelatodes dicitur, & quæ ex pituitæ mixtione oedematodes. Itaque phlegmonæ omnes ita à iunioribus medicis vocatæ (quando, uti dictum est, inflammationem phlogosin Græcis dictam, non Hippocrates solum, sed omnes ferè alij, qui ante Erasistratum fuerunt, phlegmonen nominarint) calidi tumores sunt, cum calore præternaturali, & dolore, & quandoque etiam cum rubore, quod in externis facile comprehenditur. Rubescit verò ubi ex sanguine vel simplici, uel impense calido & crasso fit. Flauescit in erysipelate & phlegmonē erysipelatode; nigrescit, si ex sanguine permixto melancholico humori; & albescit, si ex pituita, uti est phlegmonē oedematodes. Omnis uerò phlegmonē ex humoris fluxione generatur, quæ fluxio fit ad partes corporis imbecilliores, debilioresue, ex partibus robustioribus humorem demandantibus, scilicet partibus vel ab humoris qualitate molesta aut à quantitate ad protrudendum humorem concitatis. Quomodo verò phlegmonē ab eo confluxu humoris fiat, hisce verbis Galenus nobis exprestit, dicens: Quippè calida fluxio ubi in musculum

musculum procubuit, primum maiores arteriae venaeque opplentur ac distenduntur, ab ijs minores, atque ita res procedit donec ad minimas sit peruentum. In ijs ubi valenter impacta fluxio est, nec amplius contineri potest, partim eius per ipsarum ora, partim per tunicas colatum foras transmittitur, tum vero spacia ipsa vacua, quae inter prima sunt corpora, fluxione implentur. sic omnia ex humore omni ex parte incalescunt, ac perfunduntur. ea sunt, nervi, ligamenta, membranae, caro ipsa: Antequam haec arteriae & venae, quae scilicet & primae, & praeter cetera vario dolore afficiuntur. Quippe interius a fluxione, tum excalescunt, tum distenduntur ac diuelluntur. Exterius non modo excalescunt, sed etiam premuntur, ac degaudentur. Sanguine igitur optimo, si de vera phlegmone loquamur (ait iridem Galenus) ac mediocrem crassitudinem habente ad particulam aliquam vniuersim fluente, atque ob multitudinem conculcato, vehemens dolor arripit hominem nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit: pulsusque in profundo molestus accidit, tendique omnia, ac contundi membrum apparet, & vehementem calorem persentit, adeo, ut comburi videatur, & refrigerari desideret. talisque rubor per summa viget, qualis ex balneis aduenit, aut ex igne aut quouis alio modo calefactis. Atque haec est phlegmonum generatio. Variarum vero sunt, ex vario humore, vel simplici vel mixto, tum ex varijs partibus, quae inflammantur: haecenus quid phlegmone sit, ostendimus, quod duplex sit, atque quomodo in qualibet parte corporis generatur, nunc superest, ut de ipsius cognitione agamus.

In 2. libro ad
Glaucum. cap. 1.

De phlegmonum cognitione in communi, & primum de phlogosis interna cognoscenda signis. Cap. III.

Cum dixerimus phlegmonum nomine duo deprehendi, quippe flammeum affectum, calidum nempe & siccum simplicissimum absque ulla praesentia humoris quem Graeci φλογωσιν appellarunt, atque alterum affectum sanè calidum cum tumore. Quo nomine nos comprehendere eos omnes affectus volumus qui sunt a fluxione humorum, vel suapte natura calidorum, cuiusmodi est vera phlegmone, erysipelas, herpes & similes alij. vel etsi natura frigidi sint, qui putredine vel calidorum humorum permixtione incalescunt. De harum igitur phlegmonum cognitione acturi, primo signa proponemus quibus phlogoses internae nobis innotescant. deinceps, quibus signis nos calidos tumores, qui verae phlegmonae sunt, deprehendamus: tertio quomodo internos itidem tumores, quos cunque & abscessus cognoscere possimus, accurate perscrutabimur. Quod igitur ad primum attinet, nimirum, ut phlogosim in corpore adesse cognoscamus, signa huiusce siccæ phlegmones accurate & proponere & considerare debemus. Quae si accendatur in partibus corporis sensu praeditis, haec profecto erunt: scilicet in parte inflammata aderit summum caloris incendium, siue calor intensissimus erit, una cum dolore, ab ijs non dissimile, quos igne usti sentiunt. febrisque accendetur ardens continua, equalis, colliquans, planè ei, quam patiuntur igne usti, similis. si uiscus internum, quod similem phlegmonem patitur, sit nobile, breui moriuntur, si ignobile & a principibus remotum, diu uiuunt, sed ad tabem deducuntur. Accedit etiam, quod si affecta pars ex principibus sit, perpetuo, ubi uehemens sit inflammatio, aut totum corpus aut saltem extremae partes refrigerantur, diuque frigidae manent. Itaque si ex internis partibus caua iecoris pars phlogosim (exempli gratia) patiatur, necessario aderit intensa caliditas primo in dextro hypochondrio iuxta hepatis regionem, quae postea etiam uentriculo communicabitur, aderit etiam dolor circa dextrum hypochondrium sub

ad 2 costis

In lib. de ineq-
temperie.

In 6 epid. sect. 1.
cap. 2. a

Gal in 2. de loc.
affect. cap. 7.

Gal. in 2. de cri-
sb. cap. 10.

Galen. 2. de loc.
affect. cap. 7.

Gal. in 2. de loc.
affect. cap. 5.

In lib. 4. de loc.
affect. cap. 8.

costis præsertim spurijs, acutus absque ullo tumore sed tra-ctu temporis hypochon-
drium tenditur. & febris ardens accedet cum siti inextinguibili, & si inflamma-
tio sit vehemens, aderit itidem magnus calor æstus, atque frigiditas in extre-
mis partibus. Itaque hæc signis haud iniuria, interna inflammatio nobis signi-
ficabitur. Cæterum si in aliqua parte ex ijs quæ aut nullum sensum, vel ipsum
maximè hebetem habent, cuiusmodi sunt pulmones, cerebri substantia, pancreas
mesereon, mesocolon, epiploon, siue omentum, & similes partes, phlogosis exci-
tabitur, nullus vel maximè hebes sensus in ea parte & calor & doloris perci-
pietur, tamen febris accedet lenta hecticis similis, quæ corpora colliquantur & con-
turbescunt. & colliquamenta cum in fecibus tum in urinis apparent, quod signu
sanè fiet, atque obseruabitur ex inflammatis partibus etiam sensibilibus nõ prin-
cipibus, si diu inflammatio durauerit. sed transeamus ad phlegmonem, quæ
non sola est ignea intemperies, sed habet humorem coniunctum, quum Galenus
statuit esse inæqualem intemperiem cum affluxu humoris; vnde necessario hæc
cum partis tumore est, atque dolore seu cum tristi quadam sensatione: tumores
dolorosos phlegmonum esse proprios ex Hippocrate Galenus tradidit. sed age
de signis, ad eas deprehendendas agamus. In partibus externis facile cognoscu-
tur, cum partibus inflammatis necessario contingat, vt rubescant, loquimur
de vera phlegmone quæ ex puro sanguine fit, tendantur, renitentur, intumescant,
& doleant. Ita vt præter phlogosim partes inflammata & dolorem & tumorem
necessario habere debeant. Harum atque aliarum etiam cuiuslibet generis in vi-
sceribus ipsorumque partibus concitatarum, haud facilis erit cognitio, omniumque
maximè illarum quæ in partibus aut hebetem sensum aut nullum habentibus,
fiunt. Nos verò plurimum laborabimus, vt eas proprijs signis internoſcamus.
Itaque, vt rem ipsam aggrediamur, in partibus internis phlegmone obsessis, aut
dolor sanè manifestus, qui in sensu præditis percipitur, aut aliquis saltem obscu-
rus, & vix apparens, qui aliquando tactu, parte inflammata compressa, depre-
henditur. Quod ad ipsum dolorem pertinet, nimirum in partibus sensu præditis,
constat varias dolorum species ex varijs partibus excitari ac deprehendi. Nam-
que si phlegmone arterias notatu dignas opprimat, aut partem in qua sint plu-
res arteriæ, sitque notatu digna inflammatio, dolor cum pulsu sentietur, quem
merito pulsatorium omnes appellant, nisi phlegmone transierit ad suppuratio-
nem, quando in parte etiam suppurationem habente dolor pulsatorius fiat. si ve-
rò membranas phlegmone deprehenderit, dolor si ab humore acuto, punctorius,
& si à puro sanguine distendens erit, etiam inflammati nerui, arteriæ atque vene
dolorem per longitudinem tensionum patiuntur. dolor aliquando deprehenditur
veluti palo fixus, qualis in vrteribus atque in renibus apparet. verumenim-
verò huiusmodi dolores, si inflammatio levis sit, leues; si fortis, fortes sentientur.
præsertimque in partibus maxime sensibilibus, vti est os ventriculi. Obscuros ve-
rò nonnunquam phlegmonæ licet sint vehementes in partibus hebetem sensum
habentibus concitare solent. Quorum alij graues sunt, cuiusmodi existunt qui
pulmones opprimunt, hepar, renes, adenes, lienem, cutem, membranamque cuti
substratam. Pulmones nunquam dolore vehementi cruciantur, verum quandam
grauitatis sensum, & aliquando extensionem quandam vel ad os pectoris vel ad
spinam prouenientem ægotantes sentire, Galenus tradidit. Aliquando enim si
substantia ipsorum inflammationem patiatur, membrana eos circumuoluens
grauatur atque distenditur. eodem modo & hepatis carnosâ substantia, lienis,
renum, adenumque phlegmone grauata fit dolor grauis cum distensione quadam,
si verò horum viscerum, præsertimque hepatis, vasa, vel tunica inflammetur,
sentiant dolores acutos. Cæterum ex ijs partibus inflammatis satis aperte dolo-
res, qui oboriuntur, deprehendi circumscribere possunt, at alijs partibus nullo
sensu

sensu aut obscurissimo præditis phlegmone obsessis, etiam notatu digna non ni-
 si magna cum difficultate deprehendi possunt. Atque hinc fit, ut prouincia in
 hisce partibus (quas alias diximus esse pancreas, epiploon siue omentum, mese-
 raum, mesocolum partes inter musculos ventris interiacentes) phlegmonas, tu-
 mores, atque abscessus cognoscendi sit difficillima. Quo medicos alioquin eru-
 ditissimos, sepius nullam de interna phlegmone, quæ tamen quampiam prædi-
 ctarum partium tenebat, suspicionem habentes, illa postea ab erumpente vel
 pure vel sanguine deprehensa, deceptos fuisse, haud mirum est. Ex quibus ple-
 risque creditum est, internas phlegmonas, abscessusque in pancrea, meserao, me-
 ocolo, & omento neutiquam deprehendi posse. Verum si horum affectuum co-
 gnitio quæpiam haberi poterit, ab his quidem & non ab alijs signis assequemur,
 quod nimirum (licet aperte neque dolor neque tumor vsquam in corpore sentia-
 tur conspicuus) ægroti quendam grauem sensum, aut angustiam, aut pondus
 in ventre vel in hypochondrijs sentire animaduertant, quem molestum sensum
 longe manifestius sensu tactus percipiunt & animaduertunt, si digitis accurate
 rotus venter comprimatur, non tamen admodum valide, at leuiter quidem, sen-
 simque ac sensum venter erit comprimendus: præter hoc aderit febris continua,
 non admodum vehemens, quæ initio horroribus inuasit, & quæ etiam plærunki
 horrores inordinatos habet, præsertimque, si fluxio renouetur, aut affectus ad
 suppurationem transeat. adde pulsus inæquales veluti ferrantes, non tamen mul-
 tum duos animaduerti, respiratio verò quadantenus inæqualis atque impedita
 erit. At de his nunc obiter, quando de singulis nunc longe accuratior à nobis
 sermo sit futurus. Itaque ex præmissis constat phlegmonas internas cognosci pri-
 mo ex doloribus, aut saltem à quodam sensu in parte inflammata molesto, vel
 grauitatis, vel distensionis vel angustiae, qui aliquando non nisi viscerum accu-
 rata compressione deprehenditur. Secundum signum erit in aliqua parte ventris
 durities, quæ digiti compressu maxime percipitur, de qua auctor Coacorum præ-
 sagiorum dixit: Durities circa ventrem cum dolore in febribus horrificis, egro-
 cibos auersante, & alio parum soluta, siquidem non expurgantur, ad suppurationem
 veniunt. Tertium signum ex rigore vel ex horrore assumitur. Phlegmone
 quidem deprehensi principio rigent, aut horrent, aut refrigerantur, nimirum hu-
 more acri aut salso, aut acido à venis protruso sensibiles partes lædente, quo mi-
 rum non est, si cum horroribus inordinatis febres quoque accedant. Cuius sanè
 signi rationem Desiderius Iacotius Medicus olim eruditissimus in Coacorum præ-
 sagiorum commentarijs perbelle ita expressit, dicens: Horrificas autem febres
 Hippocrates vocat non intermittentes, sed symptomaticas, & phlegmonum in-
 teriorum proprias. Quibus horror duobus modis superuenire consuevit, vno pro-
 pter exacerbationem, quam habent, & interdum typum à varia putredine hu-
 moris, cuius pars in venis continetur, pars extra venas iam collecta est, & intra
 abscessum. Vnde Hippoc. in lib. de vict. ratione agens, meminit frigoris pedum.
 Altero ratione ipsius phlegmones, idque tripliciter, initio quidem fluxionis ad
 interiora, quæ habitum corporis refrigerat, & inæqualis spirituum calorisque
 natiui ad viscera contractionis causa est. deinde concepto iam abscessu ad suppu-
 rationem tendente: quo tempore suppurans vapor per morsum rigorem concitat,
 aut ad suppurandum congregatus calor in reliquis membris horrorem parit. Po-
 stremo sanie effusa, & membranas vellicante. ex quo Hippocrates effecit, horro-
 rem, qui sine ratione inuadit vnà cum febre, inflammationis interioris notam
 esse, & suppurationis. Hæc Iacotius: quibus sanè comprehenditur, quomodo ri-
 gor atque horror solent esse nota interioris phlegmones. Pulsus quoque inæqua-
 lis, vulgo ferrans & ferrinus ab inæqualitate cum quadam duritie dictus, aliquid
 vibrationis præseferens, phlegmones interioris indicium confirmabit. Respiratio
 itidem

In lib. 3. sect. 2.
 tex 34.

Hipp. in 1. epid.
 1. tex. 23.

Gal. de pulsib. ad
 Tyr. cap. 11.

itidem in omnibus inflammationibus difficilis obseruatur. frequens enim spiritus in ijs semper est, & magnus etiam (nisi dolor vrgeat, teneatq; quampiam ex partibus respirationi seruiētib; tunc enim paruus & creber fit.) Vbi verò phlegmone fuerit, vel in pancrea, vel in mesenteræo, vel in omento vel in adenibus, respiratio quidem cum angustia erit & crebra & non parua. hisce omnibus signis additur febris quoque continua, quasdam exacerbationes habens, at non semper, quoniam nisi humoris ad partem inflammatam fluxio renouetur, neq; ad suppurationem inflammatio venerit, nullus rigor vel horror, ab initio ad finem vsque obseruabitur. atque hæc de phlegmonum cognitione in communi nobis sufficiant, nunc singularum particularem & noticiam & curationem dicemus.

De medicamentis ad phlegmonas internas, & primo de illarum, quæ phlogoses seu inflamina dicuntur, curatione. Cap. IV.

In lib. 13. meth.
med. cap.

PHlegmonas simplices, quæ in sola caliditate siccitateque partem veluti perurente, inflammanteue constitutæ sunt, in corporibus concitari ex Hippocrate ac ex alijs antiquis medicis à nobis nuper demonstratum est, hancque inflammationis speciem Græcos phlogosim appellauisse. Verumenimvero, huiusmodi inflammationem raro exquisitam (nimirum quæ intemperies simplex calida siccaque sit, nullo humoris confluxu accedente) obseruari solet, & tantummodo per initia. loquor de ijs, quæ effatu dignæ sunt. Etenim in his singulis cum pars inflammata & vehementer doleat, & vehementer incaleat, diu absq; humoris fluxione esse non poterit, nam, vt & Galenus docuit, calor atque dolor sunt causæ præcipuæ phlegmonum materialium. siquidem ex dolore atque ex calore humores ad partem inflammatam attrahuntur. vnde phlogosis exquisita si magna vehemensue sit, diu exquisita manere non poterit, nam ex dolore caloreque sanguine attracto tumorosa phlegmone euadet. si verò non magna sit, vel si magna, partes sensu hebetes, vel non sentientes occupet, poterit quidem exquisita & simplex seruari, cum sublato partis sensu humoris fluxio non sit futura. Phlogosis, si quampiam ex nobilibus partibus occupat, vehemensque sit, profectò morbus erit & acutissimus, & maximè periculosus. Ad quem quidem affectum (quod & ipse morbus adstrictus sit magnus & pro curatione laxatoria præsidia indicabit magna) conueniet quamprimum sanguinis euacuatio tantumquam magnum laxatorium, aut vena secta, aut scarificatis cruribus, aut adhibitis cum incisione cucurbitulis, antequam verò medici eam moliantur, alius clystere mollitorio erit laxanda. & sanguinis copia ex viribus, atque ex morbi magnitudine metienda erit. per os conuenient aquæ stillariæ ex herbis facultate frigidis, actu tamen calidæ exhibitæ. Dabitur decoctum paratum in aqua ex folijs maluæ, altheæ, violæ, endiuie atque ex seminibus itidem maluæ, altheæ, portulacæ, melonis, endiuie & similibus. Nisi febris vehemens sit poterit per os exhiberi actu calidū lac asininū, aut equinū aut deniq; caprinum, camelinū, si haberi poterit, omnium erit maximè ad hoc negocium accomodatum, dabitur ad vncias quatuor calidum. Balnea aquæ dulcis calidæ erunt vtilia. eximis partibus, si iuxta ipsas subsit phlogosis, vtiliter adhibebuntur fomenta itidem ex decocto altheæ, maluarum, funci, fænugræci, hordei, temperate quidem calida. Epithemata ex simplici aqua tepida, vel ex alterata nuper dictis simplicibus medicamentis. Victus ratio erit humida, potestateque non calefaciens, vt prifsana hordeacea cum lacte seminum melonis & saccharo candido. aut lac ipsum seminum maluarum

maluarum, altheæ, melonis, cucumeris, portulacæ cum modico panis triti dissoluti, saccharoque candido. Potus erit aqua hordeacea, vel stillatitia, cichoreæ, ex folijs vel endiuic, vel boraginis cum modico sacchari, vel iulep, vel syrupi violati, clysteres, nisi alius sponte laxa sit, saltem alternis diebus mollitorij erunt iniiciendi. At ad phlogoses cum tumore, persanandas declinemus, quæ cum plures sint, scilicet, cerebri, cuiusmodi est phrenitis, lethargus, aurium, gulæ, & gutturis, stomachi, hepatis, lienis, intestinorum præsertimque ilei vocati, venarum atque arteriarum effaru dignarum, renum, vesicæ, vteri; pleuræ membranæ & musculorum intercostalium, vt pleuritis, pulmonum peripneumonitis dicta, diaphragmatis, cordisque pericardij: nunc de ijs agamus, quæ cerebrum seu caput occupant.

De phrenitidis curatione. Cap. V.

Am ad phlegmonas accedimus persanandas, quas, cum tumore etiam fiant, merito inter morbos adstrictos adnumeramus. In quibus tractandis, ab ijs, quæ capitis partes vexant, exordiri libuit. Harum verò præcipuæ sunt, quæ cerebrum, ipsiusque membranas occupant, cuiusmodi est phrenitis, lethargus, & phlegmone cerebri, ex Paulo, atque Demelmaoi Egyptiorum. Quarum quidem nunc medica præsidia tractabimus, à phrenitide exordientes; quam omnes affectum esse intelligunt, in quo φρένα, idest, mentem læsam deprehendunt. Aurelianus putat phrenitim dictam fuisse à difficultate mentis, vt dysuria à difficultate urinæ. Galenus ait: μάλινθαι siquidem, idest insanire omnes homines dicunt eos, qui desipiunt citra febrem; φρενιτιζαν verò, qui cum febre id patiuntur. Quod verò in febris vehementis vigore accidit, appellant & παρακρίλας, & παραχρήνας, & παραληρήσας, & παραφρονήσας: Phrenitim verò non appellant, nisi febriat eger & continuè deliret; Quo merito plerique Dogmaticorum definiunt hunc affectum, quod sit delirium perpetuum cum febre assidua. Erophylus, esse vehementem delirationem cum febre desinentem in breuem interitum tradidit. & Aurelianus inquit esse celerem mentis alienationem cum febre acuta, atque manuum vano errore, vt aliquid suis digitis phrenitici atrectare videantur, quod Græci Crocydismon, siue carphologiam vocant, & paruo pulsu acenso, siue crebro. Plures quidem notæ ad phrenitidem veram cognoscendam, quæ, vt aiunt omnes, cerebro primario affectu læso oboritur, à medicis animaduertuntur, quibus & cognoscitur, & ab ijs quæ aliunde ab infernis partibus excitantur, distinguitur. Inter has verò (vt dictum est) præcipuæ sunt, delirij, febrisque continuitas. Itaq; omnium medicorum sententia in phrenitide febris est assidua, sed id propriij habere videtur, quod in partibus extimis non ita acuta & evidens deprehenditur. Delirium verò magnum est quandoque ad læsam imaginationem, quandoque ad memoriam, quandoque ad discursum, & nonnunquā ad hæc omnes facultates læsas pertinet, quod & quandoque cum risu, cantu & similibus fit, & quandoque (vt ait Hippocrates) cum studio seu contentione, & nonnunquam cum effreni, ferocique operatione. Plerunque solet in phreniticis obseruari manuum gesticulatio, floccorumque & festucarum collectio, quæ deliramenta Aurelianus vocat carphologyam & Crocydismon. Vnde auctor libri medici vocati Galeno attributi dicebat: Phrenitidis notæ sunt infania vehemens, temeraria manuum gesticulatio, floccorum, & festucarum collectio & febris acuta, pulsus in ijs est paruus, creber, atque durus, facies rubra, itemque oculi, & calidi, respiratio magna, hypochondria haud in principio tenduntur, sed postea, quibus distinguitur ab illa amentia, quæ septo transuerso (phrenem

Gal. in 1. proreth.
4.
In 1. lib. oxenim.
In 1. proreth.
com. 1.

C. Astr. 1. oxenim.
cap. 3.

Gal. in 5. de loc.
affect. cap. 4.
In 6. aphor. 53.

(phrenem Græci vocant) laeso oboritur, in qua neque facies, neque oculi incallescunt, neque rubescunt; & respiratio est inæqualis, statimque morbi principio hypochondria tensa apparent. Urinæ solent quandoque coloratae & quandoque tenues & decolores observari: plerumque verò in principio in ipsis suspensum veluti in circulum elatum videri solet, quod & Aurelianus animadvertit; atque hisce notis cuique phrenitis innotescet. Dogmatici dicunt hunc affectum excitari à cerebri, eiusque involucri (quas membranas Græci meningas appellant) phlegmone, aut ex sanguine, aut ex bile flava, aut ex vsta effecta. Quo Hippocrates merito dixerat: Desipientias quasdam esse cum risu, scilicet quæ à sanguine, & quasdam cum studio, quippe à bile, & quasdam, ut expressit Galenus, cum temeritate, ab eadem retorrida bile obortas. Aurelianus inter Methodicos magni nominis medicus phrenitim à strictura fieri, quam postea tumoris nomine expressit. Quam sententiam ab omnibus quidem Methodicis confirmatum iri, haud fore dubitandum putamus, cum omnes phlegmonæ ad morbum adstrictum referantur. Quo non sine magno errore Aurelianus in 1. libro oxeon affirmasse, phrenitim fieri quandoque à solutione, credidimus. ita is habet: Nos verò aliam dicimus esse ex strictura, aliam ex complexione stricturæ atque solutionis, quod postea quoque sæpius confirmavit. perinde ac si dixerit, phrenitim aliam esse morbum adstrictum, atque aliam, laxum. Quæ opinio plane à veritate abhorret, si quidem verum sit, omnem phrenitim, fieri ex phlegmone in cerebro & in membranis, nullamque ab evacuatione. Neque est, quod dicat: At si adiuncta fuerit stricturæ solutio, ut aut venter fluens aut sudores esse videantur, quoniam phrenitis nunquam ex aliqua evacuatione, licet immoderata sit, vires plurimum resoluens, fieri potest, namque nullus, etsi immoderatus resoluatur, phreniticus (etsi possit quidem delirare) esse poterit, cum necessario ad hunc affectum faciendum humor requiratur tumor, atque obstructionem faciens, ut ipsemet Aurelianus non negavit. quem affectum vocat stricturam corpulentam atque calidam. Non negamus tamen phrenitidis, quæ est morbus adstrictus, posse coniungi morbum laxum, cuiusmodi sunt sudores albedui, fluores ventris & similes alij affectus. Non tamen hi phreniticam alienationem faciunt. Cognitis huiusce morbi causis, præstabit, antequam ad medicamenta, quibus phrenitici sanantur, declinemus, nos prænovisse, quales phrenitides sint sanabiles, & quales curationem non admittant. Tamen si phrenitis omnis, quod princeps sedes cerebri sit affecta, exitialis habeatur. Hippocrates, quæ cum risu sunt, securiores fecit. Gal. verò in commento dixit, nullam desipientiam secum esse, sed quæ cum risu sit esse minus periculosa. Minus malum est, si delirium non vehemens sit, & ægroti dormiant, à somnoque in peius non abeant, longeq; melius si à somno minus delirent & quietiores reddantur, si hæmorrhagia copiosa in die decretorio apparuerit, vel sudor copiosus, præcipue si ex capite multus & calidus fluxerit, sudante simul reliquo corpore. his enim evacuationibus phreniticis aliquando iudicari Galenus tradidit. Phrenitis verò contrario modo se habens summopere formidanda, & plerumque lethalis erit, quippe illa, in qua delirium præterquam est continuum, etiam vehemens itidem sit, & omnium maxime effrene atq; ferinum si fuerit, cum assiduis vigilijs, vel si somnum habeant vehementiusque eos vexat. At non solum ferinum est exitiale sed aliquando quod obscurum est & blandum videtur, ut auctor prorrheticorum expressit. & Galenus in commento dixit, hæc phrenitides esse summe exitiales, & fieri aut quia statim habent coniunctam comam, de quibus Hippocrates in epidemijs ait: Nullus phreniticorum vehementer insanivit, veluti in alijs usu venit. sed alia quadam veteruola ad somnum inclinatione capite grauati peribant. aut quia virtus

In 1. oxeon. c. 9.
Cap. 15.

Cap. 7.
Cap. 9.

In cap. 9.

Cap. 9.

Gal. in 1. progn.
24.
In 6. aphor. 53.

In 3. de crifib.
cap. 3.

Hipp. in 2. aph.
2.
In 1. prorrh. 33.
In 3. epid. sect. 3.
tex. 45.

Virtus summe languet, & quasi hecticam desipientiam Galenus vocandam existimauit: illæ desipientiæ etiam in principio, atque hæc postea apparent. phrenitidis verò generationem ita expressit: Phrenitide igitur ipsa ex bilioso succo generationem habente, cum is in cerebro decubuerit, principio quidem qualitate ipsius nondum toti cerebri corpori permista, confusaque, tumultuose fiunt desipientiæ. procedente verò tempore simile quippiam contrahitur lanis, quæ à tinctoribus appellatis tincturam accipiunt. Nempe & hæc vix eluibiles redduntur, non secus, quam quæ proprium ab initio colorem habent. Talis igitur cerebri veluti tinctura desipientiam hecticam habet, atque ob id affectio horum, vt febrium hecticarum, praua est, quas quidem cum incipiunt constitui, vix solui, exquissite verò constitutas, absolutasque solui non amplius posse demonstrauimus. Vtroque modo facta exitialis est, quo recte dicebat auctor prorrheticorum: Tremulæ, obscuræ, blandæque & contrectabiles desipientiæ valde phreneticæ. Vbi verò phrenitici maxime inquieti sunt, anxij, iactabundique, plurimum est timendum, non minus quoque periculi esse intelligemus, vbi vrinæ albæ & perspicuæ erunt, albæque itidem feces si excernantur. De illis Hippocrates scripsit: Quibus vrinæ albæ perspicuæ, malæ, præsertim si in phreniticis appareant. & Galenus dixit: Nullum vidi phreniticum, in quo talis vrina apparuisset, seruatum. De deiectionibus verò albis itidem iudicium fieri oportet. Quod auctor prorrheticorum ita expressit: phreniticis alba deiectio mala est. cum quibus excrementis rigor si apparuerit, erit pessimus, atque ab ipso sanguinis è naribus stillæ exitium prænunciant, non minus quam faciant sudores, alui fluores & omnes aliæ vacuationes, præsertimque si & ipsæ haud bonæ fuerint. Accedit manuum gesticulatio, de qua et Hippocrates ait: Qui in febre acuta, aut in phrenitide, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus ob os fert, aut frustra venatur muscas, aut colligit festucas, aut de veste euellit pilos, aut de pariete stipulas carpit, id omne malum, exitialeque est. Si verò in phreniticis postea vel tremores, vel conuulsiones apparuerint, agrotos certo morituros prædicemus, videntur enim hæc symptomata esse exitialium phrenitidum propria. De tremoribus in prorrheticis ita scriptum est: Phrenitica vehementer tremencia finiuntur. Galenus verò ait: Non autem phrenitici omnes tremorem incurrunt, sed qui deterime habent. & de conuulsionibus Galenus itidem dixit: succedit maxime exitiali phrenitidi, nec sanatum quempiam ira conuulsorum aut ipse vidi, aut alium narrantem audiui. Quare & singulus ob id, vt Aurelianus etiam notauit, erunt in phreniticis pessimi. Vnum aliud Aurelianus addidit, eam phrenitidem esse lethalem, quæ in febricitantibus post primum diatrium fit, eaque præsertim ratione quod tunc vires prædebilitas vexet. At his præcognitis, opportunum erit ad huius phlegmones curationem accedere. In qua primum viuendi ratio instituatur, quæ erit, vt a groto collocentur in aere quidem temperate calido & humido, lucido, nõ obscuro, quod talis aer conducat ad omnes adstrictos affectus, atque hunc aerem laudauit inter Dogmaticos Asclepiades medicus, decumbant præterea in lectulo molli, pluresque sint ad illorum curam, sin minus fieri potest, arcte ligentur ad cubilis partes, somnũ procurent, hilares quoad fieri potest, quietique maneant. Quo non paucis visum fuit, phreniticos non harmonia atque musica (vt aliquibus videbatur) reuocari posse: iram, atque excandescentiã fugiant. Cibus sit actu calidus & humidus, tenuis, paucus, bis in die datus. cuiusmodi erit cremor prisanæ, panis item in iure tenui aquosoque coctus, vel lac seminum melonis, cucumeris, papauerum alborum, cum modico panis parato: potus sit aqua ex hordeo decocta cum saccharo, vel stillatitia actu tepida; à vino omni planè abstinentum. si aluus adstricta sit, clysteribus mollitorijs laxetur, scilicet ijs, qui parantur ex decocto maluarum, althææ, violarum, ex oleo vel dulci communi, vel

Ec violaceo,

1. prorrh. tex. 33

in lib. 4. aphor. tex. 72.

Gal. in 1. prorrh. com. 13.

In 1. prognosticorum tex. 23.

1. prorrh. tex. 9.

in comm. 16.

In lib. 13. meth. med. cap. 8.

violaceo, melle rosaceo, atque modico salis, vel sint ex cremore pilanæ hordeaceæ, oleo atque saccharo & modico salis: quæ alio emollita statim ita indicante morbi adstricti magnitudine atque viribus permittentibus, secta vena iecora-
ria primum, & mox cephalica, mittatur ea copia sanguinis, quam vires per-
mittent, quæ euacuatio statim in principio facienda erit. Vnde Aurelianus me-
rito dixit faciendam intra diatrium aut in ipso diatrilo. Egyptij maximè pro-
ficuam agnoscunt esse sanguinis copiosam euacuationem, quæ fit cruribus scarifi-
catis, eo modo, quem nos in libris de medicina Egyptiorum aliàs docuimus.
Non pauci sunt qui sanguifugis hæmorrhoidibus apposis sanguinem euacuant,
post hæc communes sanguinis vacuationes, ita magnitudine morbi suadente,
existenteque virium robore, aliæ ad capitis partes (capite prius raso) particula-
res sanguinis euacuationes cum ab antiquis tum à recentioribus medicis commen-
dantur, ut capitis partes tumentes magis laxentur. Vnde hirudines sæpius ad ve-
nas retro aures positas adhibent, idque semel vel bis in die, modicum sanguinis
euacuando, summa cum vtilitate secta vena frontis sanguis mittitur. Aureli-
anus capiti quatuor cucurbitulas cum modica flamma adhibendas censuit, à qui-
bus si pars erubuerit, erit leuiter scarificanda, modiceque sanguis detrahendus.
Quas etiam adhibebat cum scarificatione (morbo indicante maius laxamentum)
precordijs, pubi, coxendicibus, atque alijs ex infernis partibus: verum in tem-
pore, quo sint adhibendæ, deceptus est, qui postea & non in principio adhibendas
consulerit, cum principio ad reuellendum huiusmodi præsidia hæc vsui veniant,
& postea, quæ à parte affecta euacuant, his præmissis euacuationibus, capiti appo-
nende sunt spongiæ ex aqua calida expressæ, & aliquando ex oleo dulci calido, quo
partes fouendæ erunt: frictiones ad totum corpus cum inunctione conuenient, ad
strictum enim corpus laxant. At perseverante phrenitico affectu, si fieri potest,
vitandum erit stillicidium bis in die ex aqua dulci temperata spacio vnius horæ.
Oxyrrhodina temperata, actu calida capiti apposita ex oleo dulci & modico ac-
ti ad penetrationem, iuuant, sed actu frigida improbantur, cum adstrictum au-
geant, digestionemque humoris impediunt, flammæque calorem intus cohi-
beant, augeantque non iniuria affectionem adstrictam. Dogmatici plura me-
dicamenta adhibebunt ex herbarum succis, & aquis, cuiusmodi est aizoi, poly-
goni, portulacæ, nymphæ, lactucæ & similibus, oleisque & vnguentis potestate
frigidis, quæ non sine errore actu frigida nonnulli adhibere solent, si actu calida
adhibeantur, minus malum est, sed vsus assiduus frigidatum facile phreniticum in
lethargum, qui maius malum est, mutat. Quare præstat cum Methodicis me-
dicis utilitantibus, ut humores stricturam facientes exhalent, digeranturque
Itaque (vtri dictum est) stillicidium ad futuram carnalem ex dulci aqua modice
calida vtilissimum erit, quosdam vidimus solo hoc præsidio prudentes euasisse.
fomenta quoque ex aqua, in qua malua, althea, fenugræcum & similia ebulli-
erint, spongia excepta & adhibita moderate calida, erunt vtilia, item ex oleo dul-
ci amygdalino calido apposita. Iuuabunt ouium, vel castratorum pulmones
statim ex animali extracti, & calidi capiti impositi, item pulli gallinæ medio
illorum animalium plurimum facit ad humorem intra capitis membranas ad-
strictum digerendum, atque ad eas partes adstrictas laxandas. longe plura
medicamenta scio ab alijs inuenta, sed hæc à nobis proposita, tutò phreniticos
qui sanari queunt, pristinæ valetudini restituere, apta erunt.

De medi-

De medicamentis ad alias phlegmonas cerebri, sed praesertim ad eam quam Aegyptij Demelmaoi appellant.
Caput. VI.

Cerebrum phlegmone vexatum saepe, ut aliqui veterum medicorum cognouerunt ita intumescit, ut capitis futura distendantur, dolorque eos vexat maximus, diuturnus, angor, rubor multus in facie, cum tumore molli, oculi sunt emissi, atque caput inturgescit. Quandoque etiam cerebrum erysipelate vexari deprehensum est, in ijs caput vniuersum dolore vexatur, adeo ut flammis vrideatur, os siccescit, valde siccum, facies tamen subpallida atque frigida est. Ad hos omnes praemisso clystere mollitorio, ex oleo violato, saccharo, vel melle rosaceo, & ex decocto maluarum, violarum, mercurialisque parato, sanguis mittendus erit primo ex vena, modo plenitudo adsit, vel ex cephalica, & postea secta vena frontis, utile erit etiam adimere sanguinem cucurbitulis cum scarificatione capitis partibus adhibitis, collo & spatulis, simili modo non spernenda erit sanguinis euacuatio sanguifugis apposis hœmorrhoidibus. Quibus praemissis vacuationibus, omnia tentanda erunt capitalia medicamenta, quæ ad phrenitum a nobis in altero capite praescripta fuerunt. Huic phlegmoni capitis similis videtur esse morbus, qui singulis fere annis Aegypti populos campsinos ventis spirantibus in prima estate diuexat, aliquando non minorem stragem faciens, quam si magna pestilentia esset, hoc enim affectu, quem Demelmaoi Aegyptij appellant, innumeri repente eodem tempore moriuntur. Nosque ipsum in magna Cayri ciuitate epidemice anno 1583. Mense Maio, grassantem obseruauimus, innumeri enim tunc temporis per vniuersam ciuitatem quasi repentina morte moriebantur. In ijs praecedit capitis dolor cum vigilia per aliquot dies ante non admodum grauis & postea in altero angulorum oculorum interno exilis quidam tumor rubens efflorescens apparet, quasi exinde erysipelas sit futurum, qui tumor paulo post, spacio quippe duarum aut trium horarum ad plus intro recurrit, atque euanesceat: a quo fere continuo homines obmutescunt, atque manibus delira facientes apoplecticorum modo extinguuntur. Hoc genus morbi excitari ab humore praesignti putredine quasi veneno exitiissimo reddito, apud omnes medicos Aegyptios constat. Huiusmodi vero excellens putredo ab aeris (per multos dies ventis ex meridie summe calidis, quos campsinos vocant, spirantibus) immodico estu fit, atque etiam quia humores in Aegyptiorum corporibus exuperantes (ob ipsorum prauam victus rationem) magnam ad vehementer putrescendum aptitudinem habentes, ex aeris illo estuoso calore summe computrescunt. Galeanus quoque fatetur ab intensa aeris caliditate tantam putredinem humores nasci posse, ut exinde pestilentia fieri queat. quod vero ex ambientis estuoso calore caput maxime incalefactum ledatur, quippe obeam causam quasi a calore attracti humores ex corpore vniuerso in caput delati, exitialem phlegmonem faciunt, omnes medici, antequam tumor in interno angulo oculorum conspiciatur, statim praemisso clystere laxatorio, secta vena dextri cubiti interna primum sanguinem mittunt ad minus ad libram, & altera die ex altero brachio eandem vacuationem repetunt. In mulieribus, eunuchis atque pueris mittunt sanguinem a scarificatis cruribus, vtilissima quoque est postea repetita sanguinis euacuatio adhibitis cucurbitulis cum scarificatione dorso & spatulis: etiam secta vena cephalica, post sectionem internam, repetunt educationem sanguinis, si modo vires permittant, quibus praemissis euacuationibus balneum vaporarium ingressi sudare eos iubent atque ex calida aqua lauari. Aliqui post sanguinis euacuationem, in balneo deuorato decocto ex dulci ligno liquiritiae & modico seminum

Ec 2 feniculorum

Paul. in li. 3. c. 7

In lib. 2. de diff. feb.

feniculorum parato, vomere plurimum coguntur, per vomitumque expurgati per horam sudant. Quæ præsidia statim, incipiente dolore capitis, adhibita, plures à morbo præseruant.

De medicamentis ad lethargicos. Cap. VII.

C. Auvel. 2. oxeb.
cap. 1.
Gal. in 3. de loc.
affect. c. 5. & lib.
de diff. sympt.
cap. 3.

Paul. li. 3. cap. 9

In lib. 4. com. 1.
sec. 16. et 17. ..

Auvel. 2. oxcon.
cap. 6.
Gal. 4. de caus.
pulsuum. 6. 13.

Lethargum antiqui vocarunt ἀπὸ τῆς λήθης & ἀγνῆς quasi iners obliuio, cum in ipso marcor & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas deprehendatur. Methodici strictionem vocant vehementem: Dogmatici esse continuum soporem cum obliuione, amentia, atque cum febre assidua dixerunt. symptomaque idcirco esse facultatum animalium deprehenditur, namque (vt Galenus docuit) memoria, ratio, atque etiam imaginatio læditur infirmaue redditur. Memoria verò plusquam aliæ animales facultates læditur in lethargicis. Quo cerebrum itidem lædi (dicant quicquid velint Methodici) cum animalium facultatum sit sedes, omnibus planè constabit. vnde Dogmatici merito dicunt hunc affectum esse delirium itidem (vt de phrenitide dictum est) continuum, cum febre, sopore atque obliuione. lethargici omnium, veluti amentes, obliuiscuntur, alto sopore tenentur, eosque concomitatur febris lenta assidua, non impense acris. Pulsus in ipsis magni, rarique sunt & vndosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo premuntur, à quo ægre possunt excitari, & quocunque modo excitentur, vix respondent, obliuiosi, mente capiti, oscitant crebro & hianti ore aliquando persistunt, tanquam claudere id obliui, deiiciunt per aluum complures liquidiora, nonnullis contra venter inarescit; urinam reddunt iumentorum plorificiora, ex ipsis quidam tremiscunt, & vndiquaque desudant. De lethargicorum symptomatibus, quæ tum affectum concomitantur, tum quæ postea sequuntur, Hippocrates in Coacis prælagijs ita scripsit: lethargici manibus intermiscentes, somniculosi, male colorati, subrumidi, pulsu segni, quæ sunt sub oculis inflatis & sudores superueniunt, & alui tumet biliosis & meris. sin obaridas habent vrina & alui excrementa exeunt præter voluntatem, vrina veluti iumentorum est, potu non expetunt, neque aliud quicquid postquam resipuerint, collu dolorosum se habere dicunt & sonitus per aures trāsire. In quo affectu perpetuo somniculosi sunt, obliuiosi, male colorati, subrumidi, neque potu neque quicquid expetentes; his superuenit aliquando sudor & aliquando alia excretio. Archigenes & Possidonius voluit in hoc earum partium, quæ in hypochondrijs sunt, fieri viderunt. Aurelianus voluit in hoc affectu totum corpus esse affectum, sed principaliter caput; nulli dubium est, fieri verum lethargum læso capite; primario affectu ex pituitoso humore cerebrum, eiusque membranas obsidente: aut à pituita etiam inibi putrescente. Non raro in febribus pituitosis circa accessiones fieri obseruamus hunc affectum à vaporibus & infernis partibus in caput sublatis, at hic non est assiduus affectus, sed per accessiones potius sunt somniculosi & obliuiosi. Methodici affectum idcirco esse adstrictum exinde dixerunt, quod nimirum cerebri membranæ in tumore constitutæ sint, atque in viarum densitate constrictæ. Affectus plerumque lethalis est. Galenus ait, esse hunc morbum longe lethaliorem peripneumonia, quæ phrenitidi superuenit, & omnium maximè iudicatur lethalis, quod nimirum fiat refrigerato propter innati caloris resolutionem cerebro. lethalis etiam esse solet hic affectus, qui vel sudore superueniente, vel alio plura excernente, vel aliqua alia excretionem apparente, non minuitur. sed his præmissis ad curationem instituendam nunc descendimus. in qua illud primum attenditur, vt lethargici in loco lucido, calido, reponantur, victusque itidem tenuis actu calidus atque humidus instituat, à vino abstineant (quod non nisi virium manutenedarum causa,

causa, ocligophorum seu pauciferum, vel aqua dilutum conceditur) huius loco aqua cum modico cinnamomi decocta ipsis concedatur, vel aquosa carnum iura. Omni studio, si immoderatus somno premanur, erunt expurgandi, primo clamoribus, mox aliqua dolorifica attractione. & cum hic affectus sit perinde ac phrenitis morbus adstrictus, ideo isdem est opus medicamentis laxatorijs. Neque est, quod Methodicis aliqui obijciant, curam debere esse multum differentem ab ea quæ sit in phrenitidis, cum in his omnes ferè admiserint vsum medicamentorum refrigerantium, & in lethargis calefacientium. Dictum profecto est, etiam in phrenitico affectu summe calido convenire balnea temperate calida, ex aqua dulci parata, nunquam frigida; stillicidia etiam aut ex eadè aqua vel ex oleis, quæ licet potestate frigida sint, tamen cum actu calida exhibeantur, potius modice calefacere quam refrigerare fateri oportebit, si verum est, quod Galenus sapius de aqua & de alijs medicamentis potestate frigidis memorat prodidit, quippe hæc si actu calida adhibeantur calefacere. neque credendum est hæc intra corpus recepta recipere refrigerandi facultatem, cum calor partium laserum & natiuus, & externus scilicet inflammatorius, vel febrilis nunquam permittat medicamentum refrigerare. Quod medici proxim exercentes quotidie observant in vsum medicamentorum refrigerantium ad calidos morbos externos adhibendorum, quandoquidem cum emplastra, tum epithemata, actu frigida partibus adhibita, iubent sapius mutari, quoniam quæ diu adherent, incalescunt, atque idcirco deinceps etiam incalescunt, itaque multo magis Dogmatici concedent in lethargo vsum habere calida medicamenta, cum summe calidorum vsum omnes Dogmatici etiam admittant, & in medendo affectent. Mirum itaque haud erit, si etiam ad lethargum opus sit medicamentis laxatorijs, quo magnitudine passionis ita indicante virumque robore permittente, nimirum ubi vehementer sit phlegmone, aditque febris etiam magna, omnes sanè & Dogmatici vtuntur sanguinis missione tanquam præsidio laxatorio magno, cucurbitulisque non minus cum scarificatione ad occiput, & ad dorsum, atque ad crurum partes, aliquando etiam capitis partibus sanguilugis appositis sanguinem euacuant. venis & retro aures & fronti vtiliter hirudines (si opus sit copiosiori sanguinis vacatione) poterunt adhiberi. Clysteres quoque, si alius adstricta sit, laxatorij vtiliter erunt, cum simplices (scilicet ex oleo, melle, & decocto maluarum, mercurialis, betæ, fursurum) tum compositi purgatorii, cuiusmodi erunt, qui parantur, accipiendo (exempli gratia decocti maluarum, mercurialis, betæ, centaurij minoris libram, mellis simplicis, vel rosati, atque olei communis singulorum vncias tres electuarij len. vnciam, & diaphæniconis drachmas tres. vsum veniunt etiam caput purgia, scilicet errhina, apophlegmatismata, nimirum ad pituitam ex capite purgandam. vnde Paulus dicebat: os vngi oportere, & palatum ex detrimento sinapi cum mellis momento, conarique oportere pituitam indidem affixam digitis eijcere. ad idem etiam apophlegmatismi vsum erit opportunus ex oxymelite cum hysopo, aut pulegio, aut origano, aut cum ipso quoque sinapi paratus. Neque Aurelianus hæc quod vehementer calida acra sint vlllo pacto reprehendere debuerat, cum ipsa vt laxantia purgatoria & vt metasyncritica conueniant. At quid? an non vsum vehementer calidorum lethargicis, vt omnes Dogmatici medendo observant, vtilis esse deprehenditur? Siquidem ex oleo dissolutum castoreum, sinapi, origanum, pulegium, peucedanum & similia maxime accomodata huic affectui fere ab omnibus cognita sunt. Dogmaticis quidem, quoniam indicentur ab humoris phlegmonem facientis frigiditate, atque crassitie, si fortis fuerit inflammatio, atque cum ea febris quoque vehemens neque in viam etiam Dogmaticorum ea medicamenta acra (quod & inflammationem & febre augere queant) vtilia esse poterunt, at ex oleo mista, remissa ipsorum caliditate

In 1. lib. simpl.

Gal in lib. 13. meth. cap. 31.

In lib. 3. cap. 9.

ditate ad laxantium naturam accedent, atque idcirco hæc laxantia conuenienter deraſo capiti adhibita, atque etiam naribus obiecta. Aurelianus verò damnauit uſum odoratorum, & maxime fetentium, quod repleant caput ſtructuramque augeant. At hæc ex modico aceto mixta, naribus admoueri poſſunt, quod humorem in capite adſtrictum extenuando, digerendoque capitis adſtrictas & denſatas vias laxent, laxatoriorumque idcirco genere & ipſa comprehendere oportere nos aliàs oſtendimus. Oxyrrhodinorum verò uſum, quem in iſtius morbi principio, omnes ferè ſectæ dogmaticæ ſequuntur, meritò à Methodicis non minus in lethargo quam in phrenitide etiam damnantur, ſiquidem cum ſint adſtringentia vel frigida, à capitis cute ad affectas partes humores & vapores impingunt, Quo nos aliàs animaduertimus nunquam in partibus nobilibus, in viſceribus proximis eſſe, utendum repellentibus medicamentis. Demum ad uniuerſum corpus lenes frictiones, & inunctiones ad ipſum ſanè corpus laxandum viles erunt, ad rarefaciendosque meatus, cutis, per quos humores, exhalantibus, minus ipſorum copie ad cerebrum efferatur, atque hæc ſint dicta de lethargo. cum verò ſepius phlegmonæ aurium internas partes, haud cum paruo periculo diuexant, de medicamentis ad eas perſanandas quoque à nobis in præſentia eſt agendum.

De medicamentis ad internas aurium phlegmonas.

Caput. III.

Aurium partes internas, ſcilicet in meatu auditorio neruum non ex longo ſpacio cerebri copulatum, atque tenuem cartilaginem, ſæpe cum ingenti dolore atque febre vexari ſæpiſſime deprehendimus, & non abſque multo egrotantium vitæ discrimine; ita, ut plures & deliri euadant, & conuulſi moriantur. ſigna harum phlegmonum ſunt, dolor acutus pulſatorius, & inſignis, ut ab eo ægroti moleſtiſſime agantur, & in periculum phrenitidis, atque ſpaſmi ſæpius proueantur, hunc dolorem concomitatur febris aſſidua, dolorque eſt firmus, fixus in parte, acutus, atque non ſine pulſu; quod ſi malum augeatur, delirium quoque cerebri vicinitate phreniticum fit, conuulſionesq; malo ad exitium veniente etiam apparent. Hunc morbum fieri ab humore acuto bilioſo, neruum atque membranā in aurium cavitatem poſitam inflammante. vnde meritò adſtrictus morbus eſt, vnde ad huius curationem laxantibus præſidijs erit opus. Sanatio verò eſt difficilis, & morbus lethalis, niſi humor in aure ſuppuretur. In omnibus ſanè qui euadunt, ſolet pus copioſum per aurem inflammata excerni, quod ni obſeruetur, periculum in malo augetur. Quod Hippocrates in prognosticis ita expreſſit: Aurium dolor acutus cum febre continua, ac vehementi difficilis eſt, periculum enim delirii abolitioniſque imminet. Natu minores ſeptimo die aut citius ab hoc morbo interimuntur, natu verò maiores tardius. Febris enim ac delirium minus eos infeſtant & aures in eis antea ſuppurantur. Quare ſi pus excernitur album in die critico, & ægroti alleuiantur, ſalutisque ſpes concipitur futura. Ne verò dolor delirium atque febrem faciat, medicamentis continuo erit occurrendum. primum itaque, ni aliud laxa erit, clyſter laxatorius erit iniiciendus, ſcilicet ex oleo, melle & decocto laxatorio communi (ſcilicet ex malua, althea, mercuriali, ſenugræco & ſimilibus) parato: quo excreto, ſecunda erit vena virium robore permittente vel interna, vel cephalica, vel vtraque in brachio ad aurem dolentem directe poſito, mittendusque erit ſanguis, ut affectus magnitudo expoſcere videbitur, atque virium robur permittet. In pueris primum ſcarificatis cruribus Ægyptiorum modo & poſtea adhibitis cum ſcarificatione

In iib. 3. lex. 13.

Tex. 14.

catione cucurbitulis sanguis mittendus erit. si malum perseverauerit, poterunt etiam hirudines venis post aures positae adhiberi, sed praesertim post aurem inflammata. haec quidem sanguinis euacuatio plurimum iuuabit. Qua praemissa sanguinis euacuatione ad topica medicamenta erit deueniendum. Vnde iuuabunt inunctiones ad omnes auri dolentis extimas partes, ex oleo amygdalino dulci, recenti, vel ex chamamelino, vel ex communi dulci repido, vel lilino, vel ex eo, in quo althea aut fœnugræcum, aut melilotus, aut semen lini ebullierit, calido auri fouebitur, & intra meatum auditorium idem calidum injicitur, vel hydreleo calido, vel butyro liquefacto, vel mulsæ partes circum aurem dolentem illinentur, vel spongia ipsæ oleis calidis imbuta & expressa utiliter totius auri externæ regioni adhibebitur. fomenta etiam ex decocto altheæ, maluarum, fœnugræci, lini, cymarum ebulli erunt accommodatissima: posteaquam verò pus effluerit, hydromel erit calidum injiciendum, diuque continuandum (vt pus effluat) quoad omnis morbi causa erit sublata. haud erunt in principio negligendæ frictiones deorsum versus in brachijs, dorso & cruribus factæ, & postea ad vniuersum corpus eadem fient, cum inunctione calida ex oleo amygdalino dulci, vt corpus totum diffletur, fuliginosique humores per poros cutis exhalent. Hæc enim impedita euacuatione, humores tenues fuliginosi intus clausi, necessario in caput deferuntur, malumque augebunt.

De vua, & glandularum iuxta linguam positarum phlegmone curanda. Cap. IX.

ORis partem, quæ gurgulio & vua & columella dicitur, sæpius inflammari & vehementer quidem inflammari, non est medicus, qui non obseruauerit, non minus etiam eas glandulas, quas Græci antiadas & latini tonsillas vocant, phlegmone frequenter ob ipsorum calidam humidamque naturam vexari, omnibus iudem notum esse non ignoramus. In qua nonnunquam tunica, nonnunquam subiecti muscoli patiuntur. Vua verò seu columellæ phlegmone, si quis aperto ore linguam comprimat, statim aperte ex tumore, rubore, dolore, deglutendi difficultate, cuique innotescet. Antiadarum verò phlegmonen ijs signis deprehendemus: scilicet, rubore itidem, tumoreque exterius apparente, seu duricie iuxta ipsas cum dolore, quæ aperte innotescunt, si digitis pars comprimatur: adest quin etiam transglutendi difficultas, & si malum ad gutturis partes propius accesserit, etiam respirandi difficultas. hanc inflammationem effatu dignam sequitur febris, quæ in inflammata vua non apparet, vel levis quidem. Vterque affectus cum morbus adstrictus sit, laxatorijs vtendum erit: dico vtendum esse laxatorijs vbi affectus perfectus sit, quo tempore humor maior ex parte ad partem inflammata defluxit. In principio verò, quo tempore humor fluit, non laxatorijs (quod nondum factus sit morbus adstrictus) sed adstrictorijs erit opus. Quamobrem tali tempore conuenient per os gargarismata adstringentia, vt fluxionem prohibeant, seu repellant. huiusmodi autem medicamenta erunt, aquæ stillatiuæ rosarum, plantaginis, lenticulæ palustris, polygoni, rubi, & similium, vel decocta in aqua parata ex prædictis herbis, cui decocto poterit permisceri syrupus aliquis adstrictoriæ facultatis, cuiusmodi erit, qui ex succo mororum paratur, ex rosis ficcis, ex granatis, atque ex myrto. aqua itaque conueniet pro gargarismate huiusmodi, quæ (exempli gratia) accipiet, aquæ plantaginis libram, syrupi de succo mororum (diamorrhonis vocati) vncias duas, at post principium erunt necessaria gargarismata laxatoria, quæ erunt ex decocto maluarum, violarum, altheæ, fœnugræci, caricarum pinguium, hordei, cum syrupis vel de

vel de glyziriza, vel violato, vel hydromele, vel similibus. exterius verò conuenient inunctiones calidæ ex oleis dulcibus laxatorijs, cuiusmodi est commune dulcissimum, amygdalinum itidem dulce, lilinum, irinum, & ex radice cucumeris syluestris, vel altheæ paratum. fomenta itidem ex decocto altheæ, meliloti, fenugræci seminis lini, spongia excepto & calido gulæ & extimis partibus apposito. hæc verò singula prædicta medicamenta non prius admovebuntur, quam præmisso clystere mollitorio, fuerit (ita requirente phlegmones magnitudine) sanguis euacuatus primo, aut secta vena interna dextri cubiti, aut scarificationis cruribus, & mox sectis venis sub lingua positis, scilicet morbo adhuc minime cedente. Principio conuenient frictiones extremorum ad humorem reuellendum, balnea ad pedes calida, in quibus bis in die ante cibum pedes immerguntur, quoadque plurimum rubescant, detineantur. Demum lenes frictiones fient, ex oleo calido dulci, ad omnes corporis partes, ut fuliginosorum excrementorum euacuatio per poros cutis adiuuetur. Victus ijs congruet tenuis, boni succi, modicus (cum plenus, & crassus tumentiam in corpore augeat) à vino etiam abstinebunt, cuius loco bibent ægroti, aquam hordei cum saccharo vel multisam dilutiorem.

De medicamentis ad gutturis phlegmonem, quam anginam vocant. Caput. X.

PHlegmonem gutturis fauciumque musculorum cum externorum tum internorum Græci synanchen, à suffocatione, quam inducit, appellant, latini vero anginam. iuxta verò varias faucium, gutturisque læsas partes, varijs nominibus Græci hunc affectum nominarunt: siquidem inflammatis gutturis musculis internis, σκυνάχην & externis παρασκυνάχην dixerunt. & faucium musculis itidem internis affectis σκυνάχην, & παρασκυνάχην externis. Compluribus synanchen, à canibus, lycanthen à lupis, atque à suis (qui & ipsi hoc malo vexari soleant) hyanchen, hunc affectum vocatum fuisse, visum est. cum verò angina omnis, (ea excepta, quæ cervicis vertebris (auctore Galeno) intro versus luxatisque, atque gutturis, fauciumque musculis vehementer siccatis sit) gutturis aut faucium musculis inflammatis oboriatur, necessario in ipsa hæc signa elucebunt, scilicet omnibus anginosi cum spirandi, tum deglutendi difficultas aderit, respirandi difficultas maior observabitur, gutturis musculis plus phlegmone vexatis, & deglutendi maior erit itidem difficultas gulæ musculis plus laborantibus. Primo itaque ab hoc affectu homines in spirandi & deglutendi difficultatem incidunt, cum gutturis vel faucium dolore atque febre. verum mentio vero synanche absque dolore quoque non raro fit à defluxu humoris pituitosi: in quam causam Asclepiades hunc affectum retulisse (cum ipse anginam rheumatismum esse voluerit) visus fuit. In omnibus sit deglutendi difficultas, maxima in gula inflammata, & minor (ut dictum quoque est) si guttur phlegmone vexetur. Quo fortasse non iniuria Soranus definiendo hunc affectum, dixit esse difficultatem transfluorandi cum acuta præfocatione, atque febre. Diuidunt aliqui hanc phlegmonem, in occultam, atque in apparentem: In hac depressa lingua apparet, tumor, & rubor, vel circa externas gutturis partes, in collo, sub mento, vel in ceruice, aut in pectore, atque hæc minoris est periculi. In ocula nunquam exterius, neque in oris partibus, neque in collo vel in alia parte tumor, & inflammatio conspicitur, atque hæc est summe exitialis. Alij triplicem faciunt, primam in faucibus, quæ non est periculosa, in qua lingua depressa, tumor apparet magnus, rubens in faucibus, istique difficulter deglutunt, difficultate respirant.

Gal in 4. de loc. affec. 3. & 4. aphor. com. 34. & in 4. de vit. est. acut. In 4. aph. com. 35. In 4. de loc. affec. cap. 5.

Gal. 4. aphorif. com. 34. Aurel. 3. exco. cap. 1.

respirant, atque difficulter idem loquuntur; absque febre, ni vehemens fuerit inflammatio. Altera in gula fit, quæ est periculosa, ni citò præsidia adhibeantur, in eaque tumor in gula, & in collo obseruatur, vix loquuntur, & summa cum difficultate, si vehemens sit, respirant, ceruicem torquere nequeunt. Tertia in gutture, quæ vel summas ipsius partes occupat, vel internas, quippè tracheæ arteriæ musculos, hæc verius synanche dicta est, quasi suffocatio, quod in hoc affectu suffocatio fit præcipua, veluti illius, quæ in gula est, transuorandi difficultas. In hac ipsa angina specie ægrotantes suffocantur, respiratio idcirco difficillima est, vnde recta ceruice spirant, at ingrauescente morbo supini iacent, cibus etiam, liquis guttur non pertransit, per nares effluit, pulsus est parvus, extremaque frigida. Quorum aliqui spacio horarum viginti quatuor suffocantur, alij tertia die intereunt. hæc summe exitialis esse creditur; minori verò cum periculo est, vbi vel in faucibus vel in collo, rubor & tumor erumpit, perseverat, atque augetur. Porro non perpetuo rubor atque tumor in faucibus, & in collo apparens salutem significat, aliquando enim eque internas atque externas gutturis partes vehemens phlegmone occupat. Quo merito Hippoc. de anginosa, qua interijt, ait: Tercio, rigor, febris acuta: tumor colli & pectoris ex vtraque parte subruber, durus: extrema frigida & liuida, spiritus sublimis, potus per nares effluebat, deuorare non valebat. At exitialis non erit, si tumores externi, & persisterint, & plurimum aucti fuerint de qua Hippoc. ait: Angina correpto si tumor appareat in collo, bonum, foras enim morbus existit, siquidem ex profundis & principalibus partibus morbos ad cutem transferri vtile est. Ab huiusmodi angina specie anno à Virginis partu MDCV. nos fuimus magnò cum vitæ discrimine vexati: in hac tumor sub mento tertia die exiens, dein plurimum auctus, quoad morbum resoluit, perseverans, me seruauit. Perpetuo summe exitialis est, vbi cum difficillima respiratione, deglutationeque ægroti, nullum externum tumorem habeat, de qua Hippocrates dixit: Angina grauissima est, accelerrime interimit, quæcunque nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit. Hunc morbum stricturem (ex tumore aut faucium aut gutturis in musculis adstrictum faciente) Methodici fecerunt. Quem concitare ex causis procatarticiis posse vomitum laboriosum, ebrietatem, vehementem exclamationem, niuis potationem, cibos acriores, violentam per elleborum album purgationem, & quæcunque alia quæ fluxionem, & rheumatismum mouere possunt, tradiderunt. Quando angina omnis fiat ab humorum fluxu, aut calidorum tenuiumque venas vel etiam subriles obstruentium, aut crassorum, scilicet pituitosorum, atque melancholicorum, quarum fluxio solet fauces atque spacia ampla occupare. In hoc morbo, qualiscunque sit, opportuna erunt præsidia omnia laxantia, inter quæ primum locum habebit phlebotomia; primum enim præmissis clystere laxatorio, secta vena interna cubiti, sanguis copiosior, permittente virium robore, euacuabitur. Qua facta sanguinis vacuatione, eaque corpore laxato, ni morbus cessarit, Hippocrates consulit, vt sectis venis duabus sub lingua positis, missio sanguinis repetatur. in me eo morbo vexato primum secui venam internam dextri cubiti, ex eaque sanguinis libram detraxi, & mox cucurbitulis sex adhibitis spatulis atque lumbis cum scarificatione iterum sanguis detractus est, qua euacuatione minime diminuta phlegmone, demum sectis venis sub lingua positis am-babus sanguis etiam ad libram fere eductus est, quo præsidio morbus ita diminutus est, vt in securam statum salutis fuerim (Deo optimo maximo laudato) restitutus. Aurelianus, si vehemens passio sit, citò ob celeritum laxamentum, phlebotomiam fieri voluit, laudauit non minus cucurbitulas collo, gutturi, atque ceruici cum scarificatione adhibitas. non minus etiam vtilem esse voluit, scarificationem linguæ, faucium, atque palati, quoniam, vt ille ait, locali sanguinis

Extractione

In 3. epid. com.
2. tex. 4.

In 6. aphor. 37.

In 3. prog. tex. 16.

In 3. oxon. c. 3.

detractione tumentia relaxantur, ex quo non recte ipsum venarum sub lingua positarum sectionem tantopere ab Hippocrate commendatam damnavisse nobis liquido constabit, incipiente statim phlegmone, seu (rectius ut dicam) fluxione ad faucium vel ad gutturis partes, adstringentium, repellentiumque usu erit opus. unde gargarismata ex aquis adstringentibus, vel decoctis ex medicamentis adstrictorijs paratis, erunt utilissima, utpote, quod partes roborent, quo minus humoris fluxum recipiant, ab ijsque partibus affectis ipsum humorem repellant. Quæ ex medicamentis adstringant, alias abunde ostendimus (exempli gratia) huiusmodi gargarisma erit opportunum, quod recipiet aquæ plantaginis vel polygoni, vel solatri, vel portulacæ, vel rosarum, aut similium libram, syrupi diamorrhonis uncias duas, vel quod accipit decocti foliorum plantaginis, portulacæ, cymarum rubi libram, syrupi myrtini, de rosis siccis singulorum unciam, aut sacchari rosati unciam & semis. Itaque fluxione incipiente, quo tempore nondum est perfecta phlegmone, adstringentium usus erit ad internas faucium gutturisque partes convenientissimus, vel decocta sint, vel aquæ stillantia, vel succi ex medicamentis adstringentibus expressi: cuiusmodi erunt, plantago, rosa damascena, polygonon, rubus, equisetum, myrti cum folia tum fructus, cichoreum, solanum, aizoon, balauustum, hypocistis, acacia & similia. Sed dices quamobrem in phlegmone, quæ morbus est adstrictus, usus adstringentium erit utilis? Nos alias ex Methodicorum placitis utile esse ostendimus, ut in phlegmonum principijs adstringentia, minimeque laxantia conveniant, eaque præsertim ratione, quod in principio, scilicet fluente humore nondum facta sit phlegmone, quæ est morbus adstrictus, at in perfecta phlegmone præmissa sanguinis vacuatione laxantia solummodo convenient cum interius tum exterius. In principio verò per interius gargarismata mediocriter adstringentia, repellentiaque utilem usum habebunt. Non tamen per exterius adhibenda erunt adstringentia, quod cum magno errore nonnulli huius temporis medici facere observantur, quinimo perpetuo in externis partibus laxantia convenient. adstringentia enim humorem compellendo intus internam phlegmonem adaugebunt. Unde gargarismata convenient ex decocto hordei, altheæ, fenugræci, lini, passularum & similium cum saccharo candido, vel syrupo de liquiritia, vel melle rosaceo simplicis infusionis. prædicta autem medicamenta in aqua parum ebullient, ut decoctum viscidum non reddatur, tepidumque adhibeatur. Aurelianus parabat hoc decoctum ex mulso, quo pro gargarismate utebatur. Exterius gulæ partibus convenient calidæ inunctiones ex dulci oleo, cuiusmodi est amygdalinum recens, irinum, lilinum. colloque & gutturi spongia vel ex aqua calida & oleo dulci, vel ex decocto altheæ, seminum lini, fenugræci & similium, fomenti modo adhibebuntur: in principio plurimum adiumenti erunt pedum lotiones ex aqua calida, quoad pedes rubescant, frictionesque partium extremarum. ac post principium præmissa vacuatione sanguinis ad totum corpus leues frictiones, & inunctiones calidæ ad uniuersum corporis habitum laxandum convenient. clysteres item laxativi utiles erunt ex decoctis herbarum laxatoriarum (cuiusmodi est malua, althea, mercurialis, fenugrecium, & linum, & beta) & ex oleo dulci, atque melle, vel ex saccharo, aut melle rosaceo parati. Victus tenuis, liquidus, temperate calidus, atque humidus conveniet. à vino abstinendum omnino, cuius loco aqua hordeata cum saccharo erit accommodata.

De medicamentis ad phlegmonen membrana costas
succingentis. Cap. XI.

Pleuritim affectum veteres dixerunt, à loco affecto, qui est membrana costas succingens, pleura Græcis dicta: Hippocrates morbum lateralem vocavit, quod latera vexet; nam ea membrana præcipue in hoc affectu patitur. licet etiam in costarum musculis internis hæc passio aliquando fiat, & aliquando in externis. sed hic affectus exquisita pleuritis non est, at spuria & notha vocata. sola enim membrana hæc ipsa patiente fit hic affectus. Veteres varijs modis hunc affectum definierunt, plerique verò dixerunt, esse dolorem vehementem interiorum lateris partium, cum febre acuta, atque tussi, cum qua variæ qualitatæ humor excluditur. Innoscit hæc ægritudo primo ex dolore oborto in altero thoracis latere, vel in utroque, aliquando vsque ad iugulum, vel ad spatulam perveniente, brachium (vt Aurelianus notavit) etiam attingente, vel inferius ad hypochondrium itidem perveniente, plerumque vni parti affixo, aut non stabili, in exquisita pleuritide punctorio, & in spuria tensivo: tussis quoque vna adest, & difficultas respirandi, cum sputorum excretionem; sputa verò aliquando cruenta, aliquando flava, vel pallida, aliquando pituitosa & aliquando nigra vel cruginosa apparent. Quæ plerumque quarta die conspici solent, & aliquando tardius. cum his omnibus adest febris acuta, continua, quæ solet alternis diebus accessionem habere. Pulsus durus, inæqualis suo percussu pressuram notans, in hoc morbo percipitur. Duplex est hic affectus, exquisitus, qui sectarum omnium consensu medicorum fit à phlegmone membranam costas subcingentem internam inuadente, à sanguine tenui bilioso facta: & non exquisitus, vbi à crudis, crassisque humoribus, non membranam (quando hi præ crassitie ipsam ob venarum angustiam in flammare nequeant) sed musculos intercostales internos, vel extrinsecos afficientibus, in ipsisque strictionem seu adstrictum affectum inducentibus. In hoc affectu dolor tenuius est, non ita acutus, neque febris ita acuta existit, vt in exquisita observatur, in qua dolor (vt etiam dictum est) punctorius, & vehemens percipitur. febrisque itidem acuta. Mirum est, quod Aurelianus & alij diarrhæam tamquam symptomata pleuriticorum meminerint, ex quo ipse putat, quandoque hunc morbum à fluxu fieri potuisse, & hoc non sine errore, cum pleuritis omnis sit morbus adstrictus, de quo symptomate alij quidem vel etiam ex Dogmaticis non meminerunt. solet hic morbus grassari in vere, vigente aquilonia constitutione, atque non raro oboritur à potu aquæ gelidæ post exercitium, nec non etiam à vini potu, si posteaquam corpus præ exercitio plurimum incaluerit, ebibatur. Hunc affectum persanandum speramus, si dolor mitis, febrisque atque tussis non admodum vehemens sit, & quod expuitur, citò prompteque sine dolore excludatur, quod quidem aut cruentum est, aut flauum & (vt Hippocrates expressit) excretioni admodum permixtum; aut denique concoctum, scilicet album, lene, æquale: quandoque septima die, plerumque decima quarta humor phlegmonen faciens coquitur, atque expuitur per tussim; aliquando verò diem vigesimam etiam attingit. Nisi verò intra hoc tempus humor expurgeretur, aut suffocat, aut in pus versum empyema facit. Vnde quò citius sputum appareat, eò morbum breviorē prælagit. Galenus ait: si circa initia statim in morbo laterali sputum appareat, morbum breviorē: si verò postea appareat, ipsum producit. primum in pleuriticis humor tenuis tussis excernitur, mox crassior, tandemque concoctus. qui si die tertia, aut quarta excerni incipiat, morbus ultra diem septimam non perdurabit. si critica sanguinis excretio apparuerit, & copiosa, uel alui deiectio, uel per urinam crassum sedimentum

Ff 2 copiosum

Hippoc. 5. aph. 3

In 5. aphor. 12.

copiosum exierit, salutem prælagit: aliquando enim sputa suppressa medicos fallunt, qui exitium exinde futurum timent, cum tamen sæpius humore per urinam plurimo excreto, plures seruentur. Bassani in Æde Hermetis Forcaturæ iuuenis pleuritica cum pessimis sputis omnino suppressis, quo pulsus inter mittens fuit, materia per urinam die quincta excreta, euasit. Contra pleuritim vehementem, atque sequam iudicabimus, in qua opposita symptomata obseruabuntur, utpote si dolor vehemens fuerit, assiduus, vel utrumque latus tenens, aut alteri affixus, nullatenus remittens, neque medicamentis cedens: præterea si & febris acuta sit, & vehemens, & tussi fiat admodum molesta, sicca, vel in qua cum magna difficultate expuant ægroti: vel etiam si tarde sputum appareat, prauumque sit. Dictum est, quod pleuritici ni spacio quatuordecim dierum, vel ad plus viginti probè per tussim expurgentur, ipsos aut suffocatum iri aut in empyema malum verti. Siccæ pleuritides idcirco maximè damnantur, de quibus Hippocrates dicebat in epidemijs: Multi infestabantur arida tussi, nihilq; excrebant. Hoc crudissimum morbum ostendere, coctoque difficilem, atque fore diuturnum, vel lethalem decernit. Præua quoque ea pleuritis est, in qua aliquid excreta nitur, vel cum dolore, aut dolorem non leuans, & cum magna quidem difficultate, omniumque maximè (quod suapte natura prauum est) cruentum, vel flavum, vel sincerum excretioni non probe permixtum; vel album crassum, viscidum, merum pituitosum. hoc enim sputum in pleuritide solet esse lethale, quod nobis sit indicio nihil humoris phlegmonen fouentis expurgari, sed totum intrus cohiberi. Quæ sputa nos abhinc plures annos vidimus in pleuritidibus, quæ pestilenter grassabantur, quæque omnes tertia vel quarta vel ad plus septima die ægrotos interimebant: pessima sunt, sputa eruginosa, nigra & liuida, hæc cum malis signis, certum exitium portendere solent, hisque etiam non minoris periculi videntur, versicoloria atque varia. Denique non minus praua sunt sputa omnia, quæ nedum dolorem, tussim, febremque leuant, siue non diminuunt, at quinimo magis symptomata augent, atque febrem. Pleuritis aliquando transiit in pulmoniam, Græcis peripneumoniam vocatam, quæ (auctore Hippocrate) affectus est periculosior, quippè quod vires prælanguescentes offendat. Indicia huius affectus in pulmoniam transeuntis erunt, si ægrotis peiorantibus dolor mi- rescat, & iacendi positio ex parte affecta reddatur faciliior, aucta respirandi difficultate, atque aucto genarum rubore, pulsuque molliori reddito. In pleuritidis curatione, primum victus ratio præscribenda est, quæ erit, ut ægroti in aere lucido, calido maneant, supinique in lectulo molli decumbant, cibus sit tenuis actu calidus & humidus. cuiusmodi est prisane cremor dilutus, cum tertia parte lactis è seminibus melonis expressi, atque modico sacchari candidi: bis in die cibum assumant, nonnulli adiungunt luteum oui sorbillum cum saccharo. Ægyptij, & Arabes exhibent aut iusculum è surfuribus triticeis, aut hordeaceis cum saccharo, vel lac variorum seminum cum saccharo candido violaceo ex aqua hordeacea vel ex iusculo pulli expressum ægrotis sufficere existimant, at de his cibus in libris de medicina Ægyptiorum nos satis egimus. pro potu aqua hordeacea non frigida cum saccharo, vel cum iulep violato erit oppotuna. sed iam ad medicamenta, quibus hic affectus tollitur, descendere est opus; qui cum ex adstrictis sit morbis, meritò laxantibus vtendum erit. Non possum non magnopere Aurelianum admirari, qui visus fuerit pleuritim & à strictura & à fluxu fieri voluisse, eo fortasse argumento, quod huic morbo fluor ventris solet aliquando complicari, cuius quidem symptomatis nulli veterum, recentiorumque medicorum meminere. forte Aurelianus in Africæ locis, in quibus constat medicinam fecisse, ventris cum fluore morbum lateralem frequentius grassari (et si hoc symptoma ex pathognomonicis non sit) obseruauit. sed ad rem redeo, & dico semper hunc morbum

In 1. epid. com. 1
sec. 12.
Gal. in 1. de crisi
fib. cap. 10. & 1.
aph. 10.

morbum adstrictum esse, nunquam à fluxu laxoue fieri, licet ei alterum quoque morbum, qui sit laxus, posse nonnunquam coniungi, negandum non sit. Quo merito in hoc affectu laxantium vsus erit ad medendum opportunus. si verò lateralis morbus vehemens, magnusque fuerit, maioribus quoque laxatorijs opus erit, inter quæ præcipuum locum habebit phlebotomia, quæ virium robore permittente, continuo morbo incipiente ex opposito latere atque iam incepto ex eodem, secta vena interna erit facienda, præmisso clystere laxatorio, vel medicamento leniter purgante, ut est cassia cum saccharo ad vnc. 15. vel feri lactis lib. iij. cum vncia cassiæ, vel tribus mannæ electæ. quantitas sanguinis detrahenda ex virium statu conijcitur. à multis damnatur quæ fit ad animi deliquium, quod vires nimium resoluat. etenim in thoracis partium phlegmone expugnanda, robur virium (auctore Galeno) maxime requiritur. In pueris sat erit sanguinem misisse ex cruribus scarificatis, vel ex adhibitis spatulis atque dorso cucurbitulis cum scarificatione. Hippoc. dolore petente superiora, scilicet vel claviculam, vel mâmam vel brachium attingente, sanguinis vacationem laudauit, & deorsum ad hypochondria eodem dolore vergente purgationem elleboro, aut peplio moliendam statuit. Quod & Methodici, & complures etiam Dogmaticorum damnarunt, purgationique sanguinis euacuationem merito plures prætulerunt. convenient tamen purgantia, vulgo lenientia vocata, scilicet post detractum sanguinem, vel primo die antequam fiat phlebotomia. eadem superius præscripta conuenient, scilicet, aut pulpæ cassiæ Abissinæ vncia & semis cum saccharo, vel eiusdem vncia cum feri lactis caprilli lib. iij. vel prædictum serum cum syrapi rosacei laxatiui, vel mannæ electæ uncijis tribus. Descendimus modo ad medicamenta cum interna tum externa ad hunc affectum tollendum accommodata. Et ab externis exordientes dicimus Hippocratem Methodicis maximè fauuisse visum, cum is statim lateri affecto fomenta adhibenda voluerit. ipse enim in lib. 4. de vict. rat. in acutis ita habet: Lateris dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea obortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere, non ab re existit. Quæ fomenta etiam ita expressit, dicens: Fomentorum calidorum probatissimum est aqua calida, vel in vtre, vel in vesica, uel in uasculo aut æneo, aut testaceo posita. & Galenus quoque in commento huiusmodi medicamenta laudauit; nempe (ait) fomenta calida cutim ipsam ad perspirationes rationem efficere, phlegmonesque sanguinem tum tenuare tum per halitum digerere con-
sueverunt. Quæ si facta fuerint, non solum sanguinis aliquid euacuabitur, uerum quoque & affectæ, quæ minus distenduntur, partes mitius exinde & mansuetius dolebunt. Itaque medicamenta laxatoria exterius erunt adhibenda. Hippocrates etiam per initia nulla prægressa euacuatione huiusmodi præsidia tentanda esse existimauit. Consultius uerò & tutius præmissa sanguinis uacuatione adhibebuntur. Ad hoc igitur aptissima erit aqua dulcis calida spongia excepta, & expressa, aut molli lana, aut uesica eadem semiplena adhibita, uel ex aqua dulci decoctum, fomentumque ex chamæmelo, althea, aut ex meliloto, aut ex seminibus fenugræci, uel lini, uel ex horum multis uel ex similibus alijs paratum; hydreleum etiam eodem modo utilissime uel uesica exceptum uel spongia adponitur. inunctiones quoque iuuant ex oleis dulcibus calidis, sed præsertim ex amygdalino, chamæmelino, liliaco, & irino, & adipēs quoque pingues & dulces, ossium animalium humorum medullæ, ut ouinæ, porcina non minus sunt utiles, & similes aliæ; ex his atque ex alijs parantur linimenta, ut (exempli gratia) accipiendo unguenti dialtheæ unc. ij. & ipsum cum oleo amygdalino dulci recenti dissolutum calidum dolenti lateri adhibent. Ad idem accipe mucaginis, altheæ radices in aqua decoctæ, seminum fenugræci, lini, celsipi, singulorum semunciam, olei amygdal. dulcium recentis unciam. Misce ut fiat linimentum, quo

4. Gal. 3. proarb.
com. 4. meth. c. 5

In lib. 2. de vict.
rat. in acutis
tex. 11.

Tex. 1.

Tex. 2.

quo calido pars dolens perungatur. Non minus postea vtilia erunt cerata ex iisdem parata, scilicet ex oleo dulci, polline fenugræci, aut altheæ, aut tuso meliloto, mixtis adipibus seu pinguedinibus. Aurelianus, quod antiqui diateffarum vocabant, commendauit, nimirum, quod fit ex cera, resina terebinthina, iride illirica puluerizata atque pice. De internis vero medicamentis idem quoque erit faciendum, scilicet laxatoria per os erunt assumenda. Antiqui multum familiarius habebant, cuius quidem poterit exhiberi singulo mane ad quatuor uncias; dabitur etiam vtilissime medicamentum (vulgo serapium dictum) quod exempli gratia ita parabitur. Accipe foliorum maluarum, altheæ, violarum communium, an. p. ij. seminum hordei, fenugræci, lini an. vnc. i. radices liquiritiæ rasæ, & contritiæ vnciam. aquæ communis libram. bulliant quoad pars tertia absumat: & percolatum decoctum iterum parum ebulliet cum mellis vncia. & dabitur bis in die calidum, mane, & vespere ante cibum per horas quatuor, aut dabuntur prædicti decocti, scilicet absque melle, vnciæ quatuor, cum syrups violati, vncia, & syrups de liquiritia semuncia. Antiqui familiarius dabant succum sem. fenugræci cum melle quod poterit nunc dari cum saccharo candido. Aurelianus ad hunc succum parandum, per duos dies semen fenugræci in aqua simplici, quam aquam, priori affusa atque noua addita sæpius renouabat, coquebatque donec color virefceret, quem mixtum cum melle dabat. Recentiores summa cum vtilitate vbi præsertim sputum cum difficultate expuitur, vel retinetur, hydrelæum ex aqua simplici, & oleo amygdalino dulci recentissimo paratum, vel prædicti olei calidi cum saccharo vncias quatuor vel vsque ad sex propinant. Alij non minori cum vtilitate exhibent aquæ chamæmeli vncias quatuor cum sacchari optimi semuncia. Nos verò damus aquam stillatitiam paratam ex radicibus altheæ, liquiritiæ, & ex seminibus fenugræci, lini, hordei, in aqua chamæmeli maceratis, cum saccharo. Egyptij varia genera potionum; quas mastahaleb vocant, in hoc affectu vrsupare solent, idque summo cum egrotantium commodo. Hasce verò omnes nos accurate descripsimus & docuimus in libris de medicina Egyptiorum secundæ editionis. His medicamentis addimus vsum clysteriorum itidem laxatoriorum, vel leniter purgantium, de quibus supra diximus.

*De medicamentis ad pulmoniam pneumoniam vocatam
phlegmonem Cap. XII.*

EX rheumatismo, angina & pleuritidis humore ad pulmonis substantiam decumbente non raro oritur ille affectus, quem Græci peripneumoniam, & latini pulmoniam vocarunt, nimirum à pulmone læso ita dictus. Herophilus tumorem esse in toto pulmonis corpore statuit, Aurelianus addidit cum febre, Soranus cum rheumatismo. ex quo Asclepiades fortasse hunc affectum tumorem cum solutione (perinde ac dixisset mixtum esse ex adstricto & ex laxo morbum) appellauit. sed prudentius quidem Soranus tumorem non cum solutione, at cum rheumatismo, dixisse visus est; namque ea humoris excretio, quæ per tussim fit, solutio siue morbus laxus non est, cum hæc ipsa per tussim expurgatio nedum cohibenda, at quinimo, vt peripneumonici sanentur, fouenda, atque adiuvanda sit. neque enim omnis excretio morbum laxum facit, sed illa duntaxat, quæ immoderatus profluit, corporaque egrotare facit. Merito itaque tumorem cum rheumatismo, seu cum solutione, quæ morbus laxus non est, Soranus esse statuit. Aurelianus verò hunc affectum stricturam vehementem pulmonis atque acutam cum sputo, siti, febreque acuta, vocauit. Dogmatici itidem phlegmonem pulmonis cum tussi, sputis, respirandique difficultate atque cum febre acuta esse tradiderunt.

tradiderunt. Itaque in hoc affectu adest primo febris acuta & vehemens, tussis molesta, cum sputis cruentis, flauis atque spumosis, respiratio difficillima, ita ut suffocari videantur, unde supra latus difficilis sit iacendi positio, dolorosa grauitas atque pondus in thoracis partibus anterioribus. Alij addunt eos, qui hoc malo vexantur, grauedinem pectoris, & dorsi, & laterum sentire, & cum in lateribus iacent, praefocari, supinosque semper decumbere, vel rectos sedere. maxillae rubent, oculi pleni, palpebrae tumentes, in facie ardorem sentiunt, sitiunt, plurimum aerem haurire desiderant, non minus in ipsis adest frigidi potus desiderium: Pulsusque erit vehemens mollis, inaequalis, atque respiratio frequens & magna, itidemque inaequalis. Hoc malum plus periculi, quam doloris, habet, & multo plus si pleuritidi successerit. Idem ferè erit ipsius prognosticum, quod de pleuritide dictum est. Minus periculosa erit, ut Hippoc. tradidit, in qua screatio flaua non multo permixta sanguine inter initia excernitur, hancque esse ad modum salutarem si septimo die expui cæperit, affirmavit, & minus esse securam, in qua tardius huiusmodi screatio apparuerit. Quo meritò dixerat etiam: screatio in omni dolore, qui affligat circa pulmonem & costas, citò prompteque creetur, necesse est. Itaque si citò screatio ea inceperit, & citò crassior, meliorisque coloris reddatur probeque pulmo expurgetur, salutare erit. & citò morbus finietur. Hippocratem dixisse constat breuissimam esse, quae septem diebus, & breuem quae quatuordecim per tussim expurgatur, longissimam, quae diebus duabus & viginti absoluitur. ni recte hoc tempore pulmo expurgetur, aut humor phlegmonen faciens suffocat, aut in pus phlegmone versa, empiema inducit. Quandoque verò pulmonis copiosa haemorrhagia critica sanat, & aliquando, alui deiectio biliosa, & spumosa, vel copiosa vrina, in qua plurimum crassae materiae expurgatur. Reliquum prognosis in hoc affectu ex pleuritidis prognostico (quod idem ferè omnino videtur) deprehendes. Curatur verò hæc phlegmone, iisdem ferè medicamentis, quibus pleuritim sanari diximus. Quod inter alios ex veteribus medicis Heraclides Tarentinus confirmavit. Itaque si tempus concedet, poterit prima die leniens laxatorium exhiberi, cuiusmodi erit, cassiae catharticae vncia, vel vncia & semis, cum saccharo candido vel in potione cum decocto rerum pectoralium, aut ex sero lactis. aut propinabitur medicamentum, quod accipiet syrupi rosati solutiui violari an. vnc. i. mannae electae unc. ij. cum sero lactis fiat potio & superbibantur feri lactis caprilli claresfacti librae duae. ni morbi natura acutissima permittat hanc praemitti alui laxationem, praemisso clystere laxatorio simplici scilicet ex decocto maluarum, altheae, mercurialis, violarum, ad libram, & ex olei dulcis uncijs quatuor, & mellis ros. simpl. uncijs tribus. si vires permittant, secta vena interna dextri cubiti si in dextro latere, vel sinistri, si in sinistro maior doloris molestia erit, sanguis educatur, ea quantitate, quae viribus, & etiam copiae sanguinis conueniet. viribus verò fractis & debilitatis cauendum erit ab omni sanguinis uacuatione, unde in ea pulmonia, quae uel ab angina, uel a laterali morbo fit, sanguinis non esse opus uacuatione, grauioribus medici senserunt. uel si illud erit agendum, cucurbitulis solummodo cum scarificatione scapulis & dorso apposis aut à cruribus scarificatis erit mittendus. Fomenta laxatoria, & spongiarum euaporationes ex aqua calida, ex oleo dulci, hydræleo, & ex decoctis laxatorijs, & ad pectus, & ad dorsum, & ad latera adhibita maximè conuenient. quae eadem erunt, quae à nobis in pleuritidis curatione praescripta fuerunt; itaque eodem modo, iisdem propemodum medicamentis hic affectus erit tollendus. Aliqui ex internis medicamentis maximè commendarunt, decoctum cum mellis modico ad uncias quinque singulo mane calidum exhibitum, quod paratur ex foliorum tussilaginis, maluarum, altheae, chamemeli, an. p. ij. ex seminibus lini, fanugraeci, anethi, an. unc. 5. & ex radicis liquiritiae

In 2. prog. tex. 50

Tex. 44.

liquiritiæ recentis minutim incisæ, iridis siccæ, helenijque añ. 3. ij. decoquantur in aquæ lib. ij. quoad tertia pars ablumatur. atque iterum percolatum decoctum ferueat cum mellis vncia & semis. oleum quoque calidum vtiliter cum pleuriticis, tū pneumonicis propinari auctor est Aurelianus lib. 5. chronion cap. 8. Ex eternis quoque balneum, in quo semel in die totum pectus immersum maneat, aut ex decocto calido pro fomentis in altero capite præscripto, aut ex simplici aqua calida, vel oleo dulci, aut chamæmelino, vtilissimum erit, potissimumque euacuato corpore, atque etiam lenitorijs purgantibus nuper præscriptis, aut molli- bus laxatorijsue clysteribus ventre exonerato, atque laxato. eadem itidem vi- ctus ratio conueniet, qualis fuit in pleuriticis à nobis præscripta.

De medicamentis ad phlegmonen septi transuersi.

Caput XIII.

Nunc descendimus ad phlegmonen illius musculi, quem Plato diaphragma Hippocrates aliquando *διαφραγμα*, aliquando respiratorium ventris, & al- quando etiam *φρένες* appellauit. quo postremo nomine, scilicet phrenes, philoso- phi, poetæque itidem hanc partem corporis familiarius intellexerunt; quod aut prudentiæ sit particeps, aut mentis sit domicilium (siquidem *φρεν* mentem omnes nominarint) idcirco phrenes dictus est, vel quoniam ob miram eius cum cerebro sympathiam, phlegmone vexatus repentinum, continuumque delirium concitat. Negauit tamen Hippocrates in libro de morbo sacro, quod quicquam ad prudentiam hic musculus conducatur, ita dicens: Præcordijs fortuitum nomen & per consuetudinem imposuitur est, non ex rei natura, neque enim quam vim habeant præcordia ut sapiant, & intelligant ego vnquam noui. Verumenimue- rò cum palam ab omnibus deprehensum sit, hoc musculo inflammato continuo phreniticos fieri, quippe perpetuo deliros cum continua acutaque febre, quo hic affectus idcirco phrenitis sympathica ex diaphragmate, septiue transuerso dictus est, complures merito æstimarunt hunc musculum esse mentis domicilium, quo inflammato mens quoque turbetur, & lædatur. At hoc quidem vnum non possum non vehementer admirari, scilicet quod ex eius musculi phlegmone deli- rium fiat continuum. Neque me latet, pletosque in mirabilem eius cum cere- bro & membranis societatem libenter retulisse hunc affectum. Quam rem non video liquido constare, quando & hepar & ventriculus & uterus in mulieribus miram hanc partium habeant societatem, attamen ipsis phlegmone obsessis haud continuum delirium fit. Itaque videtur, istud in aliam causam referendum, & fortasse in particularem illiusce musculi proprietatem, vel quod ipso musculo in- flammato per nervos venas atque arterias cerebri membranæ magna noxa com- municetur, à qua delirium continuum excitetur; etenim cum ea magna læsio à diaphragmate phlegmone obfesso cerebro communicata, quoad phlegmone res- foluatur, continuet, haud mirum erit, delirium exinde obortum si itidem toto illo tempore duret, perpetuumque sit. Erit igitur huiusce musculi strictura, aut iuxta membranam, pleuram dictam, qua pars superior diaphragmatis constat, aut iuxta alteram posteriorem, quæ peritonæi est, aut iuxta carnosam eiusdem musculi substantiam oborta ex aliquo humorum superfluentium, aut ex mul- tis simul mixtis. In hoc affectu, ut Hippocrates sentit, dolor eiusdem loci si tan- gatur, sentitur, estque simul phrenitis, de qua re ita scripsit: Phrenitides etiam ex alijs morbis nascuntur, atque hæc quidem ægròs pari contingit, de dolore con- queruntur diaphragmatis, ita ut se contingi non sinant. Itaq; cū dolore diaphrag- matis delirium continuū atq; febris acuta itidemq; cōtinua obseruatur. Hæc vero phrenitis

ml. w. g. i. s. w.

phrenitis sympathica est, distinguiturque ob idiopathica tribus præsertim signis, scilicet, respiratione, voce, atque hypochondriorum contractione: Namque in sympathica vox acuta est, in idiopathica grauis. respiratio parua & frequens, in idiopathica magna & rara. atque in diaphragmate strictura laborante continuo scilicet per initia intro sursum retrahitur, secumque peritonæum adducit, & cum ipso retrahuntur hypochondria, hepar, lien, ventriculus, visceraque omnia per sympathiam. hincque in ipsis hypochondriorum introsursum statim in principio reuulsio obseruatur, nequaquam verò cerebro inflammato statim in principio introsursum hypochondria contenduntur, tametsi postea à cerebro diaphragmati læsione communicata, sursum retrahantur. Morbus hic est adstrictus, magnus & acutus, maximeque, quod pars læsa cordi sit vicina, periculosus. spes verò salutis erit, si æger facile fert morbum, non admodum difficulter spiret, neque multo magnoque dolore diuexetur, deliriumque mite sit. solet etiam hæc phlegmone copioso aliquando sudore calido ex toto corpore iudicari, vel hæmorrhagia sanguinis, vel alui deiectione, aut vrina copiosa. his verò contra se habentibus malum erit lethale, præsertimque si ægroti magno acutoque dolore perpetuo conflitentur, difficillime respirent, delirio perpetuo atque terro agitentur, maximaque sit hypochondriorum introsursum retractio, & febris assidua, vehemensque admodum sit, ægrotique anxij, inquieti, vigiles & admodum angustiosi appareant. Qui hoc morbo laborant, in loco lucido calido collocandi sunt, in potu à vino omnino abstineant, aquaque hordeacea, aut stillatitia ex funco cum iute acetoso vtantur. aut iure aquoso pulli parui gallinacci absque sale. vtanturque victu tenuissimo, qualis phreniticis & pleuriticis præscriptus est. si aluus non laxa sit, clyster iniiciatur mollitioris, ex decocto maluarum, violarum, mercurialis, atque ex oleo violaceo, vel amygdalino dulci, aut communi dulci ad vncias quatuor, cum mellis rosati simpl. vncijs tribus, vel sacchari rubri geminis vncijs. aut per os laxatorium leniens vulgo dictum exhibeatur, cuiusmodi erit cassiæ abissinæ substantia ad vnc. iij. decocto maluarum althææ, vel fenugreci dissoluta, aut exhibeatur eadem cassia cum saccharo in bolis, vel potio parabitur ex syrapi rosati laxatiui vnc. iij. cum sero lactis caprilli claresceti. & superbiant ægroti eiusdem feri lib. i. si morbus sit acutissimus, præmissis clystere præscripto, aut simili, virium robore permittente sanguinis ea quantitas euacuabitur, quam ætas & cælum permiserint. quod placitum non repugnat Methodicorum placitis, qui negant etates, cælum & similia simpliciter sanguinis vacationem indicare, ad eiusdem verò vacationis quantitatem metiendam illarum causarum cognitionem haud esse spernendam. Qui sanguis aut secta vena interna è directo partis affectæ dolore posita, in cubito scilicet primo ex illius brachij vena secta; vbi verò dolor vel mediam partem diaphragmatis tenuerit, ex dextro primò sanguis euacuabitur, & in altera die ex sinistro brachio eadem secta vena denuo viribus permittentibus modicum sanguinis detrahatur. Cruentibus quoque scarificatis facta sanguinis euacuatio erit itidem vtilissima in ijs omnibus, qui hoc malo laborant, omniumque maxime in pueris, in mulieribus atque in corporibus albidioribus, quæ abundant sanguine tenuiori. præmissa vniuersali hac sanguinis euacuatione, etiam ea erit vtilissima quæ sit sanguinis hæmorrhoidalibus venis adhibitis. Tandem etiam hypochondrijs adhibitis cum scarificatione cucurbitulis sanguis detrahendus erit. Post primam sanguinis euacuationem, præstabit interim vel clysteriorum nuper præscriptorum vsum exercere, aut lenitorio laxatorio aliquo interim aluus erit laxanda. De internis, conuenient decocta laxantia, cuiusmodi erunt aquæ stillatitiæ chamæmeli, althææ, vel maluarum, vel fenugreci, vel meliloti, vel sem. lini, aut ex ipsis in aqua fluuiatili parata decocta, aut si calor intus fuerit admodum

Gg æstuosus

æstuosus. aqua stillaritia endiuia; velunci, vel malua, vel oxalidis vel vltorius herbae refrigeratoria facultatis, actu tamen calida propinabitur singulo mane & vesperi ante cibum spacio horarum quatuor ad uncias quinque: aut decoctum ex iisdem vel ex similibus paratum actu itidem calidum dabitur. si dolor vehemens acutusque fuerit, hydrelæum ex aqua chamæmeli, vel altheæ, vel fenugreci, & ex oleo vel chamæmelino, vel amygdalino dulci paratum, calidum epotum erit vtilissimum. & aliquando oleum amygdalinum dulce, vel de althea, vel chamæmelinum, vel de seminibus lini erit calidum exhibendum. Pro externis, fomenta ex decocto chamæmeli, fenugreci, altheæ, meliloti, & similibus actu calida, aut vesica, aut spongia suscepta adhibebuntur, vel aqua fluuiialis calida, spongia suscepta atque expressa calida apposita; inunctiones itidem ex irino oleo, chamæmelino, amygdalino dulci ac recenti erunt accommodatissimæ. inter alia olea, oleum de floribus cyclaminis est in magna existimatione habitum, si eo hypochondrium dolens, actu calido inungatur. lilinum, irinum atque cicinum eodem modo laxando phlegmonem digerunt, partemque phlegmone adstrictam laxant.

De medicamentis ad phlegmonem hepatis. Cap. XIV.

Hepatitis vocant phlegmonem, quæ hepar occupat, quæque fit in tota huius visceris substantia, aliquando verò pars gibba, & aliquando caua simaue dicta plus à phlegmone patitur. Hæc deprehenditur à dolore in dextro hypochondrio tenso iuxta costas spurias. (cum quadam illiusce partis grauedine) aliquando ad iugulum & ad scapulam protenso, qui non nisi in magnis gibbae partis phlegmonis obseruari solet. in qua parte calorem quoque non obscurum sentiunt. Adest quoque in dextro hypochondrio tumor figura rotundus, qui maxime tactui innotescit. gibba illiusce visceris phlegmonem, & magnam quidem patiente, febris adest continua atque acuta, aliquando etiam ardens (ubi phlegmone erysipelatodes est) siti vexantur, lingua primo rubra apparet, & mox nigrescens: tussis exigua, in qua nihil expuunt, quæque rara est, scilicet ex interuallis, atque respiratio quoque parua est, & frequens, cum pulsu itidem duro inæquali, quadantenus leuato, sed minus duro quàm in pleura sentiatur. Nauseabundi sunt, & vomunt bilem aliquando synceram, rubram, & nonnunquam è postea quæ æruginis colorem habet; alius cohiberi, & color totius corporis in ictericum mutari solet. Vbi verò pars caua plus patitur, cibi fastidium maius adest, & magis nauseabundi fiunt, & magis vomunt, atque siti in exhausta ferè ardent. Minus tussunt, & minus difficulter respirant, dolor minus excruciat, & minus tumor in hypochondrio tactui innotescit, atque deprehenditur. contra si gibba plus afficiatur, dolor respirando magis excruciat, tussis, & respirandi difficultas quoque maior erit, & tunc si magna sit inflammatio, dolor ad iugulum & ad scapulam extendi solet. Omnis hepatitis plurimum illiusce visceris ratione impendit periculum. summe exitialis verò, quæ magna est cum febre vehementissima, doloreque assiduo & maximo, cum æstuofo calore, & in exhausta siti, icterico colore, atque etiam peior est morbus (auctore Hippocrate in 7. aphor. 17.) si ipsam singultus subsequatur: mitior verò, quæ spem curationis pollicetur, ubi prædicta symptomata omnia sint mitiora atque leuiora. Hepate itaque strictura laborante, ab eiusdem visceris tumore, à sanguine vel à bile, vel ab alijs humoribus concitato, præsidia laxantia nobis ad medendum indicabuntur. Itaque primum præscripta victus ratione eadem scilicet, quæ in septo inflammato conuenire dictum est, præmisso clystere laxatiuo simplici alius expresso, vel cui addita sit cassiæ cathartica uncia, virium robore permittente sanguis

sanguis mittendus erit, vena dextri cubiti hepatica secta. aut (quod maximè vsu venit pueris, mulieribus, corporibusque albidioribus) cruribus Ægyptiorum modo scarificatis. & postea vtile quoque erit cucurbitulis dorsi partibus cum scarificatione appositis modicum sanguinis educi. haud erit inutile aluum clysteribus laxari, aut laxatorio pharmaco, quod leniter agendo excrementa in primis vijs contenta educat. huiusmodi erit cassia Abissina ad drachmas decem vel duo decim in bolis aut in potione ex aqua stillatitia endiuia dissoluta; vel syrupus ros. laxatiuus ad vncias quatuor ex sero lactis, & postea superbibendum erit serū clarescētum calidum ad libras duas. Deinceps quod pertinet ad interna medicamenta poterit singulo mane exhiberi actū calida aqua stillatitia chamemeli, vel meliloti, vel cichorij, vel maluæ, vel ex ipsis simul mixtis ad vncias quatuor cum modico sacchari candidi. aut lac dabitur expressum in aqua chamemeli, vel meliloti, ex seminibus maluarum, altheæ, portulacæ, endiuæ, melonis ad vncias quatuor, actū calidum cum modico sacchari candidi. Ægyptijs huiusmodi portionem, quam Mahastalep vocant, familiarius frequentant, quam parant accipientes (exempli causa) seminum altheæ, maluæ, fenugræci an. 3. iij. ligni sicci altheæ minutim incisi, 3. ij. liquiritiæ rasæ incisæ, 3. iij, contundunt in mortario & ex aqua chamemeli ius exprimunt, quod calidum cum saccharo exhibent. De externis verò medicamentis, eadem nunc vtilia esse dicimus, quæ ad diaphragmatis inflammati vsū in altero capite recensuimus, scilicet, fomenta spongiarum, euaporationes, cataplasmata, & epithemata laxatoria. Contenta tamen Gal. olim contra Attalum Romanum medicum Methodicum, quod nuda laxantia minime conueniant, sed quæ solummodo mixtum habent medicamentum, facultatis subadstringentis atque roborantis aliquid obtinens. De quæ superius à nobis pro Methodicis satis fuit disputatum.

De lienis phlegmone sananda.

Cap. XV.

ETiam lienem aliquando phlegmone vexari omnibus medicis obseruatum est. Cuius quidem signa erunt, tumor in sinistro hypochondrio, cum dolore, & calore, atque cum febre continua. sentiunt etiam in eodem hypochondrio grauitatem & pondus. strictura est huiusce visceris, ex tumore humoris plerunque melancholici feculenti crassique oborta. Morbus sanè adstrictus est, atque sanabilis, cautius tamen in vsu topicorum à medicis agendum erit, ne affectus in scirrhum commutetur. hinc merito Galenus damnat medicamenta omnia vehementer calefacientia, cui affectui conuenire cognouit, quæ vere laxatoria sunt, cuiusmodi mediocriter calida & humida existunt. Mirum est, quam obrem quidam celebriores Dogmatici voluerint, medicamenta debere non esse expertia alicuius facultatis adstrictoriæ, roborationis gratia, cum, si quod est ex visceribus, quod laxantibus gaudeat, hoc viscus vnum sit, hæc maxime expetens, quippe laxari, quoniam a crassitie humoris maxime pari solet. Ab humore enim hoc viscus crasso & frigido crassefacto ac indurato, obstruitur, intumescitque & aliquando ipsum inflammari contingit. Quis itaque vsū adstringentium commendabit? An non hæc omnia tenuiorum humorum quoque digestionem prohibent? Quid de humoribus crassis & frigidis, qui difficilius resoluntur, dicemus? Nonne ab vsu adstringentium medicamentorum, & crassiores reddentur, & difficilius resoluentur? Quare nuda emollientia, laxantiaue lienis phlegmonoso erunt maxime accommodata. Hæcque vel fomenta, vel epithemata, vel cataplasmata, vel vnguenta, vel inunctiones sint, eadem prorsus erunt, quæ ad hepar inflammatum in altero capite adnumerauimus. Proinde tam interna

G g 2 quam

In lib. 5. simpl.
cap. 7.

quam externa eadem erunt. (Attamen cum extra tum intra medicamenta ad lienem habere oportebit maiorem, quam in hepate, incidendi extenuandique facultatem, ob humoris, quo lienis strictura fouetur, crassitiem tollendam) Idem profecto dicimus de sanguinis vacuatione per venam sectam; neque hec euacuatio crurum scarificatione, vel cucurbitulis erit (quod sanguis crassus haud prompte his modis euacuetur) molienda. Sed de medicamentis ad lienis tumorem longe accuratius in libro decimo iterum agemus.

De phlegmone ventriculi sananda.

Cap. XVI.

Ventriculum phlegmone oblessum indicat dolor assiduus, cum tumore, grauitate, calore, atque febre continua; adest & nausea, & stomachi angustia; si vero à sanguine biliosiori hæc passio fiat, aderit febris ardentissima, sitis inexhausta, & calor in parte affecta, vehementior. Quo morbo omnes stomachi partes affici possunt, oris vero ventriculi, quod periculosior sit, habet symptomata longe maiora, & sæuiora. Morbus est plerumque lethalis, & non nisi qui maximo virium robore constant ab eo seruantur, contra in ijs, qui imbecilles sunt, affectus est maxime exitialis. Cum itaque ventriculus strictura ex phlegmone laboraret, meritò vsum habebunt præsidia laxantia, quæ ad aliarum partium eadem strictura laborantium curationem faciendam nos & proposuimus & considerauimus. In quo affectu itidem primum victus ratione præscripta, victusque præsertim instituto, qui erit ex ijs cibis, qui sunt etiam medicamenta; cuiusmodi est cremor præparatus hordeaceus cum saccharo, vel panis coctus in iure pulli sine sale alterati malua, althea, boragine, fenugræco, oua vero recentia forbilis sunt aptissima, & ipsorum lutea ex iure prædicto dissoluta cum saccharo erunt accommodatissima, & ad nutritionem, & ad curationem. Nonnulli laudant in principio, ut cum cibis admisceantur ea, quæ habent facultatem adstrictoriam & repellentem, ad phlegmones augmentum prohibendum, quod in principio facient dum erit & cibis & medicamentis leuiter roborantibus intro tamen assumptis. Vnde cibi & iura & potiones poterunt tunc temporis alterari aut oxalide, aut cichoreo, aut pentaphyllo, aut funco, aut plantagine, aut similibus, per exterius vero vsum adstringentium neque in principio neque in alio multo minus tempore erit admittendus: post principium vero sola laxantia ad digerendam phlegmonem, & stricturam erunt administranda. A vino planè eos abstinere oportet, cuius loco optimum erit ius stillatitium ex carne pulli parui calidum, vel aqua stillatitia endiuæ, funci, vel boraginis actu calida, vel hordei itidem aqua. quibus institutis, statim, viribus permittentibus, vena interna dextri cubiti secta mittendus erit sanguis, at præmisso clystere laxatorio simplici. reliquum vero curationis iisdem medicamentis laxatorijs cum internis, tum externis (quæ ad septum transversum, & ad iecur inflammatum fuere à nobis proposita) perficiendum erit, quæ ad euitandum tedium iterum non repetimus.

De ilei intestini atque coli phlegmone tollenda.

Caput XVII.

Hoc malū Græci ileon & chordapsm appellant (etsi aliquibus visum sit hisce duobus nominibus duos quoque affectus distinctos significari) Latinivolumulum, ilcon, iliacamque passionem vocarunt. Aurelianus tormentum, Salimachus phragnon, Celsusque morbum tenuioris intestini, vocauit. Galenus aliquando

Aurelianus in
lib. 3. de morbo c. 17

Loco superius
curato.

non semper adest, sed solummodo quando exitiales sunt, & si vehementius distorqueantur, stercus eis ascendit atque singultiunt. Quidam verò desipiunt & conuelluntur compatiēte neruorum principio stomachi passioni. Quo vomentes sanari quidem non posse deprehenditur; ab omni remedium vsu, si stercus quoque reiiciatur, cauendum erit. scribunt complures tunc temporis podicem vsque adeo esse adstrictum, vt ne specilli extremum ingredi queat. Alij verò, vt scribit Aurelianus, memorant ventum per podicem redditum sine odore, vt scribit, re terro perniciosum fore, & si fuerit odoris terti salutem promittere. in illis enim ob nimiam stricturam, tanquam liquatus spiritus purior excluditur. in his autem ob quādam laxamentum facultatem infectus exhalationibus stercorem excluditur. In hoc malo, quod adstrictum est, laxatorijs præsidij est opus, & si dolor vehemens magnusue sit, magnis itidem laxatorijs, inter quæ cum phlebotomia præcipuum locum habeat, in ijs molienda erit (quorum salus nondum planè desperata sit, scilicet priusquam vomitiones appareant) virium robore consentiente ex vena interna dextri cubiti, clyster verò laxatorius ex decocto maluarum, altheæ, mercurialis, violarum, fenigræci, lini, altheæque, itidem caulium & ex oleo dulci, atque melle rosaceo simplici. In potu conuenient iuscula pullorum parvorum, mastahaleb superius descriptum, aquaque stillatitia chamæmeli, vel altheæ, vel maluarum mane & vesperi ante cibum ad libram mediam, actu calida epota, hydrelæum quoque calidum, atque oleum etiam chamæmelinum, vel amygdalinum dulce, & recens ad semilibram vtilissime bibitur. Aliqui commendant chamæmeli decoctum ex aqua paratum, vel anethi itidem, vel cimini decoctum. Alij in potu exhibent calidum hydrelæum, in quo radix altheæ fuerit decocta. hæc & similia in potu calida plurimum prodesse poterunt eis, qui ileo cum ex phlegmone, tum ex siccatis fecibus patiuntur. Eodemque modo conuenient externa, quæ eiusdem sint facultatis laxatoriæ, vel sint fomenta, vel epithemata, vel vnguenta vel cataplasmata. spōgiæ ex hydræleo cum altheæ radice decocto actu calido imbutæ, expressæq; hypochondrij, ilijsq; atq; toti vteri applicatæ plurimū iuuabūt: uel ex decocto chamæmeli, sænugreci, lini, altheæ, maluarū, violarū, & similiū. vtile quoq; erit partibus tumefactis & dolentibus adhibere leniā mollē calido oleo chamæmelino, aut amygdalino dulci, aut anetino, aut irino, aut lilino, aut ex ciclamini floribus parato imbutam, in fessiones etiam calidæ ex iisdem, vel hydrelæis, vel oleis, vel decoctis nuperrime præscriptis (si totus venter immergatur, per horamq; in ipsis morentur) summo cū ileosorum commodo facituri solent. Quæ medicamenta omnes cum Dogmatici, tum Methodici adprime laudant. his adiungenda erit proba victus ratio, quæ quidem eadem profecto erit, quam in ventriculi phlegmone expressam fecimus. Vnum addimus vtilissimum esse clysteriorum vsum, tum ex supradicto decocto, tum ex oleo & melle. longe vero vtiliores erunt, qui ex solis oleis vel chamæmelino, vel anethino, vel amygdalino dulci, vel ex similibus parabuntur. Nos meminimus quendam iliois doloribus vexatum, planè sanatum fuisse, ex calido oleo amygdalino recentissimo copiosiori tum epoto, tum per clysterem in ventrem iniecto, atque exterius toto ventre ab eodem itidem copiosiori inuncto. A purgantibus abstinendum, quod hæc & acrimonia phlegmonem irritando augeant, & quod in crudo morbo quicquā vtiliter educere profus a partibus strictura ventris nequeant. horum loco poterunt substitui laxatoriæ potiones leniendo ventrem subducentes. cuiusmodi erit cassiæ abissinæ pulpa ex fero lactis, vel ex decocto altheæ, maluarum, sænugreci & similium, vel ex iure pulli sine sale parato, vel ex aqua stillatitia chamæmeli, vel altheæ, vel maluarum dissoluta. syrupus quoque ex laxatoria violarum infusione, supradictis decoctis vel aquis dissolutus erit vtilissimus. Non minoris erit vtilitatis ex compositis electuarium lenitium

lenitium vulgo vocatum eodem modo exhibitum. coli vero phlegmone nobis innotescit ex dolore continuo & febre itidem continua, cum secum retentione. Quod malum iisdem tollitur præsidij, quæ nunc ad ileon meminimus.

De omento, mesenterio, atque de pancrea phlegmone vexatis. Cap. XVIII.

Prouinciam difficilem aggredimur, tentantes primum cognoscere, & postea sanare phlegmonem, in omento, in mesenterio, atque in pancrea obortam. Quorum sanè viscerum inflammatorum cognitio haud æque facilis videtur, etenim omentum eo malo affectum facilius deprehenditur, maiori verò cum difficultate. mesenterium, atque pancreas; cum hæc intus quam omentum magis sepulta iaceant; Hæc vero omnia viscera sæpius phlegmone, tumore, obstructione atque alijs malis tentari, cuiuslibet medicinam facienti notum est. Namque in mesenterio, & pancrea, quæ sunt tanquam totius corporis sentina, è iecore & è liene superflua bilis vtrique atque pituita per ramos venæ portæ, qui illuc delinunt, deponuntur in glandulas, in quibus obstructions, tumores, atque phlegmonæ excitari solent. sed iam ad phlegmonas, quæ fiunt in hisce partibus, redimus, quæ cum omnes stricturne passionis sint cum febre, parum signis inter se inuicem differre obseruantur, cum ipsarum partium substantia eadem esse videatur, scilicet membranosa multo adipe complexa, quo membranarum & exiguorum neruulorum exiguus sensus prorsus hebescit, vnde pars sensu omni caret, proindeque & doloris experta facta, nullam molestiam grauiter sentit. Itaque, vt signa proponamus, vbi mesenterium phlegmone obsessum est, aderit in ventre tensio, cum grauitatis sensu, ciborum fastidio, & cum febre leui ac lenta, continua tamen, absque multa siti, & absque grauibz symptomatibus, nec omnino ægrum prosterne, atque (vt Galenus auctor est) cum alui deiectione liquida chylosa, saniem quandam rubram in principio, qualis ab omni parte inflammata defluere solet, habente permixtam, quæ phlegmone concocta, crassior fit, atque puri similiore, adest quinetiam cum his respiratio difficilis, scilicet frequens, inæqualis, sed non parua, atque pulsus inæqualis & ferrinus, qualis in omnibus partibus phlegmone vexatis obseruari solet, qui tamen exiguam duritiem etiam præferat. Demum aderit quoque in lumbis dolorificus sensus, siquidem (quod mesenterij membranæ oriuntur à ligamentis, quæ lumborum uertebrae connectunt, & os sacrum ilium ossibus committant) membranis præ phlegmones tumore ualde distentis, ligamenta uertebrae connectentia trahentibus, necessario dolorifica tensio ibi fieri debeat. Cæterum ad maiorem huiusce rei notitiam, pauca accuratius de tumore istius phlegmones, dolore, uentris grauitate, atque angustia in respirando, sunt perstringenda. & de tumore illud primum sciendum, scilicet in qua parte uentris sit deprehendendus, & an contactu & pressu innoscat, uel citra pressum atque quomodo ab aliarum partium tumoribus distinguatur. si de omento loquamur, profecto tumor seu tensio in superiore uentris regione usque ad umbilicum desinente, nimirum iuxta hypochondria, erit tactu pressuque perscrutandus, siquidem ipsum omentum duplicem habet tunicam, scilicet superiorem & anteriorem, illam à gibba parte uentriculi, atque lienis concaua ortum ducentem, atque inferiorem & posteriorem alteram, quæ à peritonæo statim subdiaphragmate ortum itidem habet. & (ut scribunt anatomici) ipsum imo uentriculo & superioribus intestinis obrensum raro in homine infra umbilicum descendit. merito ipsum tumorem, in hypochondrijs tactu, pressuque perquirendum esse, dictum est. Qui tumor nutat, & mouetur, in renisque parte

In lib. 5. de loc. affect. cap. 7.

parte digitis compressa, dolor tensius percipitur obscurus, tamen qui magis grauitatis tensionisq; sensus dici debet. sentiunt etiam phlegmone vexati circa pressum, grauitatem cum tensione, & quadam angustia in ea superiori ventris parte. Vbi verò phlegmone vel mesenterium vel pancreas occupat, eius tensio tumorue, in penitioribus sub umbilico partibus perscrutandus est, alte enim sepultus est, neque manu comprehendi, fecernique potest à musculis obdominis: neque primo tactui occurrit, sed firmo tantum, validoque pressu deprehenditur, sine doloris sensus, quod pars ipsa doloris sit expers, quin etiam sua mole intestina premens atque coarctans sepe efficit aluum pigriorem. sentiunt & ipsi & grauitatem cum quadam tensione & angustia. vbi vero phlegmone quadatenus induruerit, & ad scirrhum inclinauerit, clarius pressu sic animaduertitur, vt penitioribus sub umbilico partibus, vel os, vel calculus concreuisse videatur. eodem itidem modo & pancreas phlegmone obsessus deprehenditur pressu & tactu, in partibus subumbilico positis, cum hæc pars in mesereo sit, pyloro proxima, atque cum caro hæc sit corpus quoddam glandosum, cum intumuerit non minus firmo pressu & contactu partium subumbilico positarum, quam mesenterij phlegmone deprehenditur. distinguitur ab hepatis phlegmone, quod eius quidem tumor in dextro hypochondrio omnino sit circumscriptus, nimirum totus simul elatus, nec amplius extendatur. à lienis quia sublongus est, & in sinistro hypochondrio obseruetur. atque à musculi phlegmone, cum totus sibi continuus existat, protendaturque tumor secundum ipsius musculi situm. Tumoresque prædictarum partium, scilicet hepatis, lienis atque musculorum, stabiles firmi, fixiue esse deprehenduntur. cum omenti, meserei, & pancreas nutent, & mobiles sint. Necessario prædictarum partium insensibilium phlegmone oppressi in expirando angustiam sentiunt, ac erecti in ventris primæ & secundæ partis locis grauitatem pondusque persentiunt atque angustiam. Harum partium phlegmone ni digerantur laxatorijs medicamentis vel in scirrhos mutantur, vel suppurantur, & vomitam faciunt. solent etiam ægroti non rara in hecicam febrem longo nimirum tempore laborantes, prouehi. Plærunque verò si longo tempore phlegmonæ exdurauerint, in suppurationes commutantur. De his auditor coacorum præfagiorum ait: At qui tumores molles & indolentes tardius iudicantur, & minus periculi denunciant. Quod si sexaginta dies superuenerint, & permaneat febris in pus vertuntur. Cæterum his præmissis nunc ad curationem descendimus. Itaque in primis præscripta victus ratione qualis ad alia viscera inflammata à nobis fuit instituta. primum huiusmodi laxatorium leniens calidum vel simile propinabitur. Accipe syrupi rosati solutiui vnc. iij. electuarij len. vnc. i. cum decocto flor. & fruct. cord. vel cum aqua betonice q. 5. fiat portio. aut dabitur cassie recenter extractæ vncia & semis cum saccharo in bolis statim ante cibum. vel dabitur serum lactis caprilli claresfactum ad lib. tres præ potius medicamento quod accipit mellis ros. laxatiui, syrupi rosati itidem laxatiui an. vnc. ij. Misce cum feri prædicti q. 5. fiat portio, qua epota, superbibatur serum prædictum tepidum. Altera die mane ante prandium vena dextri cubiti, si tensio in dextra ventris parte animaduertatur, vel sinistri, si sinistra phlegmone esse coniiciatur, interna secta sanguis (virium robore permittente, magnoque existente morbo) educatur. ea profectò quantitate, quæ viribus, plenitudinis temporis, cæli, ætatis, conditioni respondebit. Vtilis quoque erit repetita euacuatio sanguinis, cucurbitulis cum scarificatione scapulis & lumbis adhibitis, non minus etiam hyrudinibus venis sedalibus apposis hæc aptæ sint, easue æger innatas habuerit. vtilissima quoque erit euacuatio sanguinis à cruribus scarificatis maximeque in corporibus albidioribus, in mulieribus atque in pueris, in quibus sanguinem in quacumque ætate posse tutò eo modo vacuari nos aliàs in libris de medicina

In lib. 4. sec. 2.
sex. 6.

„

„

„

medicina Egyptiorum demonstrauius. De internis verò medicamentis conuenient decoctum ex medicamentis facultate quidem laxatorijs & simpliciter laxando, & humores extenuando, atque detergendo. cuiusmodi erit decoctum quod paratur in aqua ex folijs betonicæ, ægromonij eupatoriij Arabum, cichorei, funci, & ex radice iridis; atque ex caulibus altheæ, huius decocti dabuntur vtriq; quatuor cum saccharo ad idem verò, & aqua stillatitia calida chamæmeli meliloti, cichorij & similium cum saccharo propinabitur. & si hic morbus diu perseuerauerit, vtantur ægroti sudorifico decocto ante prandium per horas quatuor, quo vel in lactulo cucurbitis plenius aqua feruenti propè eius corpus sepultis, vel alio modo. quod si æger poterit tinam laconicam ingredi suffumigio ex lapide molendinerio decocto calido chamæmeli, betonicæ fenugreci, altheæ asperso, in calefactam, epoto infra scripto decocto calido ad semilibram, spacio mediæ horæ sudabit. hoc quidem præsidio, nihil vtilius ad hunc morbum tollendum. Decoctum parabitur accipiendo, cimarum calaminthæ, betonicæ, altheæ, an. p. ij. radices cannarum siccæ minutim incisæ vnc. 15. Aquæ communis lib. iij. bulliant ad consumptionem medietatis, & coletur, cuiusquidem decocti semilibra exhibebitur. ex externis eadem, & fomenta, & cataplasmata, & in fessiones, & balnea, inunctiones, vnguenta, atque cerata conuenient quæ & ad hepatis & ad lienis phlegmones digerendas superius à nobis præscripta fuerunt.

*De renum phlegmone sananda.**Cap. XIX.*

PHlegmone renum plerunque substantiam inuadit, & aliquando contenta, scilicet, venam, arteriam, neruum, sinus, carunculas, atque vasa vterera, quæ à sima ipsorum parte ortum trahentiâ in vesicam desinunt. Huius signa sunt, dolor lumborum, si ambo renes phlegmone fuerint vexati, vel alterius lumbi, scilicet renè vno solummodo affecto, iliorum atque (vt ait Aurelianus) etiam clunium; qui dolor (auctore Hippocrate) grauis est, scilicet ipsorum carnosâ substantia phlegmonem patiente. si verò partes membranose afficiantur, scilicet tunice venes obregentes interno sinu, arteriæ venæ, productionesq; vasorû vridarum, dolorem acutum obseruari Galenus in aphor. commentarijs, tradidit. Atque etiam à magna sanè phlegmone præssis renum arterijs dolorem itidem cum pulsu fieri, atque obseruari. Tumor etiam in rene inflammato, præssu animaduertitur, potissimum renum carnea substantia phlegmone obfesa. Adest itidem in eadem parte ardor, febricula, mentis alienatio, vrinæ reddendæ difficultas, quæ initio phlegmones pauca, tenuis, aquosa nullo enæoremate prædita mingitur, posteaque aucto morbo mingunt crassa, mucosa, rubicundiora, & ut aliqui animaduertunt, colore sæculento in uini colorem nigrum inclinantia, nimirum sanguinis portione renum uenulis nimia præssura uel apertis, uel (vt ait Aurelianus) ruptis excreta, urinæq; permixta, quippè urinæ prodeunt crassæ, rubræ ad nigrum colorem mutæ. febris etiam concomittatur aliquando læuis, & aucto morbo uehemens, continua, quæ cum horrore quodam & refrigeratione manuum & pedum inuadit, & remittitur, aliquando nullum typorum ordinem seruans. accedit etiam mentis alienatio non perpetua. Vomitusq; biliofi. Morbo verò in peius labeate, omnia symptomata uehementiora euadunt, egri, naufragi, sunt uomentes etiam cibum, uenter adstringitur, fastidia uehementia egrotos urgent. si uero in pus uerratur æque etiam, ut dictum est, omnia augentur, & febres inordinate cum horrore inordinato & uario inuadunt doloresque itidem augentur, quæ signa Galenus ita expressit: Quumque renem quempiam ita affectum esse cognoueris si dolores cum horrore interpellato, uarioque inter-

Hh etare

In 6. epid. sec. 2. tex.

In 6. aph. com. 5.

C. Aurel. in li. 5. chron. cap. 3.

In 6. de loc. affect. cap. 3.

stare videantur, sequanturque febres quedam inordinate, tum primum in ventrem
 decumbere, itaque interdum in alterum latus, aut sublimis sit affectus partis por-
 situs, laborantem sese vertere iube, ac deinde interroga, num circa renem dolen-
 tem, veluti suspensi cuiusdam ponderis sensum percipiat. etenim cum hæc acci-
 ciderint, abscessum iam collectum conijcere oportet: Quo concocto pus mictum
 ut laborantem a dolore liberat ita vlcis in rene periculum affert. Hic morbus
 stricturæ passio est in renibus, facta ab humoribus in renes decumbentibus. so-
 lent vero præcedere attritiones, percussiones, plagæ, vel immoderata venus, vel
 æquitationes vehementes, aut nimie ambulationes. hæc omnia ipsos renes
 aptos, ut phlegmone deprehendantur efficiunt. Qui affectus peracuta passio est,
 quia simul & venæ à iecore in renes discurrentes inflammantur, & cum illis etiam
 iecur. Accedit etiam quod urina suppressio superuenire solet, quæ phlegmone
 vehementiam auget, unde vel mortis periculum impendit, vel coctione phleg-
 mone in abscessum à cuius eruptione pus cum urina difertur & interdum sor-
 des, aut corrupta caro ex putri renum substantia; vacuato, purgatoque ab-
 scessu vlcus manet diuturnum admodum, ac ferè immedicabile. Itaque in hoc
 affectu in id incumbendum erit, ut si fieri, queat, humor in renibus adstrictus,
 laxatorijs medicamentis digeratur, quoad fierique potest, prohibere, ne in opus
 vertatur, quod si fuit, ut quanto citius à rebus per urinam expurgetur, ne vlcus
 remaneat, & si remaneat siccet. Porro ut id assequatur, præmissis clystere la-
 xatorio (quod ex decocto maluarum, violarum, mercurialis, altheæ, seminum
 fenugreci, lini, & ex oleo violato, melleque rosaceo paratur, vel huius loco ad-
 alium laxandam, dabitur medicamentum leniter laxatorium, cuiusmodi esse
 cassia cathartica ad vnciam & semis, cum saccharo vel syrupi rosati laxatiui ad
 vncias quatuor, ex sero lactis, & eodem sero superbibito ad libras tres, vel quæ
 etiam primum dextri cubiti interna, & postea aut quæ in Poplite est dextri cruris, aut
 quæ in malleolo secta. mirifice quoque conueniet sanguinis vacuatio scarificationis
 cruribus. & postea etiam plurimum conducet, si venis fedalibus sanguisugis ap-
 positis eadem sanguinis euacuatio repetatur. Quibus factis vacuationibus quoti-
 die decoctum propinabitur facultate laxatoria præditum, cui in principio fuerit
 admixtum medicamentum facultatis adstrictoriæ, vel repellentis, cuiusmodi erit
 plantago, polygonum, cichoreum pentaphyllum & similia. dabitur tamen ad
 calidum. tale aut parari poterit. Accipiendo, foliorum maluæ, altheæ, cicho-
 rij, funi, polygoni an. p. i. seminum fenugreci, lini an. vnc. 5. radices altheæ mi-
 nutim incisæ vnc. i. in sufficienti quantitate aquæ fiat decoctum, cuius quidem
 actum temperate culidi cum saccharo dabitur ad vncias quatuor, & postea dabitur
 paratum solummodo ex laxatorijs, planè adstringentibus, sublatis, atque de-
 mum phlegmone concocta, laxatorijs, miscebuntur etiam vretica ad humorem
 purgandum per urinam. Inter quæ medicamenta hoc erit ad prime accommoda-
 tum, nimirum quod paratur, accipiendo exempli causa, seminum maluæ, al-
 theæ, fenugreci, Apij, irionis an. 3. iij. ligni altheæ minutim incisi, radices pe-
 troselinii an. vnc. i. foliorum itidem maluæ, altheæ, violæ, apij, petroselinii an. p. i.
 bulliant in lib. ij. aquæ ad consumpt. tertiæ partis & percolatum cum saccharo ca-
 lidum decoctum, in aurora propinetur, eodem modo etiam conueniet masticæ
 leb ab Ægyptijs vocatum: quod parabitur, ex seminibus maluarum, altheæ,
 hordei, portulacæ apij, irionis, petroselinii melonis, cucumeris, fenugreci an.
 partibus equalibus, omnibus in mortario contusis ex aqua chamæmeli, lac ex-
 pressum temperate calidum cum saccharo candido exhibeatur. ex externis præ-
 fidij conuenient in principio inunctiones ex vnguento rosaceo santalinoque, ex
 oleisque rosato, nenupharino, adhibitis tamen ipsis temperate calidis. & postea
 vsum habebunt prorsus, olea dulcia, temperate calida, ihydrelæum, oleum chamæ-
 momelinum,

mæmelinum, amygdalinum dulce. tamen cauendum erit, ne hæc atque alia (vel epithemata sint, vel fomenta, vel balnea) multum calida adhibeantur, quod multum calida suppurationem moueant. veluti etiam in principio actus frigida cauendum erit, ne adhibeantur, quod calorem flammeum intus claudant, euaporationemque omnem prohibeant, phlegmonemque augeant. Aliqui fuerè vsque adeo temerarij, vt spongia ex aqua algida expressa, vel folia nenupharis, quæ diu in aqua frigidissima manserint comodo actu frigida lumbis pro medicamento adhibuerint, quo præsidio quidam in iuuentute valde robusti (eo sanè modo, quo Hippoc. in aphorismis docuit tumores aliquando & dolores articulorum) large affusa aqua frigida sanari iuuati fuere in causa quod alij debiles maximeque senes eodem præsidio refrigeratorio ad phlegmonem renum vsj, plurimum læderentur, & exinde aucta phlegmone mortem quoque obierint. cuiusmodi proximis diebus fuit per illustris Sigismundus de capitibus listæ, qui cum renum dolore ex phlegmone conflictatus (quod in iuuentute aliquando vsu foliorum nenupharis in aqua refrigerantium, lumbisque admotum, aliquid iuuamenti, se sensisse, meminerit) in senio vltimo eodem morbo & meo quidem iudicio sanabili vexatus ab ijsdem folijs frigidis adhibitis, morbo in peius mutato tandem extinctus est, atque non sine magno patuinorum dolore, & mæore, cum ipse semper & bene vixerit, & omnibus fuerit carissimus. Redeo ad reliquum curationis renum inflammatorum. Quare de externis medicamentis sermone recepto dicimus ea, neque multum calida conuenire, quod pus mouere hæc apta nata sint, & neque frigida, cum hæc præterquam quod morbum intus meatus claudendo laxationemque omnem prohibendo, augeant etiam in debilibus calorem innatum extinguunt. Nam non semper frigidi occurfus calorem intus frigiditate propulsum reuocat, sed solummodo in maxime robustis. vnde Galenus recte dicebat: Aquæ frigidæ occurfus aut vincit natium calorem, aut colligit. vincit quidem cum debilis fuerit: Colligit cum fortis, ipsum diffusi-
²¹ ri prohibens. Quo maxime constat actu frigida non conuenire, at solummodo quæ temperate sunt calida, cum hæc medicamenta laxantia sint, phlegmonibusque omnibus, quæ morbi adstricti sunt, maxime conuenientia. Quare, epithemata ex aquis vel ex decoctis maluarum, althæe chamæmeli, meliloti, sænugræci & similium parata conuenient, tepida. atque ex ijsdem spongiarum euaporationes, inunctiones ex oleis nuper dictis vim digerentem laxantemue habentibus. Neque nobis obijciatur, à Dogmaticis experientia deprehensum fuisse, medicamenta potestate frigida maxime conuenire vnde ex oleis, rosaceum, violarum, myrtinum, ex aquis polygoni aquam vel plantaginis, vel portulacæ (Alexander Tralianus summis laudibus commendabat vnguentum, ex oleo rosaceo, succo polygoni, modico aceto & cera paratum) & similium conuenire. esto quod conueniant, non tamen actu frigida, sed calida quidem temperate (quomodo proximam cum laxatorijs medicamentis facultatem habere videbuntur) quod eruditissimè paradoxum haud videbitur, si præsertim animaduertent, balneum aquæ temperate calidæ (cum tamen omnes sciant aquam vim habere refrigeratoriā) habere vim laxatoriā, quod meatus rati-
²² refaciendo laxet. Quæ balnea renibus inflammatis conuenient, atque etiam multo plus, si aqua fuerit alterata malua, althæa, chamæmelo, sænugreco & similibus. His omnibus addatur conueniens victus ratio, omnino similis ei, quam in hepatis phlegmone instituendam, scripsimus.

In lib. 5. aphor.
 sex. 21 & 25.

In 5. aphor. 21.

De vesica phlegmone sananda. Cap. XX.

In 2. progn. tex.
71.
In 7. coac. pr.
sag. sec. 2. tex. 49

Vesicam sæpius quoque phlegmone vexari cuilibet in arte medica versato, li-
quido constat, maximeque in ipsius vesicæ musculo. Huiusce vero morbi
tria præsertim signa pathognomonica Græcis dicta, constat itidem observari sci-
licet dolorem iuxta pectem, pubem, pudendi radicem, ilia atque elunes vehe-
mentem cum ardore; duritiem itidem etiam iuxta pectem & pubem; atque fe-
brem continuam & acutam. Alij addunt, vigiliam, amentiam, vomitum bilio-
sum, magnamque urinæ difficultatem, & quandoq; suppressionem. Hæc passio
stricturæ inter morbos vesicæ grauissima & maxime mortifera est, lethaliorque
in qua dolor vehementior excitatur, cum febre valde acuta, ac duricie vesicæ
iuxta pubem obleruata, cum alui urinæque suppressione. De qua Hippocrates
in prognosticis & in coacis præfagijs ita scripsit: Vesicæ duræ ac dolentes omni-
no malæ; pessimæ vero cum febre continua. nam qui dolor inde est, necando
homini satis esse potest, atque ijs alui non multum deiciunt. Mitis vero phleg-
mone erit, si dolor atque durities erit moderata, neque febris acuta sit. hæc vero
varios exitus habere apta est, aliquando in gangrenam mutatur, aliquando scir-
rhi modo induratur, aut quod salutare magis est sensim digeritur, aut repente in
cute oborto erysipellate resoluitur, aut in suppurationem vertitur (quod si fiat do-
lor, atque febris ingrauescunt, atque sine ordine horror inuadit) aut denique
multa urina excreta, malum conquiescit. Quod coacorum præfagiorum auctor
hisce verbis expressit: Soluit autem hæc urina purulenta, quæ album habeat,
& leue sedimentum. Idcirco vna præcipua salutis spes erit in coctione phlegmo-
nes constituta, & pueris eruptione albi, levis, & æqualis cum urina laudabili.
etenim concocta phlegmone in internum ipsius vesicæ spacium humores conco-
cti confluunt, & cum urinis excernuntur, probæ coctionis notas ubi subfederint,
præferentes. Quod si pure ita erumpente fiat profusa urinæ copia tumor subsi-
dit, vesica remolefcit, febris imminuitur, atque excrementis exitus patet. Quod
pertinet ad curationem, eadem prorsus præsidij, quæ ad renum phlegmonem
prescripta fuerunt, erunt tentanda; Namque aluo, vel clystere simplici laxato-
rio, vel medicamento leniter, itidem laxatorio (qualia in alijs partibus phleg-
mone confictatis, conuenire diximus) laxata, vena secta expoplite vel ex mal-
leolo, si dolor vehemens fuerit, virium robore permitte saguis mittendus erit.
Aliqui reuulsionis gratia primo secant venam cubiti internam, mox, quæ in mal-
leolo est. cuius loco crurum scarificatio maximè in pueris, mulieribusque satis-
faciet. Intus conueniet iniectum per podicem oleum chamæmelinum, amygdali-
num, & in quo fuerit decocta althææ radix, fenugrecum uè. Decoctum iti-
dem ex mamæmelo, anetho malua, althæa, meliloto, fenugrecolino, & simili-
bus clystere sæpius in aluum injicietur. exterius conuenient fomenta ex hydre-
leo calido cum vesica pubi adhibita; vel ex oleo chamæmelino, aut ex amygdali-
no, vel communi in quo radix althææ fuerit incocta. magis laudantur iniectiones
ex iisdem vel oleis, vel decoctis paratæ, in quas ægrotos imergi atque per hora
spacium & plus insidere est opus. Quod si dolor non cessauerit quibuscum ex
Dogmaticis visum est, posse cum interius, tum exterius vri oleis prædictis in
quibus papaueris capita fuerint incocta, atque etia adeps, gallinaceus, & anseri-
nus fuerint dissoluti, ac non minus quoque ubi dolores vehementissimi sint, me-
dicos medicamentis narcoticis sensum partis læsæ heberantibus (cuiusmodi pa-
rantur ex opio, myrrha, & oroco) tutò vri posse, non minusque ex opio, vri di-
ctum est. cupitibus papaueris, hyosciamo atque mandragora. Quæ medica-
menta, tamen si sensum hebetando, atque stuporem inducendo, ali-
quid doloris leuare videantur, tamen quod stricturam densando, augeant,
natiuumque

nariumque calorem minuant, & humorum phlegmonem fouentium exhalationem siue digestionem prohibeant, non minusque, & futuram concoctionem retardent, ab ipsorum usu omnino esse cauendum merito Methodici duerunt: neque enim phlegmone, quæ passio stricturæ est, poterit sanari ab illis medicamentis, quæ adstrictoria itidem sunt. Itaque opus erit solummodo laxatorijs, quæ nos & in hoc capite & alibi sæpius ad phlegmones sanandos recensuimus.

De satyriasi, idest de phlegmone vasculorum seminis.

Caput XXI.

Cum satyriasis vasculorum seminis phlegmonosa affectio, ut Græcis medicis visum est, existat, merito hic de ipsa agendum quoque fuerat, quod fiet à nobis breui sermone, copiosius etenim de hoc eodem affectu posterius acturi sumus, scilicet, ubi de priapismo agemus. Itaque per satyriasmum affectum vasculorum seminis genitaliumque (ut Aretæus est auctor) phlegmonosum seu inflammatorium nos intelligimus, differentem, à priapismo, atque ab helephantiasis Græcorum, quam Galenus satyriasmum quoque appellauit, quod qui sic laborant facie satyris similes sint, atque etiam elephantici quia ad venerem, ut satyri proni sunt. differentem inquam à priapismo, quia in ipso affectu nullo veneris desiderio ægri stimulantur, ex satyriasi autem inter alia symptomata, quæ homines patiuntur, illud vnum maximum esse videtur, quod summo opere veneris desiderio incenduntur assidueque acerbèque diuexentur unde merito Aurelianus satyriasmum dictum fuisse, scribit, aut à satyris, aut à satyrio herba (hæc enim, ut Themison narrat. hoc malum maxime facit, quo etiam cretenses hoc affectu interemptos vidisse, scripsit, quia frequentius, liberaliusque ea herba in cibis visui fuissent.) De satyris verò nihil singularius prædicatur, quam ipsorum ad venerem vehemens alueritas, atque promptitudo. Paulus inquit: Satyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidam seminis vasculorum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Quæ nisi finiatur in seminariis vasorum resolutionem aut conuulsionem delabi solet, & qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. & Aretæus quod satyriasmum cum priapismo confundidit, dixit: esse affectum qui laborantis penem excitat, erigitque atque ob satyri Dei similitudinem qui pene arrecto figurantur, satyriasmum fuisse vocatum, esseque genitalium inflammationem & dolorem statuit, & postea esse etiam subdidit in explibolem coeundi appositum, qui multo assidueque concubitu nihil iuuatur, neque arrectio penis sedatur. Nervorum in uirilibus inflammatio penis tentiginem facit, cum appetitu, contristationeque in actu uenerio: sunt autem distentiones nervorum conuulsioni per similes nunquam mitigabiles. Aurelianus vero scripsit: Satyriasmum esse vehementem veneris appetentiam cum tensione rigida veretri ob morbosam corporis passionem, aut ab epotis medicamentis satyricis vocatis, quæ homines ad venerem incendunt, aut ab immodico, vel inordinatoque veneris usu. Qui hoc malo laborant, sentiunt uehementem genitalium tentiginem, cum dolore atque incendio, cum quodam pruritu immodico in ueneream libidinem cogante. Adest simul mentis alienatio facies rubescit, pulsus densitas, anhelatio frequens, creberrimaque desperatio, vigilia, hallucinatio, sitis, cibi que fastidium: Aretæus addidit largum vomitum, spumam labijs inesse, ut hircis furientibus libidine, urinum postlongam retentionem effundi album crassam, semini similem, pulsum paruum, languidum inordinatum esse, difficilis itidem urine mictio, sit atque ira, ut plerumque stercoreum abstentio fiat. Nonnumquam febris illos concomittatur. Postremo omnibus conuulsio nervorum fit, atque inuoluntarius seminis

In lib. de caus. morb. cap. 5.

Galen. 6. de loc. affect. cap.

In lib. 3. oxeon. cap. 18.

In lib. 3. c. 56.

In lib. 3. oxeon. cap. 18.

feminis iactus. Putant verò ex usu venereo feminisque excretionem initio se leuiter releuatos, sed paulo post vehementer extenduntur. In mulieribus hoc malo affectis plus præualet prurigo. Etenim prurientibus pudendis, in pudenda deuorato pudore manum mittentes, omnes viros, qui ipsis occurrunt, appetunt, & suæ libidini supplices seruire cogunt. Aretæus mulieres satyriasi non corripit, sed potius prurigne quadam. Iniuria tamen confudit satyriasmum cum priapismo, cum tamè aperte ab eo distinguatur. hæc enim phlegmonosa affectio est acuta cum ueneris desiderio inextinguibili atque feminis excretionem. Priapismo autem affecti, neque ueneris desiderio stimulantur, neque semen excernunt. Hæc passio stricturæ est, acuta atque vhemens, quæ cito in spasmon homines deducit, atque in exitium. Aretæus ait plerumque septima die interimere: statim itaque providendum est, atque primo omnium veterum medicorum consensu ex præfidijs laxatorijs, primas partes habere phlebotomiam ex secta scilicet dextri cubiti interna vena, atque postea etiam ex talo, & quandoque (ut Aretæus voluit) modo vires commodè ferant ad animi deliquium sanguinem esse mittendum. & hoc fiet quidem præmissis molli clystere quo citius poterit. Aurelianus Aretæus atque Paulus cucurbitulas cum scarificatione commendarunt, clunibus, coxis atque pubi apponendas non minusque etiam si sanguinis plenitudo adfuerit hirudinibus, prædictis partibus appositis. ac fortasse etiam multo cum fructu sedalibus venis; namque præmissa vniuersali sanguinis vacatione per venam sectam (vbi dictum est) nullus timor fieret, ne ad partem affectam sanguis attraheretur, at diuersio fructuosa sequeretur. Aretæus purgationem ex hiera sacra non omittebat. Dereliquis vero laxatorijs haud omnes Methodici equæ sentiebant. Themison huius sectæ auctor antiquissimus. primo phlebotomiam faciendam proposuit, & recte sanè cum satyriasis morbus sit adstrictus, sed postea curationem mutando, fomenta, cataplasmataque frigida facultatis adhibenda esse voluit, quibus scilicet possit extingui ueneris appetitus cum quo Dogmatici coniungunt a calfactorijs. Profecto in principio neque Methodicis aduerlabitur frigidis medicamentis scilicet densantibus adstrictisue vocatis medicos vti ad repellendum sanguinem, & humores ne copiosius ad partem affectam fluant & affectum inflammatorium augeant. Porro superius demonstrauius haud inconuenire in phlegmonum principijs ad repellendum medicos vti medicamentis adstrictorijs. profecta verò phlegmone insatyriasi incongrua esse omnia adstringentia, seu densantia, & Methodici, & Dogmatici necessario fateri cogeuntur, cum omnis phlegmonosa affectio inflammatoriaque digerentibus tollenda sit, quæ laxatoria sunt Methodicorum: unde recte quidem Aurelianus Methodicus Themisonem redarguit, qui usum adstringentium medicamentorum in morbo adstricto proposuerit, laudaueritque. quod si hæc in huius passionis principio fore adhibenda ad prohibendum passionis argumentum sentit, nulla reprehensione dignus erit. cui curationi conuenisse visus est Aretæus, qui cum frigidorum & ipse usum proposuisset primo, deinceps inquit, mutandam esse curationem, ita ut ad calidorum usum sit propinquandum. Mirum est, quamobrem Aretæus in libro 2. dixerit: stuporem & refrigerationem satyriasmum medicare. cum his præfidijs prohibeatur digestio phlegmonosi affectus. & malum intus claudatur. Quare fatus cataplasmata, inunctiones, & reliqua, à nobis superius ad phlegmonas tollendas sæpius præscripta medicamenta in hoc affectu usum absque dubio habebunt. Eademque & victus ratio congruet.

De uteri phlegmone sananda. Cap. XXII.

Restat ex internis partium internorum phlegmonis, ea quoque curanda, quæ vterum in mulieribus obsidere solet. quæque sæpe aut ex ictu vel percussione aliqua, aut ex multa venere aut ex abortu, vel à fetu laborioso edito, aut ex multo vehementiq; frigore, vel denique à suppressis menstruis excitatur. Huius quidem strictione in vtero signa patognomonica erunt, dolor, tumor, atque febris continua acutaque. Dolor quidem cum ardore, plerumque tensius & grauis quandoque vero & pulsatorius & acutus, si phlegmone vsque adeo magna sit, vt magnas vteris arterias comprimatur, vel membranas occupet, qui etiam si totum vterum phlegmone teneat, in omnibus eius partibus sentietur, obseruabiturque iuxta lumbos, spinam, pubem, circa inguina, coxas, vmbilicum, abdomen, atque circa os vteri. si vero vteri partem solummodo strictione hæc passio occupauerit, dolor iuxta eam partem erit animaduertendus, scilicet, si in ore fuerit illius visceris digito inpuendum immisso maxime deprehendetur, si in lateribus erit phlegmone, dolores inguina attingent, nec non etiam coxendices, vel coxendicum altera dolorem sentiet, quippe quæ è directo parti affectæ posita est. vnde aliquando etiam crus ob hanc anam claudicat. vbi vero huiusce visceris cavitatem malum occupauerit, dolor iuxta vmbilicum obseruabitur, atque ita, vt ne contactum quidem foris admittat eodem modo eius anteriorem partem phlegmone tenente dolor erit iuxta pubem, aderitque vnâ vel vrinæ difficultas, uel suppressio; atque demum morbo in posteriori parte existente, dolent lumbi atque spina. Tumor etiam eodem profecto modo tactu & pressu innotescet iuxta illam partem, in qua phlegmone erit. Aderit febris quæ & continua erit, & uehemens, neque mirum est, cum hoc quidem membrum maximas uenas, arteriasque habeat, per quas phlegmones, calore multo cordi communicato, febrem quoque fieri uehementem necesse est. præter hæc signa adest etiam una capitis dolor iuxta sinciput, quippe per uenas arteriasque uteri maximas in caput elatas, mittentesque ad sinciput plures & maiores ramos, per quos magnis euaporationibus calidis eam capitis partem petentibus dolores fiunt. & per consensum quandoque etiam tendines capitis, oculi, brachia, digiti, collum, stomachusque dolorem sentiunt. At dolor sincipitis, magnarum huiusce membri phlegmonum ferè unum ex signis pathognomonicis esse, uidetur. De quo Hippoc. ita meminit in epidemijs: Quibuscunq; ex fetu abortiuo atque uteri tumoribus ad capitis grauitatem conuersio sit atque in sincipite dolores fiunt. Hic morbus grauisimus esse solet, præsertimque si ex abortu, uel ex laborioso partu edito fiat. pessimusque iudicabitur, si dolores uehementes fuerint atque febres etiam uehementes: exitialis uero erit vbi animi deliquium, exolutio, singultus, extremorum refrigeratio, exudatio, delirium, vrinæ & sæcum suppressio aderit. In curatione primum aluo uel clystere laxatorio, uel ex cassia cathartica cum saccharo, uel alio medicamento ex lenitorijs purgante laxata: uena uel in poplite uel in malleolo secta sanguis, uiribus permittentibus, detrahetur, uel primum reuulsionis gratia in cubito internam, & postea in malleolo ad moliendam sanguinis vacationem, secabimus: deinceps singulo mane propinabitur decoctum calidum ad uncias quatuor cum saccharo, quod parabitur (exempli gratia) accipiendo sem. maluarum, altheæ, hordei, sænugræci an. 3. ij. caulium altheæ, & radicis minutim incisæ an. unc. 5. fol. maluarum, altheæ chamemeli, boraginis, endiuiz an. p. i. bulliant in lib. ij. aquæ ad consumptionem tertiæ partis. De externis uero epithemata ex oleo, & uino in quibus althea fuerit decocta. Alij pubi atque alijs partibus dolentibus adhibent, rosas, & chamemelum in uino albo decoctum. Fomenta ex althea, malua, sænugræco, lino, meliloto, artemisia, parthenio

In 6 epid. sec. 1.
tex. 1.

Galen. in 2. ad
Glauc. cap. 2.

parthenio & similibus alijs in aqua parata conuenient. pessi itidem laxatorii vtilis erunt, quippe ex oesipo, medulla ceruina, vitulina, adipe gallinacco, anserinoque. Alij parant, fanugrecum in aqua ipsum madefaciendo, & ter mutata aqua, cum noua puraque aqua ebulliunt quoad tertia pars absumatur, & iuri percolato addunt adipem gallinaceum, vel anserinum, atque ad ignem liquari sinunt, & mox concretum seruant ad usum. quo liquato pessi inuncti induntur in pudendum. In sessiones etiam erunt vtilissimæ, quæ confici solent ex decocto maluarum, althææ, fanugræci, chamæmeli, meliloti, artemisiæ, betonica & similibus in aqua parato. quo temperate calido vtendum erit. vtilissimum quoque pro infessione (auctore Dioscoride) decoctum ex radice sicca iridis in aqua paratum, deprehendetur, maximeque si à suppressis menstruis phlegmone fuerit oborta.

De tumoribus internis non phlegmonosis. Cap. XXIII.

HActenus de internis tumoribus phlegmonosis egimus, & quomodo via methodica curari debeant, quibusque medicamentis, satis accurate nos docuisse, putamus. Nunc restat de iisdem tumoribus internis non phlegmonosis, vt in præsentia agamus, ipsorumque curationem complectamur. per hosce tumores, eos intelligimus, qui citra febrē sunt, phlegmonē etenim necessario febris perpetuo concōmittatur. Horū variæ obseruātūr differētiæ, quæ vel ex materia quæ fiūt, vel ex tactu, vel ex parte interna quæ patitur, animaduertuntur. Namq; ex materia quædam est spiritus, statusuē, quædam humor. & ex humore quidam est ex sanguine, quidam ex bile, alij ex melancholia, alijque ex pituita, illi plerunq; phlegmoniosi sunt, perpetuoque qui effari digni, namque hos & febris & dolor sequi solet. hi vero contra plerumque absque febre & aliquando etiam absque dolore interna viscera vexant ex tactu, quidam duri sunt, & quidam molles. illi aliquando cum dolore sunt, & aliquando sine dolore. hi vero quippe molles semper indolentes (quod molle dolens non detur, cum tensio in tumoribus præcipua sit doloris causa) existunt. Ex locis, ferē oēs, vel secundā vel tertiā coporis regionem, scilicet thoracē, atq; ventrē vexare solent. particulatim vero in his hæ partes tumoribus inuaduntur, scilicet pleura membrana, musculique interni intercostales, pulmones, diaphragma, cauitates Thoracis, pericardium, stomachus, os ventriculi, mesenterion, mesocolon, omentum, intestina, hepar, lien, renes, vesica, vterus. Hæc passio stricturæ est sine febre, quemadmodum phlegmone strictura cum febre, morbusque itidem adstrictus, qui laxatorijs quoque medicamentis opus habet, vt tollatur. Medicis verò hic morbus iisdem signis innotescit, quibus phlegmones illarum partium deprehendi superius docuimus. hoc excepto, quod absque febre afficiat corpus. Maiori autem ex parte tactu, pressuq; strictura hæc cognoscitur, atque eodem fermē modo, quo internarum illarum partium phlegmonum duriciem, tumoremque cognosci docuimus. De ijs, qui ventrem færigant, Hippocrates in epidemijs ita scripsit: spiritus hypochondrijs eleuatio mollis & intentio neutra; in ipsis sursum rotundum in dextris veluti circumferentia, supporatoria. Aliud longius magis, aliud diffusum, aliud deorsum repens & hinc inde contentio vsque ad vmbilicum. in omni sursum rectitudine, si reuocetur, & abeat in rotundum, siquidem spiritus sine iudicatione, extenuatur calore, si autem hæc effugiat in suppurationem tendit. ex his musculorum potius quam aliarum ventris partium, internarumque tumores deprehenduntur, sed expressu deprehenduntur etiam qui in hepate liene ventriculo, mesenterio, ilco, pancrea, omento, renibus, vesica, atque in vtero sunt. Iuuabunt præsentem

In 2. epidem. 3.
Axx. 10.

præsentem cognitionem complura alia si animaduertantur, scilicet grauitas, siue (vt ait Galenus) aliquis alicuius in ipsa parte ponderis sensus, respirandi angustia quæ densa est, & inæqualis. non enim hi magnam habere possunt expirationem, atque in ea ipsos quandam angustiam cum grauitate sentire necessesse est. singularum verò partium in tumorem elatarum particularis cognitio à singulis singularum partium phlegmone vexatarum, de quibus ante scriptum est, petenda erit. porò cum tumescant partes aliquando ex flatibus, aliquando ex humoribus, nos nunc de tumoribus ex humoribus obortis, loquimur. de ijs, qui ex flatibus fiunt, postea (cum de dolorum curatione sermo instituetur) agemus. cum vero eorum itidem tumorum quidam à sanguine, vel à flaua bile oriuntur, quidam ex pituita vel à melancholia, qui cedemata, vel cedematosi tumores, & scirrhi, vel scirrosi dicuntur, hi duri, atque illi molles sunt ac ferè omnino indolentes. Qui ex sanguine, phlegmonosi, & qui ex flaua bile erysipelatodes dicuntur, atque quod isti humores tenuissimi sint & calidi, raro sine inflammatione existunt. vocanturque vel phlegmonosi vel erysipelatodes. de quibus & superius de phlegmonis internis scribentes egimus, & rursum agendum aliàs quoque erit, cum de externis quoque librum sequentem scribemus. Itaque tumores, de quibus agimus, omnes sunt aut cedematosi, aut scirrholosi. Qui omnes cum morbi adstricti sint, laxatorijs tollentur medicamentis. ceterum priusquam subdamus materias præsidiorum, ipsorum exitus varijs/quod de prognosi erit agere) accurate sunt à nobis animaduertendi. primus est, materiam tumorem facientem digeri & resolui, quod est omnium exituum in ipsis tumoribus maximè expetendum: nihil enim vtilius quàm fomentis tumores digeri. secundus materiæ ad extra recursus (metastasis vocant) humoris quippè à parte in tumorem elata extra recursionem, uel excretionem aut per ventrem, aut per vomitum, aut per hæmorrhagiam, aut per vrinam, aut denique per sudorem eiusdem humoris tumorem facientis. Quo semper vtile erit à tumoribus internis partibus vexatis, cum excretiones humorum spontaneas obseruari, tum etiam humoris vel ad cutem uel quouis modo ad partes extimas metastasis, id est transmutationem. Tertius est in pus tumorem uerti siue suppurari. qui exitus vtilis erit, modo eruptio fiat in partibus, quæ vijs proximæ sint per quas commodè pus expurgari queat. vnde in pulmonibus atque in hypochondrijs semper suppuratio mala erit, cum pus genitum haud commodè expurgari possit. sed de vomitarum iudicio posterius accuratius agemus. quartus est cum in insignem putredinem mutantur, quod est pessimum. vnde tumorem internum in canceram mutari maximè exitiale erit. Demum in scirrhosam duriciem non raro mutari solent, plerumque ex usu medicamentorum vehementer calefacientium & siccantium tenuioremque humorem absumentium. Qui tumores scirrholosi si prorsus doloris expertes euaserint atque insignem duriciem nanciscantur, prorsus insanabiles redduntur. Quod pertinet ad curationem, si dolor vehemens fuerit, viriumque robur permittat, sanguis mittendus erit aut secta vena aut crucibus scarificatis. Vena autem in tumore afficiente pleuram membranam, aut pulmonem, aut thoracem, aut diaphragma, aut ventriculum, aut intestina, vel mesereon, vel mesocolon, vel omentum, vel pancreas, vel hepar, vel denique lienem ex cubito interna secabitur, ex crure verò scilicet vel in poplite, vel in malleolo, ubi tumor renes, vesicam, atque vterum occupauerit. si dolor mitis sit, vel indolens tumor, non erit necessarium vti magno laxatorio, quod est sanguinis vacuatio per venam sectam. quæ vacuatio non fiet, ni alius aut laxatorio pharmaco ex lenitorijs, aut saltem clystere mollitorio fuerit laxata. Ex internis verò vtile erit medicamentum sudorificum, si tumor fuerit contumax, sanarique difficilis neque cedat laxatorijs tum externis tum internis. Quo sudo-

I i rifico

Gaenl. in lib. de
curan. rat. per
sang. miss. c. 18.

rifico decocto infra præscribendo, si ætas permiserit, bis in die ægrotum sudare oportebit: si vires propter ætatem non sint vsque adeo validæ, sat erit semel in die sudare. sudabit autem in tina lignea oblonga, quam balneum Laconicum (quod apud Lacones sit admodum familiare) vocant. poterit verò æger sudare ad minus spacio dimidiæ horæ, & mox deterfo sudore in lectulo calido manebit per horam & plus, etenim etiam in lectulo sudor renouari solet. mouendi sudorem varij modi sunt, qui tamen ad duos tantum præcipuos reducuntur, scilicet ad calorem externum, quo mouetur sudor, aut siccum, qui ignitis carbonibus substratis paratur, aut humidum, qui decocto aliquo lapidibus molendinarijs intra tinam positis, ignitisque aspersis, excitatur. præstabit tumores viscerum à calore humido sudore excitato, resolueret. Sudorificum autem decoctum, cuius calidi dabitur singulis vicibus ad vncias octo, hunc in modum parabitur: aut ex radice chinæ, aut ex arundinis itidem radice sicca, aut ex salsa parilla, aut ex ligno Indo, aut ex calamentho. atque in omni decocto ex prædictis parando accipietur medicamentum suapte natura laxatorium, cuiusmodi est, althææ radix sicca, vel eius caulibus, vel folia, vel chamæmelum vel fenugrecum vel aliud simile. Itaque (exempli gratia) prædictum decoctum parabitur, accipiendo radicis arundinis siccæ minutim incisæ vncias tres, radicis ligni Indi raspati vnciam vnam & semis, vel calamenthi montani, chamedrios an. p. i. radicis althææ siccæ vnciam, vel eius caulem minutim incisum ad vncias duas. Quæ macerata per diem in aquæ communis lib. iij. bulliant, quoad medietas absumatur, & coletur, & exhibeatur, quo calidius absorberi potest. Cæterum, quod Dogmatici omnes faciunt, priusquam ad decocti sudorifici vsum ægroti veniant, præstabit corpus totum, prius vel decoctis vel syrupis vsualibus incidentibus, detergentibusque, atque vias laxantibus (cuiusmodi sunt oxymel simplex, mel rosaceum simplex, & syrupus acetosus simplex, de boragine, de eupatorio, & similes alij, cum decocto betonica, calaminthæ, althææ, fenugreci, petroselini, funci & similibus herbarum) laxatorijs medicamentis prius purgatum esse. Inter purgantia verò laxatoria optima erunt, agaricus trochiscatus, turbit, rhabarbarum, elleborus niger, senna, centaureum minus, & alia huius ordinis; ex compositis cataportia vulgo Coccia vocata, de tribus cum rhabbaro itidem dicta atque de hyera cum agarico. Quorum dosis à drachma ad geminam erit. ex compositis vero medicamentis eductorijs confectio hamec, Diaphanicon, diacatholicon, diafena, & similia. purgato corpore & facilius, & tutius sudorem in ægrotis promouebimus, sudabuntque tot diebus, quoad tumores maiori ex parte resoluantur. Verum enimvero priusquam ad sudorifica medici veniant, debebunt vsum & internorum, & præsertim externorum laxantium tentare, operamque dare, si possint eorum vfu tumores laxari digeriq; . Itaq; & inunctiones omnes ex chamæmelino oleo, amygdalino dulci, irino, & in quo althææ radix, vel folia ebullierint, vel fenugrecum, vel lini semen; oleum quoque de capparibus, de floribus ciclamini erit accommodatissimum, & fomenta itidem ex althæa, chamæmelo, meliloto, fenugreco, lini semine, & similibus, parata maximè iuuabunt, non minus quam parata cataplasmata laxatoria: adipem quoq; gallinaceum, anserinum, porcinum, butyrūque recentissimū, actu calida erunt accommodatissima. His composita victus ratio erit addenda, quæ erit, quam in phlegmonum curatione meminimus, hoc excepto, quod, cum affectus hi sint longiores, non valde tenuis erit præscribenda. à vino non erit abstinendum; quod tamen aquosum est, tenue, albumque, erit vtilius, vel quod sit substantiæ tenuioris. Quo tempore ægroti vten tur sudorifico decocto, vt per sudorem tumores digerant, si sobrium, tenuemque victum adiunxerint, & citius & efficacius morbum resoluent, neque in prandio & in cæna à vino etiam hoc tempore abstinebunt, quantitate vero paucum erit,

erit, & non nisi quoad prandium & cæna fiat concedendum. inter hoc tempus ab ipso planè abstineant, etsi etiam multum sitierint, huius loco aqua stillatitia non frigida cum saccharo erit substituenda. hæc pauca de curandis internis tumoribus à nobis dicta, si cum ijs coniungantur, quæ de phlegmonum internarum curatione scripsimus, nobis sufficient.

De ventris tumore, quem hydropem appellant, persanando.
Caput XXIII.

Quoniam & illa stricture passio, quam hydropem & aquam intercutem appellant, ad tumores internos pertinet, ipsorumque genere comprehenditur, idcirco de hac ipsa quoque (antequam huic libro finem imponamus) agere instituimus. Itaque hydropis nomine tumorem medici intelligunt, aut totius ventris, aut qui in omnibus corporis partibus fit, quique hydrops à nimia humoris abundantia dictus est. Ceterum hic affectus duplicis differentie existit, quatenus alter ab humore, atque alter à statu gignitur; ex hac causa obortum Hippocrates (auctore Galeno) siccum hydropem vocavit, atque posteriores quod venter percussus tympani modo sonat, tympaniam, & tympanitim. Qui verò ex humore, adhuc duobus modis fit, namque humor si ventrem tumefaciat, scilicet inter peritoneum atque intestina contentus, ascitim Græcis vocatam efficit, ascitim inquam ab vtre qui *ἀσκός* dicitur, quoniam corpore commoto sonus semipleni vtri audiat, merito dixerunt. vbi vero humor omnes quidem partes corporis, maximeque carneas tumefecerit, anasarcam, atque à phlegmate albo tumore faciente, leucophlegmatiam vocatam hydropem facit. Huiusmodi stricture passionem signa complura innotescunt: Hæc verò (ut Aurelianus animaduertit) in hydropis omnibus speciebus observantur. scilicet tumefactio ventris, vel etiam aliarum partium, pigrities corporis, non minusque & motio difficilis, somnus itidem difficilis, atque anxiosus, sitis assidua, febris latens, ac parua, cibi fastidium, vrinaque ad potum assumptum collatione facta paucior. Respiratio difficilis: atque vlcera si in ipsis erupant difficulter sanantur, particularis verò illiusce hydropis, quem ascitim seu aquosum vocant, hæc signa erunt propria, pathognomonica Græcis dicta, in primis enim tumor venter, cuius quidem tumoris in supine decumbentibus extantia, seu inflatio minor est, licet magis diffusa, in latitudinemque expansa, & maior, cum maiori que distensione in ijs, qui recte pedibus stant. signum certissimum erit, si ægroti cum è latere in latus moventur, percipiatur sonus aquæ defluentis, aut (vti Aureliano placuit) humoris collisi, vel ad concussam palmæ resonans tanquam semipleni vtris, aut (vt ab alijs observatum est) quod commotus venter his fluctet instar vesicæ semiplenæ. Inualecente stricture passione tumor ad femora, ad pedes, atque tandem ad scrotum descendit, maximeque post inambulationem humore inferius delabente. reliquæ partes corporis contabescunt, ob penuriam optimi sanguinis in ipsis, haud parum deficiente nutritione. cibum fastidiunt; continenter, humore intus collecto aut falso existente, aut putrescente, sitiunt. Quocum sepius bibere cogantur, in deterius, aucto humore, abeunt; Aliquando tussicula agitantur, ventremque & vrinam plerumque habent adstrictam. si in ipsorum cute pustulæ erumpant, difficulter coalescunt, quippe vlcera humore continue abundeque fouente, humefactaque. cum his febricula quoque latens adest & color vitiat. In tympaniti vero cum eadem ventris extantia, seu distensione tumor non diffusus, sed rotundior fit cum maiori, durioreque tensione, ob quam percussio ventre sonus perinde ac in tympano, auditur. in anasarca

In lib. 4. aph. 11.

*Hippoc. in 6.
aphor. 8.*

nedum solus venter tumet, sed quinetiam aliæ partes corporis, scilicet facies, col-
lum, pectus, venter, scrotum, crura, pedes, atque manus: Tumor autem non ex
æquo in toto corpore fit, ac in partibus inferioribus magis, ob humoris gravitatem,
corpus laxum redditur cum mollitie & frigidditate, quasi mortuo simile; graui-
tas adest totius corporis. initio cognoscitur perpetuo ex extremorum frigore fa-
cieque & palpebris, & pedibus intumescantibus, quandoque pedes primo intume-
sunt, atque ab ipsis crura, & aliæ superiores partes. Quarum partium tumor ab
eo, qui fit in ascite, distinguitur, quod in cute digitis pressa, remaneat fouea. Au-
relianus addidit factorem oris, atque etiam anhelitum fetidum. Omnis hydrops
omnium consensu fit ab humore vel in ventre collecto, vel in extimis partibus
cutaneis diffuso resudanteque. Neque enim tympanitis vocata, etsi maiori ex par-
te a flatu, ventre scilicet inter peritonæum atque intestina intercluso (ut viris do-
ctissimis visum est) causam habet, est expers humiditatis, siquidem flatibus hu-
miditas commixta est. Dogmatici omnes voluerunt, hunc morbum à refrige-
rato, labefactatoque hepate nasci atque foueri, vel hoc viscus per se patiatur, vel
per consensum ex alijs partibus, scilicet, à ventre ventriculoque, à vesica fellis, lie-
ne, mesenterico, intestinis gracilibus, ieiuno, pulmone, renibus, vesica, vtero, atque
diaphragmate. sunt itidem hi affectus ab interceptis vacuationibus consuetis
maximeque mensium in mulieribus, atque hæmorrhoidarum. Atque ab iisdem
etiam immoderatis fluentibus, nec non à qualibet sanguinis, & excrementorum
immoderata euacuatione diu perseverante, à diuturnis itidem morbis, scilicet à se-
bribus chronicis, nec non etiam à morbis calidis & acutis calorem naturalem res-
solventibus, à potu aquæ frigidæ, atque ab alijs causis hepar quouis modo vi-
tiantibus, quo læso sanguificatio quoque vitatur, unde sanguinis loco humiditas
aquea, atque flatus generantur, cuius quidem multitudo hydropem facit. Hip-
poc. scribit, hunc morbum incipere ex parte inani, lumbis, atque à iecore. de qui-
bus quidem ait: Quibus ergo ex inani parte, & lumbis principia aque inter cutem
sunt, pedes intumescunt, & alui fluor diuturnus fit, neque solvens dolorem,
qui ex inani parte efficitur, ac lumbis, neque molliens ventrem. Quibus tormi-
na & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento,
neque aliter soluitur, in aquam inter cutem firmatur. Pessima est (Hippocrate
auctore) quæ ex acuto morbo fit. Tympania omnium pessima existimatur,
ascitis & anasarca in principio curantur. Ab aqua vero inter cutem habito (ait
Hippocrates) si aqua è venis in ventrem defluerit, soluitur morbus: cuius quide-
euentus ratio habetur ex alio Hippoc. aphorismo, qui hæc habet: Qui leucophleg-
matia detinetur, si fortis ventris fluxus superuenerit, à morbo liberatur. Unde
in hydropicis viles erunt euacuationes omnes, vel sudoris, vel vrine, vel excre-
mentorum. Contra curatio erit difficilis, si vna cum morbo omnes euacuationum
viæ adstrictæ sint. Quo fit, augescente morbo, quod aqua ita augeatur, ut quan-
doque etiam asperam arteriam opprimat, quo Hippocrates rursus ob hanc causam
excitatam desperatæ salutis esse signum expressum reliquit: sed iam ad cu-
rationem huius affectus declinemus. In quo quidem, cum morbus sit adstrictus,
necessario vsui erunt præsidia laxatoria, cuiusmodi sunt, quæ manifeste euacuant,
scilicet, per ventrem, vrinam, atque per sudorem, unde ex medicamentis huic
negotio erunt accommodata; purgantia, vomitoria, diuretica, sudorifica, atque
omnia digerentia, seu per insensibilem transpirationem euacuantia. At cum
phlebotomia inter magna laxantia pro magnis morbis adstrictis tollendis con-
uenientia, primum locum habere soleat, cur in hydropem eius usum medici non
affectant? Quandoque in leucophlegmatia quæ fit aut mensibus, aut hæmor-
rhoidibus suppressis, medici sanguinem vel ex talo, vel ex poplite, initio mittere
solent, sed hoc solummodo præsidio in principio (quo tempore nondum hydrops
perfecta

In 2. prog. tex. 1.

In 2. prog. tex. 2.

In 4. aph. 11.

In 2. prog. tex. 1.

In 6. aph. 14.

In 7. aph. 29.

In 6. aphor. 35.

In 7. aphor. 47.

perfecta existit) videntur. Non enim inconuenit in hydropis affectis mittere sanguinem, quod magnus morbus non sit, at quia vires non constare in magno morbo & frigido possunt. omnem profecto aquam inter cutem fieri à labefactato, diminutoque nativo calore, omnibus medicis in confesso est. quomodo igitur vires constabunt ad mittendum sanguinem? Ob hancque causam medici huiusce vacuationis loco purgationes medicamentis, hydragogis, atque phlegmagogis moluntur, Cuius modi sunt, coccognidium, Mezereum, elaterium, Iridis Illyricæ succus, brassica marina, turbit, staphisagria, centaurium minus, & quandoque veratrum quoque album. Nobis familiarissimus est succus ex iridis radice confusus expressus singulis diebus, cum saccharo, à semuncia vsque ad vnciam & semis epotus. plures scimus, qui ascite laborarunt, huius medicamenti vsu prorsus fuisse sanatos. Datus etiam ter in hebdomada grana tria elaterij cum rhabarbati quatuor obolis sunt duo catapotia, quæ ter (vt dictum est) in hebdomada deuorantur. Alij brassicam marinam ad geminas drachmas in iure carnis pingui ad libram bulliunt, quoad pars tertia absumatur; exhibentque prædicti iuris calidi cum modico cinnamomi pul. vncias quatuor. Hæc tum in ascite, tum in leucophlegmatia purgando tumorem laxant, atque etiam non minus in tympanite, quod flatus distendentes ab humore foueantur, augeanturque, vel quod absque humore non datur hydrops, licet in tympanite flatus præualeant. Itaque ex medicamentis, quæ omnibus hydropicis conueniunt, quæ sunt digerentia, sudorifica, rubefaciencia, exulcerantia (quippè recorporatiua, atque metasyncritica vacata) inustiones, punctiones, atque scarificationes cutis, quæ omnia in principio maxime conuenire solent, sudorifica vocata, quæ facultatem habent sudorem mouendi, præcipuum vtilitatis locum habere solent. siquidem omnis hydrops sudore tollitur. cum per ipsum & humor in ascite, anasarcaque, & flatus in tympanite digeratur. Itaque quanto citius ad hoc præsidij genus deuentum sit, eo tutius, atque citius hydrops curabitur. Sudor verò mouebitur commode in balneo laconico, scilicet in tina lignea oblonga à calido suffitu (ex decocto calamenthi, vel origani, vel thymi, vel tragorigani, vel pulegij, aspersis aut ferro ignito, aut lapide molendinario) incallescata, ex prædictoq; decocto calido aspersis ignitis ijs lapidebus fumo calido excitato si sudatorium laconicum probe calefiat. In ipso balneo ita probe calefacto ægroti manentes stragulis cooperti vel per horam, vel per dimidiam horam facile sudabunt. Qui sudor non inutiliter etiam interno medicamento calido intro assumpto maxime adiuuabitur. Cuiusmodi erit, quod parabitur (exempli gratia) ex calamintha, pulegio, chamædry, betonica, vel ligno guaiaco, aut sasaphras, aut similibus alijs medicamentis, quæ sunt vehementer calida & sicca. sudabunt iuuenes bis, senes vero semel in die, & non minus, quam per spacium dimidiæ horæ, in laconico ægroti manebunt. qui egressi in lectulo calido bene cooperiantur, vt denuo sudent. præsidium est ex laxatorijs in principio vsque adeo & tutum & efficax, vt plures ascite & anasarca laborantes solo hoc ipso vsu auxilio pristinam valetudinem recuperauerint. Non minus vtile quoque erit in tympanite, cum sudorifica omnia, propter calidius temperamentum atque siccum, flatus digerant, discutiantque, ipsiq; medicamenti caliditate extenuati, facile per meatus cutis à caliditate suffitus calidi rarefactos, exhalent, atq; resoluantur. Ad hunc vsum conueniunt omnia medicamenta (vt dictum est) vehementer calefactoria, cum per interius assumpta, tum per exterius adhibita: tum quia humores, vaporesque digerant, tum etiam quia sudorem moueant, eaque via & humorem contentum euacuent, & vapores, flatusue digerant. Hinc Veteres quosdam in arenam à sole excafactam, ad digerendos flatus, atq; pro absumenda humiditate, hydropem faciente, ad sudandum, coniciebant, quosdam in clibano calefacto, quosdam in laconico, vel ligneo vel ex alia

alia materia facto. atque alios in foueas aquarum sponte nascentium calidarum, cuiusmodi sunt sulphureæ, nitrosæ, vt sudent. de qua re Celsus in lib. 3. cap. 21. ita habet: Euocandus est sudor, non exercitatione solummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, uel clibano, similibusque alijs. posthæc commendantur medicamenta vrinam mouentia, cuiusmodi sunt, feniculus, petroselinum, opium, smirniolum, irio, ammeos, daucus, ligusticum & alia similia, quorum vel femina trita ex vino albo aromatico dantur, vel lac ipsum ex detritis in mortario feminibus ex vino itidem albo paratum. Nonnulli iridis radicem siccam tritam ex vino per aliquot dies exhibent. alij tria vel quatuor grana euphorbij in ovo solbillo. Nonnulli exhibent rhabbari drachmam. aut chamedrios puluerem ad drachmas duas. Alij vinum absinthinum, alij scillinum exhibere solent. Eodem modo per exterius commendantur fomenta ex vehementer calidis & siccis, cuiusmodi est chamedris, pulegium, origanum, thymus & similia. Vtuntur etiã stercore bubulo ex aceto calido ventri appposito. nec non ad hunc vsum commendantur, præsertimque ad ascitem, emplastrum ex centaureo Ætj, & quod ab Aureliano diacpreias, à Paulo descriptum, item lcesion dictum. sic in tympanite commendantur epithema diaspermatum vocatum, vel polyarcion, aut diasampsucum, atque diamelilotum. In leucophlegmaria, commendantur frictions ex nitro, & sale. Mirum est, cur Aurelianus fomenta ex aqua marina commendauerit, cum ipsa & siccando & adstringendo laxis non adstrictis, morbis sit, remedio. sed non incouenit quandoq; medicamentum adstringens ex accidenti scilicet quatenus siccando humoremque absumendo tumorem laxet. Neque est etiam vt admireris, ni conueniant laxantia primarum (vt aiunt) materierum, quippe temperate calida & humida, vt decoctum fenugræci, lini, altheæ & similia, quando longe efficaciora medicamenta ad tantum humorem digerendum desideretur, atque illa inquam quæ cum vehementer calida sint & sicca, humorem fundunt, extenuant, resoluunt. Neque obstat, quod Galenus demonstrauerit, non dari emollientia tumoremq; laxantia, quæ vehementer & calefaciant & siccant. Cum hæc humiditatem tenuiorem digerendo, crassiorem crassifaciendo potius tumorem indurent, adaugeantque. Etenim humiditas hydropem faciens cum serosa sit & tenuis, potest quidem tora à medicamento vehementer calido & sicco absumi. Atque hæc sunt medicamenta, quæ Græci metascyncritica, & Aurelianus recorporatiua appellant. Quibusdam in vfu fuerunt vesicantia, ventri adhibita, per quæ plaga remanent, & seruantur diu apertæ, vt per ipsas expurgetur serosa humiditas, sensimque ac sensim purgata humiditate extantia tollatur. probantur ab Hippocrate inunctiones, quæ aut ferro candenti sunt in regione lienis, si lien in causa fuerit huiusce affectus, vel in regione hepatis, si ab hepatis tumore, vel obstructione hoc malum venerit. Ægyptij medici non ferro candenti, at petijs lineis ignitis longe facilius & clementius, & sine multo dolore cutem inurunt. Quem modum inurendi nos in libris de medicina Ægyptiorum, secundo imprimendis (quando in prima editione in eo modo describendo error magnus commissus sit, quo modo si fiat iniustio haud probe succedet) accurate & fideliter docuimus. Ad hunc vsum maxime conducit punctio, vel scarificatio, at hoc faciendum priusquam morbus in cachexiam abierit, & viriū robore permittente: Hinc Hippocrates in epidemijs scripsit: hydropicos statim secare oportet, empyicos statim vrere. Namque hæc præsidia in morbi principio conueniunt, priusquam (vt ait Galenus) corrupta sint viscera. Inutiliter enim aqua educitur, quæ iam vitiatas, atque corruptas viscera generatur. Quo leuiter errant, qui in desperatis paracentes in exercent. Hippocrates venas in scroto crassissimas secabat, atque in eodem scroto, & in femoribus ac cruribus frequentia vlcuscula scalpello incuriebat. Paulus atque alij hydropicis paulo infra vmbilicum sectionem faciebant, ad latus dextrum

In lib. 5. simpl. c.

en lib. de infer.
part. affectibus.

dextrum si lien, atque ad sinistrum si hepar in causa est. Alij ex eadem parte, qua viscus est; à quo malum primo ortum est. atque si intestina in causa sunt, quatuor sub umbilico digitis secant. Aurelianus magis in leucophlegmatia quam in ascite paracentesim probauit. complures ex Asclepiade supra talum crus scarificant, alij vnam, alij duas sectiones facientes interius, vt cutis secta sit, alij exterius, atque alij vtrique scarificantes, vt paulatim humor euacuetur, operam dant. Hocque praesidij genere scimus nos complures hydrope fuisse sanatos, at quia curationem vulnerum neglexerunt, alio morbo quam hydrope interempti sunt, quippe vulnere in cancrenam abeunte. quo admonitos medicos esse rogamus, vt summa cura vlcera à punctione seu scarificatione custodiant, ne ipsarum nativum calido labefactato magnam subeant putrefactionem. quod praecavebunt, si calorificis vlcera fouebunt, atque ab externo frigido aere ea defendent. summopere illis conducet, si sepius vlcera lauabunt vino aromatico calido, in quo ebullierit iris sicca, absinthium, vel marthubium, vel rosa vel betonica, vel similia. nec non si vlceri admoebitur ceratum oxicroceum vocatum, & perpetuo detineatur. non minusque etiam petia linea vino calido supradicto imbuta & expressa superponatur, & perpetuo detineatur. Ex Recentioribus uero Andreas Laurentius vir doctissimus sectionem seu punctiorem longe esse securiorem, quae fit per medium umbilicum, & ratione & experimento in doctissimis libris suis de opera Anathomica inscriptis, nobis persuadere studuit.

In lib. 1. cap. 8.
controuersia. 16.

Finis Libri Septimi.

PROSPE-

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER OCTAVVS.

De phlegmonum atque tumorum internorum vomicis siue abscessibus esse agendum, & primum quid per abscessum vel per vomicam intelligatur, deq; ipsius causis agitur. Cap. I.



Osteaquam actum est de internis cum phlegmonis, tumoribus, qui sæpe in abscessus seu suppurationes vertuntur, ratio expostulare videtur, vt de internis quoque abscessibus, siue suppurationibus, seu vomicis in præsentia agamus. Neque immeritò sanè, cum hi affectus sanatu maxime difficiles sint, atque non raro medicis occurrant. Vocant verò abscessum, alij purulentiam, alij collectionem, alij suppurationem, atque alij vomicam: quo nomine Aulianus sæpe vsus est. Non me latet per abscessus Hippocratem plerumque humoris ex vna parte corporis ad aliam translationem vocare, & aliquando humoris itidem decubitus ad cutim ipsam. Verumenimvero per abscessum nos hic intelligimus phlegmones, atque tumoris in pus mutationem, suppurationemque. Etenim phlegmonæ & tumores, aut digesto humore, aut in aliam partem corporis translato, aut quouis modo vacuato resoluuntur, aut in scirrhum mutantur, aut denique suppurantur, siue in pus vertuntur; quem affectum abscessum, suppurationem, atque vomicam medici appellant. Differunt verò abscessus varijs quidem differentijs, scilicet ex loco in quo pus fit, & ex loco in quem erumpit, atque etiam quod abscessum quidam fieri incipit, scilicet quando phlegmones, vel tumoris humor cepit in pus verti, & quidam perfectus est, quippè qui ex toto in pus mutatus est, huncque propriè magis vomicam medici vocasse visi sunt. Vnde per vomicam non omnem abscessum intelligimus, sed eum solummodo, qui ex toto suppuratus, seu in pus conuersus est. Qua vomica seu pus factum, primum in parte phlegmone, vel tumore deprehensa consistit, ac postea ruptis continentibus partibus in alias partes vel internas, vel externas erumpit. quod si nobilis sit pars, vel repente inuadat, aut si vomica multa sit, interimit agrosos, aut saltem multa fastidia ingerit, etsi postea probe etiam per congrua loca pus excernatur. Cæterum hisce præmissis, præstabit ad clariorem vomicarum notitiã assequendam, primo huiusce affectus causas omnes nos perscrutari, atque cognoscere: Pro qua re illud in primis supponi debebit, scilicet suppurationem seu purulentiam esse in pus versionem à calore factam. Quo liquido constabit, ipsam esse quandam coctionis speciem, siquidem humorem phlegmones vel tumoris intus natura calore concoquente aggreditur, quem si tenuis sit, paucus, & non prauus, calor coctione digerit, & qui vel multus est, vel crassus, vel qualitate praua præditus, ipsum in pus vertit, purulentiamque siue vomicam facit.

Galenus

Galenus triplicem esse alterationem à calore in humore factam statuit: quippe coctionem, suppurationem, atque putrefactionem: Coctionemque fieri à calore naturali, atque ex humore benigno apto nato à natura concoqui: putrefactionem verò à præternaturali calore agente ad corruptionem, atque ex humore apto nato putrefieri, minime concoqui (hic enim humor praua eius qualitate, & substantia, qua naturæ aptus natus est aduersari, nihil quidem coctionis recipere potest:) Demum suppurationem mediam inter coctionem atque putredinem esse Gal. voluit, & meritò sanè, cum huiusmodi alteratio fiat à calore non ex toto naturali, sed ab extraneo etiam, atque ex humore non ex toto benigno, sed ex praua quidem, vel qualitate, vel substantia, aliquid habente, quo naturæ aduersetur. Media itaque erit suppuratio inter coctionem atque putredinem. Aliqui tamen ipsam coctionem esse dixerunt, non tamen, quæ vera & propria dicitur (qua illud quod concoquitur, vertitur in substantiam corporis, ad nutritionemque vtiliter redditur) sed ea, quæ humorum prauitatem vincit, emendat, atque compescit, vt non amplius corpus lædat, vnde improprie concoctio hæc dicta est. At iam ad præcipuum institutum redeamus, quod fuerat, vt de causis, quibus suppuratio, purulentia, vomicaue dicta sit, nos ageremus. Constat sanè huiusce affectus præcipuam causam esse calorem ipsum concoquentem, sine quo nulla suppuratio, sed potius putredo fiet. hinc Hippoc. dicebat, tumores, qui in hypochondrijs sunt, citius, & facilius suppurari, quam qui circa vmbilicum, & omnium minime, qui sub ipso vmbilico consistunt, quod hypochondriorum partes, ijs qui circa vmbilicum & sub vmbilico sunt, longe calidiores existant. Itaque à calore omnis purulentia fit, à calore quidem naturali si & ipsa coctionis species fit, non tamen omnino à naturali, sed etiam ab extraneo præternaturaliue naturali mixto, namque in phlegmonibus ac tumoribus, qui in pus vertuntur, præter naturalem calorem etiam extraneus & non naturalis vocatus agit. Naturalis enim vel à phlogosi, vel ab obstructione partium affectarum in igneum auctus permutatur: ex quo in phlegmone vel in tumore partium affectarum suppurando calorem agentem partim naturalem partimque præter naturalem esse (qui profectò auctor est purulentia) constabit. Quod verò in parte, quæ suppuratur, præter naturalem calorem agentem, etiam adscititius præternaturalisue addit, atque agat, eo quidem argumento deprehenditur, quia medicamenta, quæ suppurant, emplastica Græcis uocata, sui ipsorum crassa viscidaque substantia meatus cutaneos infarciunt, obstruantque ea potissimum causa, ut obstructis meatibus calor intus claudatur, ipsiusque effluuium prohibeatur, atque ipsius substantia, quantitasque augeatur; Quorum meatuum obstructione etiam, fuligines cum intus retineantur, necessario naturalis calor mixturam cum non naturali à fuliginum caliditate recipit, vel naturam caloris extranei nanciscitur, vel ab ipsis fuliginibus mutatur in igneum præternaturalemque. Quæ sanè caloris mutatio à fuliginum qualitate ubi plurimum augeatur, diffusa in uniuersum corpus etiam febrem accendit. Quare vomicam, à calore mixtam naturam naturalis & præternaturalis habente, eoque in partibus phlegmone vel tumore obsessis agente, fieri aperte intelligitur. Accedit et quod sanguis & pituita ab eodem calore facile in pus vertitur, atra bilis difficilius, bilis verò flaua, quæque tenuioris est substantie, priusquam in pus mutetur, à calore extenuata, digeritur. Atqui ab hisce causis suppuratio quælibet, quæ purulentia itidem & vomica dicitur, generationem habet. Vnde affectum fieri à tumoribus, à phlegmonis atque etiam à carnosarum partium confusionibus dicemus, nimirum à calore non ex toto præternaturali, neque ex toto naturali, sed mixtam qualitatem habente ex naturali atque ex præternaturali, alteratis, & concoctis.

*De partibus in quibus purulentia, seu vomica fiunt.**Caput II.**In 6. aphor. 10.**Libro 5. com. 1.
tex. 23.
In 7. epid. tex. 55*

Partes omnes, quæ phlegmonis, atque tumoribus sunt obnoxie, vomicis deprehendi possunt. Vnde & in capite non raro collectiones eæ fiunt, sæpissime in Thorace & in ventre. In ventris autem varijs partibus vomicae fiunt, plarunq; in hypochondrijs contentis, aliquando in ijs, quæ circa umbilicum subsistunt, atque demum rarissime in sub umbilico positæ, scilicet, vt Hippocrates est auctor, quod partes sub hypochondrijs contentæ calidiores ijs, quæ circa umbilicum sunt, existant, & minime omnium calidæ sub umbilico positæ, ex calore autem fieri omnes suppurationes, superius demonstratum est. hinc partes omnes, quæ iuxta hypochondria sunt, citius & facilius suppurantur, & tardius difficilisque, quæ circa umbilicum consistunt, omniumque tardissime & difficillime, quæ sub umbilico. Quo Hippocrates in 6. epid. 2. umbilicum suppurationum esse terminum statuit. Quod verò in capitis partibus internis vomicae fiant, non est medicis ignotum. aliquando enim ex phlegmone membranarum cerebri, & aliarum quoque partium vomicam ortam fuisse (licet hoc raro ob eius membri frigiditatem fiat) à multis deprehensum est. Hippocrates scripsit, si pus per nares aut os, aut aures effluerit, capite dolentes & vehementer quidem laborantes solvere: & in Coacis prælagijs, pus per nares excretum capitis dolorem itidem tollere. Hoc Echecati Cæco contigisse Hippocrates narrat in epidemijs, quippè qui, cū in eius capite affectus phlegmonosus suppuratus fuerit, pusque per aurem expurgatum, sanus euasit. sæpenumero, intra aures ex phlegmone puris collectio fit, non raro in gutture ex angina. At non addimus partes, in thoracis regione positas, quæ suppurari solent. hæque præcipuæ sunt, pleura membrana, pulmo, diaphragma, cordis pericardium. & in ventre ipso omnes partes contentæ huic malo sunt obnoxie, scilicet, stomachus quoad eius omnes partes, intestina, scilicet, pylorum, jejunum, colon, & longanum siue rectum, & omnia tenuia intestina, mesereum, mesocolum, pancreas, omentum, hepar, vesica fellis, lien, vena cava, porta, renes, vesica atque uterus in mulieribus. Itaque cum in omnibus his partibus aut phlegmone, aut tumore oppressis vomicae concitari soleant, quæque omnes cum ægrotantium vitam in magno discrimine ponant, ipsarumque curatio magnas habeat difficultates, & maiori ex parte iudicium itidem eæ habeant difficile, proinde de ipsis accurate in præsentia agendum duximus. & priusquam ad ipsarum curationem perstringendam descendamus, eas & in communi, & in particulari cognoscere operam dabimus.

*Quibus signis puris collectio vel vomica fieri deprehendatur.**Caput III.**Gal. in 2. de loc. affec. cap. 3.*

Vomicae vel magnas phlegmones sequuntur, vel excrementorum collectiones, vel tumores cedematofos, vel ab alijs humoribus obortos. & cum (vt dictum est) affectus hi qui suppurantur, vel in capite consistant, vel in thorace, vel denique in ventre, proinde priori loco signa in communi considerabimus, quibus suppuratio omnis in qualibet parte corporis oborta nobis innotescat, scilicet, eius quæ primo fit in capite, & postea in thorace, atque demum in ventre. sigillatimq; cuiuslibet partis in aliqua trium corporis regionum suppuratæ signa prosequemur. Porro internæ suppurationis signa similia magna ex parte sunt ijs quæ in externis suppurationibus elucet. Duo quidem in externis suppurationibus

tionibus obseruamus, dolorem quippè vehementer pulsantem, propter arteriarum motum aucto calore, & aucta ex humoris fusione eiusdem humoris quantitate, quæ quò magis implet, & minus cedit, eò magis premit, ac arteriam præ tumore distentam dolore afficit; atque caloris auctiorem, tum propter auctam humoris plurimum incalescenti copiam, quæ pluribus partibus communicatur, vnde ex aucto calore, etiam pars, quæ suppuratur, ruborem contrahit. Quo chirurgi in tumore suppurando hæc merito tria obseruare solent, nempe (vt dictum est) dolorem vehementem, cum pulsatione, calorem in parte auctum, & aliando etiam ita intense auctum, vt febris exinde concitetur, atque deinde in parte contractum ruborem. Quibus sanè signis medici phlegmonas, tumoresque ad suppurationem inclinantes facile cognoscunt. In internis vero vomitis futuris & dolores & febres (vt expressit Hippoc.) augentur, atque alia etiam præter hæc signa medicis innotescunt. Itaque in primis dolor maximè facit ad futuræ vomitæ notitiam, rigores, tumoresque & febres, ex his quædam sunt, quæ suppurationem prænuntiant, & quædam, quæ actui vomitæ fieri itidem notant. De ijs primo sermo est habendus. Itaque ex doloribus, qui diu perseverant cum febre absque laudabili excretionem, futuræ vomitæ erunt indicium. De quo signo Hippocrates in aphorismis habet: A ventris dolore diuturno, suppuratio. Galenus addidit: si omnia circa ægrum opportune fiant. Adhuc enim dolorem perdurare scilicet per longum tempus propter phlegmonem euenit, quæ temporis processu suppurabitur, nisi hominè morte præripiat. Quod clarius de ijs, quæ in thorace sunt, adhuc expressit, dicens: Quicumque dolor in his affigit sedibus, non desinens, neque excreationis purgatione, neque ventris subductione, neque venæ sectione, ac medicamento, & victus ratione, in suppurationem verti sciendum est, & Galenus in comm. ait: Quicumque dolor circa thoracis ac pulmonis sedes non desinit adhibitis subsidij, idque malum tantummodo habet, nec vllum aliud exitiosum indicium adest, cum suppuraturum expectabis. Eodem itidem modo & febris perseverans vel cum dolore, vel cum grauitate, vel huius loco cum tussi, sine laudabili excretionem idem futurum prænuntiat. Quam rem Hippoc. perbelle ita etiam expressit in prognosticis: Considerandum autem est & talia in hunc modum. si febris detinet, & dolor non desinit, & excreatio non excernitur ex ratione, neque biliolæ fuerint alui deiectiones, neque solutiores, ac synceriores, nec vrina admodum crassa ac plenius obtinens sedimentum, produm est: Tempus quoque circumscriptum est, quo purgari debeant, in multis phlegmonis, de quo in 7. aphorismorum Hippoc. inquit: Distillationes in ventrem superiorem ad suppurationem veniunt intra viginti dies: & particulatim de pleuritide: Quicumque morbo laterali laborantes in quadraginta diebus non repleantur, hi ad suppurationem vertuntur. Ita & in pulmonia, atque in alijs phlegmonis si diu dolor cum febre perseverauerit sine laudabili humorum excretionem, suppuratio speranda erit. De quibus auctor coacorum præfagiorum dixit: tumores si sexaginta diebus superauerint, & permaneant febris, suppurantur. in 1. vero prognost. tex. 31. breuius fieri docet, ait enim: Quod si vigesimum transcedit diem & febris detinet, & tumor non desistit, in suppurationem verti significat. sed hisce præmissis, ad signa pergamus, quæ non futuram suppurationem vomitæ prædicant, at præsertim quidem, quæ sit, significant. Quæ itidem erunt dolor, rigor horrorque, febris, grauitas seu pondus, anxietudo, inquietudoque. Dolor autem, vt ab ipso exordiamur, tensius, & non semper cum pulsa (qui externorum vomitarum semper comes est) obseruari solet. Non enim internus dolor phlegmonum, quæ in pus mutantur, necessario pulsat, quoniam rara quidem viscera sunt, quæ abundant arterijs, atque etiam quia interna

In 2. aphor. 47.

In 7. aphor. 22.

In 2. progn. tex. 52.

In 2. progn. tex. 65.

In 5. aphor. 8.

In 6. conc. præ-
sag. lex Hol. sec.
2. com. 1. tex. 3. "
In 2. progn. tex.
38.

In 1. aphor. 12.

In 5. lib. ex Hol.
sect. 2. comm. 1.
tex 76.

Gal. in 1. de loc.
affect. cap 5.

spacia, vacuæ & circumdantium laxitas facit, ut pulsatio si qua sit, citra dolo-
rem sentiat. Pro dolore aliquando grauedo fit cum calore, atque ab his ali-
quando pondus obseruari solet. De quo in coacis prælagijs Hippocrates habet:
Quibus latus sublatum & calidius est, cumq; in alterum incumbenti latus, quod
sanum est, grauitates pendere videtur, ijs pus altera parte collectum est, quod
in prognosticis clarius confirmauit ita, dicens: etsi dixerit pro dolore sibi inesse
pondus, in loco quo dolore afficiebatur. Calorem quoque in parte affecta in-
tensioem egroti incepto pure percipere solent, quod de pleuriticis, & pulmonicis
suppuratis Hippoc. expressit, dicens: latus esse calidius. neque id fit profectio
iniuria, cum necessario latus à putredine, atque ab halitu calido puris contenti,
magis debeat incalferi. Quare hæcenus signa inceptæ suppurationis ex dolore,
grauedine, pondere, atque calore aucto in parte affecta nobis innotuerunt. Nunc
alia signa prosequimur, scilicet febrem, vna cum rigore uel horrore quæ inua-
dit. febris enim dum pus fit (ait Hippocrates) augetur, vehementiusque affli-
git. Huiusmodi verò febre (Galeno auctore) priusquam phlegmonæ suppurat-
io cæperint, similes existunt tertianis continuis, cum scilicet continuæ sint, & de
tertio in tertium exacerbationes habeant: suppuratione verò iam in cæpta, quip-
pè dum materia phlegmones suppuratur, quotidie habent exacerbationes, cum
rigore horroreue, idcircoque probè hæc semitertianis comparauit. de quibus Au-
ctor coacorum prælagiorum ait: Qui identidem inhorrescunt, ad suppurationem
deueniunt, sed & febris ijs suppurationis est comes. Ex feruore enim & ex putre-
dine humoris, qui suppuratur, halitus excitatus membranas, & musculos mor-
dicans, aut etiam incepti puris acrimonia itidem vellicans partes sensibiles con-
trahit, atque horrorem inducit, quem sequitur febris ea, quæ præcessit, multo
vehementior. Distinguitur vero ab eo, qui pure factio & effuso concitatur. hic
enim horror inordinatus maiori ex parte esse solet, cum sudore & aliquando leui
animi deliquio. Horror itaque in suppurationibus apparet, horrescuntque id-
circo necessario, qui suppurantur, à contracto calore ad locum putredinis vna
cum sanguine. At hic horror, quoad pus fiat, ordinem seruat. posteaquam verò
pus factum est, citra ordinem inuadere solet, quando huius horrores non vnica
fit causa, scilicet caloris ad humorem putrescentem retractio, sed & hæc, & me-
branarum pus continentium morsus vellicatio, contractioque facta tum ex
halitus ex feruente humore concitati, tum facti puris acrimonia, quippè mem-
branam ipsa mordente. In tumoribus enim partim in pus versis, & partim hor-
rendis, ad reliquum humoris suppurandi calor intro retrahitur, quo ægroti hor-
rescunt, atque halitus ex feruente humore ad membranas commoti, nec non pu-
ris, quod factum iam est, acrimonia membranas vellicans, atque contrahens hor-
rorem itidem inducit. quem febris consequitur semitertianæ similis, quæ ex ordine
ne non fit, sed citra vllum ordinem aliquando cum sudoribus multis, ita ut sapius
& nullo ordine, modo inhorrescant, modo sudant, modo incaleant simpliciter.
Huiusmodi vero febres, nec proprie putridæ dici debent, ex pure scilicet concocto
concitatae quales ab humoribus in venis, aut extra venas putrescentibus excitantur,
nec planè hæcicæ, quoad partes solidas corporis inuaserint, sed quodammodo
inter vtrasque mediæ sunt, nec prorsus intermittentes, neque continue, videntur
tamen intermittentes, quod cum horrore, vel cum rigore accessione habent, vnde
semitertianisque vocatis similes existant. namq; quotidie cum horrore inuadunt,
vere intermittentium more, sed cum remitti horror videtur, atque accessio augeri
itidem videtur, iterum egroti horrent, adeo ut eadem die bis atque ter aliquando
horror accedat. die verò sequenti alteram habent accessionem, sed priore mor-
norem, absque duplicatione horrores. hæc verò id proprij habent, quo distinguuntur
a semitertianis, quæ sunt à commota putredine in venis bilis atque pituitæ
quod

quod nullo seruato ordine sapius in his egroti inhorrescant, modo incaleant simpliciter absque villo horrore vel frigore, modo sudent. atque hæc febres semiterrianis similes, sunt è quibus tabidos laborare Hippocrates in epidemijs docuit, quæque tales prodeunt, postquam pus fieri ceptum est. Porro quæ ante suppurationem internarum phlegmonum febres fiunt, symptomata sunt, neque ipsæ ad apyrexiam desinunt, tertianarumque naturam præferentes, vtpote quæ de tertio in tertium habent exacerbationes, tamen absque rigore horroreue, aliquando cum leui pedum frigore inuadentes, quod de pleuriticis Hippocrates expressit: Quare post factam suppurationem febres semiterrianarum more, sed nullo tamen seruato ordine, modo cum horrore, modo citra horrore calore solummodo exacerbato inuadunt, modo cum sudore, aliquando ita parua fit accessio, vt ea die vel nihil vel parum febrile suppurati videantur, nonnunquam omnino desinere videntur interdumque tempus solitum inuasionis horamque permutantes. Ple- runque vero magis ad noctem accessionem habent quàm in die, maximeque circa vespertum inuadentes: atque hæc perpetuo lethales sunt, quæ ægrotum aut puris multitudine suffocatum iri, aut tabidum siue phthisicum moriturum denotant. Vnde nos distinguere oportet, quod vbi pus fit, & commode expurgatur, nedum febres non adsunt, sed quæ ante suppurationem fuerunt, planè conquiescunt. Itaque vt ad institutum primum redeamus, pus vbi fit, febris vehementior quam antea apparet, horrorque fit, & à contracto calore, & ex halitus feruentis humo- ris & incepti puris acrimonia membranas nervosque vellicante, contrahenteque: adest etiam in parte affecta aucta caliditas, gravitasque & pondus, inquieti sunt, & anxij, pulsus languidi celeresque obseruantur, & respiratio itidem crebra & perunque parua est. Aurelianus de signis vomitæ scribens, inquit; quod eos sequatur febricula vehemens inordinata sæpe, cum rigore & torpore frigido, vel corporis cum inquietudine, iactationeue; tum loci adest feruor incendiosus, grauedo, tensio (exceptis, quæ in pulmone fiunt) sæpe stimulans dolor & pul- tuosus fit, tum celer pulsus atque humilis, & sæpe sudor magis capitis atque colli apparet. Hippoc. in 7 epidem. de Metone Pleuritico, qui postea suppuratus est, scripsit: Detectio multa biliosa, in tribus diebus ferè cessauit dolor, calor autem circa septimam aut nonam. Tussis aderat, excretiones neque biliosæ neque mul- tæ fiebant, pituitosæ verò tusses sequebantur, cibos gustabat. aliquando exhibat veluti sanus. Apprehendebant autem quandoque illum calores tenues exiguum tempus, sudores exigui fiebant ad noctem, spiritus in febre densior, maxillarum rubor, circa latus grauitas & sub alis & ad humerū tusses tenebant. Atque hisce signis nobis, quæ interius fiunt purulentia, probè innotescunt. Nunc sequitur vt ea etiam signa, quæ, facto effusioque pure, apparent, dicamus.

Quibus signis suppuratio siue puris collectio, quæ facta est, deprehenditur. Cap. IV.

Vbi pus in parte aliqua interna factum est (auctore Hippocrate) dolores, ri- gores atque febres minores euadunt, quinimo planè conquiescunt, si pus etiam commode expurgatur, seu excretum fuerit, eadem die in salutari suppuratione febrem desinere Hippocrates expressit. itaque febres, dolores, & rigores minores euadunt. Aurelianus dicebat facta suppuratione, cessare cum rigorem, tum do- lorem, febrisque recedere inquietudinem. Attamen hoc rectè intelligendum est, quod facto pure (nisi magna ex parte ipsum fuerit commode excretum) hæc pla- nè haud recedant, sed tamen aliqua ex parte minora fiunt, minusque empyicos affligunt: quod perbelle docebat Hippocrates, cū dicebat: Dum pus conficitur, dolores

*In 1 de vict rat.
in acutis.*

*In lib. 5. chronico
cap. 8.*

In 2. aphor. 47.

In 2. prog. tex 48

In 2. aphor. 47.

In 7. aphor. 57. dolores ac febres accidunt magis, quam iam confecto. Recedunt verò omnino hæc omnia ubi factum pus fuerit expurgatum. de quo Hippocrates ait: Quibus in urinario meatu tubercula fiunt, his suppuratione facta, & eruptione, soluitur dolor. Quare dolores, & febres minores redduntur, semitertianisque similes existunt, at à veris semitertianis distinguuntur, quia sunt inordinatæ, & tales quales in altero capite expressimus. Nimirum quæ nullo seruato ordine inuadunt, modo cum horrore, modo citra horrorem modo cum sudore, noctu ingrauescentes. His verò & horrores (vt dictum est) coniunguntur facti ab acrimonia puris, quod ad vicina corpora, scilicet membranas & neruos, commotum lædit. In coacis prælagijs scriptum est, Horrore affectos plerunque ad suppurationem perducere, & febres intermittentes à suppuratione plerunque sudorificas esse. Igitur non minus etiam sudores merito accidunt. vnde recte dictum est, quibus vomica interna est, & rigor & sudor sæpius accidit. sudor vero ex capite, ceruice, & quædoque ex toto corpore exit, atque hic est quædam leuis tenuisque humiditas, virium infirmitate, scilicet partium solidarum debilitata retentrice, sæpius quæ in suppuratis exudat, præsertimque à pure effuso viscera interna lædente. Vnde vires collabuntur, pulsus frequens paruus & languidus fit, & nonnunquam crebra animi defectio, cum quæ suppurati exudant & resoluuntur. quæ signa fuere à Desiderio Iacotio viro sanè doctissimo & grauiissimo, vt notauit in suis doctissimis ad coaca Hippocratis prælagia commentarijs, in quadam puella, quæ ferè repente à vomica fuit interempta. ait enim: Puella quædam, cum optime habita omnibus videretur, in lentam quandam febrè incidit, tertianæ intermittenti non ab similem, sine dolore in ventre: ad eam circa mediam noctem vocati, quod leui animi de liquio laborasset, cum rigore quodam quem paroxysmi principium esse putabant, prædiximus abscessum in ventre ruptum ex quo breui interitura esse. Hippocrates in prognosticis de purulentis (intelligit autem eos, qui in thorace pus collectum habent, de quibus nos postèrius sigillarim scribemus) scribens, ait: Principio si febris non dimittit, sed interdum tenuior, noctu vehemensior est, si copia sudoris elicitur, ac ruffiendi cupiditas est, nec quicquam tamen commentatione dignum expuunt. Aristoteles ad cognoscendum tumorem suppuratum, affundit aquam, quem, si ab ipsa colore mutatur, purulentum agnoscit. Hippocrates argilla tegendum censuit, quæ si citius, quam quæ alteri loco minime de suppuratione suspecto apposita est, resiccatur, vomicam latere ostendit. In prognosticis vero ex ponderè in parte affecta, ex rigore horroreue, ex sudore, & ex febre semitertianæ simili, sudoreque (vt hætenus ostendimus) cognoscendum voluit. Aliqui cum his signis quandam mollitiem cum puris inundatione in parte affecta (si tumor obseruari queat quando loci densitas, tactum perturbet) tanquam indicium certissimum addunt. sed hæc satis erunt ad cognoscendam vomicam, quæ interius facta est. Nunc descendendum erit ad particulares vomicas, quæ in varijs partibus fiunt.

De vomicis, quæ fiunt in capitis partibus, cognoscendis.

Caput V.

Vomicas in capitis partibus extimis fieri frequentissime, qui praxim exercent, obseruant, scilicet intra pericranium, ex phlegmonis, tumoribusque phlegmonosis. atque etiam in lue gallica infectis: in his præcedunt dolores continui, firmi, atque vehementes, sæpiissime etiam cum pulsu, aliquando cum febre, plerunque citra febrem hi dolores perseverant. Aliquando etiam intra cranium vel circa membranas cerebri vomica fiunt (licet hoc fiat rarissime propter partis frigiditatem)

frigiditatem) nam, vt aliàs dictum est, suppurationes omnes à calore fiunt. quo Hippocrates in epidemijs scripsit, vmbilicum esse terminum suppurationum, quæ in ventre fiunt, eo præsertim argumento, quod partes sub umbilico positæ hypochondrijs frigidiores sint, & idcirco non apte suppurationibus; Quare ob hanc etiam causam fit, vt rarissime cerebri partes, ob loci frigiditatem suppurentur. tamen aliquando in cerebri cavitatibus, dissectis cadaueribus, vomica deprehensa est puris collecti, quod aliàs nos vidimus in quibusdam per nares, antegressa phlegmone, excreuerunt fuisse. Signa fuerunt, dolor firmus, assiduus, vehemens, cum pulsu lancinans, longo tempore perseverans cum febre acuta, assidua, diu durante. Vomica verò facta cognoscitur, quod & dolor & febris quadatenus minus assigant, & in capite grauitas & pondus pro dolore sentiatur, at plures horum apoplecticorum modo suffocati à puris multitudine atque à crassitie cerebri cavitates infarciunt, obstruenteque pereunt. si per nares autem effluat pus album, leue, æquale, & copiosum, salutem promittit. Non rarò intra aures vomica purisue collectionem fieri deprehendimus magnam inflammationem subsecutam; Huius quidem puris collectionem ex aurium dolore acuto ac febre continua & vehementi (quæ signa sunt pathognomonica magnæ phlegmones ibi existentis) secutam. Hippocrates in prognosticis meminit, & de ipsa in Coacis præfagijs inquit: Aurium dolor pertinax cum febre acuta, & alio signo eorum, quæ leuiter difficilia sunt, iuuenes quidem septimo die interficit, & multo celerius adfert delirium, nisi pus multum ex aure, aut sanguis è naribus effluat. Itaque si dolor cum febre continua diu perseverauerit fueritque lancinans & pulsatorius, vomica futuræ est indicium: aurium enim phlegmonæ si vehementes sint, solent citò interficere, faciliusque & citius iuuenes quam senes, ob nimirum symptomatum magnitudinem, quæ fit ex temperamento calidiori, quo iuuenes sanguine bilioso abundant, vnde in affectum incidunt vehementissimum acutissimumque, à quo citò interimuntur: seniores vero (quod sanguine frigidiore abundant, à quo vehementia symptomata non fiunt) tardius & minus hoc malum (Hippocrate auctore) interficit. Tamen & multi etiam puerorum, iuuenumque ex phlegmone, quæ non sit vsque adeo magna & acuta, suppuratione facta, & per aures pure excreto, seruantur. Huiusmodi fuisse Emyris filium Hippoc. in epidemijs scriptum reliquit, de quo habet: Emyris filius febricitabat, quæ ex aure fluebat purulentum circa octauam non scio. Vbi itaque dolor & febris non usque adeo vehemens & acuta fuerit, diutiusque perseverauerit, cum dolore pulsatorio, vomica intra aurem futura est, vbi verò phlegmone in pus versa est, dolor atque febris mitescit: si vero etiam per aures pus exierit, album, leue, æquale, omnino febris atque dolor cessabunt. In oris quoque partibus internis maximeque in gingiuis atque partibus adiacentibus, sæpius oborta phlegmone suppuratur, quam præcedit dolor, cum pulsu, & aliquando etiam febris, si vehemens fuerit morbus, sæpe rupto abscessu vomica exit, & eger ita liberatur. Non rarò etiam ab angina vomica fit, etenim eodem modo hæc phlegmone in vomica sæpius mutatur, atque ita ægroti euadunt. Quam lanè vomica antecedunt quoque & dolor & febris, si enim malum sit acutissimum, maximumque, citò hominem interficit, aut abscessus purulentus fit; plerunque vero solet vomica subsequi dolorem & febrem, quæ diu perseverauerint. In Ægypto olim & in Cayri Ciuitate, quo tempore ad nationem Venetam persanandam morabamur, quidam Turca, cum longo tempore gutturis dolore laborasset, me accersito, plures aureos pollicitus est, si illum persanauissem. Cum vero cognouissem vomica in gutture adesse, intusque (nondum eruptione facta) pus adhuc contineri, atque illico, à me aliquibus tentatis medicamentis rupto abscessu, multaque copia puris expurgata per os, sanus ille euasisset negauit, mihi velle quicquam persolvere

In 6. epidem. 2.
tex. 40.

In 3. progn. tex. 13
In 1. coac. præfagi sec. 2. comm. 1. tex. 1.

In 3. progn. 14.

4. epid. tex. 11.

persolvere licet plures aureos antea mihi pollicitus fuisset, si ipsum sanitati restituissem, nullaque alia ratione usus est, ut mercedem mihi promissam negaret, quam quod dicebat, me nimis citò illum persanavisse, parumque idcirco laboris in eo persanando me sustinuisse.

De vomicis, quæ sunt in thoracis partibus, & primo de vomica, quæ fit ex pleuritide & ex pulmonia.

Caput VI.

*In 2. lib. progn.
tex. 58.*

*In 2. lib. progn.
tex. 59.*

In 2. prog. tex. 60.

Inter vomicas, quæ præcipuè sunt, quæ in cavitate thoracis fiunt, vel ex pleuritide, vel ex pulmonia, vel ex catarrho, aut denique ex spuito sanguinis. Namque, quæ in pleura membrana fit, rupta membrana, in thoracis seu pectoris caua seu inania loca erumpit, atque eodem modo in pulmonibus pus factum, aut ex phlegmone suppurata, aut ex catarrho ibi putrefacto, aut denique ab exulceratis pulmonibus, si multum effluat (vbi dictum est) in cavitates pectoris erumpit. Vomica verò, quæ ex pleuritide suppurata fit, ei admodum similis existit quæ fit in pulmonibus ex pulmonia, licet in quibusdam differant. Namque in pleuritica præcedit rigoris, febris, atque doloris auctio, factoque pure hæc omnia remittuntur, pro doloreque grauitas seu pondus in parte habet. atque hoc est, quod dicebat Hippoc. in prognosticis: Et si dixerit pro dolore sibi inesse pondus in loco quo dolore afficiebatur: Hæc enim accidunt inter initia suppurationis. Distinguitur vero grauitas & pondus, quod in pleuritica suppuratione observatur, ab eo quod ex pulmonia fit, quoniam aut in altero latere, aut in ambobus pondus sentitur. In pulmonia vero (ait Galenus) in vtraque potius, quam in altera colligitur pus: De quibus Hippocrates inquit: Si suppuratio in altero latere tantummodo fuerit, vertere atque ediscere conuenit in his, vtrum in altero habeat latere dolorem, & vtrum calidius quam alterum sit, atque eo incolumi cubante, latus requirere oportet, num aliquod desuper onus illi pendere videatur: si enim id fuerit, suppuratio in altero latere fatigat, vtrius onus existat. Accidit in pleura, suppuratione facta, difficultas respirandi, difficilisque iacendi potestas supra contrarium (vbi ex Hippocrate visum est) patienti latus, hoc est, vt Aurelianus inquit, supra latus, quod morbo afficitur, cum sensu quodam interno veluti pendentium membrorum, vel membranarum: & sæpe corpore commoto, seu è latere in latus verso, quasi sonus auditur, veluti inclusi atque collisi, fluctuantisque humoris. post acceptum cibum molestiam etiam sentiunt. Ex pulmonia verò vomica interstinguitur: siquidem dolor neutiquam antegressus est, sed pro dolore grauitas in thorace sentitur, maximaque spirandi difficultas: sed tamen aliquando videntur suppurati melius respirare, quippè in thoracis cavitates vomica è pulmone effusa: adest item tussis vehemens, cum qua pus expuunt, vox redditur (trachea arteria à puris copia vitiata) obscura, & rauca, fetida itidem redditur expiratio, thoracis grauedo, & tensio sentitur, maximeque si supinè decumbant, quasi suffocantur, idcirco recta ceruice sedentes releuantur: denique seipsos sustollunt ad partes lecti sublimiores, quo leuius habeant caput: In his maxillæ rubent, cavitates in oculis apparet: Adsunt & desudationes, febres assidue sunt, noctu incrementa: Emphyici hi à Græcis merito vocantur. De his Hippocrates in prognosticis inquit: Omnes agnosce purulentos his indicijs conuenit: principio, si febris non dimittit, sed interdiu tenuior, noctu vehementior est; si copia sudoris elicitur, & tussendi cupiditas est, nec quiquam tamen dignum commentatione expuunt: si oculi caui redduntur maxillæ verò ruborē trahunt, & cetera.

& cetera. Galenus ait, hæc obseruari in suppuratione, quæ diu moratur; breuioribus verò suppurationis signa esse rigorem, febrem, atque pondus, & si æger difficilior, quam antea, respiret. Eodem modo purulentiam in his, qui ex pulmonibus, vel ex thorace expuerunt, fieri denotabunt, rigor, febrisque (vri dictum est) semitertianæ similis, quæ tamen nunquã ad infebrecitationem veniat, eritque qualis ab Hippocrate expressa est, scilicet quæ interdum leuior, & noctu grauior apparet; pus expuunt cum tussi satis molesta, maxillæ rubent, sudantque, difficulter respirant. Quæ durante diu affectione, tabidorum signa omnia apparent. Eadem vero signa, & si fiat ex catarrho vomica, elucescunt; at primo ij non expuunt quicquam commentatione dignum, quando, si copiosè expuerent, non fierent purulenti, respiratio admodum difficilis redditur, tussis irrita, in qua, vt dictum est, parum expuunt (non expuunt autem aut propter puris crassitudinem, vel ob viscositatem, aut propter membranarum densitatem, aut denique propter imbecillitatem: multum enim roboris requiritur, ad copiam puris crassi & viscidæ expectorandam, excernendamque.) Si vero vomica fiat in septo transuerso, quod Græci diaphragma appellant, vel in parte supra præcordia intra cauitatem thoracis, vel intra ipsum diaphragma existet. si in superiori sit parte, scilicet quæ supra præcordia est intra cauitatem thoracis, dolor supra eadem præcordia per vtraque latera penetrat vsque ad postiora, tensioque & grauitas iuxta sinem pectoris, vel sub extremis costis atque vltimis ossibus perseverans vsque ad ilia distenditur, cum difficultateque respirant: si verò intra ventrem, qua ventriculum attingit, extra septum collectio sit, sonitus aliquando fluctuatione veluti inclusi humoris auditur, adestque tussicula, & in respirationibus difficultas plurima, respiratio longa, & forinsecus ex attracto spiritu dolor sit, qui nunquam sequitur eos, qui pulmonis vomica tenentur. Etenim pneumonici spiritum hauriendo magis releuantur. Vbi verò in vacuis thoracis locis collectio recepta est, aderit thoracis grauitas, tussis valida siccaque cum dolore, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuari quoque videntur, febricule per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, ad iudicandum difficiles. Postquam vero abscessus ad vomica inclinauerit, vehementius cum quodam horrore febricitant, atque in fermentationis proprietate conturbantur spiritu molestati: spirationis quoque adest difficultas, ita, vt suffocari videantur. At Hippocrates (vt aliàs dictum est) dixit: si febris non dimittit sed interdum tenuior, noctu vehementior est, si copia sudoris elicitur, si tussendi cupiditas adest, nec quicquam dignum expuunt, oculi caui redduntur, maxillæ rubent. Quæ signa potius expulmonia vomica denotare, nuper meminimus. sed iam ad vomica in ventris partibus collectam cognoscendam accedimus.

In 2. prog. tex 60

De vomicis, quæ sunt in ventris partibus & primum de ea, quæ in stomacho, in hepate, in liene, in mesenterio, pancrea, atq; in omento excitatur. Cap. VII.

Cum stomachus ab œsophago incipiendo, ex ore, quod veteres *κάρδιον* appellant, quia exquisitissimo acerrimoque sensu est præditum, principium habeat, & ad os inferius, quod pylorum quoque vocant, terminum itidem habeat, media pars, ipsius venter, atque capacitas est. Itaque signa vomica in stomacho existentis, erunt, terræ eructationes, respirationis difficultas, sed minor, quam in diaphragmate si sit collectio, aliquando tussicula parua, citra vllam humoris excretionem; nausea adest, aliquandoque vomitus puris, animi defectio,

L1 extremorum

extremorum refrigeratio, sudor parvus, languidus, in summa cute: cibi assumpti corruptio, unde acidæ quoque si interuersiones atque fetidæ; sitis cum lingua asperitate vexat, ægrè cibum deglutiunt, præsertimque si ad superiores partes vomica pertingat: namque (ait Aurelianus) hi, priusquam cibus transfluatur, pressuram sentiunt, & post deuoratum cibum releuantur. in quibus etiam nulla apparet inflatio vel extantia, sed dolor atque grauedo inter scapulas, vel in posterioribus cervicis partibus sentiuntur. Vbi verò (vt iam dictum quoque est) vomica ventrem, seu ambitum, atque fundum stomachi tenuerit, inflatio inferius à diaphragmate circa medium præcordiorum sinistrorum flexa, apparet, & impressioni digitorum cedens, atque resurgens, cum nausea, fastidio, siti, eructationibus acidis & fetidis, cum corruptione ciborum, quandoque etiam cum litquidis deiectionibus. At si in inferioribus collectio erit, facile egroti cibos transglutiunt citraque dolorem, at postea sequitur dolorosa cibi perceptio, scilicet cum cibus ad fundum stomachi peruenit, hocque confirmabit dolor ex anterioribus partibus in ore ventris perceptus, cum inflatione vel extumescencia, extantiaue, quæ impressioni digitorum cedat, ac resurgat. si in pyloro idest in ventriculi ore inferiori aderit collectio, dolor & grauedo, & extantia percipiuntur in vltima parte ventris sub dextro latere, atque ilio; vel sub iecore ipso. si vero in hepate sit, apparet inflatio & pulsiosa dispositio, quæ nobis partes sanas, quæ hepati incumbunt, tangentibus maximè occurrit. si post phlegmonem dolor, distentioque in iecore augeatur, rigoresque sine ratione fiant, in ipso inquam vomica in sinistram latus decumbere queant. Vbi verò in tunica hepatis collectio fuerit constituta, dolor erit acutus & vehemens, & ad iugulum aliquando pertingens, quod hepar præ vomica intumescens, trahat vincula, quibus cum alijs vicinis partibus colligatur. Vbi verò in substantia eiusdem visceris fuerit collectio, dolor erit cum grauitate. quod si etiam caua hepatis partem magis tenuerit, os ventriculi pressione dolet, egerque nauseabundus est, cum vomitu aliquando ichoris purulenti, & cum fastidio. De quibus auctor Coacorum præfagiorum ita habet: Qui circa hepar dolent, & os ventriculi, soporosi, rigore subinde concussi, aluo turbata, macilentis auersantur cibos, & multum exudant, per aluum purulentum prodeunt. Si vero gibba magis collectione vexatur, tumor apparentior est, neque os ventris ita patitur, & aliquando per vrinam puris ichor effluit. Vbi verò lienem collectio habuerit (quod tamen rarissime obseruatur, quando hoc viscus, & ob frigiditatem, & ob humoris crassi terrenique abundantiam, non facile ad suppurationem veniat) aperte tumor cum grauitate deprehenditur, & cum signis antegressis, scilicet, cum febris & doloris auctione, atque rigoribus citra rationem concitatis. At nunc ad collectionem abscessumue in omento, pancrea, atque in mesenterio concitatum veniamus: in quibus partibus non rarò vomica fieri solent, quod hæ partes multo calore foueantur. Itaque si in omento fiat, præter signa antegressa doloris, febris rigorisque, aderit tensio seu inflatio iuxta hypochondria subumbilico, quæ non erit firma seu stabilis, at quæ nurat & mouetur; pro dolore aderit grauitas atque pondus. Quod si lienem versus extenditur, cum tensione non parum stomacho angustia & doloris adfert, quod omentum ventriculi fundo & intestinis superioribus innatet. si in mesenterio sit collectio, difficilius cognitio, alte enim tensio, quippe in altioribus partibus sub umbilico positis, pressu perquirenda erit, quæ non primo, sed firmo validoque pressu deprehenditur. unde grauitas pondusque penitus ad intestina sentietur. cum quibus aderit lumborum dolorificus sensus, quod mesenterij membranæ oriantur à ligamentis, quæ lumborum vertebrae connectunt, ipsi nimirum membranæ puris copia valde distentis.

De vomiciis

In 6. cent. præ-
fag. sec. 2. com. 1.
tex. 23.

De vomiciis, quæ fiunt in intestinis. Cap. VIII.

SI in aliquo intestinorum vomica fuerit, erit inflatio extantiaue secundum eius positionem, si in pyloro, inflatio apparebit in parte vltima ventris subdextro latere, atque in ilio, vel sub iecore. Si ieiunum collectionem habuerit, supradicta inflatio erit in ventris parte sinistra, velut sub liene. si alia tenuiora intestina tenuerit, inflatio erit inter vmbilici atque pectinis regionem. si in colo, secundum dextrum ilium circa vmbilicum extantia siue inflatio erit vsque ad sinistra loca protensa. Accedit, quod vnâ aderunt reliqua signa ipsum colon affectum denotantia, præsertimque dolor antegressus, qui cum interno feruore atque febre continua, cum rigore citra rationem oborto apparuerit. Distinguitur vero dolor, ab eo, qui ab acris humoribus calidis fit, quoniam si in colo suppuratio fiat, dolor erit cum pulsu, grauitate, atque distentione. Si vero collectionem habeat intestinum rectum, aderit clunium dolor, cum mingendi difficultate, & ventris strictura vel aliquando cum purulenta deiectione; inflatio erit interna, quæ intromissis per podicem digitis deprehenditur. & ad inferiora venientibus liquidis commixta stercora putrida generantur, ita vt plerunque lateat, an ex pyloro, vel ex ieiuno, aut ex alijs ex tenuioribus intestinis, hæc ferri videantur, sed hæc erunt purulenta, à stercoreque separata, atque discreta, si ex colo, aut ex recto intestino deferantur: Hæc ferè Aurelianus, quibus longe plura addi possent ad deprehendendas intestinorum collectiones, quæ singula cum ex singulis signis intestinum affectum vnumquodlibet denotantibus, nobis maxime innotescant, idcirco, ne prolixius agerem, reliqua signa lubeus omisi. Quæ præsertim deprehenduntur ex antegressis signis cuiuslibet affectus intestini, scilicet doloris, febris, rigoris, atque ex grauitate, pondere, atque ex inflatione. sed age, nunc de signis agamus, vomicas in renibus, vesicæ, atque in vtero esse significantibus.

De vomiciis, quæ fiunt in renibus, in vesica, atque in vtero. Cap. VIII.

QVI memoria habuerit signa, quibus renum phlegmonas cognosci superius scriptum est, facile ex subsequentijs etiam in iisdem renibus, vel in ipsorum altero collectionem, vomicamue factam esse intelliget. In puris sanè generatione & dolores & febres augentur horroresque fiunt inordinati, febresque etiam inordinatè iidem obseruantur, pronique (vt ait Galenus) in ventrem decumbunt, atque interdum in alterum latus, vt sublimis sit affectus partis positus; laborans si sese vertat, circa renem dolentem, veluti suspensi cuiusdem ponderis sensum percipit. Aderit vrina crassa rubra nigricans cum materia crassa purulenta, qua sæpe vrinæ meatibus infarctis homines citissime intereunt. Quo oculatissimi esse debent medici, si suppurationis suspicio adfuerit, vt omni conatu viæ vrinæ laxentur, ab infarctuque laxatorijs medicamentis intus, extraque adhibitis liberentur: Qualia ferè Paulus meminit. Iisdem signis vomica in vesica innotescet, atque eò facilius & apertius ex eius positu. Abscessum vero tunc esse in vtero deprehendimus, cum intensus dolor sit pulsatusque, & vsque ad imum ventrem & ad inguina ac ad lumbos pertingit, & febres itidem fiunt inordinatæ. Paulus de signis vomicæ in vtero ita habet: Præterea vero inordinatæ febrium cum horrore accessiones obueniunt, primis quidem temporibus intensæ cum doloribus; ad vltimum, vbi suppurauerit, aliquantulum remittunt. Postquam vero erupit vomica, dolores acriores subinde visi sunt, ceu lancinantes & punctatè modo incidere; febriculæ vehementius infestant, atque vrina nonnunquam retinetur

*In lib. 6. de loc
affect cap. 3.*

*Gal. in lib. de
nit. medic.*

In lib. 3. cap. 65.

nerur, nonnunquam stercus, impedimento ab affecta vteri parte facto. aliàs tumor in pube eminet, & veluti exundationis sensus, cum abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiam instrumento ad percipiendum injecto, aut digitorum tactu deprehenditur, quod dolores ob nervosam criss vulvę membranam, acriores vrgent; sicut in fundo, sinuque minus doloris percipitur, tuncq; digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Atque hæc erunt signa collectionis in renibus, in vesica, atque in vtero factæ.

De puris eruptione, & quibus signis in varias partes corporis pus effusum deprehendatur. Cap. X.

In 2. prog. tex. 57

In 3. conc. præ-
sag. sec. 2. com. 1.
tex. 7.

In 1. conc. præ-
sag. com. 2. tex.
10.

Posteaquam pus factum est, natura pro viribus semper nititur ex affecto loco ipsum post coctionem excernere, quod aliquando assequitur nata meatum aliquem excretionem, tanquam emissarium, oportunitatem. Nonnunquam verò nullo petente emissario pus in vicinas partes & spatiola inania dispergitur, locumq; dilatat, qui vel corrumpitur, vel in duritiem scirrhomam mutatur, vel si pus supra peritonæum sit, ipsum erodit, atque supra intestina prolabitur. Vbi vero intra peritonæum est eruptio, pus ad varias partes affunditur. Quandoq; autem, nullo patente aditu, partem vomicam continentem erodit, ut in externis suppuratis tumoribus observatur, atque per illud foramen erumpit, effunditurque. Vomica vero quandoque citius, quandoque tardius erumpunt, dicebat Hippocrates interdum eruptiones puris fieri die vigesima, nonnunquam trigesima, aliquando quadragesima, atque interdum etiam sexagesima die. quæ eruptionis varietas refertur cum in partium caliditatem frigiditatemque, tum in densitatem, ac in raritatem, atque in puris crassitatem, lentorem, & tenuitatem. Ex locis quidem, quæ multum calida sunt, in ipsis & suppurationes & eruptiones citius fieri, quam in minus calidis, Hippocrates expressit. Quo dixit, qui circa ventrem sunt tumores minus quam in hypochondrijs contentos suppurari, & omnium minime, qui sub umbilico sunt, unde merito in epidemijs umbilicum suppurationum terminum fecit. Eodem modo vomica puris tenuis, admodumque acris, citissime erumpunt, atque etiam facillime si & partes sufficientem raritatem habuerint. Contra ubi pus crassum viscidumque est, tarde erumpit, omniumque tardissime si etiam membranae, partesq; continentes insignem densitatem itidem habuerint. Signa autem eruptionis factæ haud æque eadem in omnibus sunt. siquidem præter quæ, quod facta vomica omnia symptomata conqueuisse quadatenus videri solent, id etiam observatur (si vomica effatu digna sit, atque intus in profundo erumpat) quod vires vitales debiliores reddantur, ita ut pulsus parvus, frequens, atq; languidus euadat, crebraque fiat animi exolutio, sudent, rigeantque. De quibus auctor coac. præfagiorum ait: Quibus vomica interna est, ijs & sudor, & rigor sæpius accidit, & in morte alius his perturbatur. Vbi vero vomica exterius in superficie scilicet erumpit, vires robustiores redduntur, pulsus maiores, quietiores, respiratio releuatur, & reliqua his similiter respondent. sed tempus est, ut signa sigillatim prosequamur vomicarum ad varias corporis partes erumpentium. Vomica itaque aut intra peritonæum erumpit, aut extra. Quæ extra, aut ad musculos aut ad partes subter cutem positas. in hæc partes pus abscessisse tumor in parte deprehensus, dolor atque color in cute vitiat, ostendunt. Porro coloris mutatio exterius apparens latentis vomicae & puris nota est: quæ vomica in medijs musculis relicta longius dispergitur, ut ad cutem perueniat, aut ipsam cutem prava evaporatione corrumpat, sicuti pericranio pallido, flavo, aut alio colore non naturali vitiat, intus pus contineri vel in diploe, vel in cerebro, aut in superficie cranij

cranijprehendimus. Intra peritonæum ad varias partes abscedit, atque effunditur vomica, & in media regione corporis, & postrema. In media, plerunque ad tracheam vocatam arteriam pus erumpit, quod tussiculam inducit, cum sputo puris aliquid mixtum habente, & respirationis difficultatem facit. quod si coaceruata sit eruptio, aderit & animi defectio, atque præfocatio. Vbi vero vomica abscedit inter thoracis vacua & peritonæum, si homo moueatur, & in lectulo decumbens in larus alterum vertatur, sonus quidam apertissime auditur veluti inclusi humoris fluctuantis, quem Græci hydatismôn appellarunt. Accedit quod si paruus sit abscessus recteque expurgetur, & vires consent, respiratio releuatur, vires robustiores euadunt, tussisque humida est & purulenta. At si vomica multa sit, contra res se habet, etenim vires deiciuntur, tussis est valida, nec quicquam commentatione dignum expuunt, spirationis difficultas, suffocatio, animique etiam defectio accidit. cum vero vomica ad septum transuersum affusa est, aderit spirationis difficultas, tussicula, cum illius partis dolore, distensione, atque grauitate. sub eodem vero septo in vltima regione pure itidem abscedente, aderunt iuxta eam partem prædicta symptomata cum partium inferiorum maximeque intestinorum dolore. si ad ventriculum puris vomica erumpat, obseruabitur nausea, vomitus puris, & quandoque cum sanguine, animi defectio.

De quibus recte quidem Hippocrates dixit: A tuberculi intus eruptione, exolutio, vomitio, aut animi defectio. Aretæus in 7. lib. de morbis chronicis cap. 18. nauseam itidem, cibi odium, vomitum pituitæ & bilis, defectum animæ, vertiginem, vsque eò donec pus erumpat, signa eruptionis ad stomachum fecit. Ad ventrem vero si pus effundatur, partium internarum dolores vehementes, cum inflatione, & flatulentia. Aretæus addidit tormina ventris, aluum liquidam, in qua pituita & bilis primo effertur, deinde cruentum uirus circumfluens, aut humiditas aquæ loturæ carnis similis. Si vero inter peritonæum, & intestina pus erumpat, sonus apertissime inclusi humoris, purisue, fluctuantis auditur, uenterque hydropis modo intumescit, cum mordicationibus, atque doloribus repentinis, & hæc cum uirium exolutione, extremorum refrigeratione, & aliquando cum rigore inordinato, & sudore fiunt. si pus multum sit, & coaceruatum ad intestina erumpat, uix aliquis seruetur. statim enim defectio animi, & quidem crebra fit, & paulopost intereunt, ut desiderius Iacotius uir undequaque doctissimus, in suis commentarijs ad coaca præfagia Hippocratis, sæpe in multis se obseruasse, scripsum reliquit. Itaque rupto abscessu, ob puris illuuiem ad interiora erumpentem, uix quisquam seruetur. siquidem effusa sanie in capacitatem abdominis, quo modo & hydropicorum aqua confluit, & in uiscera nobilia sanie redundante, cor puris terro uapore obruitur, uenter breui intumescit, extrema refrigerantur, sudore frigido frons mader, cum inquietatione & dolore, donec æger de medio tollatur. Proinde si ad thoracis uacua, & ad tracheam arteriam pus prorumpat, tussis erit humida, scilicet cum sanie; si ad stomachum, uomitus purulentus; si ad ventrem, & intestina, pus per aluum exit, doloresque mordicantes, & dysenterici simul apparent. si ad renes erumpat, & ad uesicam, crebra mictio fit, doloresque, quales ex uomica in hisce partibus constituta fieri superius meminimus: & plerunque ex coaceruato pure urinarias uias obstruente urina planè supprimitur, & breui moriuntur. Quod proximis hisce diebus cuidam iuueni nobili Anglo contigisse uidimus.

In 7. aphor. 8.

De vomica-

De vomicarum prognostico, & primum de salutaribus, & mox de lethalibus cognoscendis. Cap. XI.

PRæmissis multis hætenus ad vomicarum notitiam facientibus, reliquum est, ut nunc de ipsarum prognostico agamus, eoque præsertim argumento, ut post hac commode vomicarum curationem etiam tractare possimus. Itaque vomica primum salutaris, vel lethales deprehendi debent ex partibus in quibus fiunt, & in quas erumpunt; hæc abscessus magnitudine, vel exilitate; ac etiam ex puris effluentis bonitate & virio, atque si paulatim vel confertim erumpat, atque exeat è corpore; demumque ex ægrotantium aut meliore aut peiore statu subsecuto. Quod itaque ad primum pertinet (in primis enim de salutaribus agimus) dicebat Hippocrates, maxime laudabiles ex ijs, quæ foras erumpunt, esse, si quam minimum loci occupent, etsi in acutissimum conum colligantur. Hoc virtutis expellentis fortitudinem, ostendit. At laudabiles quoque non minus sunt ex ijs, quæ intrò erumpunt, si ad partes corporis, in quibus, ut commode expurgari queant, viæ sunt à natura pro vacationibus faciendis destinatæ. Has eruptiones Aurelianus rationales vocavit. Huiusmodi autem sunt, quæ ad stomachum per os, ad pulmones per arteriam maiorem, ad intestina per podicem, ad renes & vesicam per urinam, atque ad uterum per sinum muliebrem, erumpunt, expurganturque. Omnium verò maximè sunt laudabiles, quæ per vesicam euacuantur, quoniam non repente & coaceruatim cum urina pus excernitur, ex qua vires exoluantur, sed sensim ac sensim absque vlla virium iactura. Hæc itaque laudabilior erit cæteris, dummodo pus ita euacuetur, ut dictum est; minimè verò, quando ipsum coaceruatim multumque in renes & in vesicam assum, meatus urinarios obstruat urina; ex toto suppressa suppurationes interimat: quod eò facilius fiet, si etiam valde crassum pus atque viscidum fuerit. Laudabiles quoque ex non minus erunt, ubi abscessus exiguus sit, viresque constabunt, ut pus vomitione prorumpat, aut per aluum, aut per urinam profundatur, natura sibi viam faciente (quæ per media ossa ipsum pus etiam nonnunquam excludit.) Quod si pus bonum quoque erit, adhuc de salute iudicium firmitus erit. Huiusmodi esse (ait Hippocrates) quod candidum, æquale, læveque, & quam minimè fetidum est. De quo in aphorismis etiam dixit. si empycis cum vruntur, aut secantur, si purum & album pus effluat, euadunt. Hippoc. in 7. aphor. 45. ait: Quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit & album, euadunt: in tunica enim his pus continetur. Oportet vero plurimum puris, ut euadant, expurgare. Galenus scribit, quosdam empyicos, qui euaserunt, quindecim vsque heminas puris expuisse, sed tamen id fiet longo quidem tempore, aliquando viginti & aliquando plurium dierum spatio. Vnde Hippocrates de empycis ait: Quicumque ex morbo laterali fiunt suppurati, si quadraginta diebus purgantur, à die quo fit ruptio, liberantur. Quod in Metone, ut scribit Hippoc. in 2. epid. observatum est. is etenim die xxx. pus expuit, & diebus xxxv. puris purgationem absoluit. Demum à morbosi status mutatione in melius post facta eruptionem puris laudabiles quoque iudicabuntur. De quibus Hippocrates ait: Hi vero potissimum supersunt, quos febris eodem dimiserit die post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & à siti liberati sunt, & venter exigua & consistentia deiecit, & pus album & leue & concolor est. & pituita expers, & sine labore ac tussi valida reiecitur. Eodem itidem modo in aliarum partium vomicarum eruptionibus dicendum erit. Perpetuo si febris post eruptionem eadem die dimiserit, si cibum appetant, si à siti liberentur, & pus optimum sit, commodeque & sine multo labore aut per vomitum, aut per ventrem, aut per urinam, aut per sinum muliebrem,

In 1. prog. tex. 42

In 5. de loc. affec. cap. 3.

In 2. prog. tex. 63

„ Hi vero potissimum supersunt, quos febris eodem dimiserit die post eruptionem,
„ ac cibum citius appetunt, & à siti liberati sunt, & venter exigua & consistentia
„ deiecit, & pus album & leue & concolor est. & pituita expers, & sine labore ac
„ tussi valida reiecitur. Eodem itidem modo in aliarum partium vomicarum eru-
„ ptionibus dicendum erit. Perpetuo si febris post eruptionem eadem die dimise-
rit, si cibum appetant, si à siti liberentur, & pus optimum sit, commodeque & si-
ne multo labore aut per vomitum, aut per ventrem, aut per urinam, aut per sinum
muliebrem,

muliebrem, copiosè (non tamen coaceruatim, sed paulatim) expurgetur, optimū erit. Haq; erūt puris eruptiones laudabiles. Nunc ad eas, quę minimè laudabiles, at quinimo malę & pessimę sunt, descendimus. Quas itidē ex loco, in quē erumpunt, primo cōplectemur, ac deprehendere operā dabimus: secundo ex puris qualitate & vitio, atq; ex incongrua purgatione: & deniq; ex ægrotantium in peius mutatione idem prosequemur. Itaq; si ex loco, in quem pus erumpit, iudicium faciendum sit, quę in partem internam erumpunt, peiores, quam quę in externam, sunt æstimandę: pessimę, quę in vtramque, scilicet & in internam & in externam; sic enim geminatur malum, quoniam nullam tunc natura sedem habet, nullumque principium renutritionis, quo ruptis vlceratisue possit opem ferre, ac veluti in solo quodam firma iacere generandę carnis fundamenta: quę sunt in vlceribus caro integra, in fracturis os sanum ē quo callus producit. Namq; et si pus ē corpore excernatur, nihilominus vlcus ex vomica contractum perpetuo multo pure sordescit, nunquamque sanescere potest. quo eger suppuratus sensim contabescit, putridaque, saniosa, ac interdum cruenta sequitur alui deiectio, ac sæpe quasi ex caduere colliquatio, aut inguinum & pubis tumor manifestus oboritur. Nonnunquam obseruatum est, testes cum intumuisent, nullisque remedijs acquiescerent, vlcus in musculis abdominis supra pubem fuisse inuentum. Quare pessimę sunt eruptiones, quę simul & internam & in externam partem fiunt. His proximę videntur, quę cum ad incongrua loca, scilicet nullam viam purgationi opportunam habentia, erumpunt. has eruptiones irracionales Aurelianus appellauit, ipsasque esse vomicas ait, quę in diaphragmate, in pleura, aut in iecore, aut in liene productę, rumpuntur, & per arteriam maiorem, uel per stomachum, aut per vesicam, aut per uterum excluduntur, scilicet cum ex ijs partibus, quę uomica affectę sunt, vię naturales existant, ad supradictas partes ducentes. Fortassè haud Medicos latet uomicam in hepatis caua commode per stomachum expurgari posse, non minus, quam, quę in pleura sit, per uesicam. Quod Galenum non latuit, & Anatomici uenam quandam inuenerunt ad urinaris meatus ducentem, ita ut non sit necesse pus ex pleura in cordis sinus (ut uoluit Galenus) deferri, ut per uesicam expurgetur. Nos iuuenem pleuriticum in domo Hermetis Forcaturę Iuris consulti celeberrimi, Patritij Parauini, Bassani uidimus, quę per urinam, sputis planè suppressis, omnē humorem pleuritici facientem, excreuit, quęque ea euacuatione ab exitiali phlegmone libera euasit. Hasce uerò uias neque Aurelianus uisus est ignorasse, cum scripserit; Quosdam, reperta fuisse uascula quędam, anatomica ratione deprehensa, ad hæc loca penetrantia, animaduertisse: alios dixisse uias esse latentes, quas logorheo-teras appellant, per quas limpida uel purulenta quadam exudatione feruntur: atque alios in singula loca ex alijs factam puris receptionem, quam metalepsim dixerunt, signis explicare uoluisse, quę non necessaria sed frequentia sunt. Ad stomachum uerò puris eruptio plurimum debilitat uirtutem, quia cibi appetentiam tollit. Vnde meritò ab Hippocrate in aphorismis scriptum est: A tuberculi introsum eruptione exolutionem, uomitionem, & animi defectionem fieri. Ad arteriam uero maiorem uomica coaceruata suffocat. omnium est pessima, quę ad cor erumpit: quod & Erasistratus affirmauit. Iacotius in coacis pręsagijs narrat cuidam mulieri, suppuratam pulpam cordis, in multos dies urinam purulentam effluxisse, quartoque mense in mortuę dissecto corpore inuentos duos calculos & abscessus diuisos in corde. eruptiones in regionem peritonęi atque intesti- norum, quoniam pus iecori, lieni, uentriculo, intestinisque offunditur, certum uitę periculum inferunt, nimirum partibus his a puris copia, & praua qualitate plurimum uexatis. In thorace etiam pus abscessum nisi diebus quadraginta expurgetur, pulmonem exulcerat, phthisimque inuehit. Particulatim eruptio in hepar

In 6. coac. præ-
sag. sec. 2. com. 1.
tex. 4.

In 5. coac. præ-
sag. sec. 2. tex. 35

Hipp. in 7. epid.
lex. 8. & tex. 35

In 2. prog. tex. 63

Lib. 5. tard. pass.
cap. 8.

hepar lethalis est: De qua Hippoc. in 7. aphor. 45. quorum hepar suppuratum ad-
uritur, si pus olei feci simile exit, lethale. quando pus facile eius carneam sub-
stantiam corrumpat. Hinc Hippocrates in 2. epidemiorum scribit: Abdominis
vomica dextra parte supra umbilicum effusas, dolorosas esse, & iactationes in-
constantes corporis, stercorisque interdum vomitiones excitare. Non minus etiam
quæ in pulmones abscedunt, malæ sunt. unde auctor Coacorum præfagiorum
dicebat: si dolores in hypochondrijs, & pulmonibus suppurant, malum. Pul-
monis quoque vomicam, si per ventrem abscedat, in coacis præfagijs scriptum
est esse lethalem. Itaque quæcumque eruptiones intrò erumpunt, non modo in
superiorem ventrem, sed etiam in inferiorem, si magnæ sint, lethales merito
iudicari debent, & propter curationis difficultatem, & propter symptomata
gravia, quæ excitantur, non minusque etiam ob partium internarum à puris co-
pia & à qualitate acri vexatarum, nobilitatem, atque demum ob puris denega-
tum exitum. Hollerius scribit in coacis præfagijs, si in mediam regionem & va-
cuam pus deponatur, & superiorem partem inuadat, lethale esse, præsertim si dex-
tram partem vexet, propter hepar. Hæque sunt malæ eruptiones ex partibus,
ad quas abscedunt, iudicatæ. Nunc ad iudicium ex puris copia, qualitate, atque
à purgationis modo faciendum in iisdem venimus. Puris multitudo, magnæ
vomicae est indicium, quæ plerumque mala est; pessima, si coaceruata hæc puris
copia intrò erumpat ad viscera nobilia, neque ex ratione expurgetur. Quod si
pus quoque erit vel crudum vel versicolor, vel biliosum, vel suberuentum, olei
amurcæ simile, aut versicolor, atque fetidum, certum exitum futurum signifi-
cat. Vbi substantia hepatis carnosa (parenchyma Græcis vocata) suppuratur,
pus exit feci olei persimile, fetidumque: & in empyicis cum vruntur, si pus sub-
eruentum, feculentumque ac fetidum exeat (Hippocrate auctore) moriuntur.
De biliosis purulentis auctor Coacorum præfagiorum scribebat: Quibus cum
bilioso purulentum sputum expurgatur, siue pus leorsum exeat, siue permixtum
bilioso, ijs vt plurimum mortem subsequi. Cuiusmodi excreuisse visi sunt, vxor
Meandri cæci, atque filius Antiphradis. Demum pessimæ eruptiones quoque
erunt, à quibus ægroti in peius mutantur, præsertimque qui immoderatus aut
per vomitum, aut per aluum pus excernunt, quo vires maxime debilitantur:
unde fastidia, exolutiones, atque animi defectiones sunt: contra, si pus intrò
copiosum erumpat, neque ex ratione excernatur, sed parum vel nihil, suffocati
ij citissime pereunt. Porro ab eiusmodi eruptionibus nedum ægri aliquo pacto
releuantur, sed rigent, anxij, inquietique euadunt, febriunt, sitiunt, difficul-
ter respirant, suffocantur, exoluuntur, animo deficiunt, extrema refrigerantur,
sudant in capite. De his Hippocrates locutus scripsit: Hi verò pereunt, quos
febris non deserit, aut, si videatur deseruisse, rursus recalescens appareat: sitiunt,
nec cibum appetunt, aluus humida est, pus viride, vel liuidum spuunt, vel pi-
uitosum ac spumosum. pereunt, si hæc omnia adsint, ac quibus horum alia ad-
ueniunt, alia non, ij partim intereunt, partim multo tempore incolumes euadunt.
Hæc eadem Aurelianus quoque expressit.

De vomicarum curatione, & primò quæ ipsarum chirurgiæ, & quæ medicamentis tollantur. Cap. XII.

PRæmissis omnibus cum ad vomicarum cognitionem, tum ad prognosim fa-
cientibus, reliquum est, vt ad ipsarum etiam curationem tractandam nunc
descendamus. quæ profecto partim medicamentis, partim sectione fit. Partes
vomica vexatæ non admittentes sectionem pro curatione faciendi sunt (Auctore
Aureliano)

Aureliano) pulmones, diaphragma si vomica sit in eius parte intrinseca; vel in ipsa vltiore altitudine; item stomachi superiora diaphragmate sitis; ventris quoque interiores loci, & intestina (excepto fine recti intestini quod secari potest) vesicæ partes posteriores, atque renes. Vomicae igitur in hisce partibus factas haud quaquam chirurgiâ posse sanari Aurelianus credidit, eoque præsertim argumento, quod hæ partes vomicam continentes sint in internis, occultisque locis positæ, compluribusque superpositis subiaceant membris: vnde incidi non possint absque multarum aliarum partium incisione. Quod si fieret, immoderatum sanguinis profluvium sequeretur, atque alia propter multarum partium vulnerationem symptomata sæua fierent. Quare hæc vomicae in prædictis partibus internis obortas consultius medicamentis quam Chirurgia curare debemus. Aliæ vero chirurgiâ siue sectione curari possunt, quoties vomicarum collectû pus ad exteriora corporis facta eruptione fertur, uel magis ab altioribus abscedit, ut in pleura membrana, aut in diaphragmate forinsecus, atque in stomachi fundo, & in uentre circa eius superiorem altitudinem: item in iecore, & in liene, & in longæone ad eius exteriora atque spincteri vicina, & in anterioribus vesicæ, uel sub umbilico pubetenus, quod Græci eron appellant, item in vesicæ collo, uel in prima eius parte, quam Græci vretan uocant, & in peringo. Atque hæc uomicae sunt, quæ sectione tolli possunt, de quibus nos postèrius accuratius agemus. Nunc ad eas, quæ non sectione curari possunt, sed solummodo medicamentis intus extraque adhibitis. Harum uero uomicarum curandi ratio hisce scopis potissimum perficitur, primus est, ut si fieri potest prohibeamus phlegmones suppurationem futuram digerentibus laxatorijsue medicamentis cum totius corporis, tum maxime partis inflammatae. Alter, si suppuratio prohiberi, quò minus fiat, nequeat, ut eandem, quoad fieri potest, adiuuemus medicamentis scilicet supparatorijs. Tertius facta uomica, ut procuremus cito, quantum possibile, eius abscessionem, eruptionemque fieri. Quartus, ut pus facta eruptione citius, & probe euacuemus, deterforijs nimirum medicamentis, atque demum ulcera ab abscessibus relicta, ut rectè curemus.

De medicamentis futurum abscessum, vomicam uel tum prohibentibus, ne fiat; tum, ut cito probeq. fiat, adiuantibus. Caput XIII.

Suppurationem prohibent ea omnia, quæ medicamentorum suppurantium temperamento, atque substantiæ, quouis modo opponuntur: porro cum suppurantia calida humidaque sint, & quàm maximè partis corporis, in qua fieri debet suppuratio, naturæ seu temperamento similia, substantiæ etiam uiscidæ, & lentæ; ea, quæ impediunt futuram suppurationem, erunt sicca, atque uel multum calida simul uel frigida: hæc phlegmonem refrigerando indurant, atque in scirrhosam duritiem mutant; illa uehementer digerendo phlegmones materiâ discutiunt, & resoluunt, atque hæc esse tenuioris quoque substantiæ oportebit. Itaque fugienda erunt ea medicamenta, quæ parti, in qua futura timetur suppuratio, temperamento planè similia existunt. Ut uero futura hæc suppuratio impediatur, primum laxantium usus erit maxime idoneus, tum eorum, quæ corpus uniuersum laxant, ipsæque laxando materiâ phlegmonum diminuunt, quo postea facilius à natura partis humor digeratur: quod si fiat, omnis abscessus futuri suspicio tollitur. Eo uero argumento id factum esse nobis innotescit, quia dolor, febris, & reliqua symptomata partis phlegmonem concomitantia

Mm planè

In 2. lib. tex. 32.

planè tolluntur, atque quiescunt: contra autem iisdem perseverantibus timendum erit de futura suppuratione: atque hoc est, quod Hippocrates in prognosticis dicebat: Quicumque dolor in ijs affligit sedibus; non desinens, neque creationis purgatione, neque uentris subductione, neque uenæ incisione, ac medicamento, & uictus ratione, in suppurationem uerti sciendum est. Quibus liquido constabit nobis omnes cum euacuationes, tum purgationes plurimum ualere ad prohibendum futurum abscessum. quod nimirum materiam, quæ stricturam phlegmonemue fouet, diminuunt, & resoluunt. Quibus præmissis, nos poterimus ad mouere partibus extremis medicamenta discutientia, uel siccantia, uel denique refrigerantia, hæc enim crassiorem frigidiorēque substantiam humoris stricturam fouentis præ frigore cogendo phlegmonem indurant: quoniam fortasse (licet quoque malum sit, phlegmonem interni uisceris in scirrholam duritiem abire) minus malum erit in aliquibus partibus phlegmonem in scirrholam duritiem mutari, quam suppurari: nam internarum partium suppurationes nunquam periculo uacant. Atque hæc medicamenta hoc ipsum facientia sunt adstringentia, scilicet laxantibus contraria: ueluti sunt fomenta tepida ex lentisco, myrto, terebintho (scilicet uel ex folijs uel ex fructibus,) uel ex plantagine aut polygono, aut equisetio aut similibus alijs in aqua parata; uel epithemata ex ipsorum decoctis uel ex aquis stillatitijs cum aceto. Eodem itidem modo, quæ generose siccant, applicita suppurationem impediunt, cuiusmodi erit lapis asius, bolus armenius, terra lemnia, & samia, tormentillæ radix, bistortæ, & alia similia. At iam descendimus ad digerentia siue humorem discutientia medicamenta: Quæ primum locum habent, sunt balnea sulphurea, bituminosa naturalia: cuiusmodi sunt in agro Patauino Apollonia, sancti Petri, sancti Bartholomæi. In agro Lucensi balneum calidum: spongijs enim excepta ipsorum aqua calida adhiberi debet: Artificialia quoque balnea fiunt ebulliendo in aqua medicamentorum discutientia: cuiusmodi sunt (exempli gratia) chamæmelum, anethum, ruta, organum, pulegium, calamintha, peucedanum, melissa, chamædryd, chamæpitys, centaurium minus, polium, thymum, asarum, abrotanum, agnus castus, dictamnus, cinnamomum, iuniperus, mentastrum, amaracus, marum, trifolium, bituminosum, sabina, apium, petroselinon, & huiusmodi similia: quæ si fortasse nimis calida ad phlegmonas calidiores videbuntur, poterunt ad diris refrigeratorijs quibudam mitioris caliditatis reddi. Ex his igitur fomenta parabuntur ex aqua, quæ spongia excepta atque calida adhibita ad id plurimum iuuabunt. ex ijs quoque olea pro inunctionibus parabuntur. At inter hæc olea utilia erunt chamæmelinum, anethinum, irinum, rutaceum, lilinum, amygdalinum, amaracinum, cicinnum, & antiquissimum dulce. hæc erunt aptissima medicamenta pro digerenda phlegmone, & prohibendo, quò minus ipsa in abscessum abeat. Quibus medicamentis si digeri inflammationis materia nequeat, ita ut non possit impediri suppuratio, quinimò ex signis superius explicatis si deprehendatur, omnino suppurationem futuram, consultius erit, eam quoad fieri potest, ut citò probeque fiat, medicamentis suppuratorijs adiuuare. Ad quam suppurationem adiuuandam Aurelianus commendauit fomenta ex decocto althææ, seminum tenuigræci, sem. lini, aut ex mulla parata per spongijs Thoraci (si sit vomica in thoracis partibus) adhibita, aut hypochondrijs, uel uentris inferioris partibus, si sub ipsis subsit vomica; aut lumbis & pubi, si in renibus, uel in vesica itidem abscessus sit. commendat itidem cataplasma ex iisdem parata. Paulus eadem ferè ad iuuandam puris concoctionem meminit in utriusque abscessu. in empyicis uero cataplasma ex triticea farina, cum ficibus pinguibus coctis, cum folijs, uel radicibus althææ, cum modico resinæ, atque nitri: aliquando simum columbinum addidit. Eodem modo iuuant spongiarum euaporationes

euaporationes ex decocto althææ, maluarum, sem. lini, fenugreci, cumque sicubus pinguibus simul concoctis. Innumera ferè sunt, medicamenta suppuratoria primo simplicia, mox composita. Ex simplicibus etiam aqua temperate calida partibus mollioribus (quod sanè suppurantia temperate calida atque humida esse oporteat, & quam simillima partis, in qua vomica sit, temperamento) affusa, ad simplicem phlegmonem suppurandam erit accommodatissima. similiter hydrelæum dulce modice calidum. Si vomica fuerit in superioribus partibus, per os oleum calidum vel decoctum althææ, vel hydrelæum ad semilibram dandum. Et si fuerit in partibus infernis, eadem medicamenta clysteribus erunt iniicienda. Per exterius verò adeps suillus, vitulinus, butyrum, celsypus congruent. In durioribus uero, & tarde suppurantibus triticum ore præmansum saluæque hominis commollitum adhibebitur. Panis item siccus vberiore oleo commollitus conducet, & sale conditus longe efficacior est. ex adipibus taurinus, & caprillus. Pix, vel resina ex vtere oleo adhibita, est utilis; tussilagoque sub cineribus cocta, atque apposita: non minus & pix arida, qualis est coracina & colophonina, vberiore oleo dulci dissoluta. Ex compositis item multa sunt. In mollioribus & facile suppuraturis conuenit cataplasma, quod ex farina triticea furfuribus repurgata, vel ex pane aqua dissoluto, addito oleo, vel butyro, coctione paratur: aut eadem farina hydrelæo coquitur, & croco coloratur. pingue etiam lanæ sordidæ adhibitum vtile erit: quod vt fiat, accipe lanam sordidam modicâ aqua maceratam, cui additur tertia pars vini dulcis, coquuntur omnia, & quod superfluit, eo vtere. Paratur etiam decoctum caricarum, accipiendo (exempli gratia) caricarum pinguum lib. v, aquæ lib. ix. bulliunt quoad tres libræ remaneant, quo calido vtere: longe efficacius suppurabit idem addita farina triticea, oleo, uel butyro, exijsque omnibus paretur cataplasma. Sunt qui in althææ decocto passulas, & farinâ coquentes parant cataplasma addito croco. In durioribus è sicubus, calce, sale torrefacto, atque aceti fæce, medicamentum parant suppuratorium; est & tetrapharmacum, vocatum, quod ex pice, resina, cera, atque adipe fit, oleoque subigitur. Hæc medicamenta ad puris concoctionem adiuuandam adduxisse sufficit.

De præsidij vomicarum eruptionem adiuuantibus.

Caput XIII.

Vomica aliquando, cōcocto abscessu, cito erumpunt, interdum tarde, vt aliquæ ad diem vsque sexagesimum eruptionem habeant. In illis dolor continenter acius vexat, febrisque vehemens itidem: vnde ægri etiam inquieti & anxij red duntur. Contrâ, si doloris febrisque vehementia quadantenus fuerit diminuta, tamen vterque affectus continenter perseueret, tardius vomica ruptum iri denotat. Vt vero eruptionem acceleremus, quando pus collectum diu in parte contineri tutum non sit, cum eam corrumpat, aptis remedijs pus tenuandum, liquandum, calefaciendum, atque agirandum erit, & natura, vt propellat, maxime irritanda: & quæ vehementer calida existunt, aptissima sunt vt pus collectum extenuetur, liqueturque; acria vero, salsa, & amara ad irritandam naturam: à quibus tamen abstinendum, si aliquid supersit phlegmones, cum, tumore exasperato, vomica maiores euadant. Motus præterea omnes utiles sunt ad agirandum, mouendumque pus, vnde mirum non est, si veteres medici omnes laudarent, primum, vt suppurati super latus decumbant, si in superioribus à diaphragmate partibus pus fuerit collectum, quod nimirum puris multitudo, præ grauitate & pondere ad vacua dependens, faciliorem ruptionem faciat.

Mm 2 Itaque

Itaque supinum decubitus idcirco euitare debebunt, quando hic decubitus, præterquam quod nihil eruptionem iuuare potest, id quoque mali facit, vt inde arteria extensa angustetur, indeque spirationis difficultas subsequatur, & nimia liquidorum fiat exclusio. Sternuramentum quoque & tussis commota pus agitando eruptioni fauent: quam ob causam aliquando etiam vomitio erit concitanda. Quo factum est, vt apud antiquos cum purgantia vomitoria tum ventris ad adiuuandam puris eruptionem fuerint in usu, atque ex ijs sigillatim tum elleborus albus, tum hiera diacolocynthidos, & similia. In usu verò medicamentorum, pro eruptione iuuanda, à mitioribus erit inchoandum. Huiusmodi sunt, fomenta, cataplasmataque nuper ad iuuandam suppurationem expressa: scilicet ex polline tritici, aut sem. lini, aut fenugreci, ex aqua mulsa vel decocto althææ. Et non tantum externa conuenient medicamenta, at quinimo magis etiam interna. vnde si vomica fuerit in partibus superioribus, per os dandum erit ante cibum oleum dulce calidum (exempli gratia) ad uncias quatuor, & etiam ad semilibram, vel mullum mediocriter coctum, aut hydrelæum, vel decoctum radicum althææ, vel fenugreci, vel lini, ex melle. In cibo dandus erit prisa cremor cum melle, vel atriplex cocta vel vrticæ folia itidem cum melle: dandum itidem mullum, aut mel cum resina terebinthina; aut dandum butyrum non antiquum, aut porra cocta cum oleo & garo, aut lac cum mulso, & quandoque prisa hordeacea cum vino scyllino. Ex medicamentis etiam dabitur ex melle resina (præsertim; si puris crassities aut lenter sit causæ difficultis eruptionis) & lini semen cum melle iuuat; item semen vrticæ, vel sinapis cum modico piperis longi triti. si verò id fiat propter naturæ expellentis debilitatem, ægri optimis cibis atque vino etiam sunt rescitendi. Vbi vero his præsidij non fiat eruptio, efficaciora erunt admouenda. Huiusmodi sunt (exempli gratia) fici decoctum calidum epotum, vel hyssopi & rutæ, vel thymi vel saturegiæ, vel origani & tragorigani, vel centaureæ minoris, vel marrubij, aut sinapis aut nasturtij, atque hæc omnia cum melle dabuntur. Ex compositis laudatur etiam diatrion pipereon ex mulso, vel diascordium, vel diacimnon. si verò pus fuerit in inferioribus partibus collectum, eruptio erit clysteribus ex supradictis cum decoctis, tum medicamentis paratis adiuuanda. atque hisce præsidij puris eruptio erit facilitanda; qua eruptione facta pus erit euacuandum, eiusque excretio medicamentis itidem adiuuanda.

De puris excretionem per tussim, per vomitum, per aluum, per urinam, per uterum, atque per abscessus. Cap. XV.

Quinque modis vomicas internas ruptas expurgari cognitum est, quippe per anacatharsim, quæ motu proprio per superiora fit: etenim pulmones iugent pus in thoracis cauitate, quo madent, quod compressione fertur in tracheam arteriam, & deinde per continuitatem ad os fertur, quæ excretio empyicorum est optima, omniumque maxime expetenda. Vbi vero pus aut propter crassitiam & lentorem, aut ob debilitatem hoc modo non expurgatur, aut per aluum, aut per urinam, aut per uterum, aut per abscessus expurgatur. At ubi eruptio fit in ventre interdum per vomitum, sæpius per aluum & per urinam, nonnunquam etiam per uterum excernitur. In suppurationis, vti dictum est, sæpe per tussim educitur, non raro per urinam, & per aluum, & per abscessus. Per urinam pus ex thorace purgari Hippocrates in 1. epidem. sect. 2. & in 3. epidem. sect. 3. affirmat: & Galenus in lib. 6. de loc. affectis cap. 4. & in 4. aphorif. 75. huiusmodi purulentias per urinam purgatas tradidit. Ambigunt autem plures quomodo à cauitate thoracis

thoracis in renes pus feratur. Nonnulli venæ ramum se inuenisse gloriantur, qui ab azygo per costas excurrens, & diaphragma permanens, cum adiposa & renali coit. Rectius videtur, quod à Galeno in lib. 6. de loc. affect. cap. 4. traditum de hac re fuit, scilicet, quantum leuis arteria pulmonis ex rupta vomica puris suscepit, id in sinistrum cordis sinum deferri, quod inde per arteriam magnam in renes fluit. hoc fuit ab anatomicis doctissimis comprobatum. quod Andreas Laurentius anatomicorum omnium hæc ætate facile princeps clarissimis exemplis & historijs demonstrauit. Non raro per ventrem quoq; pus secedere (quam purgationem Hippoc. in coacis prælagijs lethalem esse dixit) omnibus comperitum est. sed hanc symptomaticam esse excretionem constat, quod eò difficulter feratur, quoniam ex pulmone in cordis ventriculos recipitur, & ex corde aut per venam cauam in iecoris gibbam, & inde ad cauam ad portas, & ad anfractus intestinorum peruenit; aut ex corde primum in magnam arteriam, deinde in eam, quæ mesenterico intexitur, penetrat. Per vterum expurgari etiam aliquando vomica ex thorace Aretæus in lib. 3. de morb. chronicis cap. 9. se vidisse tradidit. Demum per abscessus etiam interdum easdem purulentias excerni Hippoc. in 2. progn. tex. 67. affirmavit, dicens: Abscessus si in cruribus erumpit in pulmonia vehementi ac periculosa, omnis est utilis. At hisce præmissis congruū est, vt sigillatim, quod præcipuum nostrum fuerat institutum, ad singulas vomicæ excretiones adiuuandas descendamus. Itaque si vomica in thoracis vacua suscepta sit vel à pleura, vel à pulmone, vel à septo transuerso secedat in eadem loca, ad tracheamque arteriam delata per tussim expurgari cæperit, neque copiose vt par est, pus expurgetur, vel propter eius crassitiem & lentorem, vel quia nimis tenue sit, quam spiritus foras elidere queat, medicamentis bechicis vocatis opus erit, ipsum pus attenuantibus, aut incrassantibus, detergentibusq; Incrassant semina papauerum alborum tenuissime trita cum saccharo assumpta, ex compositis diacodion & syrupus de papauere ad pus nimis acre & tenue incrassandum est utilis. Ad ipsum autem extenuandum detergentumque mulla ex prassio, vel hyssopo, vel tussilagine, vel scylla alterata, si per os exhibeatur ad semilibram. Decoctum quoque ex radice iridis sicca minutim incisa, item ex radice helenij, glycyrrhizæque, atque ex folijs farfare, capill. veneris cum modico prassij in aqua paratum, cum saccharo vel cum melle calidum epotum ad id erit vtilissimum. Non minus conducunt ex vsualibus syrupis pectoralibus illi, qui de prassio, vel de hyssopo, vel de glycyrrhiza vel de tussilagine parantur. Atque ex iisdem medicamentis eclegmata cum melle vel saccharo parata laudantur. Aulianus, præter mullum, & cremorem prisanæ cum melle, dabat etiam porra decocta cum oleo & garo parata, refinamque iridem ex melle, semen lini tritum cum melle, atque semina vrticæ trita cum melle iridem. Egyptij vruntur familiariter eclegmate, quod paratur ex iridis radicis sicce, hyssopi sicci an. 3. xx. bulliunt in tribus libris aquæ, quoad vna supersit percolatoque decocto addentes sacchari quod satis sit, apud ignem syrupum conficiunt, quo vtuntur, accipiendo id cochlearis mensura, atque etiam ipsum lambendo. Aliud, ad expuitionem puris iuuandam, familiare habere solent, è seminibus nasturtij paratum, atque ex semine tum lini, tum fenugræci iridem paratum quæ omnia à nobis descripta fuerunt in libris de medic. Egyptiorum, noua editione euulgandis. si verò pus cæperit per stomachum vomitu purgari, adiuuare excretionem oportebit vomitorijs medicamentis. primumque clementioribus, cuiusmodi sunt aqua tepida cum syrupo aceto solo largius epota, vel eadem aqua cum glycyrrhiza, semine apij, atque anisi decocta, aut hydrelæum, vel etiam oleum amygdalinum dulce & amarum, vel decoctum althææ, vel sem. lini fenugræci & similia. his enim vomitionem adiuuabimus. quæ si his non moueatur, validiora erunt tentanda,

In lib. 4. cap. 9.

tentanda, cuiusmodi aptissimum erit agarici optimi puluerizati drachma ex melle epota; aut si opus fuerit, tentanda quoque erit portio ellebori albi, priusquam æger à copia puris intereat: sed tamen semidrachma decoquendum erit in vini albi dulcis aromatici semilibra, quoad quatuor vnciæ remaneant, cum semidrachma thuris masculi, atque sem. hyperici. Aretæus in lib. 8. de morb. chronicis cap. 13. dabat hyssopum ex mulla in potu, vel marrubium, uel succum absinthij. Hæc ante cibum vsurpanda, ut humores extenuentur, & viæ lubricæ reddantur, & ut purulentia facile rumpantur. dabat etiam lac asininum in potu. Vbi verò per aluura descendit, clysteribus deterforijs opus erit, cuiusmodi erunt, qui ex mulla, oleo, & sale, parantur, vel qui ex decocto althææ, maluarum, betæ, surfurumque triticearum, atque ex melle rosaceo, cum nitri duabus drachmis, oleoque amygdalino amaro. Aprissimi quoque erunt, si ex hordei non à corticibus repurgati prisanæ cremore parabuntur, cum oleo dulci, melle rosaceo, vel ex melle atque ex nitro. Aretæus dabat lac asininum vel caprinum, vel ouinum; & cum obsonijs piper, zinziber, & ligusticum: quod aluum moueant. Si vomica per renes ad vesicam descenderit, diureticis medicamentis itidem erit opus, & primò dandum erit serum lactis ad libras tres, cum semilibra lactis serminum melonum vel cucumeris. vtilissimum erit decoctum ad libram cum saccharo potum calidum, quod, exempli gratia, parabitur accipièdo radicis althææ, glycyrrhizæ, an. vnc. i. feminum althææ, maluarum, cucumeris, melonis, an. 3. iij. petroselinij, apij, anisorum, citri an. 3. ij. simul omnia in mortario contundantur, atque cum aqua vel cum decocto althææ lac exprimat. Floris quoque cassiæ catharticæ, Abissinæ vocatæ, recentissimè extractæ drachmæ decem, cum drachma pulueris radicis glycyrrhizæ, si exhibeantur, maxime excretio per urinam iuuabitur. Demum si per sinum muliebrem expurgeretur vomica, pessis vrendum erit ex butyro recenti, vel ex œsypo, cum modico succi cucumeris syluestris, vel colocynthidis, vel cum modico nitri, vel salis. Insestiones quoque plurimum hanc excretionem adiuuare poterunt, paratæ ex decocto maluarum, althææ sem. fanugræci, foliorum vel radicis ebuli, artemisiæ, petroselinij, apij, & similibus. Atque hæc sufficient, pro puris excretionem medicamentis adiuuanda, atque hoc modo ad ægros à vomica subleuandos. Nunc illud idem tentandum erit aliter, scilicet, ut breuius atque fortasse securius pus intus collectum educamus, suppuratosque sanemus, & vomicas in partibus externis pro sectione facta educamus: cuius rationem, locum, & tempus quo fieri debet, mox demonstrabimus.

*De vomicis, quæ sectione tolluntur, quomodoque hoc sit
moliendum. Cap. XVI.*

Cum de vomicis, quæ medicamentis tolli possunt, scripserimus, reliquum est, ut ad eas sermo conuertatur, quæ chirurgia sanantur. quod nobis vñ venit, quoties collectum pus in parte interna ad externas facta eruptione fertur, ab altioribusque foras abscedit. Caterum tametsi partes corporis vomica vexatæ complures sint, quæ tuto secari, ut aliquibus visum est, possunt, quarum superius meminimus, scilicet, pleura membrana, diaphragma forinsecus, fundus stomachi ventris superior altitudo, iecur, lien intestini recti pars extima spinæque proxima, vesicæ pars anterior, collum, & prima eius pars, perineum, aut sub umbilico pube tenus: Nihilominus omnes ad duas redigi videntur, scilicet ad thoracis atque ad ventris regionem, seu partem à septo transuerso ad pubem vsque protensam. Etenim omnes partes intra thoracem vomica laborantes, ipsæque in eius vacua erupta atque effusa, vnica sectione inter costas spurias facta sanari possunt.

Aurelianus tamen visus est, voluisse pleuram vomica vexatam forinsecus facta sectione atque exinde pure euacuato sanari posse, atque etiam forinsecus itidem in diaphragmate tuto fieri posse. Verum cum pus in vacua thoracis ex qualibet parte in ipso contenta abscessum est, factaq; sectione iuxta costas spurias commode & tuto vacuari queat, quis non fateatur, vnica sectione in thorace facta, omnes vomicas in thorace genitas, ruptasque posse planè expurgari? At oportet statim secare vel vtere suppuratos. Hippocrates in suppuratis & tabescentibus vitionem plurimi semper fecisse visus est, & magis quam sectionem. Veruntamen in suppuratis sectionem quoque in magna existimatione habuisse constat. Quod prædicti genus si maturius fiat, antequam pus maiorem corruptionem acquirat, & partes internas corumpat, vere sanare solet: si verò tardius id moliamur, exitum citius inducit. Itaque cum ægroti plurimum pus in pectore habentes, desperantorum per expuitionem posse ex purgari, ad vitionem, vel ad sectionem faciendam statim vt descendant, oportet. de qua quidem quomodo, & quādo fieri oporteat Hippocrates in lib. 2. de morbis ita scripsit: Quum tempus longius protrahitur, & febris vehemens ac tussis corripit, & latus dolet, & ad sanam partem decumbere non potest, sed ad dolentem, & pedes, & oculorum cavitates intumescunt. Hunc, vbi decimus quintus ab eruptione dies adest, multa calidiorum, in sella firma collocato, & alius quidem manus ipsius teneat: tu verò humerum concutito, vt audias in vtro latere affectio strepitum edat; optandum autem esse in sinistro. Hunc ipsum igitur locum seces, minus enim lethalis est. si verò præ crassitudine ac copia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis (nam hoc aliquando contingit) utrum latus tumuerit, ac magis doluerit: hoc infime secato retro tumorem magis, quam ante ipsum, quò puris exitus facile fluxionem habeat: secato autem inter costas per nouaculam primum cutem, deinde de scalpello acuto, quod paniculo sit obligatum ita, vt summa ipsius pars ad vnguis magni digiti mensuram expedita restet, quam intromittas. postea emissio pure quantum visum fuerit, vulnus linamento ex lino crudo: alligato foras pendiente filo, concludito: & quotidie semel pus educito postquam autem decimus dies affuerit, omni pure emissio, linamentum ex linteo indito. Deinde vinum & oleum tepefacta per fistulam infundito, ne pulmo à pure humectari solitus deteram: quod vespera, mane. Vbi uerò pus tenuè uelut aqua fuerit, & ad digitum contactum, viscosum ac modicum, penicillum stanneum cauum indito. Postquam autem omnino uenter ressecatus fuerit, paulatim linamentum præfectum minuito, donec ulcus coalescat, & ipsum penitus eximas. Signum autem an euasurus sit, habes: si pus album ac purum fuerit, & fibræ sanguinis insint, plerunque sanus sit, si uero prima die prosuat lutei oui speciem habens, aut secunda die defluat crassum, cum uirore subpallidum, fetens, moriuntur, ubi pus effluxit. Itaque Hippoc. vult sectionem primo fieri in sinistra parte, quā proxime ad diaphragma: sed ita tamen, ne ab incisione lædi possit. Vnde commodè tutoque sectione fieri posse existimauit. Quo merito in libro de internis passionibus ait: Costam tertiam ab vltima usque ad os secato, deinde cum terebra caua vltra perforato, & ubi perforata sit, aquæ parum emittito. Plerique recentiorum Anatomicorum cognouerunt posse secari inter tertiam & quartam costam tuto absque septi transuersi læsione. & hæc de sectione faciendā ad uomicas intra thoracem susceptas. Nunc de uomicis, quæ sunt intra peritonæum in varijs partibus internis, agamus. In controuersiam a ueteribus uersum est, utrum peritonæum tuto secari queat. Erasistratus (Aurelianus auctore) demonstraui, tuto secari posse iuxta inguen. Quam ueritatem recentiores quoque quotidiana experientia confirmarunt. Quare, vbi intra peritonæum uomicæ eruptio sit, siue ex iecore siue ex alia parte interna

In 6. epid. sect. 7.
tex. 9.

Circa medium
libri.

In li. 3. de clero.
sap. 9.

interna in ventre contenta, sectione peritonæi expurgari potest: iuxta inguen promptius si fiat apertio, pus educetur. Aretæus vero inquit: Cuidam ego aliquando abscessum laxioris intestini dextra in parte prope iecur dissecui, multumque inde puris effusum est. multum quoque per renes & vesicam ad plures dies emanavit, unde & sanitatem homo adeptus est. Cæterum sectio peritonæi iuxta hypochondriorum partes, propter magnam, quæ succedit, sanguinis profusionem, apud omnes semper fuit maxime formidanda. Quo fortasse etiam evenit, ut antiqui in suppuratis & rabidis magis usum vitionis quàm sectionis complecterentur. Unde probe Aretæus hæc de hepatis sectione nobis scripta reliquit: Porro si ad anteriora subit abscessus, longe medico natura præstat: aut enim ad intestina, aut ad vesicam pus conuertit: verum multo innocentior est in vesicam via. At si extra feratur abscessus, ipsum non secare, vique malum est. nam si prætermittatur incisio, a pure iecur corroditur, nullaque mortis dilatio est. Si secare autem malis, profuuii sanguinis periculum instat, statimque hominem perdi contingit. nam sanguinis è iecore profusio coerceri nullo modo potest. Igitur si aliquando necessitas fatio ad sectionem venire cogeris, vstorium ferramentum candens perspicuumque ab igne accipito, & vsque ad puris locum intrudito. idem enim tibi & secat, & comburit. Nos eodem modo iuxta inguina non semel vidimus, sectione facta vsque ad puris locum, internos abscessus recte fuisse expurgatos. Intestini recti extremos peringo, atque vesicæ collo sectis, abscessus itidem in iisdem locis genitos, expurgatos, sanatosque vidimus. Verum hoc vel crudo adhuc abscessu, moliri oportet, vel non post perfectam puris concoctionem, ne puris acrimonia corrodendo viceram sinuosa faciat, quæ ægre in illis partibus sanantur, & non nisi sectione, atque vitione propter illarum partium laxitatem.

De sanandis ulceribus ex vomicis in varijs corporis partibus excitatis & primo de ijs, quæ in aperta arteria, in pulmonibus, atq; in thorace sunt. ex quibus de phthisi etiam particulatim agitur. Cap. XVII.

POSTeaquam de vomicarum seu purulentiarum curatione, quæ tum medicamentis, tum chirurgia fit, sufficienter scriptum est, reliquum erit, ut ulcerum, quæ in varijs partibus ex vomica remanserunt, curationem quoque prosequamur. Plures vero corporis partes ex vomica exulcerari solent, sed præcipuæ sunt, pulmo, arteria aspera, pectus, stomachus, hepar, intestina, renes, ureteres, vesica, atque uterus. Quarum sanè partium vlcerata ex vomicis relicta, & cognosci & curari (cum res magni momenti sit, maximeque ad medicum pertineat) diligenter debent. Etenim hæc, ni citò tollantur, hominibus tabem insanabilem inuicere solent. Quare opere pretium duximus fore, si accuratius de ipsorum curatione à nobis in præsentia ageretur. Exordiemur autem ab ijs, quæ in thorace reliquantur, quæ sunt, aut in aliqua eiusdem thoracis parte, aut in pulmonibus aut in aspera arteria. Quam rem æturi, phthisim quoque, cum necessario predictarum partium vlcerata subsequatur, tractare, de eoque priuatim affectu sermonem nos facere cogimur. plerique latiori vocabulo tabem hunc affectum appellant. Quo nomine veteres varios affectus intelligebant, aliquando (Cello auctore) atrophiam, qua corpus non alitur; interdum Cachexiam, scilicet malum corporis habitum; nonnumquam rabidum affectum ex renibus exulceratis, quandoque marasmodem ex quacumque causa obortam, atque etiam ex dorsali medulla a nimia Venere nimis exsiccata, contabescenque exinde toto corpore. Fit etiam pulmonibus

pulmonibus nimium exsiccatis ab intemperie calida & sicca. Demum phthisis proprie magis totius corporis colliquationem consumptionemque propter pulmonis vlcera factam, omnes intellexerunt, quem affectum Athenienses (Galenus auctore) *phthisin* appellant: quæ sit perpetuo pulmonibus exulceratis aut à pituita, ut Hippocrates docet, ex capite ad pulmones destillante, ibique putrescente aut ex acri fluxione erodente aut ex rupto aliquo vase, vel eroso vel aperto, aut denique ex vomica inibi existente, de quo affectu in præsentia agimus. Cæterum non solum ex vlcere pulmonis, at quinetiam ex vlcere in quacunque thoracis parte ex purulentia relicto, nec non etiam ex trachea arteria itidem ulcerata homines in phthisim prouehuntur. In ulcerato pulmone plurimum, per sputum, puris reijcitur, dolor non aderit, & quandoque pulmonis substantia ulcerata eiusdem scilicet caruncula per tussim excernitur, aut nonnunquam eiusdem pulmonis bronchion; si vero vlcus in thoracis parte sit, expuunt quidem purulentum, & habent doloris sensum in eadem parte. Trachea vero arteria si ulcerata sit, pauca per tussim excernunt, tussiculaque affliguntur, & in affecta arteria, dolorem sentiunt. Harum singularum partium vlcera diu perseverantia phthisis consequitur. Cuius quidem affectus (quam passionem Aurelianus communiter stricture atque solutioni adscribendam esse voluit) hæc signa obseruabuntur. primum enim aderit febricula latens, quæ sæpe die declinante incipit, atque veniente luce lenior fit tussicula attestante plurima initio noctis atque fine, cum sputis saniosis ac paruulis in ijs, qui non ante sanguinis fluore uexantur, salua permixtis, quæ deinde etiam plurima excerni tussi obseruantur. Iis vero, qui ex sputo sanguinis in hanc inciderunt passionem, primo sputa cruenta, tum feculenta extussuntur, deinde liuida & prassina; atque postremo alba ac purulenta dulcia, vel salia, cum vocerauca aut clangosa, cum inspirationis difficultate, & rubore genarum, colore cinereo totius corporis, oculorumque aspectu exolero: Adest insuper corporis tenuitas, quæ nudatis membris magis quam ex aspectu vultus innotescit. in aliquibus vnâ sentitur sibilatio, vel stridor in pectore: Sudant etiam superiores partes vsque ad pectoris finem. Crescente passione, cibi fastidio tenentur, maiorque est suis quam ciborum desiderium. Quibusdam grauis etiam doloris sensus adest, ulcerati scilicet pulmonis: quandoque eiusdem visceris fibras per tussim expuunt. Aliquibus vero thorace exulcerato punctiois sensus adest. pulsus in ipsis est debilis, densus, ac deinde morbo in peius abeunte formicalis vocatus. digitorum summitates crassescunt obuncatis unguibus. His accedit pedum inflatio seu extumescencia, nunc frigus, nunc feruor articularum, nali summitas pallescit, auriumque fibræ frigescunt. Passione autem peiorante, fit venteris fluor, in quo egeruntur alba & indigesta excrementa. sputa vero purulenta, quæ potissimum phthisim decernunt, cognoscuntur & quod carbonibus iniecta fateant, & quod in aqua marina posita resideant; atque etiam si in aqua dulci calida, ut Philotheus in aphorism. Hippocratis commentarijs notauit, iniecta itidem fæteant. Cæterum, ubi ita excernuntur, proximum exitium significatur. Veruntamen vlcera, quæ vel in aspera sunt arteria, vel in aliqua thoracis parte, haud planè insanabilia dicuntur; cum ex ijs, plures diligenti curatione adhibita incolumes euaserint. Quæ vero in pulmonibus sunt, si inueterauerint, prorsus à sanatione abhorrent. In principio vero nonnunquam aliqui seruari sunt, aut in principio vlcere paruo sanato, aut obducta crusta. Quomodo Auicenna scribit, mulierem tabidam annos tres & viginti superuixisse. Rasis vero ait ex Hippocrate phthisim in pueris ætatis mutatione aliquando sanari. Quibus ita præmissis prætentare, non erit inutile, etsi supercaneum forrasse istuc cuiuspiam uidebitur, ab istius affectus inuitabili fato persuaso. Porro pulmonis vlcera inueterata planè

Non incur-

In 2. lib. chron.
cap. 14.

Hippo. in 5. aph.
11. & 12.

in curabilia esse omnes quidemprehenderunt, attamen in principio illorum curatio haud omnino desperata aliquibus visa est; quamvis frequentius curentur vlcera, quæ aut in thoracis parte sunt, aut in aspera arteria, potissimum iuxta fauces, constituta. Quorum curatio merito, si diligens cura adhibeatur, consequi poterit. sed age curationem incipiamus à victus ratione inchoantes. In qua illud primum fore cognoscendum, voluit Aurelianus, scilicet, an vlcus sit cum dolore, & febre: in quo casu laxantia consultius convenire credidit. Vnde aerem temperatè calidum laudavit, aliquantulumque à cibo atq; à vino abstinentiam; fomēta item laxatoria, cataplasmata, spongiarum evaporationes, atq; modicam etiam sanguinis evacuationem per cucurbitas cum scarificatione appositas. Verum si vlcus tumens non sit, sed solum, laxatoria omnia deiranda erunt, cum solutionem augeant. Cibi itaque erunt, boni succi, qui multi alimenti sunt, & citissimè concoctionis, cuiusmodi sunt, ova gallinacea recentia sorbilia cum saccharo assumpta: ex carnibus, auiculæ montanæ, pulli gallinacii iuvenes, caro hædina, vitulina, atque à proprietate etiam pulmones agnorum. conveniunt pitana hordeacea, cum melle, vel saccharo. atque etiam cum lacte caprillo erit aptissima in principio, quo tempore vlcerum deterfioni erit incumbendum. Cæterum inter omnes cibos, maxime convenit lactis usus, primo muliebris, secundo asinini, atque ultimo caprilli. tantopere lactis usum assiduum posse ad pulmonum vlcera, & exinde ad tabem consecutam constat, ut Galenus aliquando scripserit, quodam existimavisse, vlcera pulmonis tantummodo lactis porione sanari posse, scilicet in principio, antequam vlcera augeantur atque callosa evadant. Aretæus lib. 7. de morbis chronicis, ait: Si quis phthificus multum lactis potet, nullo alio eger auxilio. Vinum quoque optimum erit album, tenue, pauciferum primo dulce, & postea vlceribus deterfis nigrum, austerum conveniet. His accedunt exercitationes, navigationes, locorum mutationes, gestationesque. Veteres maxime laudarunt longas navigationes, & privatim (ut Celsus auctor est) ex Italia in Alexandriam Ægypti. gestationes vero & in naui per mare (quod aer saluginosus, auctore Aretæo, plurimum valeat ad vlcera siccanda) & in lectulo pensili, & in lectica aut in cathedra oblonga (Aureliano auctore) vtilissime fuerunt: ab antiquis gestationes in phthificis deprehensæ. Quod vero ad medicamenta attinet, & primum ad ea, quæ vlcera à sorde detergunt, complura fuere veteribus medicis cognita: & primò Dioscoridi hæc familiaria fuerunt, quibus homines à phthisi sanari queunt, pix nempe liquida, quæ ex melle delinctam ad tabem atq; ad purulentos maxime commendavit; ius adipis eorum. Plinius & axungiam ceruinam sine sale inueteratam in pilulis sumptam antiquam phthisim sanare, tradidit. Porrum capitarum coctum & biscoctum, eiusque succum ex melle delinctum maxime conducere itidem Dioscorides voluit: agaricum item, ex passo ad drachmam eorum, rhaponticumque similiter ex passo: Acanthi hortensis radix ex melle delincta; marrubij succus itidem ex melle, & foliorum decoctum; betonicæ quoque folia, atque succus itidem ex melle: Laudantur quinetiam cancri triti ex lacte epti, Myrrhidisque radix decocta in sorbitionibus data. Aurelianus verò laudat, ut ante cibum propinentur mulsæ cyathi tres, vel fænugraci vsti succus; sed dilutioris substantiæ, qui sit, si parum in aqua ebulliat, multa enim ebullitione viscosus fit, & ad id inutilis. Huius succi vni cyatho, cochleare vnum melis miscebant. Mulsam itidem datur ex lini semine fixo & contrito, mixto vtendum licet eius puluere. Si maiori in vlceribus deterfione sit opus, orob vtendum censuit, atque iridi. Iraque orobum rubrum erit seligendum, in aqua macerandum, quoad semina intumeant, ipsumque testa ignita terere in tenuissimum pulverem oportet. exhibebat enim huius pollinis cochleare ex mulla: laudavit quinetiam radicem, aristolochiamq; tritam ex melle. Marrubij decoctum, quod parati oportere

In lib. de cibis
boni et mali suc-
ci. cap. 3.

oportere scribit, accipiendo eius manipulum, ipsumque decoquendo in tribus aquæ sextarijs, donec pars tertia remaneat; dein percolato decocto miscet mellis optimi libram: rursus ebullit, quoad debitam crassitiem sit adeptum: datur etiâ succus eiusdem marrubij (exempli gratia) ad vnciam & semis, miscendo libram mellis, & coquendo quoad fiat electuarium. Marrubio iris quoque mixta præclare iuuat: atque hæc erit compositio: Accipe succi marrubij sextarios tres, mellis libram: coctione crassefactæ mixture addito iridis optimæ puluerizatæ drachmas duas. Non minus vtile quoque erit strobili decoctum ex melle exhibitum. hæc sunt medicamenta, quibus vlcera detergi possunt. At Paulus cataplasma exterius thoracis partibus apponit compositum ex polline sem. lini, decocto senu-græci, vel maluæ; aut ex oleo, melle, althææque folijs; temporis progressu ad cerata transendo ex butyro, oleo cyprino, laurino, atque iride parata. Ex compositis itidem vtile emplastrum Mnasei. Aurelianus vero commendat emplastrum ex orobi polline, aceto, atque ex melle paratum. At vlceribus deterfis, ad medicamenta Græcis colletica, larcotica, atque epulotica; Latinis conglutinantia, carnem generantia, atque cicatricem vlceribus inducentia appellata, erit descendendum. Huiusmodi sunt ex ijs, quæ intus assumuntur (exempli gratia) si boli armeni, vel terræ lemnæ, vel samiæ semidrachmæ ex mulla, vel ex ptisana hordeacea exhibeatur, succus itidem plantaginis, polygoni, marrubijque ex melle coctus. Item medicamentum ex succo marrubij, melle, atque iride confectum, quod nuper meminimus. datur & bolus armenus ex vino austero, succus mali cytonij, aut mespili immaturi, aut myrtillorū vel mentæ ex melle cocto, atq; iridis polline. Ex cōpositis oēs vsus Mithridatij, Theriacæ, & similiū laudarūt. atq; exterius quoq; adhibeda esse voluerūt cataplasmata valde siccata, adstringētiaq; cuiusmodi fuerunt (vt visum est Paulo, Aureliano atq; alijs Græcis medicis) melinō vocatū, amithaoniū, polyarchion & alia similia antiquis probè cognita. Addimus nos medicamentū, plurimi æstimatum à Tralliano, commendatumq; ad ulcera trachæ arteriæ, scilicet pollinem lapidis hæmatitis cum succo sanguinariæ seu polygoni. hoc solo remedio Trallianus quosdam ab ijs vlceribus sanatos, tradidit. Nonnulli radicem dipfaci, id est cardui fullonis, tritam ex melle ad natis magnitudinem mane & sero pro secreto exhibent. Nos verò tabescentes inuenies non paucos in principio iridis decocto sanauimus: quod paratur accipiendo radicis iridis siccæ minutim incisæ (exempli gratia) vnciam, betonicæ, capil. vneris, farfaræ, an. p. rad. glycyrrhizæ semunciam, aquæ betonicæ lib. iij: bulliant ad consumpt. medietatis, & colatum decoctum ex sacchari drachma, ad vncias quatuor, calidum, singulo mane, in aurora, propinetur. Huius verò vsus ad minus quinque & viginti dierum spacio continuabitur. Diocles sudorem ad phthificos laudauit; quod auxilij genus ab Aureliano reprehenditur: Attamen (vt nos credimus) non est hoc medicamentum vlllo pacto in principio damnandum, si moderatè, semel in die, vltra dimidiæ horæ spacium, phthificus sudet in balneo laconico, scilicet in tina lignea, quæ fomento ex decocto radicis Iridis siccæ, marrubij, atq; betonicæ, ignitisq; lapidibus molendinarijs eo, sæpe conspersis sit incallescata. porro antequam sudet, bibet supradictum decoctum ex iride paratum ad semilibram ex saccharo. In parando autem supradicto decocto poterit addi chinæ radicis, vel harundinis siccæ minutim incisæ vncia. Utatur optimis cibis & vino quoque paucifero, odorato, tenui, aliquantulum austero. Huiusmodi præsidium, humiditates superfluas corporis, pulmonum, atque cerebri absumendo, totumq; corpus siccando vlcera pulmonum atq; aliarum partium sanare aptum natum maxime est. His lubens addimus aquam stillariciam bechicam vocatam; quæ ad phthificos datur maxima cum vtilitate ad vncias quatuor quotidie mane: iuuat enim omnem tussim atq; omnem difficultatem anhelitus,

Nn 2 quæ

In lib. 3. cap. 24.

quæ ab humoribus fit. Paratur autem accipiendo picis liquidæ, axungie ceruinæ ana vncias quinq; , rad. iridis sicce raspatæ vnc. iiii. cinnamomi pulverizati drac. i. sem. anisorum, feniculorum, an. drac. ij. radice myrrhidis, acanthi hortensis, glycyrrhizæ, agarici, rhapontici, an. vnc. ij. lactis caprilli, succi porrorum sub cineribus semicoctorum, succi marrubij, betonicæ, plantaginis, menthæ, ptisanæ hordeacæ, mellis an. lib. i. omnia contusa in mortario macerentur in succis vase vitreo clausis, & per dies quinque maneat vas supra calidos cineres, mox distillentur in balneo mariæ, & aqua ad vsum referuetur. Dosis in pueris erit vncia, in viris à duabus ad quatuor, & exhibeatur calida. Atque hæc erit curatio vlcerum, in pulmonibus, in thorace, in aspera q; arteria quæ ex vomica relicta fuerunt. Nunc aliarum partium ipsdem vlceribus vexatarum curationem itidem prosequamur.

De sanandis vlceribus, ex vomica abortis, in stomacho, in mesenterio, in iecore, atq; in intestinis. Cap. XLIX.

Sæpe ex vomicis vlcari solet stomachus, mesenterium, omentum, pancreas, hepar, intestina, renes, vesica; atq; vterus in mulieribus. Nunc de ijs vlceribus, quæ ventriculum vexant, sermo à nobis instituitur, & de ijs non minus quæ cæteras ventris partes occupant. Vlcatus verò ventriculus, his profecto signis à nobis deprehendetur, scilicet, quod in eo antegressa sit vomica, vel aliunde in ipsum eruperit, dolor vero acutus vlcerae partis signum erit: Accedit etiam, si effatu dignum vlcus fuerit, ut quandoque vomitu & sanguis & pus cum humore excernatur: Coctio vitatur, cibi fastidium adest; a frigidis, salis, acrisq; cibis vlcus læditur, à dulcibus dolor obliuitur, & restituitur: febris sequitur, atq; totius corporis tabescens habitus. Si vlcus fuerit in omento, dolor, si membrana attingat, circa fundum stomachi tactu pressuq; observabitur, & quod neque ipse à cibo & à potu exacerbatur offenditurque. Si vero in mesenterio vel pancrea vlcus remanserit, per aluum pus cum sanguine fecibusq; effluet, deiectiones vero chylosæ erunt cum pure, & aliquando cum sanguine; etsi vlcus magnum fuerit, fluxus chylosus succedit, feculentus, purulentus, & aliquando sanguine mixtus: qui certe lethalis, ut plurimum esse solet: adest & simul febris lenta conturbaciens, vlcusque adest hæc significabunt, etiam si nullus adsit dolor, quod ratione partis non sentientis, quando neq; mesenterium, neque mesocolon, neque pancreas dolores sentiant. Si vero iecur sit vlceraum, pressu, tactuq; dolor elucescet, præsertimq; si iuxta gibbam partem fuerit. Si vero in caua substantiam carneam, parenchyma vocatam, vlcus tenuerit, dolor vel nullus aderit, vel obscurus; aliquando per os pus, sanguisq; excernetur, & plerumque in ventrem secedet; veluti per urinam, quod gibbam vexat, excernere pus solet: si pus liuidum, vel olei amurcæ simile sit, foetidum, putridumq; & quouis modo malum, exitium denotat: quod si album, lene, æquale, non foetidum exierit, spes salutis aderit. In intestinis, vlcera relicta ex vomica, innascent ex torminibus ventris, atque cruentis purulentisq; alui deiectionibus, & crebris factis, æque ac in dysenterijs fieri observantur: quam etiam ipsdem signis, quæ dysenterias notant, à nobis comprehendentur; sed oportebit, & phlegmonem, & vomicam vel in ipsis, vel in alijs proximis partibus fuisse antegressam. Sed his præmissis, ad vlcus in prædictis partibus curationem venimus. Itaque in vlceribus quæ stomachum vel omentum, vel mesenterium, vel pancreas, vel iecur, vel denique intestina vexant, primum victus ratio siccans præscribetur: unde panis conueniet biscoctus cum coriandris paratus, vinumq; nigrum austerrum: aer vero siccus; qua ratione aer marinus ad hos valde utilis existimatur: fugiendus humidus, pluviosus: eger vigilet

let quam dormiat magis; ambulet, & exercitijs vratur. postea (premissa totius corporis tum euacuatione, tum purgatione) si robur virium aderit, iubeto egrum sudare singulo mane cum decocto guaiaci, chinae, vel radicis harundinis siccae, aut in hyocaufto calore, aut sicco incalfacto, aut ex suffitu fomentis siccantibus parato. Conueniet ad id faciendum decoctum parare in vino albo austero, aut in aqua marina, cum marrubio, salua, centaureo minori, betonica & similibus: Hoc decocto si ferru candens vel lapis molendinarius saepe aspergatur, atq; ita suffritus pareretur, tina, vel hypocaustum, ad sudorem concitandu, sufficienter (vt superius quoque meminimus) calefier. Sudorem singulo die mouere ad corpus, atq; ad vlus siccandum erit vtilissimum, modo etas, viresq; ipsum patiantur. Quod pertinet ad medicamenta, primum, si vlus fuerit purulentum & sordidum, opus erit deterforijs; iisdemq; propemodum, quae in detergendis vlceribus Thoracis, atque pulmonis superius praescripta sunt. Igitur conueniet saccharum rosaceum antiquum, mel rosaceum & simplex & laxatiuum vulgo vocatum, hydromel, ferum lactis caprilli, vel vaccini haud plane a caseosa substantia repurgatum, quod si fuerit chalybeatum, erit adhuc vtilius; efficaciusq; deterget, si mellis modicum immisceatur. Cremor item pristinæ hordeaceæ ex hordeo non purgato cum melle deterget. Vinum item mulsum idem prestabit. Vbi verò & conglutinare vlcera, & cicatricem inducere opus fuerit, dabis (auctore Galeno) medicamenta austera, glutinosa, & minime mordacia: Cuiusmodi erunt (exempli gratia) hypocistis, balaustrum, citinus puniceorum, galla, malicorium, terra samia, sigillum Lemnium, Rhos, succus rosarum, acatia, succus plantaginis, equiseti, verbasci, myrtillorum, vel similia. dabuntur haec in puluere trita ad drachma, vel ad geminam drachmam, ex vino austero, aut ex decocto adstringentium medicamentorum, scilicet, vel cymarum myrti, vel rubi, vel plantaginis, vel polygoni, vel equiseti. Radix Dispaci puluerizata ex melle, vel ex melle rosaceo simplicis infusionis, data bis in die, vt superius meminimus, ad nucis iuglandis magnitudinem, plurimi adiumenti esse solet. Nonnulli radicem symphyti maioris ex melle eodem modo, vel eius succum deuorandum exhibent. Conueniet itidem succus plantaginis, vel polygoni, vel equiseti, vel rubi, vel cymarum myrti, vel lentisci ad uncias tres vel quatuor, cum drachma aut acacia Aegyptiacæ, aut terræ samiae, aut lemniae puluerizatae, si per plures dies singulo mane exhibeatur. Ex iisdem quoque medicamentis siccantibus, adstringentibusque conducent parata cataplasmata exterius adhibita, cuiusmodi esset, si pararetur ex farina fabaceæ, hordeaceæ, in vino austero chalybeato, aut in aqua ferrata vel in decocto rerum adstringentium, cum pulueribus gallarum immaturarum, balaustrorum, corticum granatorum, acaciae, bolique armenij. Iuuabunt itidem spongiae, vel in vino nigro austero generoso, vel chalybeato, vel in quo calcis modicum fuerit maceratum. haec enim plurimum siccando vlceribus remedio sunt. Si vero vlcera intestina obsideant, iisdem vtendum erit tum per os, tum maxime paratis ex iisdem clysteribus. Ad quæ vlcera eadem conuenient medicamenta quæ dysenterijs mederi posterius, cum de laxorum morborum curatione agemus, ostendemus. Nunc priuatim ad ea, quæ in renibus, in vesica, atque in utero sunt, persananda, descendimus.

Gal. in 4. meth.
cap. 7.

De sanandis vlceribus, quæ ex vomiciis reliquantur in renibus, vreteribus, vesica, atque utero. Cap. XIX.

Sæpius vlcera ex abscessibus vomiciisue relinquantur in renibus, in vreteribus, in vesica, atque in utero, unde operepretium est, illis quamprimum medicamentis

mentis occurrere. signa vero quibus nobis hæc vlcera innotescunt, hæc erunt: si quidem renibus exulceratis in lumbis dolor aderit cum grauitate, & sine impedimento vrina redditur, cui pus mixtum existit, carnosus particulis innatantibus. vesica autem exulcerationem habens, tormentum vehemens in pectine, imoq; in ventre mouet, vrinae difficultas urget, pus, vbi reddita vrina est, subsidet, squamulæ foedi odoris, vel laminis similes insunt. furfuracea autem subsidentia vesicam scabie laborare norant. Si vero meatus vrinarij sint exulcerati, etiam puris mixturam medio quodammodo habet mixtio, & pilis similia potius per lotium feruntur, dolorque mediam inter renem & vesicam regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernantur, eaque citra vrina exeant, aut antecedant urinam, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendi exulceratio significatur. Itaque ad vlcera renum primum mulsæ in potu dabitur, aut sanugraci decoctum ex passo, aut seminum cucumeris aut melonum, aut maluarum, aut papauerum, aut portulacæ lac expressum ex melle crudo: poterit lac dari ad quatuor vncias, cum mellis drachmis duabus: aut lac asininum, vel caprillum, uel etiam vaccinum ex saccharo, vel ex melle itidem dabitur in potu. Serum quoque lactis chalibeatum ad libræ, cum lactis seminum cucumeris domestici vncijs duabus, & mellis semuncia. Tandem deterfis vlceribus, dabitur in potu lac caprillum vel asinum chalybeatum, aut cum succo plantaginis, vel cum drachma pulueris acaciæ orientalis, vel terræ samie, vel lemnia. Sed præstabit, etiam hæc dari cum lacte seminum althææ, apij, portulacæ, cucumerisq;. Cæterum, vt dictum est, lactis potio (siue sit caprillum, siue vaccinum) vehementer iuuabit. Non minus etiam ex aquis naturalibus, Villenses, & Patavinæ Beatæ Virginis proderunt: hæc siquidem siccant, adstringunt, deterguntque: possunt ad libras multas singulo mane propinari. Dioscorides ad eadem vlcerà decoctum graminis, succum portulacæ ex vino passo commendauit: lac itidem dulce, cupressi folia cum myrrha ex aliquo liquore adstringentium, vel ex vino austero epota: maluanq; in cibo sumptam: myrri fructus, atq; saccharum. Demum in vesicam vlceratam liquida medicamenta, cathetere iniicienda sunt, vnde mulsæ dilutæ erit accommodata, vel aqua Therma- lis ex Aponensi balneo in agro Patauino, vel Beatæ Virginis vocata, aut Sancti Petri ex melle: aut Villensis ex Lucensi agro: aut vinum chalybeatum ex melle, aut decoctum plantaginis, myrthi, rubi, vel similibus, aut cum terra lemnia puluerizata, aut cum samia, ex melle itidem: succus quoque rosarum, vel plantaginis, velesquifeti: vel ex pomo granato dulci toto cum putamine confuso succus expressus, cum modico mellis. si vnâ cum ijs medicamentis, purgationes adhibeantur, ac et sudorifica (modo ætas viresq; ferant) modo superius præscripto, plurimum iuuabimus. Iisdem ferè medicamentis vlcerà in vtero relicta erunt sananda. In quo affectu, si ulcus magnū sit, à copiaq; humoris foueatur, præstabit & purgationibus hydragogis & phlegmagogis uti, ac etiam sudorifico, quoad humiditas superfluens in corpore per sudorem absumatur: interimq; etiam topicis medicamentis erit incumbendum: Quorum quedam liquidiora cathetere in uterum iniicienda erunt, pessi itidem parabantur intromittendis, uel in sessiones ex decoctis quidem proponendis fient. neq; exterius quæ admoventur negligenda erunt medicamenta, scilicet, fomenta, epithemata, unguenta, inunctiones, atque cataplasmata appropriata. At priusquam ad horum medicamentorum usum medicus descendat, in primis cognoscendum erit, an ulcus sit cum multo dolore, aut cum inflammatione, quæ si vnâ cum ulcere egrotam feminam uexent, addenda cum ulcerum medicamentis quæ & dolorem sedant, atq; phlegmonem mitigant. Cognoscendum itidem vnâ est, an ulcus sanie sordescat, aut si pauco pure redundet, illudq; pus si sit bonum uel malum. Itaque ulcere existente cum dolore uel cum phlegmone, cum multa sanie, quæ etiam mala sit, Cathetere iniicietur ui-

num in quo rosæ ebullierint, cum mellis modico. & rosæ in uino decoctæ poterunt cataplasmatibus modo calide adhiberi pectini, pubi, atque intra coxendices. Mulsæ etiam intus conueniet ex decocto fœnugræci, aut maluarum, aut furfurum, aut lentium, quibus cortices fuerint detracti; aut pilasq; cremor cum melle; uel succus plantaginis, uel solani, uel polygoni, uel lentisci, uel similium, cum melle mixtus. Quod si ulcera neque sint cum multo dolore, neque cum inflammatione, ualentioribus uti poterimus. Itaq; conueniet succus expressus ex granatis malis austeris dulcibusq; in mortario cum putamine & corticibus contusis, cum lacaro aut mellis modico: itemq; uinum nigrum austerum, in quo ebullierint oleæ cymæ, uel cupressi, uel rubi, uel myrthi, uel lentisci, uel rhamni, uel folia sumachi. Item ex pessis iuuabunt, qui ex succo plantaginis, uel polygoni, uel equiseti, uel rosarum, uel similium, parantur. postea parum aluminis loti addendum erit, uel acacie, uel lycij, uel hypocistidis, uel terræ lemnis, uel samis: Ex iisdem medicamentis parari poterunt iniectiones, quæ aut ex aqua marina conuenient, aut ex uino austero, modo dolor uel inflammatio non adsit: quæ si sint coniuncta, primum ex decocto maluarum, althææ, fœnugræci, & similium parabuntur; sedatisque doloribus, & inflammationibus, ex supradictis parabuntur iniectiones atque etiam postea ex ualentioribus, scilicet, ex decocto cymarum, oleæ, foliorum cupressi, exquiesci fœci, balaustrorum, corticumque granatorum. Exterius quoque adhibendæ erunt spongiæ ex uino nigro austero, in quo prædicta medicamenta siccantia adstringentiaque ebullierint, expressæ, uel ex aqua thermali siccante, uel ex simplici aqua cum modico calcis, uel in qua ebullierint prædicta medicamenta. Si uero dolor uel inflammatio adfuerit, optimum erit uinum, in quo rosæ ebullierint, cum fœnugræco spongiis appositum, uel rosæ in eodem uino decoctæ emplastri modo pectini, atque pubi calide adhibita. In quem usum commendatur etiam emplastrum ex pane puro, hydromelite, oleo rosaceo, althæa, fœnugræco & palmulis pinguibus confectum, atque prædictis partibus appositum. Qui hæc ulcera patiuntur, quæ curationi haud facile cedunt, plurimum iuari solent, si bis in die manserint per horam & plus in balneo, quod ex Villensi aqua paratur, quæ in agro Lucensi sponte calida erumpit, uel ex Aponitano balneo. atque hic esto finis libri octauus in quo de uomicis ex phlegmonis internis (quod & hi affectus adstricti sint) agere uoluimus.

Finis Libri Octauus.

PROSPE-

PROSPERI ALPINI MAROSTICENSIS DE MEDICINA METHODICA LIBER NONVS.

De phlegmonis, & tumoribus externis esse agendum. & primo de ijs in communi agitur. Cap. I.



*Galen. in 2. ad
Glauc. cap. 1.*

*Galen. in 2. ad
Glauc. cap. 1.*

Cum superius de internis phlegmonis, & tumoribus via methodica curandis à nobis actum sit, congruum est, ut nunc de ijsdem extimas partes occupantibus scribamus. De quibus primum in communi agimus, atque mox de particularibus nimirum quasdam partes corporis vexantibus sermo itidem instituetur. Quid vero phlegmone sit, quoduplicisque differentiæ obseruetur, & quomodo generetur, in septimo libro sufficienter dictum est. Nunc de ea primum, quæ propriè dicitur, simpliciterque inflammatio phlegmoneue, & quæ herpes, & quæ erysipelas, & quæ anthrax siue carbo, vel carbunculus vulgo dictus est, dicemus. Inflammatio, phlegmoneue ex Græcis, tumor est supra effluuescentiam rubens, durus, dolens, atque tactu renitens, ex sanguine probò, mediocriter crasso, in particulam irruente genitus; Cuius quidem sanguinis fluxio quandoque à rheumatismo fit, quandoque ex alijs fluxionem mouentibus, ut sunt vulnera, conuulsiones, contusiones, ruptiones, defatigationes ob exercitiorum, exarticulationes, ossium fracturæ, vlcera spontanea, immoderatæque venarum repletiones, quibus sanguis ad partem aliquam funditur. Phlegmones in aliqua parte oboriatæ signa sunt, vehemens dolor, nisi pars inflammata hebetem sensum habuerit, pulsus vnà in profundo molestus accidit, tendique prorsus & frangi particula affecta videtur, atque vnà calorem vehementem sentit, perinde ac ipsa comburi videatur, refrigerarique desiderat. Rubor etiam per summam cutem conspicitur, qualis ex balneo, aut ex igne, aut ex quouis alio modo calefactis aduenit. Herpes vero phlegmones species generatur à bile flaua, excreta à sanguinis massa in partem procumbente, quæ si substantia crassior, acriorque fuerit, totam cutem ad subiectam vsque carnem exulcerat, exedensque idcirco herpes vocatur. & si tenuis minusque acris atque calida extiterit, exiguas pustulas milio similiter per summam cutem excitat, ideoque herpes quoque dicta est miliaris. Erysipelas autem fit ex sanguine & flaua bile calidioribus quam oporteat, multo phlegmone calidior, magisque flauum colorem in cute repræsentans, aut ex solo sanguine attramen feruescente, & secundum substantiam tenuissimò: Minus quam phlegmone dolet, neque, ut aliqua phlegmones species, pulsus, aut compressionem, aut tensionem inuehit similem; sed aliquando valde parum infestat, præsertimque quando per solam cutem diffusam fuerit, nihil inferiorem carnem molestant. siquidem exquisitum erysipelas cutis solius passio est; phlegmone uero partium tantum cuti subiectarum, sed harum quidem præcipue, nonnunquam vero etiam cutis; & est ipsa cutanea profectò dolorem afferens nihilo minus, quam altera carnea; pulsus tamen in illa deficit. Hunc affectum mixtum

mixtum ex phlegmone & erysipelate, si erysipelati extumescencia quedam, sed dispersa, nec dum collecta in tumorem verum, & prominentem, copuletur, appellat erysipelas phlegmonodes; si autem phlegmone seu tumor profundior præualeat phlegmonem dicunt erysipelatoden. Anthrax vero siue carbo, siue carbunculus vocatus exoritur, vbi sanguis influens calidus sufficienter extiterit, & crassus: quod enim membrum occupauerit, hoc comburendo facit vlcus in eo cum crusta: & quicquid circumiacet in phlegmonem ledat, efferuescentem, grauiterq; dolentem. Si vero sanguis influens sit niger, crassus, feculentus ac feruens, simulq; saniem tenuem admixtam habuerit, pustulas quasdam per summa cutis excitat, similes ijs, quæ ex igne fiunt, quibus ruptis crustosum sub ipsis vlcus inuenitur, atq; hic affectus quoque carbo est. At hisce de phlegmone atq; de eius speciebus premittis, reliquum erit, vt ad curationem veniamus. Quæ ex Methodicis (cùm quælibet phlegmone stricturæ passio sit, ideoquæ adstrictorum genere comprehendatur) ab adstricto indicabitur. itaque conuenient præsidia laxatoria: excepto principio, in quo non conueniunt; quia, vt rectè Galenus animaduertit, augent fluxionem, omniumq; maxime si phlegmone à rheumatismo ortum duxerit. Quamobrem vero in phlegmonum principijs laxatoria minimè conueniant, aliàs à nobis demonstratum est. Galenus damnat in phlegmonis, quæ à rheumatismo obortæ sunt, calida & humida medicamenta; quamuis, vt ipse ait, ab initio aliquid iuuare videantur. At quid credendum? an non transacto principio sanguis in membro adstrictus, impactusq; calidis & humidis, scilicet laxatorijs erit digerendus? quod vt commode eueniat, nonne meatus cutis rarefaciendi itidem sunt? certe quidem hæc post principium faciendæ, ad phlegmonem digerendæ, resoluendæq;, neminem medicorum latere arbitror; ni dixerint, hoc malum tolli itidem medicamentis adstrictorijs repellentibus sanguinem à parte affecta. Quo pacto neque Galenus phlegmonas posse curari diceret, si vera sunt, quæ ipse multis in locis tradidit, nimirum, quod humores, quoad sunt in fluxu, fluuntque in partem inflammata, & reuelli, & diueri ab ea parte, atq; etiam medicamentis non minus adstrictorijs à parte itidem phlegmone vexata repelli, ac propulsari possint: Qui vero iam influxerunt in membrum, in eoq; adstricti atq; impacti sunt, hos ante concoctionem nequaquam moueri medicamentis, vel alio quouis modo, à membro inflammato, vel attrahi, vel repelli posse: hoc. n. solummodo in principio fieri potest, quo tempore humores in motu sunt, fluuntque. In phlegmone vero, quæ ab alijs causis fit, Galenus quoq; medicamenta calida & humida quæ laxatoria sunt concessit. Itaque adstrictoria medicamenta solummodo per initia in phlegmone conuenient, quo tempore nondum hoc malum factum est omnino adstrictum. Neque perpetuo etiam per initia phlegmonum repellendum erit. Siquidem medici prohibent in emunctorijs faciendam esse repulsionem, nunquamque humores, si sint prauj, & venenosi, esse ab extimis partibus corporis repellendos deprehensum est. At hæc de horum vsu. Iam parcius magis curationem instituamus. Quæ exorditur à præscripta victus ratione laxatoria, scilicet, vt ægroti sobriè viuant, & cibis boni succi, pauciq; nutrimenti, à vi no caueant, cuius loco aqua hordeacea cum saccharo vti poterunt: vigilent plus, quam dormiant: atque cætera alia his proportionem respondeant. Quibus institutis, si magna vehemensq; phlegmone sit, viresq; promptè ferant, sanguis continuo erit mittendus (laxata prius aluo aut lenitorio pharmaco, aut clystere laxatorio cum cassia) in ea quantitate, quam & vires, & sanguinis copia redundas ferunt, hoc vero vel secta aliqua vena fiet, vel adhibitis cucurbitulis cum scarificatione dorsi partibus, aut cruribus, prout medico melius videbitur; aut cruribus itidem scarificatis; aut sanguifugis apposis hêmorrhoidibus: ita vt in principio phlegmones ex oppositis partibus, & post principium ex proximis sanguinis fiat educio:

Oo

educio:

eductio. Si affectus haud magnus sit, sat erit loco sanguinis euacuationis exhibere (ni alius sponte fluat) aliquod lenitorium pharmacum, cuiusmodi erit serum lactis caprilli, vel alterius lactis, ad libras tres cum syrupo rosato laxatorio ad uncias tres; aut detur cassiæ catharticæ (si vir sit) uncia & semis cum saccharo, si puer sit uncia cassiæ: aut medici propinent syrupum rosatum laxatiuum cum manna, vel simile aliud purgans lenitorium. Praxim facientes medici huius ætatis singulo mane, vel aquam stillatitiam refrigeratorem cum syrupo actu tamen calidam propinant; vel decocta ex cichoraceis exhibent. Sed iam ad partem affectam a morbo adstricto sanandam medicamenta addo. Inter quæ primò ea dicā, quæ dolore haud vehementer adfligente, statim in principio locum habent. Ex Galeno commendatur cataplasma, quod constat ex semperuiuo, mali punici corticibus, vino incoctis, rhu, & polenta. Si vero doloris vehementia urgeat, Gal. adhibebat vel oleum rosaceum tepidum cum modica cera, vel lanam mollem, quæ cœsyi multum contineat: paulo ante etiam supra partem affectam apponendam spongiam voluit vino austero imbutam vel posca, quæ omnia tepida adhiberi debent. Sunt qui adhibent rosas ex vino decoctas cataplasmatibus modo, ubi vna dolor vehemens adfuerit. Post initia verò vsus laxantium maiori ex parte conducet, ad resoluendum nimirum impactum restrictumque humorem, cum sola laxantia, fundentiaque conuenire vel etiam Galenus concesserit. Vnde laudatur olei rosati tepidi inunctio, vel cum adipe anserino mixta. Conuenient vero ex toto laxantia, humoris finita fluxione. Cuiusmodi erit olenum, in quo radix althææ decocta sit, vel folia; vel spongia decocto fenugreci, lini, althææque imbuta atque apposita. Verum his propositis, videndum erit, an phlegmone ad suppurationem veniat: in quo casu suppurantibus puris generatio adiuvanda erit; & facto pure, vel medicamento, vel ferro vomica erit aperienda; deterforijsque repurgandū erit vlcus; & mox sarcoticis, atque epuloticis sanandum: quæ omnia petenda erunt ab ijs, quæ de vomicis sanandis in antecedenti libro nos scripsimus. At iam ad herpetem sanandum accedimus: in quo quidem affectu vtimur, si magnus sit, & sanguinis euacuatione, & purgatione, quæ sit cum pulpa tamarindorum, cassia, vel manna, vel syrupo rosaceo laxatiuo, ex sero lactis, vel ex aqua aliqua stillatitia; & laxato corpore cum euacuatione sanguinis, tum purgatione lenitoria, ad medicamenta descendimus, quæ pustulis non vlceratis conueniunt: primò, nisi malignus humor sit, & si pars affecta permittat, neque eruptio critica sit, possumus uti medicamentis percussivis, siccantibus, non humectantibus. & postea finita fluxione, biliosus humor laxatorijs digerendus erit: vnde aqua calida conueniet ex spongia adhibita, vel fomentum calidum ex decocto althææ, maluæ, sem. lini, fenugreci, & similibus. In vlceratis vero pustulis, requiruntur medicamenta vlceribus accommodata: de quibus in chirurgia dicemus. Ad erysipelas eademmet sanguinis euacuationes, & purgationes ventris, vel clysteribus factæ conuenient, si morbi magnitudo hæc requirat. Non est vsque adeo tutum repellere, si sit in facie, vel etiam in alijs locis; aqua vero dulci tepida si spongia imbuatur, ac adhibeatur, tenuissimus sanguis digeretur: vel oleum rosatum conueniet, in quo althæa decocta sit, tepidum; vel succus coriani actu calidus, vel etiam alterius herbæ refrigeratoriæ: quandoquidem hæc, si actu calida adhibeantur, quadantenus digerunt, ut etiam aquam dulcem idem facere, calida si adhibeatur, aliàs a nobis demonstratum est: omnes enim succi, vel aquæ potestare refrigerantes igne incalescitas reddi facultate aliquatenus laxatorias, neminem latere arbitror, cum & Galenus docuerit, aquam mediocriter incalescitam calefacere & humectare, & vehementer calefactam vehementer calefacere. Ad carbonem vero curandum, statim (laxata vel clystere vel medicamento lenitorio alio) vena incisa sanguis euacuabitur; & aliquando in parte

anthrace

In 3. simpl.
cap. 17.
In lib. de Ther.
ad Rifon. cap. x.

anthrace obfessa, ut exitum maligno, & ardenti humore paremus, scarificationem moliemur. Nullo autem pacto erit vel refrigerantibus, uel adstringentibus (quæ omnia Methodici sub adstringentium medicamentorum genere comprehenderunt) humor repellendus: periculum enim maius inueheret repulsio facta. Vlcus uero detergendum erit, medicamento ex succo apij, ex melle, & resina terebinthina. Nonnulli postea facta deterfione, malum punicum austerum minutim incisum, in uino austero decoctum, atque contusum cataplasmatibus modo adhibent; uel puluerem eiusdem corticis sicci, uel aliud simile ex epuloticis. Ad anthracem uero pestilentem medicamenta posterius in chirurgia adnotabimus. Atque hæc de phlegmone in communi pauca in primis præmittere uoluimus; nunc ad particulares phlegmonas, in quibusdam corporis partibus, quæ sæpe fiunt, descendimus, & postea ad tumores quoque externos tractandos declinabimus.

De phlegmonis, quæ externas corporis partes vexant, sanandis, & primo de ophtalmia. Cap. II.

EX phlegmonis, quæ externas partes corporis vexant, sunt ophtalmia, parotis, & quæ in mammis, & in testibus, & in digitis fit, nec non in partibus articulorum, quam arthritim, podagram, & ischiadem, seu coxendicum morbum & dolorem appellant. Gallicæ itidem phlegmonæ, atque tumores œdematosi, strumosi, scirrholi, & qui à materiæ, quæ continent, similitudine cum melle, sæuo, pulre, meliceris, steatoma, & atheroma denominantur. Nunc de ophtalmia tractabimus, quæ oculorum phlegmone est: externa enim tumica, coniunctiua dicta, ex sanguine inflammatur, unde oculi cum rubore & tensione dolent, & nonnunquam simul febris adest: cuiusmodi sunt, quæ certis temporibus anni in Ægypto grassantur, cum ob ventorum caliditatem, tum ob arenarum calidarum, quæ à ventris campis uocatis per aerem feruntur, copiam. De quibus nos in libris de medicina Ægyptiorum sermonem habuimus. itaque cum hic affectus phlegmone sit, mirum est, cur aliqui hunc ipsum morbum ex laxo & adstricto mixtum fecerint; cum planè adstrictus sit, quem Methodici pressuram oculorum uocant: Ni dixerint, in principio, scilicet quo tempore sanguis fuit ad oculos, uideri morbum laxum, idcircoque indicari eo tempore pro curatione, nempe in principio, medicamenta adstringentia uocata. Si morbus mitis sit, prescripta uictus ratione tenuissima, quæ maxime omnium conuenit oculorum inflammationibus, utitur mitioribus adstrictorijs externis, ita, ut aliquando nulla euacuatione, purgationeque sit opus, sed sat erunt topica in principio ad repellendam fluxionem, etiam mitiora, ut aqua rosacea, aut plantaginis, uel succus rosarum tepidus, aut oui liquor tenuis, aut lac asininum instillatum, & postea aqua fluminis tepida, aut decoctum maluarum, uel althææ, uel sanugreci, uel meliloti. Sed si morbus fuerit magnus, magnis quoque laxatorijs internis erit opus: cuiusmodi sunt, sanguinis euacuationes, aut per uenæ sectionem, aut per crurum scarificationem, aut per cucurbitulas colli & dorsi partibus cum scarificatione adhibitas, aut per hirudines varijs partibus itidem appositas. Purgationes quoque lenitorio cathartico factæ, & clysteres maxime conferunt. Itaque in primis præmisso clystere mollitorio, & secta uena cephalica eiusdem lateris, sanguinis congruens quantitas educetur; vel quandoque uena interna iecoraria si plurimum sanguinis abundauerit, & mox cephalica incideretur, imò etiam, ni affectus tollatur, ut Ægyptij facere solent, & uenam frontis, & anguli interni oculi affecti. Alij ceruici, collo, dorso, scapulis, cucurbitulas adhibent cum scarificatione,

ficatione, & eo modo sanguinem euacuant; alijque sæpius post aures uenis ap-
positis sanguifugis eandem moliuntur euacuationem sanguinis, quam si opus sit,
sæpe repetunt. Nonnulli in affectu perucaci vtuntur setaceo in occipite per plu-
res dies, quo purgari caput, & humorem ab oculis diueri, obseruatur. Nos uti-
lissimum esse experientia in multis deprehendimus, vtramq; aurem ad imam par-
tem perforare, introq; mittere subtilem funiculum ex filis sericis contextum, eūq;
sæpius in die agitare, ne foramen siue vlcus coalescat. per aures enim facillima hu-
moris est euacuatio, diuersioq;. Solo hoc genere præsidij complures à difficilli-
mis ophtalmijs sanatos vidimus. Post sanguinis euacuationem conueniunt me-
dicamenta leniter laxatoria, cuiusmodi erit, si exhibeatur cassiæ catharticæ abissi-
næ vncia & semis cum saccharo, vel post ipsam superbibatur serum lactis ad li-
bras duas: vel poterunt exhiberi quatuor vnciæ aut mannæ Calabræ, aut syrapi
rosati laxatorij; & postea superbibant, seri lactis libras tres: si in potione deside-
retur, poterit dissolui aut cassia, aut manna, aut syrupus laxatiuus rosarum, cum
aqua stillatitia, in qua ebullierit semuncia pulpæ tamarindorum. Sed venio ad
localia ophtalmica medicamenta, quæ sunt collyria in principio ad repellendum
sanguinem opportuna: cuiusmodi erunt aqua stillatitia rosarum tepida, aut plan-
taginis, aut cimarum rubi; vel succus rosarum simplex, aut cum albumine oui
despumato; postea conueniet lac muliebre vel asininum instillatum, aut liquor
expressus ex ouis coctione induratis: & tandem balnea ex aqua dulci fluuiatili
calida, aut ex decocto maluarum, aut althææ, aut meliloti, aut fenugræci parata
utilia erunt: eodemque modo spongiæ eodem calido decocto imbutæ calidæ sum-
ma cum utilitate adhibebuntur. Quæ sanè medicamenta expressisse visus est Hip-
pocrates, cum dixerit: oculorum dolores, meri potio, aut balneum, aut fomen-
tum, aut phlebotomia, aut purgatio soluit. At primum faciendæ erunt tum eua-
cuationes, tum purgationes, & postea balnea, fomentaque vsum habebunt.
quandoque nulla præcedente euacuatione aliquor, cum ex balneo plurimum su-
dassent, ab ophtalmia fuisse liberatos vidimus: & nonnullos, vt Galenus quoq;
animaduertit, ex vino mero ebrios factos, in somnumq; delatos, proflus sanatos.
Atque hæc de ophtalmia.

In 6. aph. 37.

*De parotide sananda, mammarum phlegmone, atque in in-
guinibus facta. Cap. III.*

PAROTIDEM phlegmonem esse glandularum iuxta aures positarum neminem
medicorum later: proindeque hanc & stricturem & morbum adstrictum me-
thodici fecerunt: idcircoque ad eius curationem indicari medicamenta laxantia.
Itaque, præscripta victus ratione laxatoria, qualem nos alias in curandis phleg-
monis internis tradidimus septimo libro, si morbus magnus sit, viresq; constent,
conueniet sanguinis vocatione corpus laxare, aut vena interna lateris è dire-
cto positi, aut cephalica secta; aut cruribus scarificatis, aut cucurbitulis cum scar-
ificatione scapulis & dorso appositis; vel etiam hyrudinibus appositis hemor-
rhoidibus. Cæterum antequam sanguis euacuetur, alius laxabitur mollitorio
clystere ex decocto maluarum, violarum, althææ, mercurialis, cum oleo commu-
ni dulci; vel, si febris adsit, ex oleo violaceo ad vncias quatuor, cum mellis ro-
sati simplicis vncijs tribus, adiecto modico salis, concinnato. & sanguine euacuo
viribus consentientibus, si febris multa etiam vexet, vel cassia simplex dabitur ad
vnciam & semis, cum 3. ij. pulpæ tamarindorum, vel manna, vel syrupus rosatus
laxatorius ad vncias quatuor: quæ dissoluantur in decocto flor. & fructuum cord.
in quo semuncia pulpæ tamarindorum fuerit aut macerata per noctē, aut parum
efferbuerit.

effruerit. Et si febris fuerit cōtinua, & ardens, cū multa siti, & calore, assument egroti aliquod ex supradictis laxatorijs, & postea superbibent seri lactis caprilli duas, vel tres libras. Verum, si parotis in morbo acutissimo critice appareat, & tardē moueatur, vt ad topica veniamus, si alte delitescat, & tarde moueatur (auctore Galeno) attractorijs & aliquando adhibita cucurbitula excretio erit addiuuanda, vel calido fori adhibito, scilicet ex decocto aut althææ, aut fenugræci, aut lini, aut chamæmeli, aut similibus; aut ex multis prædictorum simul; aut fovebimus ipsam parotim oleo dulci amygdalino, aut hydreleo calido, molliana, vel spongia excepto; aut spongia aqua calida expressa: sed hac conuenientius est prædictum decoctum calidum spongia exceptum, & post expressionem adhibitur: sic quæcumque caliditatem humiditatemque coniunctam habebunt, erunt aptissima tum ad iuuandam parotidis extractionem, tum ad dolorem demulcendum. Si vero tumor vehementi impetu moueatur, nullo modo erit excretio attractorijs iuuanda; sed totum negotium naturæ permittendum. In his enim solis inunctionibus oleorum dulcium repidorum vti solemus. Ex quo non rectè se gerunt ij, qui conantur quamprimum uti cataplasmatibus attractorijs, atque suppuratorijs. Quoniam phlegmone plurimum si augeatur, dolores augmentur, atque caliditas. Quibus symptomatis facile cerebri membranæ communitatis, vigilæ, deliriaque succedunt, non rarò lethalia. sepe vidimus ex commotis, auctisque parotidibus ex vsu attractoriorum medicamentorum, deliros complures factos interiisse. Neque parotides si suppurentur, & rupta vomica expurgentur, medici certam salutis spem polliceri ægrotis possunt, etiam si & rectè (vt dictum est) suppurauerint, & effluerit pus album, & probè concoctum: quoniam in acuto morbo, nisi vnà apparuerint signa concoctionis in vrinis, haud profecto quimus ex ijs probè suppuratis certam salutem polliceri: quæ certè prædicti poterit, si vna cum signis concoctionis, scilicet morbo planè concocto, suppurauerint. In Crastina & Ancilla pictoris (vt auctor est Hippocrates in libris epidemiorum) parotides ambæ suppurauerunt, qui tamen ambo interiire. Si verò parotides absque ratione delituerint, aut ipsis suppuratis pus non effluat album & concoctum, omniumque maxime morbo crudo existente, exitium certum succedet. At qui cupiunt plura de parotidarum prognostico intelligere, non grauentur legere nostros libros de præfagienda vita & morte egrotantium abhinc annos complures euulgatos. Ex parotidibus suppuratis, rupta vomica, aut ferro, aut medicamento, detergendum purgandumq; pus erit, laxatorijsque medicamentis durities erit emollienda: ad quod conducent, spongiæ aqua calida, vel decocto althææ, aut fenugræci, aut similibus imbutæ & appositæ. Mox vlcere deterlo, æquatoque, carne replendum erit medicamentis ijs, quæ modice siccant, atque detergunt, sine adstrictione: cuiusmodi est iris, betonica, pompholyx, & similia tenuissime trita, & inspersa. Tandē opus erit epuloticis, idest cicatrice vlcus claudentibus: hæc autem sunt sicca, adstringentia, sine deterfione: Huiusmodi erit ex simplicibus galla immatura, balauftium, cortexque mali punici, equisetum, & similia. Sed iam ad mammarum phlegmonem accedimus. Quæ sæpe fit in mulieribus enixis & lactantibus, & quandoque suppressis menstruis, sanguine ad mammas defluente. Hæc si rectè tractentur, solent citò atque tutò sanari; si vero non rectè, solet inflammatio mutari in tumores quidem & longos & malignos. Antiqui omnes vrebantur in curatione laxatorijs præfidijs, præsertimque sanguinis euacuatione ex talo pedis, si menses fuissent cohibiti, vel ex vena interna brachij è directo mammæ affectu: sic alui purgationem moliemur medicamento leniter laxatorio, vt cassia ex sero lactis, vel cum decocto tamarindorum si febris adsit, vel syrupo laxatorio ex infusione rosarum multiplici, cum sero lactis, dissoluto; vel horum loco clysteribus lenitorijs aluum laxabimus. Quod ad exter-

*In 3. de comp.
loc. cap. 2.*

ad externa medicamenta pertinet, quidam in principio illinunt mammas rosaceo tepido in pila plumbea, pistilloque plumbeo, quoad nigrescat, diducto, cum terra lemnia; vel terra eadem cum lacte eodem modo deducta: attamen hæc non actu frigida, sed tepida adhibeantur. Verum nullo adstrictorio repellenteve medicamento in hac plegmone vtendum medici censent. Mirifice conducere solent folia althææ, vel maluarum ex butyro recenti, vel ex oleo amygdalino dulci decocta, atque apposita: vel emplastrum ex radice althææ, butyro, & lacte paratum, vel addita mica panis molli vel farina sænugræci. Et quia plerumque hæc phlegmonæ solent suppurari, caueant medici à sectione cum ferro facta, & potius expectent, sponte ut vomica erumpat. & postea vlcus curabitur, vt aperta parotis. Non possum tacere miram efficaciam ad huiusmodi phlegmones aperientdas, atque ad ipsarum vlcera sananda, quæ inest folijs Androsæmi à Dodonæo vocatæ, hunc plantam herbam Sicilianam officinæ appellant, folia enim hæc viridia modicè confusa, sed tamen integra, exterius apposita vim habent pus etiā feculentum, atque crassum, durumque, quod vix magna incisione facta educi posset, educendi, atque vlcus promptè expurgandi, detergendique, & prorsus sanandi. Complures vidimus mulieres, quæ quasi miraculo à phlegmonosis tumoribus sanata difficillimis, in mammis obortis, breuissimo tempore & iucunde quidem fuere omnino sanatæ. Non potui in mulierum vtilitatem, non communicare medicis tam facile atque preciosum medicamentum. Demum phlegmones in axillis, & inguinibus, bubones vulgus vocat, curantur eodem modo, quo parotides curari diximus.

De plegmonis articulos vexantibus præsertimq; de arthritide, de coxendico dolore, atque de podagra. Cap. IIII.

A Rthriticorum dolorum genere comprehendi omnes affectus, qui cum dolore re articulos, & cum tumore vexant. At triplici tamen differentia distinguuntur. Etenim quidem articulares dolores statim à principio omnes ferè vel complures articulos (quo nomine, vt Paulus Ægineta scribit, etiam vertebra, humeros, maxillas, omnemque mobilem ossium commissuram comprehendimus) inuadunt; atque hi simpliciter arthritici dicuntur: huncque affectum Græci arthritim & Latini articulem appellant. Alij à pedum articulis incipiunt, atque tractu temporis affectus ad manuum, humerorum, brachiorum, genuum, atque aliarum partium articulos progreditur: atque hunc affectum podagram (vulgo guttam) appellant. Demum sunt qui in coxendice fiunt, ischiadicique idcirco & coxendici dolores dicuntur. Horum verò omnium affectuum causam duplicem esse Galenus statuit, scilicet, partium humorem recipientium debilitatem, atque humores in corpore superfluentes, qui ad partes delabentes, & dolorem, & tumorem creant. Imbecillitas verò partium, scilicet articulorum, quandoque ab hæreditario semine procedit, vt quando parentes eo affectu scilicet podagrico vexati filios generarunt. Nonnunquā à percussione articulorum copaginis diuexatis hic morbus originē ducit, quod nimirū ex ea causa articulorum partes maxime debilitentur. A qua causa nos in podagrā incurrimus, s. vniuersa articulorum copagine ex casu plurimū debilitata, scilicet cū olim ex Ægypto in Italiā redeūtes nauigaremus propè Corcyrā Insulā in loco, qui dicitur Casoppus: etenim propter naufragiū ex naui in cymbā præ timore repente delapsi, cymba procelloso mari agitata valde in pedibus percussi fuimus: à qua percussione pedes plurimum intumuerunt. Vnde tota corporis mole valide percussa partes nervosæ, omniumq; maxime articuli imbecillitatem insignem naçi paulo post, phlegmonis

nobis doloribus diuexari ceperunt. Itaq; à percussione quassationeq; partium
 neruofarum, atq; articulorum articulares dolores fieri solent, quoniam exinde
 partibus ijs maxima creatur debilitas. Idem ab ebrietatibus, à frigore intenso,
 ab immoderatis exercitijs, atque ex immoderata venere euenire ab omnibus de-
 prehensum est. Atq; ab his causis fieri solet partium suscipientium debilitas, qua
 partes nequeunt tueri se à superfluentium humorum decubitu. Humor vero su-
 perfluens copia, & aliquando etiam qualitate molestus, ad debiles partes à for-
 tioribus protruditur, vel quouis modo descendit, quandoque etiam etsi neque co-
 pia, neque qualitate molestat, tamen vel immodico calore susus vel liquatus, aut
 ex frigore ambientis immoderato expressus ex capite, vel ex vniuerso corpore ad
 articulos demittitur: quas partes distendens, tumefaciensq;, dolorem cum phleg-
 mone facit. Qui humor quandoque simplex fuit, vt sanguis, vel bilis, vel pitui-
 ta, vel melancholia, vel plerumq; ex his mixtus. Distinguunt pleriq; arthritim,
 podagramq; in calidam, atq; in frigidam. Hanc tumor, non multum dolorosus,
 sine rubore, sine caloreq;, atque absq; febre manifestat; illam ex vehementibus
 acutissimisq; cruciatibus cum colore rubro partis affectæ vel flauo, coloreq; insi-
 gni & febre continua deprehendimus. Febres vero hæ semiterianis, à catharro
 excitatis prorsus similes videntur: etenim diebus singulis exacerbantur noctu po-
 tius, cum horrore inuadunt, mox calor tota nocte quandoque insignis qui die
 acquiescit: accessiones sunt inæquales, siquidem vna est maior, manifestiorque,
 altera mitior atque obscurior. Itaq; sunt hæ arthritides ab ichoroso tenuiq; hu-
 more potius, quam à sanguine vel à bile. Quæ vero à pituitoso crassiq; humore
 sunt, plerumq; haud multo cum dolore iuncti sunt: neque sæpe cum his ægroti
 feбриunt: sed tumores maiores, grandioresq; apparent. Maiori ex parte hic affe-
 ctus fieri solet à cruditatibus, quæ in stomacho abundant, atque in vniuerso cor-
 poris habitu. Vnde ex crapulis, ebrietatibus, venereq; inordinata hi affectus ma-
 ximè foueri videntur. At priuatim nimius inordinatusq; vini potus hoc malum
 facit. quod etiam eo argumento facile intelligitur, quia omnes ferè qui podagrā
 patiuntur, præsertimq; calidam, vino immoderatus, atque inordinatus incum-
 bunt: & nonnulli qui à potu multum abstinerunt, plurimum ab illo malo alle-
 uamenti perceperunt. Hic affectus facilis cognitu est, cum eo partes articulo-
 rum & doleant, & tumeant: Nam si in principio non appareant, saltem postea,
 ad exterius etiam conuersa materia; & quandoq; cum calore, coloreq; vel rubro,
 vel flauo: Et in antiquato affectu, solet dolor primum inuadere uel pedem, vel
 manum, vel genu; & postea ad plures partes progrediens, eas eodem tempore ve-
 xat. Certe hoc malum sanatu difficillimum est, potissimumq; quod à pedibus
 incepit & tractu temporis ad complures partes progreditur. Arthritis verò, quæ
 statim omnes articulos inuadit, facilioris curationis esse solet, ita, vt complures,
 si statim initio accurate medicamentis incumbant, prorsus liberi euadant. Atque
 etiam in coxendico dolore idem eueniet, si principio ægrotantes probè à medicis
 tractentur: Qui verò curationem in initio spernunt, ad exitum vsque morbum
 hunc comitem habere solent. Sed age, curationem aggrediamur: Et quamuis
 Medicinæ præsidij interdum hoc malum ex toto tolli non potest; ijs tamen sæpius
 finè eousq; redigitur, vt multum decrescat, mitiusq; adeo reddatur, vt ab homi-
 nibus leuius ferri queat: Quinimo audebimus affirmare, ab illo, qui non mul-
 tum antiquatus sit, posse, qui senes non sunt, atq; debiles, omnino sanari. Itaq;
 cum morbus adstrictus sit, laxatorijs quidem tum internis, tum externis præsidij
 indigebit. Poterunt vero initio phlegmonum adstringentia conuenire, vt mali
 augmentum futurum diminuant, prohibeantq;. Attamen adstringentium repel-
 lentiumq; vsus in morbo recenti conducet; minime tamen in antiquato, in quo
 omnes ferè articulorum partes plurimum laxæ, & debiles euaserunt. Namque in
 his

his, si morbum in principio (exempli gratia) à pedibus medicamentis adstrictorij repellas, ipsum alijs partibus recte nunc valentibus communicabis. etenim humor à pedibus protrusus ad alias partes articulares feretur, easque diuexabit. Itaque tumefactio, & strictura articularum à praesentia humoris facta primum laxatorij est tollenda: & mox sublato affectu adstricto, partes laxae & debiles erunt adstrictorij roborandae, atque firmandae. Hac quidem curationis methodo, etiam Dogmatici omnes vtuntur, cum ex causis curationem dimetiantur, & depromant. Constat enim, vt superius quoque dictum est, huius affectus duplicem esse causam, scilicet partium suscipientium laxitatem imbecillitatemque, atque humorem in corpore superfluentem, qui certis quibusdam temporibus copia immoderata auctus, ab expultrice partium ipsum continentium, ad articularum laxas partes detrusus dolorem, phlegmonemque facit. Mirum certe est, hoc malum certos quidem ac terminatos in anno vel annis periodos habere, adeo vt in aliquibus singulis annis, in vere; alijs, in autumno; alijs in alio anni tempore, redeat: atque in alijs non semel in anno, sed & bis, & ter, quaterque: qui ita terminatis temporibus exacerbatur, vt sepe ne vel diem vnam euariare, compertum sit, atque hunc periodorum ordinem perpetuo seruare solet, ni ab aliqua causa procacitica hic ordo impediatur. Etenim aliquando caliditas solis immoderata, vt qui seipsum in estate soli immoderatus exponunt, humorem fundens, ante solitum tempus, vt humor ad articulos moueatur, est causa: veluti etiam intensum frigus aliquando humorem, exprimendo facit, vt humor superfluens ad articularum partes irruat, ante tempus solitum, atque phlegmonem faciat. Quibus quidem constat, hoc malum redire, posteaquam corpus certam quandam humorum superfluentium quantitatem generauit. Confertim enim humore ad eam quantitatem aucto qua expultrix semper mouetur ad excernendum, propellendumque ipsum ad partes articulares iam ex aliqua causarum nuper dictarum debilitatas, hoc malum redit, atque toties in anno, quoties profecto corpus nuper dictum humoris supradictae quantitatem generat: quae quantitas cum expultricem moueat, necessario humore ad articulos propulso, malum exacerbatur, reditque. Atque haec erit huiusce morbi periodorum exacerbationum uel diuersarum, quae in anno fiunt, ratio. Cum igitur hic affectus morbus adstrictus sit, necessario ipsum laxatorij tolli medicamentis oportebit. Quam curationem etiam Dogmatici sequi videntur, cum in curandis morbis articularibus à tollenda materia, ex qua fiunt, perpetuo exordiantur: Eaque causa praefertim, quod partium articularium recipientium imbecillitas minimè restaurari, tollique queat. Quam partium debilitatem posse tolli fortasse sperandum esset, si longo tempore, partes doloribus phlegmonisque, à quibus debilitantur, planè caruerint. Medicamentis verò quam difficillimo negotio robur solitum illis partibus poterit restitui. Itaque, si de curatione loquamur, quae praeservatio est, atque de ea, quae affectus quoque curatio existit; Profecto dicemus, omnia medicamenta conuenire, quae humorem superfluentem tollunt. Cuius quidem generatio optima victus ratione primum obseruata, prohibetur. Itaque qui his morbis vexantur, parco cibo & potu vtantur, caueantque a crapulis & ebrietatibus, ab immoderata venere, ab otio, quinimo quotidianas exercitationes obseruent. Quotidiana quidem experientia deprehensum est, homines, qui validis exercitijs assidue vtuntur, hoc genere mali non prehendi, atque illos, qui ipso consistantur, eo minus consistari, si, quoad sudent, in exercitijs laborauerint. Ad tollendum verò humorem superfluentem, omnes commendant praesidia quouis modo euacuantia, & purgantia, scilicet, sanguinis vacationem, purgantia tum per vomitum, tum per deiectionem alui; omnium verò maxime sudorifica. Vnde in illis instituunt decocta sudorifica ex Guaiaco, china, salis parilla, quae non nisi purgatis corporibus, euacuatique, in tempore quo recte valent, ad praeservandum.

præseruationem, quæ sit potiori causa, quæ est humor abundans, sublata: & aliquando in ægrotantibus eadem instituunt, sudorem ex ijs, ad corpus siccandum, prouocando: & quidē per plures dies, prædicta sudorifica exhibent, vt quandoq; ad viginti, nonnunquam ad triginta dies, ijs decoctis ægrotos vti velint. Quod institutum nunquam potuimus in articulario morbo, qui ab humoris consueta fluxione ad articulos facta excitatur, exacerbaturque, probare. siquidem exquisitæ euacuationes quæ præmittuntur, simulq; purgationes, viscera interna debilitant, atque ita, vt postea plus humoris excrementitij suppedietur, sunt in causa: imò sæpius in corporibus nondum eo morbo vexatis, dolores mouent, exacerbantque: Quod & in nobismetipsis atque in alijs compluribus obseruauimus: qui cum omnino doloribus vacarent, statim à præbito pharmaco purgatorio vel ab euacuato sanguine in solitos dolores inciderunt. Quare haud iniuria fortasse Aurelianus phlebotomiam in ijs, qui huic affectui sunt obnoxij, partes patientes replere, scripsisse deprehenditur. Itaque exquisitas euacuationes per sanguinis missionem & per pharmaca laxatoria, reiteratasq; in hoc malo antiquato, raro vtilis esse cognouimus: quinimò sæpe complures in deterius ab earum affectato vfu labi deprehendimus. Non tamen negamus quorundam purgantium vsum eos multum iuuare posse. Neque etiam sudorifica multis diebus adhibita, & si aptissima sint ad humiditatum siccationem faciendam, planè laudamus, eodem nimirum argumento, quod nedum inutilem excrementitiamque humiditatem, sed quinetiam vtilem resoluunt: vnde admodum viscera interna debilitantur, scilicet ipsorum & humido substantifico & calore innato exoluto, atque diminuto: ex quo viscera postea, deterius coquendo, copia maiori superfluentis humoris abundare soleant. Quam rem facile deprehendere exinde quimus, quia complures ex ijs, qui hoc morbo diuexari solent, posteaque ita longis euacuationibus, ad præseruandum, vfi fuerunt, & crebrius, & citius, quàm essent soliti, hoc malum incurrerunt. Nos verò soli fuimus, qui non probauimus ita longas accuratasq; euacuationes per sudorifica medicamenta, neque sanguinis frequentatas euacuationes, neq; laxatorias catharticasque purgationes. Sat nobis vsum est, sudorifico podagricos eo vsque vti oportere, quoad humor solummodo superfluens, qui morbi accessionem facit, absumatur. Neque in morbo antiquato tempus conterendum in vniuersali totius corporis accurata cum euacuatione, tum purgatione præmittenda; cum neque tutum sit, eas euacuationes, purgationesque diligenter præmitti, quia sæpius dolores, qui non aderant, ab ipsis in partibus commouentur. Itaque, vt curationem veram dicamus, statim, inuadentibus doloribus si alius fuerit adstricta, præmisso clystere laxatorio, aut lenitorio pharmaco, aut leui etiam eductorio, potissimumque ex hermodactylis vel ex agarico, vel ex mechoacan, vel alio simili parato, iubemus epoto decocto calido, quod interius præscribemus, podagricos homines in balneum laconicum, idest in tinnam ligneam oblongam, suffitu, qui ex lapidibus molaribus ignitis decocto infra describendo conspersis excitatur, incalēfactam descendere, in eaque collocatos probeque linteis coopertos, ne calor exhalet, quoad multum sudent, ad summum per horam, manere; mox sudore linteis calidis deterſo in lectulo calido reponi, in quo etiam non parum sudare solent; in lectuloque postea rursum deterſo sudore, post tres horas vt cibum assumāt, iubemus: Hic autem, cibus debet esse quantitate parcus, qualitateq; optimi succi, & facilis concoctionis, cum modico etiam vini clari pauciferi. si senes sint, semel in die eos sudare sufficiet; si iuuenes, & robusti, bis indie sudabunt, eodem modo sex horas à prandio rursum assumpto decocto sudorifico sudabunt autem aut septies, aut ad plurimum, decies. Hic sudor sat profectò erit ad absumendum humorem superfluentem, siue eius quantitatem, quæ apta est dolores renouare. Tunc enim solummodo excitantur do-

tur dolores articulares, cum ea suboritur humorum copia, quæ in visceribus, & vasis retineri nequit, ac sua molesta vi & qualitate naturam irritat, vt eam ad articulos, ijsque vicinas partes protrudat. Hanc igitur solummodo humorum quantitatem superfluentem, quæ morbum articulare factura est, sudorifico præsidio absumendam putamus. Quam sanè sudor per quinque dies factus, si bis in die sudent, sufficienter absumet. Qua resoluta, fluxiones ilicò ad articulos cessare est necesse, atque exinde etiam phlegmonas doloresque non amplius augeri, neque multo amplius perseuerare malum, deficiente humore (qui per sudorem & diuertitur, & absumitur) phlegmonem fouente, consentaneum est. Quem modum sudandi ita arthriticis doloribus fore vtilem confidimus, vt nedum etiam senes eo malo vexatos posse plurimum iuari, verum etiam iuuenes, si aliquibus annis (vt dictum est) eo præsidio vtantur, posse omnino ab eo morbo liberari, audeamus affirmare: ea præsertim ratione, quod sperandum sit, partes articulos, si longo tempore sudandi beneficio à doloribus non diuexentur, à quibus profectò eæ laxæ & debiles euaserunt, etiam ad pristinum robur restitui posse. quæ imbecillitas, altera causa est horum dolorum, qua sublata (vt ait Galenus) nunquam podagra fieri potest. Decoctum vero sudorificum, cuius quidem calidi semilibra propinabitur sudaturis, parabitur ex radicis arundinis siccæ minutim incisæ vncijs tribus, radicis itidem siccæ iridis minutim incisæ semuncia, calaminthæ montanæ manip. duabus, aquæ communis libris sex. facta ebullitione ad consumptionem medietatis percolatum seruetur. Hoc decocto ignitis lapidibus aspersis totus calidus paratur, ad balneum laconicum calfaciendum: cuius quidè calor ad ciendū sudorem toto ipsius sudationis tempore conseruabitur, reiterata sæpe ex prædicto decocto lapidum ignitorum asperione. Aliud itidem decoctum eodem modo vrsupandum parabitur accipiendo foliorum arundinum siccatorum, saluæ, asarique an. M. iij. radicis cyclaminis siccæ minutim incisæ, aristolochiæ rotundæ, spicæ Italicæ siccæ, an. vnc. i. aquæ communis lib. xx. bulliant ad tertriæ partis consumptionem. Atque hoc est præsidium nostrum laxatorium, quod feliciter mederi articulare partium dolorosæ stricture nuper tradidimus. Sed fortasè aliquis ex medicis Dogmaticis hanc nostram medendirationem multis rationibus reprehendet; & primo quod non præmittat euacuationem, purgationemque totius corporis exquisitam: quibus non præmissis, haud tutò in corpore impuro sudorem sudorificis posse moueri mordicus contendet, quod verendum profectò sit, humorem à calore sudorificorum fufum posse ad principem aliquam partem irruendo grauissimum morbum inuehere; vel, si hoc non fiat, saltem dolores novos in pluribus partibus articulis concitatum iri. Accedit etiam, quod huiusmodi euacuatio sudorifica tam breui tempore frequentata, sit insufficiens pro tollendis, auertendisque iis phlegmonosis doloribus. Ad primum argumentum respondemus neque venæ sectionem, neque laxatorium purgans in omnibus superfluentem humorem absumere, maximeque in affectu antiquato, in quo partes sunt valde debiles, & hac de causa, nempe, ob insignem laxitatem tum ab euacuatione sanguinis, tum à medicamento cathartico humorem superfluentem commotum copiosius recipiunt. Hinc complures vidimus podagricos, qui cum incipissent vacuari, & purgari, in gratiam sudorifici decocti assumendi, ex commotis humoribus ad articulos obortis doloribus coactos fuisse in aliud tempus remittere curationem per sudorifica medicamenta faciendam. In morbo verò recenti partibus non ita laxis existentibus etsi dolorum concitatio non adeo sit timenda, tamen frustra tempus in vniuersali euacuatione purgationeque facienda terimus, cum præcipuum institutum sit, humorem superfluentem, qui cœpit ad articulos fluere, per sudorem absumendo ab afflictis partibus totum diuerrere. Neque est quod timeant in corpore impuro repletoque humorem fufum à calido sudorifico

sudorifico in viscera interna irruere posse, atque idcirco malum illis grauius posse inuicere: quoniam humores omnes à sudorifico externo (quod est calor humidus laconico balneo conclusus) non ad intra sed ad extra mouentur, nimirum eos calore externo trahente exterius. hinc apud quosdam medicos antiquos aliquando legisse; meminimus, quod olim corpora haud ita familiariter, vt nunc, internis phlegmonis aliisque morbis corripiebantur, propter frequentem balneorum usum, eo tempore ab omnibus ferè frequentatum, quo ad exterius humores ferri consueuerunt. Accedit etiam, vanum profectò videri illum timorem quod in corpore impuro sudorificum grauius malum excitare queat, etsi humores à calore fundantur, cum humor superfluens à sudorifico fusus totus per sudorem exeat, atque euacuetur. Hic timor certe, ni humor fusus prorsus per cutim euacuetur, adesset: sed omnis timoris causa tollitur, cum humor à calore fusus per sudorem excernatur. etenim in prædicto laconico omnes sudare, si (vt dictum est) recte instituitur, certissimum est: calor namque Laconici fusum ad cutem omnè trahit humorem, cutaneosque meatus rarefacit: vnde facillime sudor mouetur. Quod genus præsidij longe facilius iuuabit eos, qui ex ichoroso humore tenui podagra laborant. Hoc præsidio sudorifico complures veterum medicorum ad febres periodicas in longum tempus progredientes finiendas, vt familiarius solebant, & cum magna utilitate ipsum in usu habuerunt. Ante accessionem etenim per duas horas dato sudorifico, vt in ludorem agroti erumperent, operam dabant. Ex his ergo liquido cuique patebit, statim incipientibus doloribus consultius esse incipere sudationem oportere, solo clystere ad adstrictam aluum laxatorio præmisso, aut aluo laxata lenitorio aliquo pharmaco, vt est cassia, aut manna, aut syrupus rosatus laxatiuus, aut simile aliud. Atqui hic est modus, quo utimur in podagricis, arthriticisque doloribus, cum ad præseruandum, tum ad curandum per interna medicamenta sudorifica. Experientia, quoque cognitum est, decoctum ex ligno lentisci per plures dies assumptum ad semilibram plurimum efficaciam habere ad prohibendas podagricas periodos, quod ea ratione illud præstare potest, quia cum facultatis sit adstringentis, vias internas, per quas humor fluit, lassatas & debilitatas maxime roborat. Nunc pauca quoque cum ad podagram tum ad ischiadicum dolorem de medicamentis cum internis tum externis dicemus. In podagra (vt dictum est) iuuat sudorificum, quo septem vel decedibus sudent, spacio vnius horæ. Si dolor in principio plurimè diuexerit, anodyna quidè exterius apposita conuenient, sed mixta cū repellentibus: cuiusmodi erit succus foliorum, vel coriani, vel plantaginis, vel rosarum vel similibus cū lacte, oleoque rosæ, quæ tepida adhibeantur: vel emplastrum paratum ex lacte, oleo rosaceo, & medulla panis adhibitum. Alij adhibent rosas in vino nigro feruefactas. Post principium laxantia, vel è primæ materiæ adhiberi poterunt, cuiusmodi erunt folia althææ, decocta in hydrelæ, vel tepidum fomentum in aqua ex fenugræco althææ, chamemelo paratum. Alij adhibent mucaginè psyllij, fenugræci, atque althææ seminum, summo cū iuuameto. Aliqui ebulli folia trita vel ex aqua vel ex vino feruefacta cū sæuo hircino adhibent: cyclamen itidem ex aceto decoctum; radix quoque cucumeris sylvestris ex aceto decocta ijs maxime auxiliatur. Non minus postea utile erit lac ficulneum cum farina fenugræci, atque aceto. scordeum vero, thymum, vel origanum, vel thymbra, vel pulegium, vel calamentum ex aceto acerrimo decoctum, ad resoluendum est efficacissimum medicamentum, sepius namque aliqui, qui ambulare non poterant, cum per noctem tantum supra pedes podagrici detinissent medicamentum supradictum, ambulare ceperunt, eodem modo & nitrum ex acerrimo aceto dissolutum, plurimum iuuat. Antiquis fomenta ex sale friso adhibita, fuerunt maxime familiaria; atque friciones pedum volis manuum ex sale & oleo antiquo factæ plurimum ab iisdem commendabantur. Non

nulli experti fuerunt, vtilissimam, esse resinam pini appositam: sed tamen interposita petia linea tenui, ne pedi adhæreat. Sed age de medicamentis ad coxendicum dolorem agamus.

De medicamentis ad coxendicum dolorem vsurpandis.

Caput V.

EX internis medicamentis sudorifica magis vtilia esse solent, atq; inter illa, quæ sunt efficaciora, scilicet vehementer calida & sicca, tenuissimæq; essentia. Etenim ipsorum facultas vehementer discussoria externio à balnei calore per vniuersum corporis habitum deducta, crassos humores ischiadem fouentes extenuat, digerit, atq; vt tandem per sudorem euacuentur, est causa. Huiusmodi verò erūt, quæ parabuntur ex calamentho, cinnamomo, cariophyllis, rora, smirnio, chamæpithy, chamedry, ligno Indo, sassaphras, & ex similibus alijs. Hæc sunt cæteris efficaciora; quorum vsus conuenit, vbi morbus ab humore crudo crassoque foueatur. Minus efficacia, maxime vtilia erunt sudorifica, si materia fuerit tenuis, serosa, ichorosaq;: atq; hæc parabuntur ex china, vel ex falsa parilla, vel ex smilacis asperæ, vel arundinis radice, vel ex milio, vel ex radicibus asparagorum, vel erytrodani, idest rubæ tinctorum, vel similibus in aqua decoctis. dabitur decoctum fere ad libram actu calidum, & externo sudorifico sudor excitabitur, sudabuntq; multis diebus, quoad scilicet dolor resoluatur. Hinc Dioscorides ad ischiadicum morbum commendauit per plures dies, scilicet, per quadraginta, decoctum radicum asparagorum, rutæq; feminum, ex vino paratū; itidem Chamæpithyos, betonicæ, hyperici, corticum capparum, smirnij, cyclaminis. solebat et dare puluerem corticum capparum, ad drachmam vnā, vel ad geminā, ex vino; vel rutæ syluestris, vel smirnij, vel hyperici feminis, vel chamæpithyos herbæ. Nonnulli summa cum vtilitate exhibent puluerem eupatorij Arabum, vulgus pharmacopæorum Auicennæ eupatorium vocat: alij radicis cyclaminis; vel bryoniæ, ex vino. Nonnulli sunt, qui sudorificorum loco exhibent purgantia singulis diebus ad drachmam ex vino vel ipsorum decoctum. Dioscorides laudauit decoctum centaurei minoris; alij dant agarici drachmam ex vino singulis diebus; alij turpetum; alij mechoacam radicem: alij vero compositis purgatorijs vtuntur, scilicet vel decoctis, vel electuarijs, vel tyris, vel catapotijs. Cæterum cum purgantia omnia maxime stomachum, atq; viscera interna lædant, viresq; deiciant, sudorificorum vsus longe vtilior existimandus erit. Vnde Methodici merito purgantium vsū maxime suspectum habuerunt, raroq; ijs vtébantur, atq; nonnisi in morbis difficillimis, posteaquam omnia alia præsidia medicamentaria inuoluerunt adhibita. Non negandum tamen in coxendico dolore ante vsū sudorificorum summe vtilis esse sanguinis euacuationes ex vena tali, aut poplitea, atq; purgationes, cum morbus hic foueatur ab humore crasso atq; viscido, difficulter resolubili. Inter externo vero medicamenta ea quoque vtilia erunt, quæ humorem à centro ad cutem attrahere, eundemq; digerere apta nata sunt; atq; etiam ruborem inducentia, exulcerantiaq;. Hinc pauperum complures in coxendice vlcerum complura (adhibitis flammulæ iouis contusis folijs, aut radicibus ranunculi, aut alio detrimento, ex acetoq; acerrimo appposito, vel similibus) faciunt, eaq; diu aperta seruantes, humorem fouentem malum, euacuant. Hinc antiqui etiam iberidem tritam & emplastri modo coxendici appositam maxime commendauerunt. Nonnulli vtuntur exterius oleis calidissimis vehementerq; discusso-rijs, cuiusmodi est rutaceum, petroleum, sulphuris oleum, & ex feminibus sinapi paratum, item cicinum, liliaceum, laurinum, & illud in quo ebullierit sinapi, vel

vel pyretrum, vel costus, vel zinziber. Nonnulli vtuntur eodem modo aqua vitæ. Sed tamen in primis vtendum erit primarum materierum laxatorijs, vel oleis, vel fomentis, vel balneis, calidis digerentibus: quibus non conferentibus, su prædicta vehementer laxatoria, scilicet, quæ vehementi discussione humorem euacuando laxant, erunt opportuna.

De doloribus sermonem continuari, & primum quid dolor sit, eiusque differentia, causæ, & curatio in communi tractatur. Cap. VI.

Cum dolores inter morbos adstrictos locum habeant merito, antequam ad laeos morbos transeamus, de ipsis à nobis sermo est continuandus præsertimque (quod omnes phlegmonæ dolorem coniunctum habeant) vt affectus dolorificos omnes absoluiamus. Sed priusquam ad ipsorum curationem tractandam veniamus, quædam, cum ad cognitionem, tum ad curationem in communi facienria præmittimus: & primum quod dolor sit illud, quod voluptati opponitur: vnde Galenus tristem atque molestum sensum esse statuit. Varijs vero differentijs observantur dolores, ita, vt quidam cum pulsu, quidam cum punctione, quidam cum tensione, quidam cum grauitate, quidam cum torpore, & quidam cum erosione sentiantur: quidam dolor dicitur calidus, quidam frigidus; quidam continuus, quidam intermittens; quidam æqualis, quidam inæqualis; quidam fixus, & quidam mobilis. Hippocrates in lib. de locis in homine dixit: His, quibus mutatur & corrumpitur natura, dolores fiunt, non quibus corrupta iam est, & mutata. Omnis vero dolor (auctore Galeno) fit, aut à partis alteratione, siue ab immodico temperamento, aut à continui solutione, quæ non sensim sed repente ac cum violentia fit, vt Gal. expressit in lib. 12. meth. med. cap. 7. In postremam verò causam plerique doloris essentiam retulisse visi sunt, eoque præsertim argumento, quod nulla qualitas dolorem, nisi soluat continuum, concitare queat. Quare Galenus merito Hippocratem laudauit, dicentem scilicet, omnem morbum esse vlcus. Hinc quoque est, quod Galenus dixit, phlegmonem, erysipelas, vlcus, abscessus, inæqualem intemperiem, spiritus crudos, flatuososque, humoris cum calidi, acrisque, tum frigidi lenisque multitudinem distendentem, dolorem facere, quod nimirum hæc omnia soluant continuum, scilicet, aut distentione, ut in arthriticis doloribus; aut ruptione, aut exesione, vt in hæmoptoicis ex venarum arteriorumque, tum ruptura fractioneque, tum exesione factos; aut punctione, vt in pleuriticis; aut incisione, vt in vulneratis: caliditatem verò immodicam resoluendo, & frigiditatem comprimendo, & quasi exprimendo à parte humorem, soluere continuum, neminem in naturæ cognitione eruditum latere scimus. Dolores vero varijs à varijs quoque causis fiunt. Etenim repentini aut à spiritus aut ab humoris influxi multitudine (auctore Galeno) excitantur. Veteres calidos dolores, qui à calidis humoribus; & frigidos, qui à frigidis fiunt, nominare consueverunt. Qui verò cum pulsu sentiuntur, aut inflammationem notabilis magnitudinis in partibus sensibilibus, in arterijsque notatu dignis refertis existentem, denotant, aut pus in phlegmone fieri: quare pulsatorius dolor aut à magna phlegmone fit in partibus arterijs magnis refertis, aut à suppuratione. Eodem modo & tensiuus, aut à spiritus flatuosi vel humoris copia membranas, cæterasque alias partes membranofas distendente, oboritur. proindeque ipsum proprium nervorum, nervosarumque partium & membranarum esse, multis visum est. Grauem verò & proprium esse cutis, hepatis, lienis, pulmonum, renum, adenum, & tensiui genere

In primo de elementis.

Gal in 6. aph. 5.

Gal in 4. simpl. cap. 2. in 3. de fract. comm. 3. in lib. de integ. intemp. cap. 6.

In 6. aphor. Mix. poc. com. 51.

Gal in 1. de loc. affectis cap. 3. & 5.

Gal in 2. de loc. affect. cap. 7.

In 6. epid. sec. 1.
sex. 5 in 2. de lo-
cis affect. cap. 4.
Cap. 5.

genere comprehendere, constat, cum (vt Gal. docuit) hic dolor fiat quando mem-
brana viscera circumuoluens maxime distenta est. Rodens ab acri humore fit:
perforans à pituita vitrea: fixus vel ab humore parti infarcto, vel à lapide: vagus
verò & mobilis aut à flatuoso spiritu, aut à tenui humore veluti turgente. Paulus
hisce verbis & dolorum differentias & causas complexus est: Itaque dolor stupi-
dus ex frigida oritur affectione; pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi pe-
culiaris est: sin autem tanquam à palo impacto, aut velui à terebro forari putes,
crassi intestini species doloris est: Punctorius autem circa membranas constitui-
tur: pertundens vehementissimis non heterocranijs solum, sed cephalis quoque
accidit. est autem pertundens dolor, cum à parte primario affecta ceu à radice
subito in uicinas perfertur. Porro distendentes vtrinque neruorum dolores sunt,
cum & laborant, & ad vtraque extrema tenduntur: minimè verò in latitudinem
porrectos nerui dolores percipiunt. At tensiuos stupefacientesq; dolores mem-
brana quidem sub cute porrecta inducit; quæ vero inter carnem hærescit, tan-
quam diuellentis cruciatus excitat: multæ siquidem existunt, inæqualiterque
inhærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Membranaum vero, quæ ossibus
circundantur profundi sunt, ipsorumque ossum tanquam dolentium imaginem
repræsentant. At his præmissis, ad doloris curationem in communi declinamus.
Quæquidè curatio, quod omnis dolor morbus sit adstrictus, per laxantia itidem
perficitur. Etenim dolor omnis aut ab intemperie calida, aut frigida, aut sicca
vt Dogmaticotum aliqui docent, absque vlla humoris præsentia, oboritur, aut
cum præsentia humoris, vel vaporis cuiuspiam aut distendentis, aut mordican-
tis, aut pungentis, aut incidentis; vel demum partes dolent phlegmone vexatæ.
De horum dolorum curatione egimus superioribus libris, in quibus de phlegmo-
nis actum à nobis est. Acturi itaque sumus in hoc libro de doloribus ab alijs
causis, concitatis, minimèq; phlegmonosis. Qui omnes cum (vt Dogmaticis
videtur) vel ab intemperie fiant, vel ab humoribus, vel à spiritibus flatulentis,
adstrictorum morborum genere meritò comprehendere debebunt: proindeque om-
nes laxatorijs præsidijs tollentur. Hinc alias demonstrauimus morbum tam ca-
lidum, quam frigidum medicamento laxatorio sanari: etenim ad partem aliquam
corporis tum calefactam, tum refrigeratam oleo (exempli gratia) dulci actu ca-
lido vtimur, quis quæso est, qui negare ratione queat, dolores esse morbos adstric-
tos, si medicamentorum, quæ doloribus medentur, Græcis anodyna vocantur,
natura seu essentia (etiam Dogmaticis consentientibus) sit temperate calida,
atque humida, vt aqua calida, oleum dulce calidum, amygdalinum dulce, cha-
mæmelinum, anethinum, & similia. Neque est, quod in quibusdam doloribus,
nempe vehementissimis, aliquando vsum habeant medicamenta vehementer fri-
gida sicca, narcoticaque vocata. hæc enim non verè anodyna dici debent, quod
nimirum non dolorem sedent, sed sensum partis dolentis perinde, ac si non sentiat,
stupefaciant. Quam veritatem Galenus confirmasse visus est, hisce præsertim
verbis: Atque frequentissimus & plurimus in dolentibus particulis calefactionis
usus apud medicos est, nam & contenta relaxat, completa euacuat, frigerata cal-
facit. Refrigeratione autem rarius sedandis doloribus vtimur, membrorum qui-
dem superficiem densante, & propterea diffusiones impediende, distenta vero
magis intendente. Quare medicamenta dolorem sedantia anodyna Græcis ap-
pellata erunt laxatoria, scilicet temperate calida atque humida: quæ medica-
menta per se doloribus opponuntur: atque hæc sapore potius dulcia sunt, licet
Homerus, vt auctor est Galenus in primo de antid. cap. 5. voluerit, quæ dolores
amouent, esse amara. Neque est, quod quandoque frigida densantia laxatorijs
contraria, dolores tollant, maximeque ex calida intemperie simplici, citra vllum
humorem, obortos: cuiusmodi dolor est capitis vel à solis calore, vel à febris
feruore

In 6. epid. sec. 6.
comm. 5.

feriore factus: frigiditas enim tollit dolorem a caliditate obortum, calorem ipsum in parte dolente susceptum, adstrictumque ad alias quidem partes propellendo. Verum enim vero longè felicius hic dolor sedabitur, aut a balneo aquæ tepidæ, vel a calido epithemate aquæ alicuius stillariæ calidæ, vel ex oleo aliquo dulci calido, vel simili alio laxatorio medicamento, apto etiam ad intemperiem calidam partis digerendam, & resolvendam. At si quis petat, quomodo medicamenta hæc quæ temperate calida & humida sunt, doloribus omnibus medeantur? Respondetur, mederi doloribus a quacumque causa obortis, primum quia partis naturale temperamentum foueant, atque augeant: hæc enim cum similia sint partis sanæ naturæ, seu temperamento (ut auctor est Galenus) copia augendo calorem innatum cōstioni humoris, atque alterationi fauent: quare cum augeant ipsam naturam concoquentem humorem dolorificum, haud mirum est, si doloribus sint remedio. Secundò, quia humoris partem tenuiorem digerunt, cutem rarefaciunt, & distillationes itidem faciunt. vnde humorum acutorum, vel mordacium, vel pungentium, vel rodentium, exasperantiumque tenuiorem partem digerendo, atque excludendo, hos dolores demulcere apta nata sunt, humiditateque coniuncta longè melius illud præstare possunt, quod acutiem illorum humorum humiditas hebetet, hinc Galenus ad dolorem ventriculi, ex æruginoso humore os ipsius mordente vellicanteq; dabat in potu aquam dulcem calidam. Quod eo promptius humiditas faciet, si pinguis, oleaginosaue fuerit: nimirum quia pinguis ea humiditas efficacius hebetat humorum acutam qualitatem. Hinc ad venena corrodentia, exedentia, inflammantiaq; vsus oleorum dulcium, pinguedinum, butyri recentis, mulsæ, lactis, mucaginum decocti alibæ, maluarum, fenugræci, lini, & similia medicis innotuit. hæc enim medicamenta laxatoria valent plurimum prædictos dolores sedare, nimirum molestam venenorum qualitatem hebetando. Addimus, quod huiusmodi dolores, punctorii, exedentes, & acutissimi, non solum laxatorijs epicæraisticis, acutiem humorum hebetantibus tolluntur sed et subduetorijs, purgatorijsq; (quæ medicamenta profecto laxatoria sunt) intro assumptis. Quare liquido constat laxatoria medicamenta primarum materierum esse aptissima ad sedandos dolores ab humoribus, vel a vaporibus acrioribus obortos. sed quid de ijs, quæ ex spiritu quidem flatulento crudo, vel ex humore frigido, crasso, lentoque & trudo, fiunt, dicemus? an non laxatoria etiam his medebuntur? certe quidem, ut putamus, quando hæc similia sint (Galeno ita in libris simplicium demonstrante) naturæ partis secundum naturam se habentis, augeantque caloris innati concoquentis quantitatem. Vnde humorum illorum cruditas coquitur, crassitiesq; & lentor tollitur. Accedit etiam, quod, si humores maxime frigidi, crassi, & lenti non poterunt laxatorijs primarum materierum (quorum quidem vsus ad sedandos illos dolores Galenus plus laudauisse visus est) sedari, non deerunt nobis laxatoria longe calidiora. Vnde Galenus ad dolorem colicum & alium & Theriacam antiquam, & similia calidioris qualitatis medicamenta laxatoria quandoque commendare non est veritus. Qui vero a flatulento spiritu dolores fiunt, sedabuntur a laxatorijs valenter digerentibus, quæ secundarum, ac etiam tertiæ materierum sunt, scilicet calidis supra secundum & aliquando supra tertium caliditatis ordinem. Verum his quoque conuenient primarum materierum laxatoria, quæ scilicet primo gradu caliditatis alterant. eiusmodi est oleum amygdalinum dulce recentissimum, chamæmelinum, anethinum, & similia. Verum enim vero, tamen si verum sit, quod dolor omnis est morbus adstrictus, idcircoque ipsum laxantia exposcere medicamenta, nihilominus hæc intelligi oportebit de dolore qui iam perfectus est, quando in principio alicuius doloris externi non laxatorijs, sed adstrictorijs præsidijs perinde ac fieri in phlegmonum principijs superius oportere ostendimus,

In lib. 5. simpl. cap. 6.

Loco citato.

dimus, sit opus: nimirum ad prohibendum doloris augmentum, hocque Aurelianus in dolore capitis meminisse visus est, qui in paruo dolore scribit, adstrictorij, & invehementi laxatorij esse vtendū medicamentis. Quare in oībus dolorib. perfectis, laxantibus medicamētis erit opus. Cum itaq; demonstrauerimus dolores sedantia medicamenta meritō esse laxatoria, quę itidē cū plura & varia sint, meritō de singulis cum internis tum externis laxatorij sermonem habendum duximus. Itaque in primis prescribatur dolentibus victus ratio laxatoria; in aere claro, atque calido reponantur; à vino, & à multo cibo, & potu caueant: neque cibis eorum erit modicus solum, sed facilis etiam concoctionis: si alius adstricta fuerit, vel clystere laxatorio, vel medicamento leniter purgatorio vtendum erit: quales vero ex clysteribus, & qualia ex purgatorij pharmacis conueniant, superius dictum est. Eademq; doloribus conuenient, quę phlegmonis sanandis conuenire superioribus libris meminimus, sed de clysteribus ad particulares dolores accommodatos, & de medicamentis laxatorij posteriore scribemus. Accedit, in vehementissimis doloribus sanguinis euacuationem veng sectione factam maximē iouare, atq; ēt purgationem ex eductorio medicamento, medicos, vtilē & efficacem experientia deprehendisse. Interius ad dolores dantur decocta calida vel ex chamæmelo, vel ex althęa, vel ex semine fenugreci, vel lini, vel ex similibus ex aqua parata. datur etiam hydræleum, vel oleum amygdalinum dulce atque recens, vel chamæmelinum, vel aliud simile. Exterius fomenta ex ipsa decoctis, vel ex oleis, vesica aut spongia excepta calida adhibentur. Paulus Ægyneta in lib. 2. cap. 41. rectam quidem curationem dolorum in communi complexus est. At de ijs accuratius scribemus, cum de particularium dolorum curatione sermonem instituerimus.

De dolore capitis persanando. Cap. VII.

Dolorem capitis, qui non est inueteratus, Gręci cephalalgiam, at inueteratum, cepheam, appellarunt: de illo, qui sanatu est facilius, nunc primum scribemus: Dogmatici caput dicunt dolere ex multis varijs causis. Quandoq; ex simplici caliditate, aut ex solis ardore, aut ex ignitis carbonibus, aut ex immotico motu, ex calido balneo, aut denique ex ira immoderata, oborta: caput exinde dolens tactu calidum est, eiusque oculi rubent: Aut ex frigore, vtpote, cum quis diu in ambiente frigido fuerit versatus, aut ab vsu medicamentorum facultate immodicē refrigerantium. In his caput nullum calorem sentit, facies sub tumida apparet, atque pallescit: aut ex humore quoque caput afficiente, scilicet, aut ex sanguine, aut ex bile, aut ex pituita, aut denique melancholia, aut denique ex plethora; humoribus scilicet singulis in massa sanguinea proportionē ad auctis. si sanguinis copia dolorem induxerit, facies atque oculi rubent, & cum grauitate caput dolet, tempora pulsan, pulsusque magnus & vehemens percipitur, vrina itidem coloratior est, si fiat ex bile, dolor est acutus cum magno calore & vigilia, faciesq; & oculi flauescunt colore. Et si a pituita, tenuius, si mulq; grauatiuus est, neque dolor magnus est: Vehemens verō cum grauitate atque diuturnior erit ex melancholia. Quandoque status tenuis distendens membranas dolorem facit. Quandoque verō sit consensu partium infernarum, frequenterque ex stomacho, & in mulieribus ex vtero, in quibus familiarius occipit quam sinciput dolet. In febribus familiarius dolere capite ægroti solent, præsertimq; in biliosis, & ex summa putredine humorum obortis, maximeq; in ipsarum vigore, nimirum ex calidioribus halitibus, aut caliditate, aut acrimonia membranas cerebri afficientibus, inferne ad caput sublatis: a quibus febre vexati,

vexati, si diu perseverauerint, & vigiles redduntur, & deliri. Atque hæ sunt doloris, cephalgiæ, Græcis dicti, causæ. Differt verò à cephalea, quod & brevior & minus vehemens est. Cephalea enim, vt Galenus docuit, inueteratus, & ægrè cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione maximas exacerbationes habet, adeo, vt neque strepitus, neque vocem vehementiorem, neque lumen splendidum, neque vini potum, neque odoramentum, caput repletia tollerare possint; neque item motum; sed in quiete & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere velint; tanquam à malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim, velut contundantur, aut distendantur ea, quæ circa caput suat, sentiunt: non paucis verò vsque ad oculorum radices progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando verò exacerbationes, & intervalla, siue ordinata, siue inordinata. Aurelianus hanc passionem aliquando totum caput occupare, atque hanc dici cephaleam, statuit, aliquando mediam capitis partem, hemicraniamq; idcirco appellari, aut denique tempora, quorum dolor choraphus itidem dicitur. Scribit etiam hunc dolorem radices oculorum occupare, occipitium, collum tendens vsque ad spine partes, vt cum sedere voluerint, vertigine capiantur, cum nausea atq; vomitu bilioso. Augescere verò dolore oculi rubent, & prominentes, & clausis palpebris lumen fugientes sunt, cum lachrymarum fluore, iugi fastidio, visus obtusione, aurium tinnitu, difficilique auditu. Hosque aliquando sequi vigilias assiduas, dentium dolorem, atque accessionis initio stillæ sanguinis è naribus absque iuuamento nonnunquam apparent. Causæ vero, à quibus cephalea fit, ex doloris qualitate innotescunt: siquidem, si dolorem foueat humoris multitudo, cum grauitate dolor erit; si verò cum mordacitate fiat, humor est causa, vel vapor acris: cum tensione citra grauitatem, & pulsum, dolor caput vexans sit à flatu tenuis & ventosi multitudinem; cum grauitate distendens, humorum multitudinem in membranis capitis adstrictam denotat. cum tensione autem, & pulsu citra grauitatem dolor, membranosi corporis phlegmonem (de quo dolore hic non loquimur, cum de eo superius satis superq; scriplerimus) itidem detegit. Vbi superficiem duntaxat capitis vexat, membranam os caluæ ambientem affectam denotat; cerebriq; membranas, si in profundo dolor inualuerit. Cephalea grauissimus affectus est, qui grauiora mala diu perseverans minatur. Proinde ad doloris nunc descendimus curationem, quæ in cephalea, quam in cephalgia longè difficilior esse solet. Omnem capitis dolorem esse morbum adstrictum ex ijs, quæ nuper scripsimus, facileprehenditur, vel etiam qui ex nuda intemperie fit, talis æstimari à nobis debet, proinde etiam in ipsis medicamenta laxatoria, quæ illam digerant qualitatem, ad curationem indicari. quæ idcirco in qualibet capitis dolore vsum habebunt. Neque est, quod complures vfu adstringentium à Methodicis vocatorum medicamentorum, sanari & experientia doceat, & illud non minus Dogmatici ratione nobis maxime demonstrari affirmant, nimirum cum plures dolores ex capite tollantur, repellentibus medicamentis capiti adhibitis, ac ne dum actu frigidis, sed quinetiam (in doloribus præsertim calidis) niue vel gelu, uel alio modo plurimum refrigeratis. Etenim si verum est, repellentibus medicamentis & humores & vapores à capitis parte affecta, aliò protrudi, propelliq; ad alias partes, quis quæso contendet, dolorem, quem humorum vel vaporum præsentia fouet, ilico cessare. De qua re Galenus ita habet: Refrigerabis autem quæcunque adhibere voles in aqua vehementer frigida collocata: quæ si non adsit, niuem vasculo circumpones. Hoc auxilium, siue humorum siue vaporum multitudo in caput impetum faciat, præclare auxiliatur: repellit enim eos, infraq; in corpus detrudit, adeo vt ego in sexcentis hoc medendi modo vsus, nullo alio opus habuerim. Quid igitur dicendum? si hoc verum

Q9 est,

In 2. de comp.
med loc. cap. 2.

In 1. chron. 1.

In 2. de comp.
med loc.

In 5. lib. simpl.

est, scilicet, quod capitis dolores usu medicamentorum adstringentium abigantur, verissimum quoque videbitur (ni dixerimus morbum adstrictum aliquando tolli adstringentibus) quosdam dolores haud esse morbos adstrictos. Certe, tametsi quilibet dolor capitis sit morbus adstrictus, aliquando non inconuenit vti frigidis repellentibus, idest capiti dolenti frigida repellentia adhibere, quoniam hæc quoque ex accidenti partem humore aut vapore tumentem laxant, scilicet, quod humorem repellendo quadantenus euacuent, quod Galenus non negat, quippe docens adstringentia, & quouismodo humorem à parte affecta depellētia, quadantenus dici euacuantiā, quare non inconuenit aliquando morbum adstrictum adstringente, & laxum laxante solui, licet non per se illud præstent ea medicamenta. Namque Galenus affirmat hæc medicamenta capiti adhibita, repellere humores, vel vapores dolorem inducentes, infraque in corpus detrudere: atque hanc detrusionem esse tutam in quamplurimis experientia se deprehendisse. At hæc medicamenta in ijs doloribus, qui à calidis vel vaporibus vel humoribus fountur, atque etiam ab humoribus tenuioribus quouismodo factis, turgentibusue, tuta videntur: Cæterum in cerebro debili ac imbecillo huiusmodi humorum detrusio repellentibus facta, ignoro, an planè careat timore. Itaque supposito, dolorem capitis qualemcumque esse morbum adstrictum, ad eius curationem usu venient laxatoria, & quoniam, vti deprehensum est, etiam medicamenta adstringentia ex euidenti, à parte affecta humorem, vaporemue detruendo, laxare videntur, proinde mirum haud erit, si ferè omnes medici ad tollendos calidos dolores eorum meminerint, usumque affectarint. Sed iam ad curationem descendimus: pro qua priori loco conueniens victus ratio præscribatur, quæ sit omnino laxatoria. Aer velerit temperate calidus & humidus: Etenim cunctis doloribus aer mediocriter calidus & humidus, qui humores, vaporesque digerere aptus natus sit, conueniet, mediocriterque lucidus: aliquando vero dolor est usque adeo vehemens, & acutus, vt ægroti nedum nimis lucidum aerem ferre non valeant, sed neque mediocri luciditate præditum intueri aliquando, queant: adeo vt oculis clausis in obscuro aere degere cogantur. Somnus sit moderatus: ab immoderato (vtpote qui tumentia augeat, exindeque affectum adstrictum) ægroti cauere debebunt. Caueant itidem ab animi passionibus, aluiumque laxam esse oportebit, adstricta enim dolorem auget. Cibus sit parcus, prohi succi, faciliisque coctionis, non flatuosus: à vino abstineant, quoad dolor plurimum declinasse visus sit: quod si dabitur, erit pauciferum, vel ex multa aqua dilutum. præscripta victus ratione, ad præsidia medica declinandum erit. pro quibus moriendi illud in primis cognoscendum, scilicet, an dolor magnus vehemensque sit, an mitis & paruus. In magno enim dolore magna quoque præsidia laxatoria conuenient, modo virium robur illa permittat. Quare, aluo laxata vel clystere purgatorio, vel cathartico leniter purgante medicamento: cuiusmodi erit aut cassia, aut manna calabrica, aut tamarindus, aut syrupus vel mel rosaceum laxatiuum, vel aliquod aliud huius generis; primò secetur vena cephalica cubiti directè capitis parti aut dextræ aut sinistræ dolenti respondentis, aut maiori dolore vexatæ: Sanguinis ea quantitas dematur, quam vires ferunt, & sanguinis abundantia suadet. A qua euacuatione ni dolor diminuatur, eadem repetatur adhibita cucurbitula cum scarificatione & ad occiput, & ad collum, & quandoque ad spatulas, & præsertim, si pars anterior doleat, affectusque sit in principio. Ad eundem affectum vtilissima erit crurum scarificatio, præsertimque in pueris & mulieribus maximeque si in ijs menses fuerint suppressi. In Ægypto sæpius vidimus, homines ab antiquissima, & sæuissima cephalæa, secta frontis arteria, atque ex ea euacuato sanguine quasi miraculo statim liberatos. At qui discere volunt, quomodo arteriæ tutò & commode pro molienda sanguinis vacuatione secari queant, nostros

nostros libros de medicina Aegyptiorum, in quibus de ipsarum sectione accuratissime scripsimus, legere non grauentur. Ad eundem affectum, si diu contumax sit, neque cedat primis euacuationibus, praestabit, secare etiam frontis venam & per eam sanguinem rursus euacuare. Aliqui saepe modicum sanguinis educunt, sanguifugis venis retro aures adhibitis. Alij, his non iuuantibus, vtuntur sinapismis, vesicantibus ad sinciput, & saepe capite euacuato, purgatoque etiam erihinis & apophlegmatismis, plures capitis partes inurunt, vel adhibent medicamenta pyrotica, quae vulgus caustica potentialia appellat, vlceraque, quoad dolor tollatur, aperta seruant. Post haec etiam cathartica, tum vomitoria, tum maxime ventris sua, locum habebunt. vnde ex simplicibus commendatur agarius, ad drachmam & semis: colocynthis, siue eius trochisci ad scriptulum; & ex vsitatis compositis catapotia de hiera cum agarico, aut cocchia vocata, aut de agarico, & similia ad geminas drachmas. Aurelianus exhibendum (ni affectus cedat alijs medicamentis) etiam elleborum album non semel, sed bis atque ter, relictis viribus, voluit. Quapropter mirum est, ipsum postea Dogmaticorum reprehendentem curationem cathartica medicamenta plane damnassee. Inter purgantia maxime inuabunt elypteres laxatorii, in quibus recipitur ex simplicibus medicamentis, aut centaureum minus, aut colocynthis, aut agarius, aut ex compositis hiera, aut diaphenicon, aut electuarium e baccis lauri. poterunt in toto doloris tempore imponi alternis diebus, ni alius sponte fluat. Inter purgantia, quae particulatim capitis tumentia laxant, maximopere ad cephalicam commendantur Erithina, sternutamenta, atque apophlegmatismi, nimirum quod haec humorem doloris causam educant. Pro Erithinis vero maxime huic affectui accommodatis, erit betae succus, iridis, cyclaminis, herbaeque Anagallidis: praeterea & hederæ, & calaminthæ succus naribus infusus multum mucum per nares ducit, atque etiam scammonium ex oleo dissolutum. Itaque per aliquot dies, mane ante cibum, capitis illo dolore vexati naribus succum alicuius praedictorum medicamentorum hauriendo humoris educationem procurabunt. Hanc Galenus commodè effici posse euacuationem, melanthij seminibus pridie aceto acerrimo maceratis, ac cum eodem aceto detritis naribus infusis. Dioscor. ad antiquum capitis dolorem plurimum commendat succum iridis radice in nares attractum, atque tritam radicem cucumeris syluestris ex lacte naribus infusum. Post haec non minus conducent parmica vocata, quod eodem modo caput repletum euacuet, ad quæ vsus puluis naribus insufflatus maxime conuenit, aut veratri albi, aut staphidis agriæ, aut pipetis, aut cyclaminis, aut iridis radiceis, aut similibus. Non minus etiam capitis partes tumentes laxant apophlegmatismi, qui gargarizando, aut masticando (vulgus masticatoria vocat) pituitam per os euacuant. Inter haec efficax est, decoctum sinapi & staphidis agriæ: decoctum item pyretri, thymi, cyclaminis, in ore gargarizatum. ex masticatorijs vero optimum erit, quod paratur (exempli gratia) ex pipere nigro, & staphide agria, puluerizatis cum mastiche, & cum cere modico massa parata. Cæterum non erunt omittenda praesidia, quæ quouis modo humorem a capite aut auellunt, aut diuertunt: etenim haec etiam apta nata sunt capitis tumentia laxare. Omnes extremorum frictiones, atque ligaturas laudarunt. Themison sectæ Methodice auctor, in augmento laudauit vnctiones acerrimas, frictiones durissimas, articulorum contrictiones, atque etiam sinapismum extremis partibus adhibitum. Aurelianus laudat cucurbitulas cum flamma primo dorso, mox ceruici, ac tandem etiam capiti adhiberi. Non minus etiam dropaces, idest medicamenta, quæ ruborem inducunt, primo cruribus, mox thoraci & dorso à primo ceruicis spondylo vsque ad clunes, vel eorum vltimum spondylum. Recentiores vulgo vesicantia vocata medicamenta & cruribus & manibus adhibere solent, vlceraque diu aperta, vt per ipsa

Q9 2 quotidie

In 1. chron. cap. 1

In 2. comp. med.
loc. cap. 2.

quotidie humor expurgetur, seruari iubent. Atque hæc inter laxantia præsidia, erunt ex ijs, quæ alijs præmitti debent, nunc ad ea, quæ parcius magis capiti conueniunt, transeamus. Itaque ut à mitioribus exordiamur, primum vtilia erunt laxantia primarum materiarum, cuiusmodi ex inunctionibus est oleum dulcissimum, aut amygdalinum dulce recentissimum, aut rosaceum, aut chamæmelinum, aut irinum actu calidum sincipiti adhibitum, aut illud in quo ebullierint folia aut radix althææ, aut fenugreci semina, aut melilotus, aut cucumeris sylvestris radix, aut melanthij semen, vel sesami, vel nasturtij. Iuuabit item vinum album aromaticum expressum ex rosæ siccis decoctis. Proderunt quoque fomenta ex althæa, meliloto, fenugræco, chamemelo, in aqua decoctis parata, spongia excepta, capitiq; adhibita calida. Quibus ni dolor cesserit, efficaciora laxantia adhibeto: ut ex inunctionibus, oleum, in quo aut iridis radix sicca ebullierit, aut melanthij, aut viticis semina; aut ex herbis, serpillum, aut ruta, aut calamintha, aut verbenaca; aut ex radicibus spondylium, aut peucedanum, aut radix cucumeris sylvestris. Galenus ex Archigene laudauit spondylium, aut peucedanum cataplasmatibus modo adhibitis, aut semen viticis tritum, aut succum ex baccis lauri, expressum cum aceto & ruta viridi: serpillum quoque viride ex oleo decoctum & appositum iuuare cognitum est, semen item coriandri tritum ex melle, & lolij farinam cum pinguedine porcina capiti adhibita, sed hæc omnia raso capiti erunt calida admoenda. Maxime verò conuenient stillicidia prædictorum oleorum, aut aquarum dulcium calidarum ad futuram coronalem; aut sponte calidarum aquarum, cuiusmodi sunt in agro Patauino Aponentes, Laſtenses vocatæ, & Ducæ in Lucensi agro, & in Corleſina villa existentes: quæ ibi accuratè, summa cum diligentia, & fructu administrantur: huiusmodi aquarum vel oleorum vehementes illusiones (Græci caraclysmos appellant, nostri stillicidia) per dies multos, mane, vel vespere, ante cibum, erunt continuandæ. Aurelianus, præter hæc, commendat, ut caput radatur, nunc pro capillatura, nunc contra capillaturam, donec cutis rubore afficiatur; ac dein in balneo nitri puluere caput aspergatur, & confricetur: postea laudat paroptesim ex carbonibus ardentibus, idest equalem calfactionem, qua meatus cutis laxantur, & humores vel vapores digerantur atque exhalent. Nonnulli (vri dictum superius est) nisi his cedat passio, adhibent capiti & dropaces, & sinapismos, & quandoque exulcerantia, & demum inurentia aut ferro ignito, aut medicamentis pyroticis potentialibus vocatis, ad sinciput, iuxta coronalem futuram, adhibita: Quorum vlcera, eschara ab ijs sublata, diu aperta seruant.

De aurium dolore. Cap. VIII.

AVrium meatus externi sæpe difficillimis doloribus inuadi solent; qui aliquando vsque adeo graues sunt, ut in consensum trahant occipitium, oculos, oris musculos, tempora, atque interdum totum caput: Vnde non rarò, si vehementes dolores fuerint (quod dolor attrahat) phlegmones oboriri solent. Proinde quam primum illis laxatorijs succurrendum erit, cum & hic affectus sit ex adstrictorum genere. Orrum verò hic dolor habere solet, aliquando ex frigidityte, aliquando ex caliditate (ut uolunt dogmatici) simplici, plerunque ex humore crasso ac viscido, vel à flatu eas partes distendente, & aliquando ab vtraque causa simul concurrente. Itaque præscripta victus ratione, si dolor haud vehemens extiterit, sat erunt localia medicamenta partim in dolentem meatum instillata, partim aurem ipsam atque vicinas partes fouentia. Instillabuntur, oleum dul-

cissimum

cissimum calidum, aut amygdalinum dulce, aut chamæmelinum, aut irinum, aut anethinum, aut nardinum, aut quod in excauata cœpa ebullierit apud ignem aliquando oleum dulce instillabitur, cui pauxillum euphorbij fuerit permixtum: hydromel quoque erit satis ad dolorem demulcendum accommodatum: Lana molli luccida calida, summa cum vtilitate, auris meatui, ac partes circumstantes fouebuntur. Idem accidet, si calidus forus per spongiam, aut vesicam decocto fenugræci, althææ, chamæmeli, que plenam factus, eisdem partibus administrabitur. Oleum quoque, in quo ebullierit cucumeris syluestris, aut iridis, aut dracæneuli radix, aut in quo centaury minoris, aut polij cimæ itidem efferbuerint, aut ruta, aut anethum, commendatur vinum instillatum, in quo senectus anguum efferbuerit. Si verò dolor fuerit magnus vehemensq;, necesse erit, ad di laxantia maiora, eaq; etiam interna; cuiusmodi erit sanguinis euacuatio aut secta vena cephalica, aut cucurbitulis cum scarificatione colli & dorsi partibus adhibitis, procurata: post principia etiam, premissa vniuersali sanguinis euacuatione, vtilissimum erit, cucurbitam (auctore Aureliano) & cum scarificatione & circa scarificationem, post aures adhibere, aut hirudines affigere circum auditores meatui. Cathartica medicamenta & clysteres cathartici erunt vtilissimi.

De dentium dolore. Caput IX.

Dentes dolent aliquando ex frigiditate aut ex aere, aut ex frigido potu contracta. Quo dolore sepe vexantur, qui dentibus algidam aquam repente senserunt. Etenim dentes calidis & vehementer quidem delectantur, & à frigidis læduntur. Quod ipsum sit, vel (vt Aristoteles sensit) quod dentium meatui tunc exigui, vel (vt alijs visum est) nerui, cui dens adhæret, ratione, quia neruis frigus est inimicissimum. Plerumq; ex defluxu humoris ex capite, & nonnunquam calidi affectum phlegmonem concitantis, atque non raro dentibus ipsis affectis, scilicet vitatis, & corrosis dolor excitatur. Inter ossa dentes etsi comprehenduntur, tamen id proprijs habent, vt doleant, cum reliqua ossa doloris sint expertia. Dolent vero aut ipsorum substantia affecta, aut neruis affectis, aut denique ginguijs ipsis vitatis. Quouis modo dolor fiat, erit laxatorijs medicamentis tollendus. Aurelianus in principio vitæ repellentibus, scilicet non per se, sed humorem ab affectis dentibus protrudendo, adstrictas, tumentesq; partes laxantibus. Quæ medicamenta etiam in phlegmonum principijs esse opportuna alias à nobis ex Methodicorum etiam placitis, demonstratum est. Itaque commendat acaciæ, aut hypocistidis, aut pentaphylli decoctum, at nunquam actu frigida erunt hæc decocta ore continenda; quod dentibus (vt dictum est) frigida sint inimicissima. Quare non conuenient repellentia, quæ frigiditate, sed quæ sola adstrictione humorem à parte affecta quasi exprimendo propellunt. In alijs vero temporibus laxantia conuenient: & inter alia sunt multis familiaria & quæ ore continentur, & quæ exterius musculis buccarum (vt ait Aurelianus) adhibentur, tum fomenta, tum illitiones. Lana mollis dulci oleo calido imbuta, & expressa vtilissime adhibetur: atque etiam decoctio chamæmeli, althææ, aut fenugræci calido imbuta atque apposita. Inter illa, quæ intra os assumuntur, ad sedandum dolorem, est oleum dulce commune feruens, si præsertim ad dentem accommodetur: si dens meatum habeat, in quem feruens oleum gossipio exceptum imponi queat, nihil erit præstantius ad tollendum dolorem. Oleum itidem dulcissimum calidum erit vtilissimum. Alij pyretrum, alij cucumeris agrestis radicem, alijq; rithymali itidem radicem, ex vino aut ex aceto decoquunt, calidoque vel vino vel aceto vtuntur. Caterum nihil est optatius, quam oleum dulcissimum calidum inditum:

inditum: nam quò plus feruoris agrotus iuxta dentem ferre poterit, eò maior fiet utilitas. Sed ne vicinæ partes à feruore olei exulcerentur, cura habenda erit, scilicet cera, vel petijs lineis adhibitis. Commendantur non minus thuris granum igne calefactum, tenui linteolo inuolutum, dolentibus dentibus appositum: Aut thuris triti puluerem multis linteolis illigatum accipimus, eorumque singula linteola oleo calido imbuta singulis dolentibus tangenda, itidemque retinendaq; admouemus: hæc sunt ex melioribus medicamentis ad dolorem sedandum. Nonnulli & ad mentum, & ad buccæ musculos, adhibent spongiâ decocto althææ, aut fenugræci, aut chamæmeli, aut similibus madidas, & expressas. Nonnunquam dolores sunt adeo vehementes, ut exinde sequantur & neruorum & gingivarum inflammationes. Vnde coguntur medici & secta vena, & cucurbitulis cum scarificatione appositis iuxta oris partes sanguinem mittere. Sed præstabit tunc temporis gingiuas scarificare, ab ipsisq; dentes separare, atque eo modo aliquam moliri sanguinis euacuationem. Nonnulli dentes frangunt, fractisque dentibus dolor exhalat: quod fit adhibitis actioribus medicamentis, uti est radix chelidonij maioris, aut tithymali alicuius, aut pyretri, aut cucumeris agrestis triduo acerrimo aceto macerata, & dolentibus dentibus indita, aut quouis modo imposita: aut exuium serpentis, aut gummi hederæ aceto acerrimo itidem maceratum, atque inditum. Pro singulari medicamento non pauci habent, si per noctem intra manum in vola præsertim contineant radicem illiuscæ herbæ, quam ob id fortasse Rondeletius Dentrillariam vocauit, & vulgus herbam sancti Antonij appellat: ipsa facultatis viuentis est, vnde reuellendo aut diuertendo humorem ad dentes fluentem dolorem aliquando tollit.

*De medicamentis ad Stomachi, ventris, atque laterum
dolorem. Cap. X.*

Dolent, stomachus, venter, atque latera, plerunq; ex frigidityte, aut ex aere frigido, aut ex cibo, vel ex potu frigido, atque ex cruditatibus in stomacho contentis, vel a solo flatu distendente; aut denique ab acri humore os ventriculi mordente, vnde fit affectus doloris, quem nostri morsum stomachi, & Greci Cardiomon appellant, quo veluti cum morsu stomachus doler, aut venter. Si ex frigidityte fit, neque distentio, neque grauitas, neque morsus obseruatur, non sentiunt egroti. Vbi verò crudum excrementum est causa doloris, si multum sit, & grauitas & distentio adest. Si status distendens dolorem faciat, grauitatem non sentiunt. Ex acri vero, humore morsum percipiunt; atque à vitrea acidâq; pituita, aciditatem. Quod pertinet ad medicamenta, si de internis loquamur, commendatur ius pulli iunioris sine sale, aut in quo althæa, aut fenugræci semina, aut flores meliloti aut chamæmeli, ebullierint, epotum. Iuuabit etiam oleum dulce, calidum itidem haustum, præsertimq; amygdalinum dulce. commendatur eodem modo lac ex seminibus anisorum, maluarum, althææ, fenugræci, & feniculorum ex vino, aut ex iure pulli paratum, calidumque ebibitum. Ex antiquis Dioscorides laudauit lac muliebre, aut bubulum, aut afininum per ignitos silices percoctum. Datur vtilissimè etiam drachma ligni Aloes triti, aut aristolochiæ longæ tantundem ex vino. Non minus viles erunt iunci odorati flores triti, aut spica celtica trita eodem modo epota. Nonnulli exhibent quotidie cochlear vnum mastiches puluerizata. Gariophylla vero, aut semina trita carpobalsami, vel feniculorum, vel coriani, vel petroselinæ, vel anisi ex vino complures in usu habent, præsertimque si dolorem fecerint aut crudi humores, aut flatuosi spiritus intus inclusi. Ex internis autem medicamentis conueniunt inunctiones

inunctiones calidæ ex oleo dulci, aut amygdalino, aut mastichino, aut spicato, aut chamæmelino, aut anethino, paratæ atque applicatæ ori ventriculi. Fomenta itidem ex chamæmelo ex althææ folijs, ex meliloti floribus, atque ex rosis, cum spica indica, aut absinthio, in aqua, vel in vino parata plurimi iuuamenti esse solent, si vel spongia vel vesica eo decocto calido imbuta ori ventriculi adhibeatur. A nonnullis commendatur melilotus in vino coctus cum farina fenugreci cataplasmatris modo calidus appositus, vel cum vitello oui assato, aut cum lini semine in vino eodem itidem modo coctus. Galenus commendauit siler & cuminum in vino coctum atque admotum: & quod recipit baccarum lauri, rutæ cymarum, singulorum manipulum, & cymini manipulum medium: quibus tritis cum mellis modico paratur cataplasma, quod calidum admouebitur. Cucurbitula magna cum igne stomacho admota quandoq; miraculi modo sanat ab ijs doloribus. Ad ventris & laterum dolorem eadem sanè præstabunt: addantur, clysteres, & medicamenta cathartica. In ventris, laterumq; dolore, clysteres sunt vtilissimi laxatorii primarum materierum, scilicet ex decocto chamæmeli, mercurialis, althææ, maluarum, fenugreci, seminum lini, atque meliloti, cum oleo dulci aut communi, aut amygdalino: aut parantur ex rebus laxatorijs secundis, tertijue ordinis, cuiusmodi sunt, quæ parantur ex decocto fursurum, anethi, rutæ, calaminthæ, mercurialis, seminum feniculorum, anisorum, sileris montani, apij, petroselinij, & similibus; quæ humores crudos crassosq; vehementer concoquunt, digeruntq; atq; ex oleis facultate similibus, qualia sunt anethinum, rutaceum, laurinum, & alia id genus. At Aurelianus ait hæc esse acerrima, & propterea tardis passionibus congrua, aut ventositatē laborantibus, & non causa tumoris dolentibus. Quare clysteres ex laxatorijs primarum materierum, scilicet ex ijs, quæ temperatè calida sunt, consultius hisce doloribus cōuenire existimauit. At si dolores etiā ijs discussorijs non cedant, addetur in decocto faciendo aut centaurea minor, aut colocynthidis pulpa ad semidrachmam, aut ex compositis laxatorijs electuarium lenitiuum vocatum, aut diaphenicon, aut de hyera, aut simile aliud ad vnciam. Cathartica etiam, si dolores sanati difficiles fuerint, haud erunt conueniendū, cuiusmodi ex simplicibus erit mel rosaceum laxatiuum, manna calabrica, ruppertum, quandoq; euphorbium, in minima tamen dosi, scilicet ad duos obolos, colocynthidis, & trochisci, qui ex ea parantur, a landal Arabibus vocati, ad semiobolum: Rhabarbarum, agaricus, & similia: aut ex compositis electuarium lenitiuum vocatum, aut diaphenicon, aut hyera piera Galeni, & similia medicamenta: & nonnunquam validiora, si antiqui dolores in ventre circa hypochondria rebelles extiterint. Qui si magni vehēmentesq; sint, ne dum sectio venæ commendatur, verum (vbi dictum est) validissima etiam laxantia, ita vt ad hosce dolores & complures antiquorum & recentiorum coacti fuerint ellebori albi decoctum exhibere: sed quomodo parari exhiberiq; debeat, & in quibus ipsum propinare tutum sit, alias in hoc opere satis diligenter perspectum cognitumque reddidimus. Nam in his partibus dolores (quod à multitudine crassorum viscidorumq; humorum pertinaciter visceribus inhaerentium foueantur) solent esse, vsq; adeo pertinaces atq; rebelles, vt, ni validissimo medicamento purgatorio tollantur, vsq; ad mortem ægrotos concomitari non raro obseruentur. Homines verò qui hosce dolores in visceribus in ventris regione penes hypochondria posita grauissimos diu patiuntur, vulgus maleficiatos, & demōnatos vocat: quos quidem aliquando quidā religiosi sanant non duntaxat orationibus, at elleborū albū oleo exceptū (quod sanctum oleum etsi diabolicum sit appellant) aut alio modo paratū exhibentes per os: complures autem medici nimis ipsum formidantes, nec vllō modo audentes elleborum propinare, patientes doloribus interimi sinunt. Verum ad eos dolores transeamus, quos colon intestinum sæpe pati solet.

De medi-

De medicamentis ad colicum dolorem. Cap. XI.

Crauiſſimos eſſe eos dolores, qui inteſtinum (colon vocatum) vexant, neminem medicorum latere ſcimus; ſed qualis ex ijs doloribus, qui in ventre ſunt, colicus ſit, haud ſcitu, cognituque eſt facile. ſiquidem, ſolent ſæpe mulieres in vtero dolores pati coli dolori quam ſimillimos. Atq; à renum quoq; dolore nõ ita aperte aliquando colicus dolor diſtingui ſolet. Dolor enim coli inteſtini, qui in ventre obſeruatur, ſupra renes ſit, in lateribus iuxta fundum ventriculi; aliquando circa vmbilicum vehementes adfert cruciatus, quandoq; circa lumbos, vagus ſæpe locum mutat, modo hanc modo illam partem grauius vrgens; & in pectinem inclinatur; qui etiam à quauis purgatione & ſurſum & deorſum facta lenitur, & nonnunquam integre ceſſat. Paulus ait colicos dolores in dexteriore potius illius parte ægros excruciare, & vſq; ad ſtomachum, iecur, & lienem peruenire. Nephriticus vero dolor à renibus incipit, fixus eſt, diuturnus in veſicam inclinans, cum vrina aut tenui in principio, vel turbida, aut ſuppreſſa cum vomitu bilioſo; adeſt illi è directo cruris aliquando ſtupor. ſymptomataq; habet leuiora, quam in colico obſeruentur. A dolore etiam qui ex vtero in mulieribus ſit, facile colicus diſtinguitur, quoniam dolor ex vtero affecto magis eſt in ligamentis ad inguina deſcendens, ita, vt coxendicus videatur. Itaq; colici doloris ſymptomata erunt, nauſea, vomitus pituitoſi atque corrupti humoris multo grauiores, quam per nephriticis affectus, ob flatuum & materiæ reſurſum ab inteſtiniſ ad ſuperiora, qui aliquando bilioſi ſunt, licet materia ſit pituitoſa. Excrementorum tanta retentio ſit, vt ne ſtutus quidem, aut ructus exeat. Aurelianus in dolore colico ait. Ventris ſequitur abſtinentia, aut cum dolore egeſtio, vrinæ reddendæ difficultas, inteſtinorumque rugitus, quem Græci borboriſmon vocant: Addiditque in acceſſione ſitum, ſaſtidium, articulorum frigiditatem, atque torporem, liuorem, ſudorem, capitis grauodinem, mentisq; hebetudinem, ſingultum, atq; pulſum paruum, & denſum: In augmento vero doloris, vomitus fieri humorum quidem craſſorum, lentorumq; & felleorum, cum tenſione peritonæi membranæ, quæ perſeuerans facit inſtationis cauſa reſonum tympani, cum palma manus fuerint loca pulſata: In declinatione autè magnos crepitus per anum excludi. Plerique medicorum in quadruplicem affectum diſtinxerunt colicum dolorem, ſcilicet in eum, qui ſit ex craſſo pituitoſoq; humore intra anfractuſum colon craſſis membranis tectum adſtriſto, cuiusq; membranæ pertinaciter hærente: aut ex ſpiritu craſſo & flatulento intra inteſtinum clauſo, qui exitum non habeat: aut ab acris, mordacibusq; humoribus inteſtinum mordentibus: aut deniq; ob iſtius inteſtini phlegmonem quampiam. de quo dolore ex phlegmone concitato aliàs à nobis actum eſt. Colici vero doloris, de quo nunc agimus, plerumq; occaſio eſt ſtutus craſſus intercluſus diſtendens inteſtinum, aut herens pituita: vnde venter in tumorem attollitur, ex quo grauiffima tormina inuadunt. Nonnunquam tamen colon dolet ab acris humoribus demorſum. In ijs vero, qui colico vexantur ex craſſo pituitoſoq; humore, hæc ſymptomata obſeruantur: primum hi per totum abdomen in alto excruciantur, & præſertim qua parte colon ſitum eſt ceu terebra ſe pertundi ſentiunt: torſiones quoque eos affligunt, ructus, nauſea, vomitio cuiuslibet humoris, porriſſimum pituitæ: Aluus grauiſſe impedita nihil reddit, ac ne ſpiritum quidem tranſmittit; ſtercus autem quandoq; excretum, bouino ſimile videtur, leue & ſtutus plenum. Qui vero ex ſpiritu flatulento indoleſcunt, ijs tenſionis magis ſenſus obuenit. At qui ob acres rodentesq; humores dolorem patiuntur, perinde ac ij, qui ob inflammationem dolent, ardorem, ſitumq; ſentiunt, ac vigiles redduntur; ſed tamen minus, quàm dolentes ex phlegmone, febricitant; vrina excernitur acris & colorata: per aluum excrementa bilioſa deiiciuntur, ſæpeque alui deiectione maiorem

maiores excitat cruciatum, grauiusq; irritant dolores cibis potusque assumpti. Talibus ergo signis colicus dolor omnibus innouescet. Qui profecto est & grauius affectus, & plenus periculi: transit enim sepe in ilium: & si diu perseueret, hydropem minatur: de quo Hippocrates in aphorismis habet: Quibus tormina adfunt, & circa umbilicum cruciatus, & lumborum dolor, qui neq; medicamento, neq; aliter soluitur, in siccum hydropem firmatur. Sed his præmissis, reliquum est, ut curationem complectamur: quæ, cum hic affectus sit adstrictus, laxatorijs medicamentis opus habebit, ijsque præsertim, quæ anodyna sunt, quæque anodyna temperata sunt: Cuiusmodi sunt olea temperata, ut est dulce amygdalinum dulce, chamæmelinum, sesaminum, & commune, in quo vel meliloti flores, vel althææ radix, vel fenugræci, vel lini semina ebullierint. & hæc primo cum intus tum extra admouebuntur. Postea anodyna calidiora in usum venient, cuiusmodi est oleum rutaceum, anethinum, laurinum, lilinum, irinum, atque illud, in quo flores cyclaminis effebuerint, aut semina cimini, anisorum, carui, dauci Cretici, tileris montani, & similia. Horum usum Aurelianus plus in colico ex flatulento spiritu, quam ex humore frigido oborto commendat. Quæ etiam aliarum scætarum medicis in principio suspecta visa sunt, quod nimirum plus flatulenti spiritus in colica humorosa concitent, quam resoluant. Itaque si dolor sit magnus, phlebotomia utilis visa est, neque immerito, cum ipsa sit magnum chalasticum siue laxatorium, quod ab omnibus in maximis doloribus maxime laudari solet. Quandoque etiam purgantia utilissima sunt, cum per os assumpta, tum clysteribus indita. Ex medicamentis laxatorijs laudatur mel rosaceum laxatiuum ad quatuor uncias, vel cum manna calabrica, veluti si quis vtriusque binas uncias dissoluat in decocto chamæmeli, meliloti, althææ, anisorumq; & calidum propinet. Aliqui exhibent hyeram simplicem, & validiora etiam. Cauendum tamen, ne hiera copiosius, quam par sit, exhibeatur. Melchior Guilandinus è colico dolore à deuoratis catapotijs de hiera ad semunciam, in ileon, quo extinctus est, incidit. Præstabit ergo vti medicamentis laxatorijs per clysteres: hæc enim, quod colon tumens laxare idonea sint, ideo plus utilitatis afferunt, quam medicamenta purgantia per os sumpta. Vnde medici solent parare clysteres purgatorios, nimirum cum medicamentis catharticis, id est eductorijs, oleisq; itidem laxatorijs anodynis paratos, ut si exempli gratia quis accipiat decocti maluarum, althææ, chamæmeli, sesaminum fenugræci, mercurialis, anethiq; libram, agarici, aut turbit, aut hieræ simp. 3. ij. aut electuar. de hiera semunc. aut diaphiton. semunc. mell. rosac. simp. olei chamæmelini, anethini an. unc. ij. fiat clyster. Hæc medicamenta per clysteres indita mirum in modum conueniunt, quod humores detergant per aluū educant, flatusq; discutiant, atq; dolorem demulceant. Post hosce purgatorios, conuenient clysteres aut ex solis oleis, ut R. olei chamæmelini, amygdalini dulcis, an. libram semis: aut ex solo oleo amygdalino dulci exhibentur clysteres, qui colico ex omni causa conueniunt. Nonnulli vtuntur clysteribus ex vrina puerorum calida paratis. Paulus commendat itidem clysteres ex oleo communi, in quo ebullierit althæa, aut fenugræcum, cum adipe recenti anseris, vel gallinæ; aut ex fenugræci, vel althææ, vel chamæmeli, decocto, calido indito. Aurelianus voluit injici vel oleum dulce calidum ad cyathos quatuor, cum adipe anserino aut gallinaceo liquato, ouorumq; vitellis simul dissolutis: vel decoctionem calidam radices maluæ vsualis, aut fenugræci. Porro ad illa, quæ per os assumpta ad hosce dolores usum habent, redeamus. Inter quæ primo occurrunt olea, quæ calida ad semilibram pondus propinantur, olea inquam dulcia, cuiusmodi est amygdalinum, omnium præstantissimum: mirifice enim conducit colico à quavis causa oborto. Complures mirifice vsu istius olei calidi fuisse adiutos, praxim medicam faciendo obseruauimus. Eodem modo & commune, modo dulce sit.

R r & experts

In aph. 11. lib. 4.

& expers cuiusque qualiratis vel acris vel salsa. Quod vero aut ex chamæmelo paratum est, aut ex radice althææ, aut ex fœnugræco, aut ex lini semine, vtilissimè quoque calidum in potu ad semilibram datur. Alij decoctum chamæmeli, aut althææ, aut fœnugræci calidum ad semilibram propinant. Dioscorides laudat, vt fœnugræci pollinis duo cochlearia ex aqua exhibeantur: non minusq; sterus galinarum tostum tritumq; ex vino: Myrus olim medicus (Galenò auctore) dabat bibendum ijs, qui diuturno coli dolore fuissent vexati ex œnometri, aut ex aceto, aut ex vino aqua diluto. Nonnulli commendant vsum Philonij, Theriacæ, diatrion pipereon, & similia. At præstabit etiam externa medicamenta colico dolore vexatis accommodata hic commemorare: conuenient autem ijs inunctiones calidæ ex supradictis oleis, præsertim vero conducit inunctio ex oleo calido ex floribus cyclaminis parato, vel in quo radix althææ, & cyclaminis decocta sit, si venter eo illiniatur. fomenta itidem commendantur ex decocto chamæmeli, althææ, fœnugræci, & similia parato, spongia aut vesica excepto: alij pro fomento apponunt abdomini vesicam semiplenam olei aut chamæmelini dulcis, aut de cyclamine. Præter fomenta, vtilissimæ erunt infusiones aut ex oleo dulci calido, aut ex chamæmelino, aut ex amygdalino dulci, aut ex hydrelæo paratæ. Cataplasmata etiam ex althæa, fœnugræco, floribus chamæmeli contusis, & cum axungia recenti aut anseris aut gallinæ, oleoq; calido, & cum farina aut polline fœnugræci, aut lini, aut seminis althææ subactis parata calida erunt accommodatissima. Si dolor ijs non cedat, cucurbitula magna cū flamma adhibeatur umbilico: hæc enim sæpe dolorem à flatulento spiritu obortum quasi miraculo sustulit. Conuenient etiam quandoq; plures cucurbitulæ eo modo cum flamma abdomini adhiberæ: quandoq; etiam cum scarificatione, pro molienda sanguinis aliqua euacuatione: ad quem vsum aliqui affigunt plures hirudines: sed hæc potius in affectu inflammatorio conueniunt, pro euacuatione ex parte affecta molienda. Aliqui sinapismos adhibere solent, vel etiam dropaces, quoad abdomen nedom rubesciat, verum etiam exulceretur: quæ vlcera ex continua, quam efficiunt humoris purgatione coli partes tumentes laxant.

De dolore renum, atque vesicæ. Cap. XI.

Renes dolent plerumq; à calculis, aut ab humore acris, salsoue, & copia distendente, & qualitate mordente, vel à sanguinis grumo, vel à flatulento spiritu, aut à viscida lentraq; pituita, quæ à calore siccata calculos facit. Nephritici vero gravem in ipsis renibus infixum dolorem impacti pali in se sentiant, eiusdemq; lateris, ac è directo subiectus testiculus ijs dolet; femur eiusdem partis directè obstupescit; alius plerumq; adstrictus, & clysteribus citata sterus biliosum, flatuq; egerit: vrine paucæ arenosæ magis prodeunt. hisce signis dolorem in renibus à calculis fieri nobis indicatur. Vbi vero à sanguine grumoso dolor sit, præterquæ quod solet esse vehemensissimus, etiam secum sæua symptomata coniuncta habet, scilicet febrem magnam, inquietudinem, cum animi angore, à quibus facile in animi deliquium & in syncopem etiam aliquando homines proueniunt. Si crassus lentusq; humor id efficiat, dolor est cum tensione & vrinæ suppressione. Vbi acris & mordens humor cruciatus infert, non absq; acrimonia vrina redditur colorata. Ab iisdem causis & vesica aliquando in dolorem agitur. At facile dolor vesicæ ab eo, qui fit in renibus, discernitur: siquidem dolores antrosum magis ac longe inferius, quàm renes siti sunt, sentiuntur: præterea in mictione, vitium deprehenditur vbi calculi dolorem in vesica excitant, vrina cruda, subalbida mingitur, arenosum sedimen habens: pruriunt crebrò, atque pudendum contrectant: sæpe etiam si calculus

si calculus fuerit effatu dignus, cum mingendi desiderio tenentur, recto intestino communicata passione, vna etiam deicere ægroti cupiunt. si ab humore crasso vesicæ in hærente dolor fiat, & grauitatis, & tensionis sensum habent, vrinaq; cruda cum crasso sedimento excernitur, & non raro supprimitur. si à flatu distendente dolor fiat, abdomen plurimum intumescit cum dolore distendent e, & vrina impedito. si verò vrina coloratior, acrisque mingatur, non sine ardore, & cum siti, nobis argumento est, eum dolorem fieri à calidis mordentibusq; succis. His præmissis, reliquum est, vt medicamenta proponamus, quibus harum partiū dolores conquiescant, atque tollantur. Itaque crebra balnea conueniunt, epithemata modicè calida, fots cataplasmata, atque infusus in superiori capite ad coli dolorem præscripti. Per os autem dabitur decoctum seminum althææ, maluarum, radicūq; asparagorum hortensium. Nonnulli cum magno vtilitatis fructu assumunt singulo mane decoctum foliorum maluæ, aut althææ, cum saccharo candido. Alij lac seminum althææ, maluæ, erysimi, perroselinii, melonis, fænugræci, ex aqua radicū anonidis stillatitia extractum calidum exhibent. fots ijdem, quos ad colicum dolorem meminimus, emplastra, & infusus, sunt maxime proficui ad dolorem in renibus atque in vesicâ tollendum. In doloribus vehementibus, & phlebotomia ex talo, & cucurbitulis cum scarificatione vel lumbis vel abdomini apposis medicis vti solent, atque alijs quandoque magnis etiam laxatorijs.

De vteri dolore.

Cap. XII.

DOlet itidem in mulieribus vterus, aut ex sanguine menstruo suppresso, aut vitiose purgato, aut ab eiusdem sanguinis grumo permeante vasa angusta vteri, aut in ipsis adstricto; aut ex sanguinis, seminisq; corrupti copia & praua qualitate; nā halitus inde elati nedum distensione, sed veluti quadā qualitate venenosa, vterum lædunt; vnde sæuissima symptomata in mulieribus concitari solent: aut à frigido humore crasso; aut à simplici frigiditate; aut à flatulento spiritu; aut denique ab humoribus acris, mordentibusque. Ex sanguine menstruo deficiente, aut vitiose purgato dolorem excitari, ex mulierum relatione facile conijcitur. Grumofum verò sanguinem dolorem facere cognoscitur, cum ex qualitate doloris qui fixus acutusq; est tum ex symptomatibus subsecutis deprehendimus: Nam propter eum mulieres anxietate fieri solent, inquietæ, atque exolutione affici. Si vero sanguis grumofus per vasa angusta moueatur, dolor est vagus, quoad excernatur, perseverans. Vbi vero doloris causa est aut seminis aut sanguinis vitii halitus, prauaq; idcirco qualitatē, cum dolore quandoq; vteri strangulatus, atq; epileptica symptomata obseruari solent. A flatu itidem vterum dolere, notant vteri distentio, & extuberantia hydropi tympaniti similis; crepitusq; ructus, rugitus vnā apparent. Ceterum vteri dolori conuenient anodyna dicta, atq; Methodicis laxantia temperata seu primi ordinis, aut (vt aiunt) primarum materiarum, cum intus, tum extra: Cuiusmodi sunt olea, fots, infusus, & similia. Itaq; si dolores admodum vehementes sint, vtilissimū erit, illis exhiberi aut oleum dulce mediæ ætatis calidum, aut amygdalinum dulce & amarū, aut chamæmelinum, aut è feminibus lini: aut, si flatuum copia adsit, anethinum etiam, aut rutaceum conuenient. Clysteres ex iisdem oleis calidis, & decoctis maluarum, althææ, fænugræci, chamæmeli, rutæ, & similibus, cum rhodomelle, & aliquando quopiam medicamento cathartico parati, quales ad colicum dolorem fuere à nobis præscripti, summopere conuenient. Demum ijdem fots, ijdemque

Rr 2 infusus,

infectus, quos ad coli dolorem commendauimus, vteri doloribus etiam conducent: Addi tamen poterunt ijs ex simplicibus medicamentis artemisia, parthenium, chamædrys, betonica, eupatoriumq; Arabum.

De dolore articulari

Cap. XIII.

Articulorum dolores vel plerosq; articulos occupant, huncq; affectum arthritim Græci appellant; vel quosdam particulares; si enim pedum articulos vexauerit, podagram, quasi pedum dolorem; & si manuum, chiragram; si genui, gonagram; si coxendicum articulationem occupet, ischiadicum Græci, coxendicum Latini appellant. Dicitur est, duplicem horum dolorum esse causam, scilicet, aut articulorum imbecillitatem, aut humorem superfluentem, aut quod utraq; causa hosce dolores foueat. Quomodo homines ab hoc malo præseruari, atque etiam sanari debeant, nos superius satis superque docuimus. Vnde, ne eadem repetamus, studiosum ad ea, quæ supra à nobis de hoc malo scripta sunt, relegandum, remittendumue esse duximus.

De quodam dolore nocturno, qui pedum, aut crurum, aut coxendicum, aut alterius partis musculos repente inuadit. Caput. XIV.

Noctu repente complures, æstate præsertim, incidunt in vehementissimos dolores, distensiuos plerumque in pollice pedis, aut in cruris sura, aut circa coxendicem in musculis, aut in manibus, aut in brachijs; aut in abdominis musculis. Quem dolorem pati solita est vxor mea, quo tempore vterogerebat, quî dolor quemadmodum haud est ita magnus, vti qui in pede, vel in crure, vel in coxendice fit; tamen longè diuturnior esse solet, ita, vt aliquando plurium horarum spacio perseueret: qui vero pedem aut suram inuadit, aut manum, est acutissimus, fitque cum maxime dolorosa distensione, sed cito resoluitur: etenim si diu duraret, citò interimeret: resoluitur verò ex frictionibus, aut si statim homo, cum dolorem senserit, violenter ambulet, & pedibus quidem nudis super frigidum pavementum. Hunc affectum esse illarum partium conuulsionem in musculis factam, neminem, qui ipsum probè nouerit, latere arbitror. Oritur à frigiditate musculos densante, ipsorumque in meatibus statulentum frigidum spiritum concludente, qui violenter distendens musculos, eosdem maximo cum dolore conuellit. Non me latet, Patauinos, aliasque Italiæ gentes, hunc ipsum affectum cancrum vocare, licet me ignorare huiusce nomenclationis causam, fatear. Nisi ita nominatus sit, quod vulgus existimarit ab occulta quadam proprietate, illiusce animalis insecti, quod aliqui ceruum volentem appellant, quem Patauini cancrum itidem nominant, cornua gestata ab hoc malo homines præseruari. Porro solet æstate frequentius, quàm hyeme, familiariusq; obseruari, quoniam præ æstu homines solent decubare atq; dormire sæpe nudis cruribus, aut linteis subtilissimis leuissimisque cooperitis. Hyeme verò rarius obseruatur, quia probè linteis panisque contecti homines dormiant, vnde minus à frigore læduntur. Præseruatio ab hoc malo fiet, si, qui

qui eo vexari solent, bene pannis cooperti dormiant, dieque & nocte mem-
bra corporis probè stragulis cooperta habeant. Nonnulli partes oleis calidis
inungunt, alij aqua vitæ easdem illinunt sæpe, vt ab eo malo præferuen-
tur. Actu vero dolor vexans, frictionibus calidis tollitur & motu continuo
si partem affectam patientes exerceant. Lotiones calidæ, inunctiones ex oleis
dulcibus itidem calidis, nec non fotus ex chamæmelo, aut ex althæa,
aut ex sennigræco, aut ex simili alio medicamento parati, calidi si
vel spongia, vel vesica adhibeantur. balneum verò ex
dulci aqua calidum cito dolorem dissoluet: co-
demque modo, & efficacius, balnea
naturalia sulphurea, bi-
ruminosaque ad
eos dolores
agent.

Finis Libri Noni.



PROSPE.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER DECIMVS.

De morbis nonnullis adstrictorum morborum genere comprehensio, cur in hoc libro sit agendum, & de quibus particulatim. Caput I.



Superfunt nobis quidam particulares morbi adstricti tractandi, posteaquam de febribus, de phlegmonis, deq; doloribus haecenus egimus. Hi verò omnes sunt, qui cerebrum & capitis partes vexare solent, & thoracis regione contenta viscera inuadunt, scilicet tracheam arteriam, pulmones, ac cor ipsum eiusque partes, atque demum non minus stomachum, iecur, lienemque offendunt. Sed neque hos omnes nobis tractandos instituiamus. Etenim ex ijs grauiiores periculosioresq; solummodo complectemur. Sunt autem affectus, de quibus agere nostrum erit institutum, hi: Vertigo, caros, catochus, apoplexia, paralysis, stupor, tremor, epilepsia, spasmus, mania, melancholia, tussis, asthma, cordis palpitatio, tremor, sitis immoderata, caninia appetentia, cibi fastidium, obstructio & scirrhus iecoris atque lienis, icteritia, renum & vesicae calculus, priapismus, atque vteri strangulatus. Hi igitur sunt affectus adstricti, de quibus in hoc libro à nobis agendum erit.

De apoplexia. Caput II.

Ab apoplexia, tanquam ab acutissimo summeque lethali morbo, exordiri libuit: quam motus sensusq; priuationem interpretantur. exinde ita vocatam fuisse Aurelianus estimauit, quod tanquam ex lethali percussu repentinum faciat casum. hinc vulgus hunc affectum percussiam, siue percussione appellauit: Hæc passio est strictura acuta & vehemens, in qua homines repente cadunt, sine sensu & motu, seruata; vt ait Galenus, respiratione: vnde corpus apoplecticum est, quod planè in omni parte sensu atque motu destitutum, resolutumq; est. Paulus inquit, quando, affecto communi neruorum principio, omnes corporis partes motum, & simul sensum amiserunt, apoplexia dicitur. sed longe plura sunt signa, quibus hæc passio innotescit. namque iacent apoplectici, voce sublata intermortaue, sensus atque motus expertes, stertentesq; citra febrem. De qua Hippocrates dixit: Quicumque sani capitis dolore derepente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, ni febris apprehendat. Aurelianus hæc signa ad hunc morbum cognoscendum expressit, scilicet, vocis amputationem (quæ apoplexiæ, epilepsiæ, cardiaci affectus est propria) mentis oppressio-

In lib. 6. aph. 41.
In lib. 3. acut. „
morb. c. 5. „
Galen. in 4. de
vici. rat. in acut.
ia com. 23.

nem ex repentino casu, immobilitatem perfectam totius corporis, vultusque con-
ductionem: In quibusdam etiam suspensionem palpebrarum simul atque oris
hiscentem distantiam apparere, pulsus esse densum & quadam persecutione su-
gatum, articulorum gelidum torporem, respirationem parvam, colorem plum-
beum, lachrymationem inuoluntariam: stertorem vero cum ijs signis compre-
hendit, quæ lethalem apoplexiam concomitari plerunque solent. Antecedunt
vero hanc passionem maiori ex parte capitis subitus acutusque dolor, venarum
iugularium elatio, vertigo, oculorum splendores, extremarum partium sine ra-
tione refrigeratio, totius corporis palpitatio, difficilis motus, dentium stridores in
somno, vrinaque veluti æruginosa; atra, modica, & farinæ crassiori, similia ha-
bens sedimenta. Hoc malum fit aut (auctore Galeno) propter quandam passio-
nem phlegmonosam calidam in cerebro constitutam, aut ubi cerebri ventriculi
ex humore frigido & crasso infarciuntur, obstruunturque ita, ut spiritus introclusi
haud præterfluant per nervos, ad motum, sensumque partibus ferendum. Passio
(vt dictum est) strictura est, quæ si maxima est, statim iugulat homines, respira-
tionem simul cum motu & sensu adimendo. Vbi verò quædam respiratio appa-
ret, eaque magna cum violentia; inæqualiter, & inordinate trahitur, apoplexiam
fortem notat; quam curari impossibile esse, Hippocrates affirmavit: si autem
parua respiratio; neque violenta, neque inæqualis sit, spem aliquam salutis
promittere videtur; atque hanc parvam appellant, quam tolli medicamentis
non esse facile Hippocrates docuit. Itaque cum maxima, tum fortis apoplexia
vocata non cedit medicamentis: Quæ verò debilis dicitur sanabilis est. Rarissi-
mi sunt, qui apoplexia liberati in alicuius partis corporis paraplegiam siue para-
lysim non incidunt; unde apoplexiam in paraplegiam mutari sanatio est; si ta-
men medici accuratius eius sanationi incumbant. Mutatur quinetiam in men-
tis alienationem, humore protruso ad cerebri membranas, sicuti protruso itidem
ad nervos paralysis fit. Aurelianus verò ait, curationes esse fortium hominum;
etenim debiles oppressionibus magis superantur, & ferre maiora adiutoria mini-
me possunt. At nunc ad curationem accedimus, quæ cum passio strictura sit, &
magnæ sanè stricturæ, quæ sæpe citò homines suffocati pereunt, fiet per medica-
menta quidem laxantia, & maiora sanè, quod magnis morbis magna profectò
remedia conveniant. Itaque reponendi sunt in loco calido & humido; & præ-
missis clystere, si aliud sponte fluat, statim ad phlebotomiam veniendum est:
Quam omnium Dogmaticorum etiam opinione apoplecticis convenire liquido
constat, ne dixerim in ea, quam calida phlegmonosa passio in cerebro constituta
efficit, sed etiam in ea, quæ a frigido crassoque humore cerebri ventriculos ob-
struente fit, etiam si morbus frigidus dicatur, cum obstructis cerebri ventriculis
maxime procurari debeat magna laxatio, apertio. Quod Hippocrates in lib. 4.
de vict. ratione in acutis, hisce verbis visus est maxime collaudasse: Inquit enim:
"Quod autem quis repente obmutescat, id venarum interceptiones occlusionesque
"faciunt, si sano absque occasione, vel forti alia causa id contigerit. Venam igitur
"brachij dextri internam secare oportet, sanguinemque auferre inspecta secun-
"dam habitum, etatemque plurius minorisve ratione. Verum Aurelianus monet
fieri debere phlebotomiam in accessionis declinatione, neque tunc in accessionis
augmento, vel statu, eam profectò fieri posse. Unde merito dictum est, phlebo-
tomiam aut ægrotos iugulare, aut sanare. Si quis statim incipiente affectu adstet,
poterit audacter secare venam, permittentibus viribus, atque alijs non ipsam
evacuationem (quæ tanquam præsidium laxatorium ab morbo adstricto ma-
gis indicatur) sed ipsius quidem quantitatem decernentibus. Plerique venam
cephalicam secandam duxerunt, quod morbus sit in capite: Hippocrates verò in-
ternam dextri brachij, & postea, viribus permittentibus, fortasse cephalicæ sectio-
nem

In aph. 42. li. 2.

Tex. 23.
Tex. 24.

nem locum habere existimavit. Nonnulli, ut sanguis secta vena fluat, quando præfrigore gelatus sæpius quidem non commode exeat, fluatque, præmisso clystere, fori utendum ad omnes partes corporis ex oleo calido, frictionibus, & similibus, censuerunt. Post phlebotomiam usus clysterum acrium, laxatoriorum, maximè accommodatur: cuiusmodi sunt, qui parantur ex decocto chamæmeli, rutæ, centaurij minoris, althææ, mercurialis, dauci, feseleos, feniculorum, & similibus; ex oleis calidis, cuiusmodi erit rutaceum, anethinum, laurinum, amygdalinum, chamæmelinum & similia; atque ex pulpa colocynthidis, centauro minore, aut turbit, aut agarico, aut ex compositis laxatorijs, ut est electuarium de hiera, de baccis lauri, diaphænicon vocatum, & similia. Itaque ex ijs prudens medicus clysterem parabit, addendo salis communis drachmas duas. Aurelianus commendat clysteres simplices laxatorios, quos profecto hætenus sæpius meminimus. Commendant itidem vehementer laxatoria, cuiusmodi est colocynthidis infusum, vel ex eius pulpa parati trochisci Arabibus alandal vocati, aut agaricus, aut turbit, aut veratrum nigrum; imo & album nonnunquam in robustioribus, atque probè paratis corporibus non sine fructu aliquando exhiberi solet. Paulus ex compositis hieram laudavit cum castorei parte vna admixta ad tres obolos in principio cum piperis obolo ex melle, & ex aqua calente soluta. Quam postea aucta dosi ad 3. ij. & plus etiam interpositis diebus dare consueverat. Nonnulli commendarunt summis laudibus hieram Pachij Antiochi à Scribonio Largo descriptam; atque etiā Logadij, Diacolocynthidosque Galeni. Nostri familiarius catapotijs cocchijs vocatis vtuntur. Aurelianus contendit, cathartica non conuenire, ijs profecto argumentis, quibus alijs ex Methodicorum placitis cathartica haud frequentius, familiariusque esse in morbis usurpanda, à nobis demonstratum est: de qua re fortasse in sequenti capite denuo quædam considerabimus. Sed ad rem redeo. In primis hominem apoplecticum adstantes concutiunt, eius corpus perfricant, in pedum plantis pruritus mouent, barbam vel pubis pilos vellicant, modicumque aquæ vitæ in nares induunt, ut nimium à paroxysmo remoueat, atque (ut dictum est) permittentibus viribus, præmissoque clystere, secta vena sanguinem demunt, mox catharticis purgant: per os aliqui sagapenum ad erui magnitudinem, vel assam fetidam exhibent, aliqui castoreum ad drachmam vsque, vel theriacam antiquam illis offerunt: exterius caput capillis derafum oleo calido inungunt, ac fouent, spongiamque ex eodem oleo expressam capiti adhibent. Oleum verò verus à nonnullis summo opere laudatur, in quo scylla ebullierit, si eo caput calido foueatur, oleum non minus laudatur, in quo ebullierint ranunculi radices, aut piper, aut castoreum, aut pyretrum, aut cachry, aut spondilij radix. Cucurbitula item cum scarificatione capitis partibus utilissimè affiguntur, præsertimque occipitio & spinæ partibus, ut & Aureliano visum est. Sinapismi extremis partibus appositij, & postea etiam capiti, maximè conueniunt. At nunc his de apoplexia præmissis, ad paraplegiam siue paralysem curandam declinemus: cuius quidem curatio fere eadem erit, quæ apoplecticis congruit.

De paralyysi curanda.

Cap. III.

Post apoplexiam sequitur paralytis, paraplegia, & paraplexia ab Hippocrate vocata affectio, & nostris æneruorum resolutio, sideratioque alicuius partis vel partium corporis. Nam quemadmodum in apoplexia omnes partes corporis motu atque sensu destituuntur, ita in paralyysi aliquæ partes cum motum tum sensum amittunt, illæ sensibus interioribus. Differt à stupore, qui fit, ubi in parte seruat

seruato motu aut leuiter laeso, sensus amittitur, aut obscurior redditur: at verò à torpore (modo differat à stupore cum plerique vtrumq; simul confundant, idemque esse velint) quia in hoc partes affectæ, haud planè sensu motuque, vt in paralyti, destituuntur, sed sensum, motumq; obtusum, hebetem, atque diminutum habent. Cæterum partes paraplecticæ aut sensum, aut motum amittunt, aut vtrumque & hæc est exquisita paralytis, in qua sensus atque motus amittitur: Imperfecta verò, in qua perit motus, illeto sensu: imperfectissimæq; in qua perit sensus, illæso motu. Aurelianus distinxit paralytim in eam, quæ conductione (vt ait) siue retractione fit, & in eam, quæ extensione. Hæc est vera paralytis, de qua hoc loco agimus; illa non vera, cum sepius ex vulnere, aut ex contusione, partibus retractis, ac veluti conuulsis, oriarur. Cæterum quadruplex paralytis obseruatur: vna, in qua partes faciei resoluntur; altera in qua partes infra ceruicem patiuntur; tertia, cum pars dimidia corporis vitatur; quarta, demum vbi pars quædam tantum læditur. Omnes verò partes, quæ motu voluntario præditæ sunt, quæque proprium neruum habent, huic passioni videntur obnoxie. Hinc Aurelianus credidit, interna viscera paralyti affici, præsertimque pulmonem, cor, septum transversum, pleuram membranam, splenem, atque iecur. Omnis verò paralytis in neruorum læsionē refertur: propter ea Celsus merito neruorum resolutionem hunc affectum vocauit, & Scribonius Largus syderationem. Laesio autem, quæ neruis accidit, vel est eorum incrassatio, vel obstructio, vel quelibet compressio: à quibus impeditur spiritus animalis, ne, tanquam radius, in partes inferiores diffundi queat; vnde eadem partes amittunt motum & sensum. At nunc ad signa descendimus, per quæ singulæ partes paraplecticæ deprehenduntur. Si faciei partes, vel dimidia pars corporis paralyti fuerit vitata, apertissime cuique patebit ex amisso motu atque sensu, illæsis sensibus internis. at si aliqua pars tantum paraplectica sit, ipsius vitium deprehendemus ex amisso eius motu, quo mouebatur, atque sensu. Complures autem sunt partes, quæ vitari paralyti possunt, hæcque præsertim, supercilia, palpebræ, oculi, lingua, labia, odoratus instrumentum, quod esse cerebri ventriculos anteriores Galenus docuit, Musculus, qui buccas colligit, quem Græci *σιαζών* appellant, mentum, fauces, guttur, stomachus, musculus laryngis, atque gulæ communis, quem *πρωτός* vocant, pylorus, ileum intestinum, cæcum, colon, rectum, vesica, peritonæum, colis, meatus spermatici, crura, brachia, pedes, atq; manus: quarum partium paralytes signis proprijs comprehenduntur. Etenim supercilia paralyti vitata, laxiora circa palpebras superiores propen debent; vel certe sustollentur, vt ipsas palpebras etiam suspendant: idque fit cum alterum supercilium, quod sanum est, egrum ad se trahit, nam in paralyti sana pars ægrā trahit, vt in conuulsione sanam egra: Item palpebræ superiores hac passione oppressæ laxiores fiunt, & pupillam oculorum contegunt, aut è contrario extensa sustollitur, atque oculorum pupillam nudat: item inferiores palpebræ paraplecticæ nunc interius flectuntur, nunc in semetipsas aut exterius refunduntur, & motu carent, oculos non contegunt: sequitur etiam inuoluntarius lachrymarum fluor, quod est vtrique palpebrarum vitio commune: & si in risum venerint ægrotantes contortum, vel conductum simulant vultum. Tunicæ verò oculorum, siue membranæ, hoc vitio affectæ visum impediunt, pupillis ampliatis: qui affectus mydriasis dicitur: At si conductione fuerit paralytis facta, cessante nutrimento, pupilla fiet angustior, qui affectus itidem phthisis pupillæ appellatur. Lingua verò paralyti vitata vocem non articulatam profert, sed interius mouetur, & nunc nullius significationis vocem reddit, nunc amputatione facta medio tempore oppressis conatibus conticescit; demonstrata tamen verbi intelligibili prolatione; nunc imperfecto motu, nunc ex omni parte motu carens. sed discer-

si auntur

nuntur ab ista passione, qui forte ex alia causa vocem amiserunt, cum neque colorem linguæ superficies mutauerit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suæ mutauerit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti vitata. Cognoscitur itidem odoratus instrumentum paraplegia tentari, quod nullum odorum accipiat sensus. discernitur tamen ab ijs, qui narium vitio odoris instrumentum amiserunt, quem affectum ozanam appellant, quia neque partium torpor, neque pallor, neque atrophia sequitur. Labium superius paraplecticum inuertitur forinsecus, proditum magis cum risus aduenerit, aut locutio: conducitur enim cum sano inferiori: item potu sumpto exterius facit fluere liquorem. Musculus vero buccas colligens (quem siagon Græci appellant) paraplecticus conducitur, aut laxatur, vicinusque denique oculus non poterit perfectam facere apertionem, conductæ retractæ palpebra inferiori. Mentum itidem eodem modo vitatum, amisso motu, laxatur, aut vehementer sustollitur. fauces paraplecticæ transuorationis difficultatem faciunt. Gutturis verò summitas vitata (quam vel arteriam asperam vel bronchon Græci vocant) fortem, aut paruum, cum difficultate transuorationis, tussiculam inducit: siquidem operculum ligulæ superpositum ad radicem linguæ iacens, Græcis epiglottis vocatum (quo perfecto, assumpta deglutuntur) haud perfectam eo tempore contractionem facit: Deinde etiam videbitur eius extantia plurimum relaxata. Stomachus autem eodem malo vexato, fit transuorandi difficultas, aut omnino impossibilitas, unde etiam præfens periculum imminet: videbuntur etiam difficilia transuorantibus accepta, veluti acriora, aut immaturo tempore collecta: item sequitur præfocationis sensus cum frigore, in quacunque eius parte fuerit paralytis: illie namque etiam transuorata deglutitæ sistuntur. At discernuntur ab ijs, qui paralyti similem affectum ex difficultate transuorandi patiuntur: siquidem etiam decoloratio, cessante nutrimento, ac frigus, & immobilitas faucium necessario concurrunt. Item ab ijs, qui supradictis querelis afficiuntur, si in stomacho humores fuerint, discernuntur, quod dolore etiam atque fetore partium vexantur. Si verò musculus laryngis & gulæ communis (quem Græci *Kardia* appellant) fuerit paraplecticus, aut eius summitas, locorum grauedinem faciet, atque sumpti cibi & potus in præcordiorum vijs permanebunt, cum sensuum torpore, ac manuum tumore, aliquando etiam crurum, attestante singulorum cum inani tumore, scilicet qui subito eminet & confidit. Aliqui etiam reuomunt, assumpta nulla corruptione alterata vel mutata. Pyloro verò affecto, eibus nulla digestionem mutatur, sed tanquam per infundibulum ad inferiora descendit, & circum ventrem laxior locus efficitur inferius, inflatiorque: Que verò per ventrem egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque fluida. Ileo atque cæco intestino paralyti vitatis, quæ per ventrem excluduntur, erunt plurima & minus fluida: Videtur enim ileon cum naturam seruauerit, & nullo fuerit morbo vexatum, alimenti plurimum accipere, & parum excrementorum facere. Et colo eodem modo vitato, inordinato motu atque inuoluntario stercora descendunt, sine vlla humectatione, & cum fetore maximo eorum fit egestio, absque villo dolore. Longanone cum sphinctere atque podice paralyti vitato, erit inuoluntaria egestio stercorum, nisi id ex aliqua circumcissione fiat, ut cum hæmorrhoides, condylomata, thymi, callosæ fissuræ, & id genus morbi, scalpello tolluntur. Aliquando etiam præcedit, vel certe defectionem stercorum sine tumore & sine aliqua simili causa fieri permittit. Vesica eadem passione vitata, fit inuoluntarius vrinæ exitus absque villo dolore, neque incisura, neque circumcissione antecedente: aliquando etiam per intervalla prohibitus, vel paulatim retardatus, aut omnino negatus: & sepe etiam pubetenus extantia partium fit, extenta vesica. Sed si ex tumore, vel ex sanguinis gelati corpusculis (quæ Græci thrombos vocant) aut ex lapide,

ex lapide, vel ex vulnere difficultas fuerit mictus, aut ex toto supprimatur, discernitur, quod sine dolore & partium liuore, & sanguinis mictu, apposita manu compresso pectine, vrina in paralyfi excludetur. Præterea etiam peritongo paralyfi affecto (vt Erasistratus ait) vrina supprimitur, & neque excluditur nisi adhibito cathetere. Non enim vesicæ ambitus naturali consuetudine peritongo incumbente opprimitur, neq; similiter contrahitur ad exprimendam vrinam. Collis itidem paraplecticus multo maior, aut minor efficitur, & nulla tentigine prouocatur. Seminalibus vero vijs (quas Græci poros spermaticos vocant) vitiat, si solutione fuerit paralyfis effecta, sine vlla tentigine inuoluntarius fit seminis lapsus: & dicitur hæc passio gonorrhæa, quam nos seminis fluxum appellamus. At si strictura conclusionē paralyfis fuerit, iugis tentigo egrotantis sequetur, absque vlllo dolore, atque seminis lapsu, fluxuue, vocaturque hæc passio priapismus. Crus quoque paralyfi læsum, aut conductione breuius fit, aut extensione longius, vt plerique putent articulorum laxationem hic factam: sed hoc discernitur, siquidem concuitas, atque extantia à loco motos aut eiectiones articulos sequitur. Atque hæc sunt partes, quæ paralyfi vitiatæ cognosci possunt, quibusque signis deprehendantur, hætenus ex Aureliano, qui fuit in tradendis singulorum affectuum signis, si quis alius, accuratissimus, didicistis. Credidit etiam (vt aliàs dictum est) interna viscera paraplectica fieri aliquando posse, scilicet, pulmonem, cor, diaphragma, pleuram membranam, splenem, atq; iecur. Quorū quidem paralyfes nos latent, quia propria signa, quibus deprehendantur, non habent. Herophilus subitanam mortem ex nulla manifesta causa secutam, cordis paralyfi fieri credidit. Erasistratus verò paralyseos genus quoddam paradoxū appellauit, quo ambulantes repente sistuntur, vt ambulare nequeant, & tum rursus ambulare sinuntur: quod accidit statibus sic musculos distendentibus, vt breui spacio temporis ijs vti non liceat. Sed tempus est, vt de paralyfis causis agamus. Itaque si partes in facie positæ resoluuntur, causa erit cerebri læsio (auctore Galeno in 3. de loc. affect.) si animantis partes sub ceruice positæ, quæ à consilio, & voluntatis imperio moueri possunt, nervos habent à spinali medulla procedentes læsos, aut ipsammet spinalem medullam. Qua tota læsa omnes partes sub ipsa positæ resoluuntur, quippe suscipiente spina à cerebro vim tum sentiendi tum mouendi pro arbitrio. Itaque si in ipsa fiat aliqua dispositio, qua impediar facultas, quominus permeet inferius, omnia membra inferiora (excepta facie) sensu motuque priuabuntur. Atque etiam si dimidia pars spinæ lædatur, dimidiæ quoque corporis partes è regione positæ patiuntur. Demum si vna solummodo pars paralyfim patiatur, læsio erit nerui illius, qui ei inseruit, siue a cerebro, siue à dorsali medulla comunicetur. Ex quibus verò causis neruorum principium, quod est cerebrum aut spinalis medullæ principium, aut deniq; nerui particulares hinc deducti paraplecticis partibus inseruientes, vel in exortu suo, vel in processu afficiantur, nunc cognoscere oportet: Alij dicunt, quod si paralyfis subito fiat, hominemque repente corripiat, substantiam neruorum per defluxionem imbui humore, qui eos molliores reddit: ipsos enim nervos extendi atque laxari, sicuti tendones: quo fit (ob plenitudinem, & obstructionem, spiritu non transeunte, vel quia leuissima contractione sit opus neruo ad mouendam partem) vt membrum concidat, & immobile permaneat: hique putarunt aliquando presentem passionem fieri à sanguine, sed plerumque ex pituita tenuiori multa à cerebro defluxa, atq; in neruorum substantiam penetrante. Galenus vero paralyfim fieri statuit, si nerui à frigore constringantur, aut à crasso lentoque humore obstruantur, aut ab aliqua externa causa comprimantur. & alibi scribit: torporem atque paralyfim fieri à neruorum obstructione, vel humidorum, aut crassorum, aut glutinosorum impactu. Itaque paralyfis causa erit aut neruorum obstructio ab

*In 2. de sympt.
caus. cap. 2.
In 2. prorrh. 26.*

Si 2 humore

humore crasso aut lento; aut incrassatio obscuratioq; , qua uia spiritus impeditur, quo minus inferius permeare queat. Hinc errare eos deprehendimus, qui nervos ab imbibita humiditate laxari, ipsorumq; laxationem paralyfis esse causam dixerunt, cum obstructio vel compressio, vel densatio, seu incrassatio nervorum, sit præcipua causa, quominus spiritus transire & permeare inferius valeat. Plerique Methodicorum paralyfin omnem adstrictam passionem fecerunt, scilicet ob duritiem partium vitiatarum, siccitatem, grauedinem, atque torporem. At cur omnes etiam Dogmatici idem non fateantur, cum (vri dictum est) ex Galeno constet, paralyfin fieri vel ubi nervi à frigore adstringuntur, aut à crasso lentoq; humore obstruuntur, aut ab externa causa, vel interna comprimuntur. vnde ex vulnere, aut ex ictu, aut ex casu nervis compressis, partes paralyticæ euadunt. Vnde Erasistratus quondam medicus grauissimus Aureliano visus fuit errasse, quod statuerit omnem paralyfin laxatione fieri, atque exinde etiam collegerit, non conuenire malagmata & emplastra in paralyseos curatione vsurpari solita, quòd laxatoriæ essent facultatis: mēbra enim cū extensione aut laxatione resoluta, dicebat illorū vsu magis laxari atque extendi: proindeque methodicam curationem daminari. Siquidem, vt Aurelianus docuit, extensioni membrorum, strictura facta, maxime conducere medicamenta laxantia, discutientiaque, obseruatione deprehensum est. Malum est grauissimum, quod ni medicamentis hebefcat, minatur apoplexiam & mortem. Aurelianus ait: paralyfis est passio grauis & difficilis, & curatio longe grauior, si partes toto sensu atque motu caruerint, maximeque in corporibus debilibus, vel alio morbo vexatis. Proinde diligenti curatione est opus, quæ fiet per medicamenta laxatoria, cum passio stricturæ sit. Omnes quidem conueniunt, quod paralytici debeant in loco calido collocari, qui sit etiam mediocriter humidus; item quòd ijs parco victu, concoctu facili, optimi succi, & qualitate calido atque humido sit vtendum. Verum & à vino abstineat, aut oligophoro, tenui, odoris aromatici, quantitate paucò, iridem vtantur. Quòd pertinet ad præsidia medica, quæ omnia laxatoria esse oportebit, in primis vacuationes, purgationesq; locum habebunt; tandemque localia digerentia. Omnes ferè medici in hac passione phlebotomiā commendauerunt, omniumque maxime in paralyfi cum plethora, ex contusione, ictu atque casu facta. At Asclepiades in ijs, qui etiam sensu priuati sunt, abstinendum à sanguinis vacuatione censuit. Themison phlebotomabat ex ea parte, quæ paralytica est, modo sensu non caruerit. Aurelianus laudauit & ipse phlebotomiā ex parte patienti contraria. Græci modicè sanguinem detrahendum ex cephalica partis sanè arbitrati sunt. Arabes verò liberalius magis in huiusmodi præsidij genus inclinarunt. Nobis quidem videtur nisi corpus plethoricum sit, quamlibet modicam sanguinis euacuationem sufficere, modo tamen vires eam permittant. Omnes itidem laudauerunt laxatoriorum clysterum, etiam catharticorum vsum frequentem, non minus quàm purgantium medicamentorum. Praxagoras ex antiquis, si Aureliano credendum sit, in paralyticis laudauit vomitum, ventrisuā medicamenta, vrinalia siue diuretica, clysteres assiduo acres, sudoris prouocationem, acetiam ellebori albi vsum ad vomendum. Mirum est, Aurelianus in paralyticis tantopere damnasæ medicamenta cathartica, quod nimirum ea sint corruptiæ virtutis, & corpus consumant potius quàm laxent; cum tamen postea in eodem capite dixerit: Præterea, perseverante passione, ad hellebori vsum probemus accedendum, non solum semel, sed & cogentibus rebus, secundo, vel tertio. Ex purgantibus verò eadem erunt in paralyfi in vsum accipienda, quæ apoplecticis conuenire superius meminimus. Purgare caput Erihinis, masticatorijs, & apophlegmatismis, erit vtilissimum. Conueniunt etiam cucurbitulæ dorsi partibus, præsertim spinæ, cum igne adhibite, & aliquando etiam cum scarificatione, modo partes sensu non caruerint.

caruerint. Exhibentur antidota calefacientia digerentiaq; cuiusmodi est Theriaca, & Mithridatum, ad drachmam ex vino aromatico. Aliqui vtuntur sudorificis in balneo laconico, cuius in libro, in quo de podagricis doloribus egimus, meminimus, & modum docuimus, quo sudorificum adiuuari debeat. Suffitus vero quo incaliescit balneum laconicum, erit decoctum saluic, stachados, calamenti, origani, chamemeli, fenugræci, & similium: quo lapides igniti consperguntur. Verumenimvero parum vtilia esse obseruauimus sudorifica, seu sudoris prouocationes in cruribus paralyticis, potissimum, si simul cum motu sensum quoq; ex toto amiserint. Etenim medicamenta efficacius euacuantia, digerentiaue plurimum spiritus dissipant, proindeque membra debiliora redduntur, nimirum, que parum caloris innati habeant. Multo minus sudorifica erunt admittenda in balneo sicco, nimirum in stuphis, vbi sicco calore sudor prouocabitur. namque humoris obstruentis neruum crassities & lentor adaugebitur, scilicet humidiori, & tenuiori humoris parte resoluta, manenteque crassiori & lenta: vnde difficilior nervi ab obstructione liberabuntur. His peractis ad humoris euacuationem atinentibus, topica medicamenta ad spinam & ad partem affectam neruorum adhibenda dicamus: è quibus vtile erunt, inunctiones ad ceruicem, ad spinam ex oleo chamæmelino, anethino, amygdalino dulci, de meliloto, de radice cucumeris syluestris, & tandem ex costino vel laurino, vel rutaceo, cum euphorbio, aut castoreo, aut pipere. conuenient etiam medicamenta rubefacientia, scilicet dropaces, phænigmata, atque sinapismi. Atque hæc nunc à nobis præscripta medicamenta cum ijs, quæ in cura apoplexiæ meminimus, sufficient in communi ad paralyfim tollendam: qui vero particularia medicamenta ad singulas partes paralyticas scire desiderant, legant Aurelianum, qui ad singulas partes vitiatas perscrutandas, præcipua medicamenta atque præsidia non omisit.

De vertigine scotomatica curanda. Cap. IIII.

Vertigo, Græcis *Νίφος*, est turbulenta commotio spirituum crassorum, aut flatuorum, aut solius spiritus cum multo vapore in anterioribus cerebri ventriculis, ex qua caput circumagi videtur. *σκότα Νίφος* autem, vbi caput circumagitur quidem, at cum tenebrosa oculorum offusione. Aurelianus ait, scotomaticam passionem à symptomate, scilicet, quod repentinis oculis ingerat tenebras, dictam fuisse. Quo *σκότα Νίφος* & *σκότα Νίφος* hæc passio à Græcis appellata est. Veteres paruam epilepsiam appellarunt. Fit hic affectus vbi repente obtebrationes hebetudinesque oculis obuersantur, & omnia circumagi & rotari videntur. Huius passionis hæc signa esse medici statuunt, scilicet primo repentinam visus tenebrationem, atque nebulam cum capitis vertigine, ita vt omnia secum moueri scotodini existiment, ante oculos iactus sentiunt, marmarygas Græci vocant; aliqui ex Hippocrate spectra rubra oculis obuersantia interpretantur. adest quinetiam capitis, oculorumque grauatio, & federe volentibus timor, aurium tinnitus, sudor frontis, repentinus casus cum celerrima surrectione. Exasperatur hæc affectio, si ex alto egroti aspexerint meatum fluminis, aut rotæ vertiginem, siue ignis. Paulus addidit, quod leui occasione protinus etiam concidunt, veluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, vt rotas, verticesue, aut quando etiam ipsi circumaguntur. Oboriri autem hunc affectum experimur cum frigidus glutinosusque humor cerebrum occupat, interim vero etiam calfacti capite circumaguntur, cum humores in eo contenti vel spiritus quoque commouentur: Interim excitatur etiā in prioribus cerebri ventriculis, dum caluaria confRACTA perforatur, pressis, in quibus etiam vehementes oboriuntur cruciatus. Aliquando

Aliquando hic affectus fit cerebro primario læso, scilicet ubi crassus lentus humor ipsum occupat, à quo vaporosus spiritus à debili calore resolutus in cerebri partibus inordinatè mouetur. in qua passione præcedunt, vehemens capitis dolor, veternus sopor, quæ ægos Græcis dicitur, & aurium sonitus, & quidam olfactus læduntur, quidam vero gustus. Addidit Aurelianus gravitatem capitis præcedere, læsionemque olfactus, aut alterius cuiusque sensus. Et aliquando scotomia fit per sympathiam ex ore ventriculi. In qua morsus stomachi, quem Græci cardiogmon appellant, observatur, & nausea. Hic affectus, scilicet, qui consensu oris ventriculi fit, minus gravis est, quam qui cerebro per idiopathiam patiente oboritur: hic enim minatur epilepsiam, vel etiam apoplexiam. Proculdubio quod hæc stricturæ passio sit, proba victus ratio pro instituenda curatione, scilicet, laxatoria præscribatur: in qua illud primum observabitur, scilicet, ut in loco calido vertiginosi collocentur: qui caueant ab aspectu fluminum, atque aquæ celeriter fluentis, nec non rotarum, atque ignis: caueant itidem à diuturno somno, atque à meridiano præsertim. Cibi pauci sint & optimi, scilicet, ova forbilia, panis in iure pulli coctus, & carnes avium montanarum, aut gallinaceorum pullorum, aut hedi, aut vituli: à vino abstineant generoso; & in accessione dum caput hoc affectu vexatur, nunquam vino utendum erit, sed eius loco, aqua cum cinnamomo decocta: sed in tempore, quo abest affectio, vtantur vino tenui odorato, paucifero. Caueant ab animi passionibus: exercitationes non intermittant: procurent alui quotidianam exonerationem. Præscripta ratione viuendi, quamprimum præmisso clystere, sanguis erit vacuandus secta vena cephalica, modo vires permittant. Vereres summa cum vilitate secabant arterias post aures positas. Ægyptij etiam illas, quæ in temporibus sunt, secant, & tutò quidem, ut nos in libris de medicina Ægyptiorum probè docuimus. Paulus laudat clysteres acres ex decocto præsertim centaurei minoris, atque pulpæ colocynthidis paratos: Commendatur quoque purgatio ex hiera diacolocynthidos, vel simili alio cathartico. Postea probantur apophlegmatismi, qui per os pituitam purgant, atque per nares itidem purgantia, scilicet, errhina, atque prarmica, idest sternutatoria, quorum sepe superius meminimus. Quibus præmissis, de- raso capiti cucurbitulæ ad occipitium cum scarificatione; vel etiam, statim facta phlebotomia, altera die adhiberi poterunt. Caput irrigare oportet oleis calidis digerentibus, maximeque chamæmelino, anethino, amygdalino dulci, aut tandem eo in quo semina feniculorum fuerint decocta, aut paucedani, aut spondilij radix. Eodem modo & fomenta ex decocto chamæmeli, meliloti, althææ, fanu- græci, & similibus, & aut sponsia aut vesica suscepto capiti adhibenda erunt: non minus quoque vtilia erunt stillicidia aquæ dulcis calidæ, atque sponte nascentium sulphurearum, atque bituminosarum.

De caro, seu subet.

Caput V.

CAROS passio est, in qua homines somni profunditate occupantur cum sensuum, vniuersarumque motionum priuatione, spirandi facultate illæsa. Solet hic affectus febribus accidere plerumque in accessionibus semitercianarum, ac aliarum febrium superueniens. Præcedit quidem febris, & in eius accessione ter- rē sensu atque motu, ægroti priuantur, somnoque profundo ita occupantur, ut in- clamati & stimulat, tamen sentiant, nihil tamen respondeant, & vix quidem stimulari aliquid dicant, neque oculos aperiant (oculis scilicet perpetuo coniu- cibus) illæsa tamen respiratione. Fit etiam hic affectus (ut Paulus est auctor) in cerebri compressionibus, potissimumque caluaria coarctata, aut membrana

anteriorē

anteriorē cerebri ventriculum custodiēte itidem compressa. Quæ verò non
fit ex cerebri compressionibus, pro causa habet humorem frigidum, crassum, om-
nino viscidum, cerebrum occupantem. Qui affectus differt à comate, quia coma-
tosi neque sensu, neque motu privantur, ut in carō: & à lethargo, quoniam le-
thargum febris subsequitur, & carum antecedit: & lethargici stimulatī aliquid
loquuntur, neque omnino mutipermanent: in carō verò nihil etiam stimulatī
dicunt. Malum est grave, & in febribus semitertianis longe gravior, ac peri-
culosius, præsertimq; in senili etate, in qua maiori ex parte exitiale est. Hoc
quidem morbo affectuue interiit Marcus Antonius, Guadagninus, Bassanensis
Guadagninæ olim uxoris meæ dilectissimæ frater. Passionem verò esse stricturæ,
nemo contendit; proindeque laxatoria etiam ad instituendam curationem indi-
cāre præsidia, eademque profecto, quæ de lethargi, atque soporis commatise
curatione superius meminimus, de quibus (ne eadem cum fastidio iterum re-
periantur) nihil aliud in præsentia dicimus.

Decatoche & catalepsi. Cap. VI.

Confusè satis cum veteres medici, tum iuniores de catochæ & catalepsi egisse visi sunt. nonnulli distinguere videntur catochen à catalepsi; Galenus in 3. de locis aff. cûs visus est affirmasse catochen esse comam vigil, & catalepsim occupationem; plerique recentiorum pro vno eodemque affectu cum catochen tum catalepsim accipiunt. Vnde etiam nunc non est, hunc affectum à multis varijs nominibus fuisse vocatum. Veteres (auctore Galeno) κατόχους & κατεχόμενους appellabant; iuniores ipsam affectum κατόχην & καταλήψην. Vnde nostri occupationem, detentionem, & deprehensionem dixerunt; & recentiores congelationem; Diocles aphoniam; Hippocrates catochen; Praxagoras comatoden; Asclepiades catalypsium; Philippus catochum; atque Aurelianus, & Methodicis apprehensionem, atque oppressionem itidem nominavit. Auctor finitionum medicinalium ait, catochum esse, cum sensu priuata anima, corpusque omne veluti gelu obrigescit. Triaque genera constituit, vnum somniculosum, lethargo proximum; alterum vigilans, cui affinis tetanus est; atque tertium phreniticum non inerudite appellatum, quod fiat ex mixtis inter se morbis, catochæ & phrenitide. Verum Galenus ex Archigene & Philippo profundum comam, aliquod habere cum catochæ consortium, statuit; non vigilans. Paulus verò catochen pro comate vigili accepit; postea vero catochen ex aliorum etiam opinione à comate vigili distinxit. Quod fieri statuit non ex composita causa, vt vigil comam, scilicet ex permixtione bilis & pituitæ, sed ex simplici humore frigido & sicco posteriore cerebri ventriculum obstruente; quo si æger corripitur subito, in illa permanet figura, quæ erat, dum corriperebatur, stans scilicet, vel sedens, clausis oculis, aut apertis. Ob quam causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochous, vel catochomenous, quasi dicas occupatos, detentosque, nominauerunt. Hunc affectum (vt nuper etiam dictum est) Galenus distinxit à comate vigili, conuenire autem cum profundo comate, cum Archigene statuit. Vnde cum errore Paulus caput de catochæ (De catochæ, aut comate vigili) inseripuisse, visus est, cum vel etiam ipsemet postea distinxerit comam vigil ab ipso catochæ, aliumque à comate vigili morbum per catochum descripserit. Aurelianus vero (qui & ipse itidē vna cum Paulo catochum & comam cōfudisse videtur, quod nimirum, signa catochi ab ipso proposita, cum signis comatis vigilis à Paulo propositis maximè conuenire videantur) haud ita debuit gloriari, quod hunc affectum soli Methodij probè cognouerint. Nam falsò sibi persuasit ne quidem Hippo-

cratem

Слр. 415-2018

In 4. de caus.
puls cap 16.

In 3. epidem. 2.
com. 8.
In lib. 3. cap. 10.

In 3. epidem. 2.
com. 8.

In 2. oxeon. c. 10.
In 2. chron. c. 5.

In 2. prorrh. tex.
56.
In 3. prorrh. tex. 4.

In 1. prorrh. 3.

In li. 3. c. 10.

cratem (quem nihil in medicina latuisse, auderem affirmare) hunc affectum probè perspectum habuisse, quia aliquando ipse catalepsim, aphoniam, dixisse visus est. Aurelianus autem deceptus est, quia non omnes libros Hippocratis fortasse legit, in quibus catochen ab aphoniam distinctam expressit: etenim in multis locis de catochis egit: in prorrheticis ait: capite dolentes cum catoche delirantes, & cætera. & postea: catoche cum exolutione perniciofa. Complura loca alia in ipsius libris reperiuntur, in quibus veræ catoches meminit. Paulus de propriè catochis vocatis inquit, eos, quieo morbo corripiuntur subito, in illa permanere figura qua correpti sunt, stantes scilicet, vel sedentes, clausis oculis, aut apertis. Addit Galenus in medicis definitionibus, corpus omne veluti obrigescere, animamque sensu priuari. & alibi hoc singulare, quod propriè vocati catochici oculos habent tenfos atq; apertos, non vt comatosi, & cataphorici clausos. Ait Galenus de quodam presso aut catocho detenso: lacebat enim veluti lignum prorsus inflexus, rigidusque atque extensus, videbaturque oculis apertis nos ita intueri, vt ne conuieret quidem, nihil tamen loquebatur. is quoque tempore eodem, quæ loqueremur audire se dixit, quanquam non euidenter clareque: nonnulla item & memoria tenens referebat, præfentesq; omnes sese conspiciere dixit, ita, vt quorundam actiones recordatus exponeret: sed neque loqui posse, neque posse vllum membrum mouere. At Paulus signa omnia catochi profecutus ita inquit: Detinetur æger supinus extensusque, interim facies subrumescit, & modice lethargicorum modo liuet; interim rubore tincta est; & superior gena sursum conuelli videtur, ac excedere, vt ne conuiere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decumbit: pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus; vrina & aluus cohibetur, aut certe modice redditur: qui sanè medicocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutiunt, qui vero malo victi sunt, ad nares regurgitant. Aurelianus vero ait, febriculam adesse, vocis amputationem, oculos patentes, atque palpebras itidem immobiles, in passionis præsertim statu, quando in declinatione aliquid moueantur. ait itidem, inclamatos oculos intendere, lachrymantes absque vlla responsione; respirationem esse frequentem; eisdemque laceffitos collugere, ingemere, cum vultus rubore, cum pulsu magno ex vehementibus & fortioribus saltibus confecto; ipsosque fœtida nariibus oblata fugere, sentireq; dulcia atque amara labijs admota: sudorem item multum & feruentem sepe in declinatione apparere; peiorante verò passione in accessione accedit plurimus feruor cutis, & respiratio est celerrima, quam Græci Tachypnæam appellant. fit itidem oculorum conuersio, manuum contractio, igneique sudoris defluxus, maculis emergentibus in vultum, & thoracem, primò rotundis, vlcera similitudine. Hæc sunt signa catalepticorum ex Aureliano ex lib. 2. chronion. Quædam alia in libro 2. Oxeon addidit, quo in loco omnia quidem signa tum quæ passionem antecedunt, tum quæ in constituto affectu observantur, tum illa, quæ instatu, & in declinatione apparent, atque etiam peiorante passione, omnia diligenter profecutus est. Ex quibus catalepsis propriam esse febrem acutam statuit, aphoniam, sensuum hebetudinem, pulsum magnum vehementem, & plenum, & humectum, atq; obturum oculorum fixum. De febre non videtur sibi constare, atq; in alijs quoq; cum aliàs dixerit febrem esse acutam, aliàs febriculam: item de pulsu. sed quia meum non est institutum, omnia quæcumq; de hac passione scripsit, prosequi, sed solummodo ad essentiam affectus necessaria; ideo vnum tantum diligentius considerabo, scilicet de febre, quæ in hoc affectu excitatur: An febris simul fiat cum catochi, vel in febrium accessionibus accidat? porro Galenus de catochi locutus quicquam de febre non meminit. Paulus (quod dixerit signa catochi esse communia phrenitidis & lethargi) videtur voluisse catochos simul febre assidua, sed parua, laborare. Quæ de causa

causa fortasse recte Aurelianus de catochis seu catalepsi, tanquam de chronico morbo agens dixit, adesse febriculam, idest paruum febrem: ubi vero de eodem, tanquam de morbo acuto egit, dixit itidem febrem esse acutam. Nos dicimus quandoque hunc morbum esse per se, & idcirco habere simul febrem similem lethargicorum febri: sapissime vero consequi febres continuas, aut intermittentes acutas, atque chronicas, in tempore accessionis. Verum tamen (ut Diocles & Archigenes docuerunt) febres intermittentes tunc atque innoxiae sint frequentius, quam continuae; nihilominus homines etiam periclitantur, si in accessionibus catochis seu catalepsi apprehendantur vehementi. At enim Archigenes, perniciosos esse typos periodicos, quibus accessionis tempore pressurae vehementes adveniunt, & quodam somno corpus demergitur: quem affectum righon vocauit. Quem etiam aliquando quotidianis contingere scripsit, at magis tertianis.

De quo affectu Asclepiades (auctore Aureliano) ita habet: Apud Romam vero frequenter aduertimus hasce febres cum corporis, atque mentis oppressione in similitudine lethargiae, quae secundo vel tertio in statu accessionis constituta statim recalescente corpore, vel cessante vehementia, in resumptionem, atque resurrectionem mediocrem reuocant egrotantes; at si non re vera cessauerint semel apprehenso aegro, nullam resurrectionem dabunt, sed in sudores & respirationem celerem, in pulsum febricitantem desinunt, ac occidunt. Haec Asclepiades. Itaque hisce signis nobis innotescunt cataleptici, catochi, pressive. Qui affectus distinguatur a compluribus alijs & similibus proprijs quibusdam signis: Et primum a lethargia, quia in lethargia pulsus est maior, sed tardus & vacuus, & palpebrae clauduntur; cum catochi aperti oculis palpebrisque iaceant, atque pulsum habent plenum, celerem, & vehementem. Ab apoplexia, quia apoplecticis pulsus est paruus, celerrimus, durus, & febre carent; neque etiam corpus apoplecticorum rigidum est. Similis affectus oritur vitio stomachi, in quo affectu pulsus paruus, debilis est, cum stomachi exolutione, & aphonia, cum frigido torpore, post oppressionem; atque haec passio febri non superuenit. In syncope stomachica exieiunio immodico, homines demersi videntur, oculos habent distentos cum dentium clausione, pulsu paruo, praelanguido, frigido torpore, atque haec cito finiuntur; quae si perseverauerint, catalepsin praenunciant. Ab uteri praefocatione in mulieribus, catalepsis discernitur, quoniam in mulieribus uterus sustollitur, & supra umbilicum, vel ventrem, apparens extantia cernitur; & etiam ex eo, quod fuerint assuetae pati hanc passionem: in ipsis collum latius fit, cum palpebrarum clausione, & frigido torpore. Paulus ait: At si mulier hoc laborare vitio ceperit, hac nota discernes, quod naturaliter iacere videatur, & inelamantes percipiat, excitetur, & rursus somno graui sopiatur. A vermibus non raro pueri hoc vitio laborant, sed in ipsis oculis conuiuentes sunt, dentium stridores, motus conuulsui apparent, cibumque stomacho continere nequeunt. De causis Galenus sentit fieri catochos refrigerato cerebro, quae refrigeratio (ait) si fortis fuerit, mixta quidem humiditate facit lethargum, cum siccitate catalepsin. Paulus rectius a frigido siccoque humore posteriorem cerebri ventriculum obstruente. Aetius aliquando ex sanguine in caput irruente se vidisse scribit in adolescente sanguineo, qui cum dies tres exegerat, neque conuiuens, neque ad obiecta quidem oculis nutans, neque respondens, tandem quarta die copiosa haemorrhagia protinus conualuit. In hoc affectu corpus totum strictura laborare deprehenditur, quare morbus adstrictus cum sit, eget laxatorijs. Est tamen grauissimus, qui cito interimit. dicebat Hippocrates catochum cum exolutione perniciosum: & in epidemijs, cum oculorum distorsione esse pessimum. Quare statim, cum sit magna strictura, & acutus affectus, opus erit phlebotomia, si vires permiserint: hocque faciendum, posteaquam accessio declinauerit, ex vena aut interna, si fuerit

T c plenitudo

In 2. aphorif.
com. 3.

In 1. prorrh.

plenitudo sanguinis, aut ex cephalica; idque præmisso clystere communi. Quæ præmissa sanguinis vacatione; etiam vsum habebunt cathartica; atque acres clysteres & purgatorii ex decocto cætaurei minoris, & pulpæ colocyntidis, parati. Chrysippus dabat diagridium cum castoreo. & Themison ante accessionem per quatuor horas dabat diagridij obolum, cum tribus obolis castorei ex aqua. Post hæc fomenta capiti capillis derafo adhibenda erunt ex decocto althææ, chamæmeli, serpilli, fænugræci, & similium; aut ex oleo dulci calido concinnata: accommodatissimum erit amygdalinum dulce, chamæmelinum, irinum, anethinum, & similia. Vtilissimum erit capitis occipitio adhibere cucurbitulam cum flamma, & aliquando etiam cum scarificatione. Themison occipitium & tempora illinebat ex thapsia aqua trita. Principio conueniunt, frictiones extremorum, ligature, & omnia, quæ & euellere humorem ex capite possunt, & corpus incallescere. Chrysippus vrebatur sinapismo ad articulos. His conueniens viuendi ratio adiungenda erit, vt in loco calido mediocriterque humido æger maneat, parco cibo vtatur, qui facilis sit coctionis, & boni succi. Quæ ratione ouum forbile cum pane in iure pulli aquoso decocto sat erit pro prandio; atq; in cœna aqua vini loco dabitur cum cinnamomi modico decocta. & hæc de catochæ & catalepsi dicta sufficiant.

De epilepsia, seu morbo comitiali. Cap. VII.

Epilepsia Græcis dicta est, quod hæc passio sensum pariter atque mentem apprehendat. Nonnulli morbum comitalem; à Romanorum comitijs dixerunt. Alij sacrum morbum, scilicet quod sacram animam contamineat, vel quia in capite sit, quod plurimorum philosophorum opiniones sacrum templum dicitur partis animæ in corpore dominantis. Alij affectum puerilem vocant, quoniam pueri eo vexantur frequentius atque familiarius. Hippocrates heracliam; ab Hercule, qui (auctore Aristotele) fuit epilepticus, appellasse visus est. Demum aliqui lunaticum dixerunt, quod Lunæ motu hæc passio moueatur, vel natus interlunij tempore corripiat. Apud omnes constat esse conuulsionem totius corporis cum principis animæ functionum noxa, partim sanè (vt Paulus habet) in ipso cerebro, partim in vniuersis eius ventriculis causam habentem, modo ex pituitoso, modo ex melancholico humore obstruente eosdem ventriculos, aut ex vapore frigido (vt ait Galenus) in cerebrum ex partibus infernis delato, nempe aut stomachi, vel vteri consortio. Itaque vna species est, quæ fit cerebro primo affectu læso, atque altera partium aliarum consortio, scilicet aut ex stomacho aut ex vtero læso, aut ab externis etiam partibus, aliàs à ciure, aliàs à manus digitis, aliàs à coxendice, maligno vapore ad cerebrum sublato. Vbi vero iam passio insisterit, ægri derepente concidunt, conuelluntur, interdum exclamant voce nihil significante: peculiaris eximiaque illorum nota est spuma circa os, nonnunquam vrina, & stercus, aliquibus etiam genitura, præter voluntatem excernitur.

In 1. lib. c. 5.

De his petibelle Aretæus ita habet: At in ipso morbi insultu sensibus captus homo iacet: manus ipsi neruorum distentione conuelluntur: crura verò non solum distrecta sunt, sed etiam huc atq; illuc à tendonibus projiciuntur: id genus calamitas iugulatis tauris haud ab similibus est: ceruis incuruatur, caput varie distorquetur: Siquidem nonnunquam pronus, ceu arcus inflectitur, quandoq; pectori manibus xilla adhærescit; nonnunquam verò in scapulas refringitur: veluti ijs, qui per vim crinibus trahuntur, visu venit, quando modo in hanc, modo in illam partem ad humeros admouetur: sic laborantes magno hiatu os aperiunt: id siccum habent, linguam prælongam, vt periculum sit, ne magno vulnere saucietur, aut penitus

» penitus abscindatur. Interdum conuulsione dentes inter se colliduntur: oculi
 » inuersi sunt: palpebræ cum palpitatione frequenter dehiscunt: quod si quando con-
 » niuere velint, palpebræ non committuntur, sed alba oculorum cernuntur, ac sub-
 » apparent: supercilia nonnunquam, vt his, qui ad iram concitantur, in glabellam
 » attrahuntur, nonnunquam ad tempora vehementer admodum reuelluntur, vt
 » cutis circa frontem valde prætensa sit, atque in superciliorum medio rugæ eua-
 » nuerint: malæ ruentes palpitant: labia interdum quidem in acutum clauduntur,
 » interdum vero ad obliqua dilatantur; quando in ridentis speciem dentibus cir-
 » cumtenduntur: Malæ rubent quidem; sed cum morbus increuit, & faciei liuor
 » accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, vt in strangulatu, aufertur; etiam si ve-
 » hementer inclames, non sentiunt: eorum vox nihil nisi gemitus, & suspirium
 » est; respiratio vero suffocatio quædā est, veluti in his, qui laqueo strangulantur:
 » inter initia arteriarum motus vehementes sunt, & celeres & parui: in fine vero,
 » magni, tardi & languentes, in vniuersum autem ordine carentes. penis quoque
 » erectio sequitur. De epilepsia verò, quæ fit ex aura frigida, vel halitu maligno
 » ab infernis partibus in cerebrū sublato, idē ita habet: Quibus vero familiare ma-
 » lū, & consuetum est, simul atq. morbus in digitum impetū dedit, aut aliunde exor-
 » tus est, vñtatos, qui adsunt, adiutores inelamant futuram ab experimento cala-
 » mitatem prospicientes: obsecrant quoque, vt membra vnde oritur, constringant,
 » reflectant, dirigant. Quinetiam ipsimet sibi ipsis affecta membra, tanquam in-
 » de morbum eximentes, trahunt, velluntque; atque ita sibimet auxiliantes, non-
 » nunquam eo die accessionem repulerunt. Quandoque (vt dictum est) vitio sto-
 » machi, & quandoq. vitio vteri hoc malum fit. si ex vtero fiat, apparent ante signa
 » læsi vteri, & sentiunt mulieres huiusmodi symptoma in vtero incipere, & conti-
 » nuo ad caput ferri: quædam experiuntur calidas quidem euaporationes ex vte-
 » ro ad caput. Vbi vero ex stomacho læso fit, præcedet etiam palpitatio, turbatio,
 » erosio, & priuatim inedia itidem præcedere solet. Dicta sunt signa, quibus affe-
 » ctio præsens nobis innouescet. sed præstabit illa quoque animaduertisse, quæ futu-
 » ram prænunciant accessionem. Paulus ait, præcedere inuitum corporis, animiq;
 » statum, tristitiam, obliuionem, somnos perturbatos, capitis dolorem, eiusque con-
 » tinuam repletionem. Aurelianus hoc malum duplicis differentiæ esse scriptum
 » reliquit, alterum scilicet, quod cum raptu seu conuulsione partium fit, atque al-
 » terum, quod videtur simile somno altissimo. Quæ passio longè est grauior, si-
 » milisque apoplexiæ. Sed iam causas dicamus, à quibus oritur: Dictum est, fie-
 » ri læso cerebro aut primario affectu, aut per consensum vel ex stomacho, vel ex
 » vtero, vel ex alijs externis partibus, infernisque, cuiusmodi sunt pedes, crura,
 » coxendices, brachia, digiti, & similes alię partes. læditur vero cerebrum per idio-
 » pathiam ab humore frigido crasso, & viscido, ventriculos ipsius obstruente, cuius
 » præsentia seu molestia cerebrum in seipsum contrahitur, nititurque humore, quo
 » læditur, expellere. Nam quod subito obstruat, & subito soluat obstructio, hu-
 » morem crassum viscidamque ventriculos replere colligitur. Præter obstructionem
 » autem ventriculorum, simul à cerebri contractione fieri quoque adstrictionem,
 » alij voluerunt. Sunt quidem alij ex recentioribus, qui voluerunt, in qualibet epi-
 » lepsia cerebrū lædi à praua quapiā vel humoris qualitate violenter cerebri expul-
 » tricem commouente, quo in seipsum contrahatur, vt noxium expellat. Læditur
 » verò ab ore ventriculi, aut vtero vehementer læso, per consensum, scilicet, nervo-
 » rum principio itidem eodem modo læso, contractoque in seipsum. Itaque cum ab
 » hisce causis hoc malum oriatur, meritò dixit Galenus apoplexiæ esse simile, idcir-
 » co maxime timendum; in pueris vero minus. Ita Hippocrates inquit, epilepsiam
 » ante pubertatem recipere a motionem; & quæ post annum vigesimum quintum
 » fit, ad mortem maiori ex parte comitari: Ante pubertatem verò pueros laborantes

Libro 3. de les.
affect.

In 2. aphor. comm.
45.
In 5. aphor. 7.

cum loci, victusque, tum maxime ætatis mutatione, liberari. Quod tamen curre est intelligendum, cum sepe & puerorum aliqui ex morbo intereant, & post annum xxv. etiam aliqui fuerint ab illo liberati. Paulus inquit: ni in pubertate hic morbus solvatur, aut in menstruis purgationibus, vel per conceptum, sæpe usque ad mortem comitatur. Vbi initio paroxysmi ægri multum agitentur, & citò cessauerit ea agitatio, si æger minime releuetur, at illi stertor eueniat, ex signisque ad apoplexiam, quàm ad epilepsiam, plus accedere videatur, timendū erit periculum etiam in accessione illa: si verò post agitationem releuetur, ac probè restituitur, etsi de accessione haud erit dubitandum, tamen in diuturni morbi suspicionem incidimus. Hic vero morbus cum passio stricturæ & quidem magnæ stricturæ sit, idcirco opus erit pro curatione præsidij laxatorijs, & magnis quidem laxatorijs. Curatio duplex erit, & quæ in accessione fit, vt scilicet homines ab accessione liberentur, & ab hoc malo præcaueantur, atque liberentur. In accessione partes conuulsas ait Paulus oleorum aspergine esse fouendas. Aurelianus adstantes debere seu ministros manibus calidis nunc caput & frontem cū blanda fricatione, nunc collum, atque gutturis partes fouere, sed consultius hæc facienda, præmissis frictionibus, & ligaturis ad crura, & ad brachia, erunt: omnesque partes refrigerantes calidis vel pannis vel fomentis erunt recalescendæ, præsertimque etiam thorax, & pars inter scapulas, metaphrenon Græcis dictum: sed assidue caput fouendum. At Aurelianus omnes partes capitis mollioribus lanis dulci oleo calido infusis esse contendas, maximeque occipitium, statuit. Atque etiam pubetenus & vesicæ partibus vesicam semiplenam oleo calido adhibendam, vt ipsa quoque laxatæ & mitigatæ conquiescant. In nares quoque, perseverante accessione, peucedanum, aut assa fetida, aut bitumen imponendū; & in ore castoreum, aut assam fetidam, cum melle ex aceto. Quibus ni releuentur epileptici, cucurbitulæ sicyæ Græcis dictæ, idest leues cum flamma erunt apponendæ stomacho, Thoraci, & inter scapulas partibus atque præcordijs. Alij oleo dulci calido, præmissis leuibus perfractionibus totum corpus inungunt, atque fouent. hæcque pauca sat erunt, pro accessionis curatione. Altera vero curatio, vt ex toto homines hoc malo liberentur, longè maioribus auxilijs opus habet. Paulus in infantibus nihil faciendum putauit, quia mutatione ætatis ad siccum sponte sanentur. Veruntamen, si affectus magnus sit, non erunt absque remedijs infantes relinquendi; sæpe enim hoc malo quamplures ex infantibus moriuntur. Ideo cum ipsi haud omnibus medicamentis sint apti, hæc poterunt admoueri. In primis utilis erit radix pæoniæ collo suspensa. Galenus enim scribit, puerum quandam epilepticum, quoad pæoniæ radicem collo gestabat, nunquam in epilepticam accessionem incidisse: At illa sublata, subito inuasisse illum epilepsiam. Clysteres utilissime imponuntur cum decocto centaurei minoris, & oleo calido. At omnium utilissimi sunt, qui ex calido lacte cum saccharo aut melle iniiciuntur, quod plerumque à vermibus hoc malum excitetur, os ventriculi lædentibus. Oxymellis modicum in os ponere iuuat, quod crassum humorem incidat atque extenuet. Caput fricare solent leniter quidem, aut calefactis manibus, vel linteis itidem calidis: & inungere calido oleo amygdalino dulci: quandoque fricant ipsum ex pipere trito, aut ex nitro, aut euphorbio, quoad rubeat: nonnunquam adhibent vesicantia capiti, sed partibus primum extremis scilicet, cruribus, brachijsq; & tandem capiti. Qui utilissimè quoque affiguntur cucurbitulæ, & vna præsertim ad occipitium, cum flamma. At virgente occasione, nullis iuuantibus, occipitium medici inurunt, aut auro candente, aut argento, aut denique ferro itidem ignito, vlcusque diu seruant apertum, ut per ipsum caput commode expurgari queat. Marcellus Virgilius in capite de fimo, meminit unctiones, quæ in Italia circa XL. diem à partu infantium occipitio, aut inter scapulo

Aurelianus in 7. c. vi
vnt chronienrū.
80p. 4.

scapulis inferri solent candente ferramento. Cura etiam præcipue habenda erit nutricis, ut victu in primis utatur facultatis incidentis, attenuantisq; abstineat à vino, & à rebus flatuosis, caput replentibus; Nihil est magis noxium, quam nutrices uti in cibo selino, cepis, porris, & similibus. Haud erit inutile, si ex quoque aut agarico, aut turpeto, aut hiera purgabitur. At iam ad adultos homines, qui hoc malo tenentur, curandos accedimus. quorum curatio consistere visa est in sanguinis vacatione, purgatione, medicamentis alterantibus, cum interius tum exterius adhibitis. Quod pertinet ad phlebotomiam omnes quidem veteres atque recentiores medici eam esse in hoc malo moliendam, secta vena in cubito cephalica, voluerunt. Aretæus primum in cubito, mox in fronte, venam secandam meminit: & mox secandas arterias ante & post aures. Ægyptij secant arteriam frontis. Aurelianus & post primam statim accessionem, & compluribus prægressis, mittendum sanguinem censuit. Themison quoque ex Methodicis nedum phlebotomandos epilepticos censuit, sed hoc auxilium pluries reiterandum esse quoque credit. Neque dubitandum est, phlebotomiam, modo vires patiantur, vtilem esse omnibus epilepticis: quæ, ut alias meminimus, longe utilior erit existimanda, si nihil eam impedierit, atque clyster laxatorius fuerit præmissus, ipsaq; alius commodè fuerit laxata. Celsus scribit, quod ad medicum pertinet, ultimum est, iuxta talum ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitium incidere, & cucurbitulas admovere. post sanguinis euacuationem, videtur reliquum curationis in corporis purgatione cathartica molienda consistere. Vnde clysteres acres ex decocto centaurei minoris, atque colocyntidis pulpæ paratos convenire omnes ferè voluerunt. Aretæus insignes moliendas purgationes aut ex hiera, aut ex scammonio, aut ex coccognidio, aut ex similibus cathartica statuit. Paulus esse reiterandas, resectis prius corporibus, quantitatem semper augendo, statuit. Aurelianus, etiam cathartica ferè semper damnauit, atque etiam in hoc capite, contra Dogmaticos, tamen postea ita scripsit: At si non sufficiens fuerit ellebori agitatio, quam Græci sparognon vocant, & parum euentus successerit, perseverante passione, erit etiam secundo, vel tertio ellebori usus adhibendus. Quem usum paulo ante laudavit, licet postea suo more cathartica omnia damnauerit. An non ellebori albi (nam huiusce meminit) propinatio est purgatio insignis, ad quam tamen urgente occasione Aurelianus inclinavit? Praxagoras & alij vomitum ieiuno stomacho etiam laudarunt. Complures quoque diuretica, idest per urinam purgantia, cuiusmodi sunt semina apij, petroselini, fœniculi, irionis, & radix eryngij, cyperi, mei, & similia, laudarunt. Post hæc commendant ex internis scyllam, helenij radicem, pœoniæ itidem radicem, & semine, luna decrescente, collectum, lapidem pulli hirundinis. Dioscorides complura ad epilepsiam meminit; inter quæ commendavit mustelam, costam abiecto capite & pedibus; in cibis sumptam: eiusdem quoque iecur ex aqua potum; & asinum assatum in cibo sumptum; agaricum ad obolos tres ex oxymelite per aliquot dies voratum: rutam item sylvestrem: de cuius quidem usu & Aetius, & Alexâder. Trallianus mira scripserunt. Galenus leporis coagulū erui magnitudine ieiuno stomacho sumendum affirmavit. Experientia quoque cognitum est, oxymel scylliticum quotidie potum plurimum epilepticos iuvare: item mel in quo scylla liquefacta sit. Ex compositis vero laudatur ab Aretæo Mithridatium, Theriaca, antidotus Bytini. sed iam ad præsidia externa descendimus, quæ sunt plura, scilicet, inunctiones, foras, frictiones, sinapismi, stillicidia aquarum calidarum, scarificationes, cucurbitulæ, hirudines, atq; terebrationes. Aurel. laudavit inunctionem totius corporis ex oleo calido dulci, fotuumq; loco, lanis mollioribus dulci oleo calido in fufis, omnes capitis partes contendas voluit, præsertimque occipitium: capitique raso frictiones adhibendas ex nitro, ex euphorbio, atque

In lib. 1. de curat. acut. 6. a.

Lib. 1. tard. c. 4.

In 1. empir. c. 16.

In x. simplicium

Paulus lib. 3.
cap. 13.

atque ex pipere rubefacientes. Aretæus vero ad ruborem vsque ad fricandum ea put ex cantharidibus statuit; sed triduo antea lac esse bibendum, ne vis cantharidum vesicam lædat. Hinc nostri medici intelligant, haud tutum esse vesicantia ex cantharidibus externis partibus corporis adhibere, quod facultas illarum exitialis ad vesicam feratur, eamque maxime aliquando lædat. Quo haud mirum est, quosdam maligna febre vexatos, adhibitis vesicantibus ex cantharidibus, veneno ipsarum læsa vesica, interiisse. Sinapismum non pauci adhibere solent, primum ad manus & pedes, & postea capiti: sinuntque adherere nedum quo ad capitis partes rubescant, sed quoad etiam vlcerentur; seruantque vlcera diu aperta. Aquarum sponte calidarum (cuiusmodi sunt sulphureæ, bituminosæ) stillicidia per aliquot dies etiam esse molienda, Aurelianus meminit. cucurbitulæ quoque sicyæ vocatæ cum flamma appositæ capitis occipitio iuuant: cum scarificatione etiam nedum capitis tantum, sed compluribus alijs corporibus partibus esse admouendas ab omnibus medicis receptum est. Paulus primo voluit affigendas, cute, scalpello incisa, præcordijs, atque dorso; postea, purgato corpore, occipitio. Aurelianus vero occipitio, collo, vertici, & temporibus. Celsus ait: occipitium incidere atque cucurbitulam admovere, in huius affectus curatione, vltimum esse. Inuentionem quoque esse ex maximis præsidijs constat, quæ in occipitio fit. de hac Celsus: Ferro candente in occipitio quoque & infra, quæ summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, vt per ea perniciosus humor euadat; quibus si finitum malum non fuerit, prope est, vt perpetuum sit. Hanc ex veteribus Aretæus, Themison, atque ferè omnes alij olarum commendarunt. Non paucis quoque visum est, vtile illis fore os capitis perforare vsque ad secundam laminam, atque terebra nuda ossa circumcidere. Adduntur corporis exercitationes, quæ ambulatione fiunt, atque gestatione. In epilepsia vero per consensum à partibus infernis vel sint brachia, vel crura, vel pedes, vel manus, vel hypochondria post accessionem (antequam enim accessio fiat, ligare supra partem quam arctissime conuenit) hæc præsidia admoueri oportebit: primum verò mittere sanguinem, dissectis venis, aut cute scarificata. Vtile quoque erit affigere cucurbitulas sicyas cum flamma, atque etiam cum scarificatione. In iisdem partibus affectis cauterium infligere, aut sinapismum, aut vesicans medicamentum, vt vlcus fiat, diuque feruetur apertum, præstabit. Quod aut ex lepidio, aut ex flammula iouis, aut ex radicibus ranunculi, vel ex similibus commodè fieri poterit. & hæc sint de curatione istius affectus, in qua vtantur ægroti ea victus ratione, quam ad vertiginem sanandam congruam esse scripsimus.

De conuulsione. Caput VIII.

Conuulsionem totius corporis, quæ leso cerebro fit; epilepsiam dici, superiori capite dictum est, atque quomodo sanari debeat, demonstratum: Nunc vero de ea, quæ neruis musculisque contractis fit, agendum est. Passio hæc neruorum præcipue videtur, ex qua contorquentur muscoli simul cum neruis, & tendonibus, contrahunturque præter voluntatem ad suum principium, atque sanam partem secum trahunt. Quo differt à paralyfi, quoniam in hac passione nerui resoluntur, & humore flaccescunt, ita, vt concidant in partem sanam, quæ partem resolutam laxam, mollem, flaccidamque trahit. Itaque conuulsio est contractio musculorum vel plurium, vel alicuius; qui ad sua ipsorum principia contracti, partem simul, cui inferuntur, adducunt, immobilemque deinceps retinent, ita vt vel recta, vel inflexa, vel denique contorta videatur. Si caput antrosum

trorsum curuatur, & mentum annectitur pectori; duo, musculi anteriores, caput flectentes, laborant: atque hæc conuulsio emprosthotonos Græcis appellata est. Si in dorsum & scapulas caput intorqueatur, ex duodecim musculis caput extendentibus in posteriore parte colli, vel aliqui vel omnes conuellantur: hæcque eadem conuulsio Græcis dicta est opisthotonos. Tetanos autem, quando ceruix recta & immobilis manet, in neutram partem curuata: & tunc utrique musculi, & anteriores & posteriores, affecti sunt. Si oculus contorqueatur, Græcis strabismus dicitur; fitque musculis, qui illum mouent, contractis. Si mandibula eadem contrahatur, affectus fit trismus dictus, scilicet musculis temporalibus, vel neruis & secunda, & tertia coniugatione affectis. Labris vero naribusque contractis, & parte contracta sanam adducente, latus musculus, ex quo musculi narium, superciliorum, & labiorum fiunt, affectus in causa est, vel nerui affecti sunt, qui proueniunt à primis vertebra, & ramis tertiæ coniugationis: atque hic spasmus cynicus appellatur. Si utraq; pars vultus, dextra scilicet, & sinistra, lædatur, musculi utrinque contracti, maxillares nimirum, in latera os labraque deducunt, ita, ut egri perpetuo ridere videantur, spasmus (quem risum sardonium vocant) faciunt. Hos affectus hæc signa concomitantur, auctore Areteæ, scilicet, dolores omnium atroces, vox omnium flebilis: suspirant autem missantes profundius. Labor, & intentio tendonum adest, & dorsi, & musculorum, qui in maxillis, & pectore sunt: inferiorem enim maxillam superiori adeo annectunt, ut neque vectibus, aut cuneis diduci possint. Facies rubida, variegata, oculi ferme rigentes, qui circumuoluuntur; strangulatio vehemens, spiratio vitiosa, manuum crurumque distentio, musculi palpitantes, facies varijs modis distorta, buccæ & labia tremunt, maxillæ quatuntur, dentes strident, & quandoque aures mouentur, lorium aut suppressitur, aut sponte effunditur, cum vesica premitur: hæc in omnibus rigentibus conuulsisue obseruantur. Sed in tetano priuatim, totius in rectum distentio apparet, nullam prorsus in partem detorta, neque declinans: recta quoque sunt crura & manus. Opisthotonus vero retrorsum incuruat hominem, ut reflexum caput inter scapulas locetur, guttur extat, maxilla inferior plerumque dehiscit, & raro cum superiore committitur, in respirando stertunt, venter & pectus prominent, lorium his minus contineri potest, abdomen intentum est, & si percussas resonans, manus retrorsum extensione detorqueantur, crura inflectuntur: è contrario poplites vitiose curuantur. Emprosthotonus autem è contrario fit: homines enim in priorem partem contrahuntur, & conuexa quidem his terga sunt, equaliter cum parte pectoris opposita, quam metapneon Græci appellant: coxendicibus extra pulsus, dorsum totum rectum est: vertex, caputque in pectus vergunt: mentum ossibus pectoris annectitur: manus conferte sunt, & coherentes, crura exserta. Hæc signis hic affectus, priuatimque & singulæ species nobis innotescunt. Solet hoc malum (auctore Hippocrate) fieri, neruis musculisque vel repletis, vel siccatis inanitisque. Recentiores addunt tertiam causam, quam vocant materiam non proportionatam, quæ noxia qualitate cerebrum mouet in se, ut expellat, quod noxium sentit, ut dolente neruo ob puncturam, aut ob morsum venenosum. Quo pacto ex vulnere partium nervosarum homines conuellantur, maximeque membranis, aut tendonibus, aut neruis, punctis, ab ictu vehemente ceruicis, ex abortu, ex ore ventriculi, lasso ab eruginoso biliosoque humore, à moribus ferè venenatis, à vermibus, fungis, & similibus. Nerui musculique replentur, aut spiritu aereque crasso & frigido, aut à frigido humore, aut etiam à sanguine: unde qui crapulis, ebrietatibusque incumbunt, huic malosis obnoxij. Secantur itidem nerui musculique aut ex vulnere, aut ex phlegmone membranarum ac neruorum, ex febre ardens, atque ex immoderatis euacuationibus vel sanguinis, vel excrementorum. Passio stricturne, ex quavis causa oboritur

oboriatur, existit, & quidem magnæ stricturæ, quæ celerrimè aut necat, aut non facilis sanatu est. Quæ ex vulneribus, ex abortu in mulieribus, ex febris ardentibus, aut ex inflammationibus, nervosis partibus vehementer siccatis, sunt, prorsus insanabiles existunt; & si quampiam sanationem egroti sperare poterit ex laxatorijs extrinsecus admotis medicamentis illud assequantur. Febris, si superueniat spasmò à repletis, vel congelatis, refrigeratisue nervis oborto, vtilis erit, quòd calfaciendo siccet. Vnde Hippocrates ait: Melius esse si spasmò superueniat febris, quam eam subsequatur. Cæterum, vt ad particularia descendamus, in omni rigoris specie siue tetanus, siue emprosthotonus, siue opisthotonus sit, statim, præmisso clystere molli, phlebotomia est facienda, si vires eam patiantur. hoc genus præsidij omnes laudarunt, Paulusque, & alij veteres medici, ne dum per venam sectam; sed etiam adhibitis cum scarificatione cucurbitulis sanguinis largam euacuationem, modo vires permittant, esse faciendam voluerunt; non tamen conferunt totam sanguinis educationem, ne vires collabantur, sed per vices esse molendam. Cucurbitulas vero ceruici, spinæ, pectori, vbi pectus est musculosius, præcordijs, & aliquando renum, & vesicæ regioni adhibendæ erunt. Vtilissimi sunt clysteres & molles, & purgatorii laxantes, si saltem alternis diebus exhibeantur. Posthæc partes conuulsæ lanis mollibus ex oleo calido, castoreoque imbutis contegantur; musculorumque tendonibus vesica oleo calido dulci semiplena pro calido fotu erit adhibenda: aut forus ex chamæmeli, rutæ, althææ, fœnugræci, castorei decocto paratus iisdem partibus erit adhibendus. Ratio vero fouendi huiusmodi erit: tendonibus, resupinato ægro, fomenta vsq; ad verticem subijcienda sunt: vterius verò ad synciput non procedito. Inunctiones quoque ex calido oleo dulci, aut hydrelæo, aut ex oleo, in quo castoreum, vel euphorbium, vel nitrum, vel denique pyretrum fuerit dissolutum. Cataplasmata itidem ex radice althææ, ruta, manna thuris, polij coma, resina pini, & terebinthina, cum oleis prædictis; & ex althææ radice in mulla decocta parantur. Quid si modicum castorei permixtum sit, adhuc magis ipsorum vsus proderit. Tandem complura sunt, quæ per os (modo fieri commodè queat) vtilissime exhiberi solent. Dioscorides memorat pulegium cum sale & melicrato; Iridis radicem ad 3, ij ex aceto epotam; myrrham fabæ magnitudine; laser erui itidem magnitudine aut cum biscocto melle illitum, aut ceræ inuolutum voratum conferre: ammoniacum itidem erui magnitudine; Inter omnia verò castoreum expeditissimum est, si eius duo vel tria cochlearia (vt inquit Paulus) parita ipsius quantitate & per vices exhibeantur. Dioscorides vero scribit, castoreum omnium maxime efficax esse, si tritum cochlearis mensura exhibeatur. At hæc sufficiant de medicamentis ad conuulsionem. Quibus hæc adhibentur ex laxatorijs, ad conuulsas partes siccatis nervis partibusque nervosis, scilicet, exterius inunctiones & insectiones in oleo dulci calido: fomenta, ex decocto maluarum, althææ, fœnugræci, lini, seminum cytoniorum, & similibus; balneum itidem ex aqua dulci calida atque lauacrum: emplastra etiam huiusce generis: Interius verò cum cibis liquidus, calidus, & humidus; tum decocta ex suprædictis herbis, & seminibus parata; tum oleum dulce, tum hydrelæum calidum; tum clysteres omnes molles, laxatoriiue.

De tremore.

Caput IX.

Conuulsioni similis affectio est, quam tremorem appellant, atque ab iisdem ferè causis oritur, idemq; ferè iudicium, atque curationem habet. Passioq; stricturæ existit, quæ & ipsa laxatorijs medicamentis tollitur (si initio recte tractetur à medico) curationique cedit. quæ vero aliquandiu neglecta, & parui fuerit

fuerit æstimata, potissimumq; in senibus, minimè sanatur. Oritur enim à neruorum imbecillitate quocumq; modo facta, scilicet, cum facultas mouens per ipsos quidem neruos aut frigiditate densatos, aut ab humore obstructos, liberè minime transit, uerum multo paucior, quàm par sit ad rectè mouendas partes; aut cum sufficienter non defuit ex cerebro, quoniam hoc admodum refrigerato, in solita copia minimè suppeditari potest: unde, quæ per neruos delabitur, exigua est, & debilior, quàm ad mouendum esse debeat. Quæ possunt huic affectui fauere sunt ea quidem omnia, quæ possunt cerebrum refrigerare, atque labefactare, cuiusmodi est aeris summa frigiditas, vel potio frigida, aut uinum ex gelu vel ex niue immoderatus refrigeratum, & ipsum quoque generosum liberalibus, immoderatusque eorum, immodica uenus, crapula, otium, & similia. Cæterum in hunc affectum incidunt homines non raro vel ab ardentibus febribus, vel à phlegmonis membranarum cerebri admodum exsiccati. Qua causa iisdem præfidijs tremantes curandi, quibus & conuulsi, hoc excepto, quod in tremore non semper sanguis sit mittendus: præstabunt purgationes aut ex agarico, aut ex colocynthidis pulpa, aut ex turpero, aut ex iisdem medicamentis cathartici paratæ, ut ex alijs etiam simplicibus compositæ, cuiusmodi est hiera dyacolocynthidos, pilulæ cocchiæ vocatæ, sætidæ, & his similia medicamenta cathartica. Exterius inunctiones ex oleis calidis, emplastra, cucurbitulæ cum flamma à priori vertebra spinæ ad lumbos usque. Quæ & capiti erunt adhibenda; occipitioq; præsertim. Ad affectum hunc etiam inunctiones laudantur. Sed qui hoc vitio vexatur, optima victus ratione uti debet: & inter cætera parcè uiuat, caueatque à prauis cibis, ut sunt legumina, pisces, caro porcina, ouina, bouina: Lacticinia omnia fugienda, atque omnium maxime à uinis generosis abstineat, uinoque paucifero sobriè utatur. Venus denique est cauenda.

De mania, seu furore sanando. Cap. X.

MAniam Græcè dictam Latini insaniam, amentiam, desipientiamue cum furore appellant: quòd nimirum hoc malo detenti, ferarum instar, effrenes reddantur, atque furiant. Distinguuntur tamen à phreniticis febre, quæ assidue phreniticos tenet: maniacy autem non feбриunt. Hi uerò amentium, desipientium, vel delirantium genere comprehenduntur, sed tamen ab his maniacy differunt, quia præterquam quod delirant, etiam, instar ferarum, furiant, atque effrenes redduntur. Primum desipere seu delirare deprehenduntur, quoniam (ut Galenus docuit) loquuntur aguntq; nihil rationi consentaneum, aut multa præter consuetudinem, etsi in quibusdam sapientes videantur. Præterea homines amentes dicuntur, qui solitis sensibus absq; causa defecerunt, vel ijs præter consuetudinem utuntur, aut demum, qui aliqua ex uoluntarijs actionibus, carent, vel abutuntur. Quare merito auctor Coacorum præfagiorum inquit: Facere quid præter consuetudinem, ueluti instituire, uelleq; ea, quæ prius non consueueras, aut contrarium ijs, quæ fuerint consueta, malum, & proximum dementiae. Qui itaq; amentiam patiuntur, seu desipiunt, delirantue cum animi motu, vel furore, maniacy, insani atque fures merito dicuntur. Nonnullis uero differentijs hi inuicem distingui solent: siquidem alij cum risu delirant, utpote qui ex sanguine hoc malum habuerunt; alij cum rixa, & iracundia, qui ex bile flaua incidunt in hanc passionem, alij cum furore & ferocitate, cum hoc malum sit ex flaua bile exusta caloris incendio, atq; ad atram accedente, hancque amentiam manioden & tyrioden Græci, nostri autem ferocem, furiosam, ac ferinam, dixerunt. Demum alij cum timore & tristitia desipiunt, scilicet ex melancholico humore

U in hunc

in hunc affectum prouecti. Quæ melancholica amentia duplex obseruatur: Vna enim, quæ ab humore melancholico nondum putri reddito, orta est, absque tumultu sit; altera verò cum tumultu agitationeque & ferocitate obseruatur, quipè quæ aut à melancholia putrefacta, aut à bile flaua exusta, in atramque mutata, excitatur. Hinc nonnulli ex antiquis, qui de hoc affectu scripserunt, melancholicam insaniam, sub capite de mania, seu de furore, merito comprehendisse videntur: Cuiusmodi fuerunt Aurelianus, Aretæus, Paulus, atque alij, qui vel sub melancholia furorem, vel sub furore melancholiam comprehenderunt. At maniam præcedere solent capitis debilitas, tinnitus aurium, splendoresque oculis obuersantur, curaque sibi inuicem succedentes, eos turbant, grauedo capitis, somni turbati, atque pauci, aut assidue vigiliæ, animi anxietas, iactatio, oculorum frequens palpebratio, cordis saltus, tremor, & similia, cum paraphrenesi, aut leui desipientia. In hac verò passione perfecta, absolutaue signa apparent amentia, cum motu, & agitatione vehementi. Vbi verò sanguinis haud corrupti copia cerebrum obsidens maniam facit, hæc similis est ieiunio, quæ in ebrijs obseruatur: homines enim cum risu (ut expressit Hippocrates) insaniunt, canentes, aut loquentes, exclamant, atque exiliunt, ridiculis quibusdam ante oculos obuersantibus. Si vero bilis flaua, vel sanguini mixta, cerebrum eiusque membranas stimulat, diuexatque insani ad iram atque ad excandescentiam proueniunt, quo iracundi ac feroces euadunt. Quod si eadem bilis incendio caloris exusta, retorridaue, in atram mutata, cerebrum eiusque membranas inuadat, aut eiusdem vapores inflamment, mordicent, diuellantque easdem membranas cerebri, ferinum delirium oboritur: ex quo homines exclamant, exiliunt, calcitrant, pedibus manibusque feriunt, mordicus impetunt, maximeque excandescunt, omnes quibus occurrunt tanquam hostes habentes, atque ubi insania vehementer aucta sit, hanc Græci tyrioden appellant: in hac ingentia quæuis mala maniaci perpetrant. Eadem symptomata apparent etiam ex humore melancholico vehementer putrefacto; sed cum ijs adest quoque timor cum mæstitia: vnde isti melancholici furentes præ timore plerumque se ex præaltis locis præcipitant, atque ira moriuntur. Qua morte Franciscus à ponte olim pictor excellentissimus, atque Delphinus à Como, ambo Bassanenenses præteritis annis interierunt. Qui vero ex melancholico humore haud putrefacto insaniunt, aut ex vapore aliquo tetro ex hypochondrijs in cerebrum sublato, timore ac mæstitia absque causa assidue diuexantur. Vnde recte inquit Hippocrates: si timor & mæstitia diu absque causa perseuerauerint, melancholicum symptoma est. Aurelianus ait hæc signa melancholicos concomitari, scilicet animi anxietatem, cum mæstitudine, silentio, atque odio cohuiuentium: sequitur etiam nunc viuendi, & nunc moriendi cupido, cum suspicionibus veluti insidiarum sibi ipsis paratarum: inanes fletus fiunt; murmura vacua sentiunt; hilaritas magis post cibum: hypochondriorum inflatio cum frigore articulorum, & leui sudore, stomachique vel oris ventris morfu vsque ad intercapulas. Atque hisce signis nobis omnes mania differentia probe innotescunt. In hac passione aut primario affectu, aut per consensum ex infernis partibus cerebrum cum membranis ipsius læditur, aut à sanguine non putri, aut putri mixto cum bile flaua, aut ex eadem bile non putrida, vel putrida, atque exusta, tum etiam ab humore melancholico putri reddito. Accedit etiam eandem passionem quandoque fieri à vaporibus calidis, mordacibusque ex infernis partibus ad caput subuectis, cerebrum atque eius membranas calfacientibus, mordentibusque. Ex Methodicis antiquis Mnaseus, & qui ipsum insectati fuerunt, putarunt furorem seu maniam esse morbum laxum, quod & animi passio videatur, atque huiusmodi passionem Græci diachisin appellarint, scilicet animi laxationem, seu diffusionem. Quam opinionem doctè sanè reprehendit Aurelianus, meritoque statuit esse stricturæ passionem.

In 6. aphor. 53.

passionemque furentem strictura affici, præsertimque in ipso capite. Quod malum, ni subito probis medicaminibus tollatur, habituatur, atque insanabile redditur. Itaque laxatorijs præsidij ad ipsius curationem erit opus: & maioribus quoque, cum morbus adstrictus sit & magnus. Itaque conueniet primum sanguinis vacuatio tum per venam sectam cubiti dextri internam, tum per cephalicam, tum etiam ex venis frontis sectis molienda est. Complures sunt, qui sola sanguinis vacuatione per venam sectam ab insania euaserunt: magnum enim in his morbis præsidium laxatorium est sanguinis euacuatio, tum per venam sectam, tum cruribus antiquorum modo scarificatis, tum sanguisugis primum hæmorrhoidibus adhibitis, præsertimque si à suppressis hæmorrhoidibus hæc passio eos inuaserit, atque postea capitis partibus, potissimumque venis retro aures positis. sæpe enim repetitam huiusmodi vacuationem plurimum prodesse longa experientia deprehensum est. Aurelianus ait: cucurbitulas cum scarificatione primo esse adhibendas præcordijs, & inter scapulis (quas Græci metaphrenon vocant) deinde occipitio, vertici, atque temporibus capitis. Præstabit tamen, antequam sanguinis perficiatureductio, clysterem mollem laxatorium, ad aluum prælaxandam, præmitti, vel medicamentum ex leniter laxatorijs, cuiusmodi (exempli gratia) erit, si exhibebitur cassia cathartica, ad unciam & semis: vel manna calabra ad uncias tres, vel syrupus rosaceus laxatiuus ad uncias quatuor, cum feri lactis capilli probè claresacti libris quatuor. At corpore prius medicamentis vulgo præparantibus dictis fluido facto, iuxta Hippocratis præceptum, vsum habebunt ventrisflua eductoria, cæliotica Græcis dicta, utpote quæ ex elleboro nigro, Melampodio olim (quod Melampodius pastor eo pratidas furentes, ut Plinius est auctor, sanauerit) nuncupato, aut ex scammonio, aut ex colocynthide, aut coccognidio, aut denique etiam ex veratro albo ad purgandum per vomitum; à quo quidem catharticorum omnium maximo haud abhorruit etiam Aurelianus inter Methodicos, qui non semel, si sit opus, sed sæpius per intervalla temporum esse exhibendum statuit. Quibus magnis laxatorijs præmissis, atque, ut opus est, reiteratis, conuenient capiti raso epithemata ex aquis frigidis actu tamen calidis adhibitis: lotiones item ex dulci aqua, in qua malua althæa, hordeum, atque chamæmelum ebullierint, conuenient, scilicet capitis, manuum, atque pedum. Nihil verò vtilius ad eos sanandos erit, quam si per plures dies maniaci stillicidio aquæ dulcis fluuialis tepide ad capitis futuram coronalem vtentur; simulque etiam eodem tempore in aquam eandem tepidam toto corpore, capite excepto, immersi per horam manserint. Hoc stillicidium, inquam, atque balneum bis in die, ante cibum, per horam integram & plus erit continuandum. Eo namque solo præsidio complures insanos atque melancholicos breui tempore sanauimus, atque hoc est ex vtilissimis laxatorijs præsidij ad huius mali curationem facientibus. Themison iridem & alij maxime lauacrum laudarunt. Aurelianus denique embasim ex oleo dulci cum althææ decocto factam commendauit. Veteres medici etiam diuretica, quæ per vrinam vacuando laxant, proposuerunt: cuiusmodi erit lac quod ex seminibus melonis, cucumeris, althææ, maluæ, portulacæ, petroselinij, erisymi, atque apij, cum aqua hordeacea contritis exprimitur, datur ad semilibram hoc vreticum mane per quatuor horas ante prandium: etenim medicamenta illa, è quibus paratur, euacuant humorem biliosum per urinam. Aurelianus iridem leni cum frictione totum corpus perungendum voluit: & cataplasmata ex laxatorijs medicamentis, præcordijs calida adhibenda. Addidit, motum esse vtilem, qui sit maniactis gestatis in gestatoria sella, aut in vehiculo, & postea, fortificato corpore, cogendos in deambulationem, vocisque exercitium, quod Græci anaphonesim appellant, descendere. Congruunt quoque colloquia amicorum, discursus, lectiones, disputationes, & similia, de quibus Aurelianus

V u a relianus

relianus accuratissimè scripsit. Asclepiades cantilenas laudauit; insanos verò flagellandos & vinculis coercendos esse summa prudentia existimauit. Alij esse vino inebriandos; alijque in amorem seu in venerem persuadendos. Demum affectu perseverante ad cauterium occipitio, & sincipiti, infligendum, atque ad trepanum vsque confugerunt.

De Melancholia. Caput XI.

In lib. 3. cap. 5.

Melancholia ab humore melancholico, vel, ut plerisque visum est, quod ab eo humore melancholica insania fiat, aut, ut Aureliano placuit, quia in hoc affectu sæpe nigra bilis per vomitum excernitur. Est enim melancholia, ut Paulus scribit, quædam mentis alienatio sine febre, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentem occupauerit. Aretæus inquit, melancholiam esse animi angorem in vna cogitatione defixum atque inhærentem absque febre. Hippocrates addidit, cum timore & mæstitia absque causa. Id proprij habent melancholici, quod omnibus imaginatio ab humore, vel à vapore melancholico vitietur, lædaturque. Etenim hi plerumq; falsis imaginationibus, cum timore atque mæstitia, defixi diuexantur. Varij vero corruptæ imaginationis modi, innumeriq; propemodum existunt: etenim plerumq; fit, ut circa illud obiectum quod (quo tempore imaginatrix facultas à morbo incipit vitari) in ipsa residet, & cum ipsa familiarius & frequentius versatur, sit melancholicorum angor, timorque, & mæstitia, qua vitata cogitatione defixi atque decepti mente aberrant. Nonnulli fuerunt, qui cum aquam bibissent, atque in ea forte serpentem vidissent, statim vitata imaginatione putarunt, se serpentem bibisse: alij (quos nos sanauimus) eodem modo ranas se bibisse, easq; in stomacho auctas alias peperisse, ab ipsisq; & præsertim ipsarum vocibus, plurimum molestiæ accipere mordicus affirmabāt. Alij cum forte (quo tempore melancholiæ morbus incipiebat) vel cadauer absq; capite, vel ligneam aut marmoream statuam inspexissent, inde se & ipsos quoque capite destitutos existimarunt. Ceterum innumeræ ferme, ut diximus, in melancholicis corruptæ imaginationes, in numerique imaginandi modi obseruantur: quorum sanè singulorum si rationem habere vellemus, nihil aliud profecto esset, quam velle cum ipsis vnâ insanire, siquidem monstruosa quamplura sint, quæ cogitant, & imaginantur. Quarum profecto vitatarum imaginationum exactam rationem haberi posse, haud est possibile. Signa verò, quibus melancholici deprehenduntur, complura existunt; propria tamen, patognomonica Græcis vocata, sunt, ut timeant, atque mæstitia absque causa afficiantur, causaque ipsorum & mæstitiæ & timoris est defixa cogitatio, seu imaginatio vitata: inania enim & falsa timent, atque ab ijs mærore afficiuntur. vnde perpetuo angorem in animo tenent defixum, ut Aretæus recte expressit, atque inhærentem vitatæ cogitationi. id vero absq; febre patiuntur. Pars affecta in melancholia, ut recentiores cognouerunt, est cerebrum, quod mens in eo residens turbetur. Hoc vero aut per se patitur, scilicet morbo in capite existente, ex atra bile in eodem capite genita; aut per consensum, ex vniuerso corpore, aut ex præcordijs capiti humoribus vel vaporibus attris sumministratis, in ipsumque subuectis. Ex hypochondrijs melancholiæ signa sunt, quia præterquam quod melancholicum animi angorem patiuntur, timentque & formidant etiam, quæ non sunt timenda, & citra occasionem mæstitia quoque anguntur, de stomacho conqueruntur, cruditates, acidosque ructus patiuntur, aliquando ardor siue æstuatio hypochondriorum adest, præcordia sursum conuelluntur, interim phlogosi quadam diuexantur, vnde nonnunquam leuiter sudant, & aliquantulum refrigescunt. A quibus quidem symptomatibus concoctione

concoctione leuantur, aut alui excretionem, vel multis flatibus excretis, vel vomitu, vel denique ruſtibus editis. Nonnulli veterum, vt Diocles, in quendam pylori affectum inflammationi perſimilem hanc paſſionem retulerunt, quo venæ calidiores redditæ humore crudo à ſtomacho intempeſtiue attracto obſtruuntur; qua obſtructione, calore transpirare, humoreque moueri, ventillariue nequeuntibus, fit quædam in ijs venis alteratio, agitatioque ac veluti etiam exinde à calore fere igneo ſemiputrefactio, ex qua vapores excitantur calidi, acres, aduſti; ex quibus iuxta varias corporis partes, in quas ab hypochondrijs attolluntur, variæ paſſiones oriuntur: ſi ad caput ferantur, mentem turbant, melancholiamque homini inducunt: ſi ventriculos cerebri impetant, epilepſiam; ſi principium neruorum, ſpaſmum itidem, vel tremorem faciunt: ſi regionem cordis inuadant, palpitacionem, & tremorem eiſdem viſceris; ſi ſtomachum ſeu os ventriculi, cardiogmon, id eſt cordis morſum, faſtidium, & non raro ſincopen creant. Atque hæc melancholiæ ab hypochondrijs generatæ erit ratio: quibuſque ſignis etiam innoteſcat, nuperrime dictum eſt. Eadem paſſio aliquando fit, cum bilis à ſolis calore aut ab aſſidujs vigilijs, curis, ſtudio, & ſimilibus cauſis in capite vratur, atque in nigram mutatur: qua cerebro læſo, melancholia itidem excitatur, in qua pauca vel nulla ex ijs ſignis, quæ ſtatuofam, ſeu hypochondriacam melancholiam concomitantur, apparent; ſed prægreſſæ dicuntur cauſæ antecedentes, a quibus ſanguis atque bilis flaua uſtione caloris in nigram mutari potuit. Demum aliquando humor melancholicus, nigraue bilis in toto corpore abundans ſcilicet, in hepate ob caloris incendium uſto ſanguine genita, in caput ſubuehitur, inſaniamque melancholicam inducit: hocq; facile deprehenderetur, præfert. ex cauſis antecedentibus, vrendi ſanguinem facultate præditis, vt eſtius calor, cura, triſtitia & ſimilia. Accedit etiam totius corporis temperamentum calidum ſiccum, habitus gracilis, & ſqualidus cum colore obſcureſcente. Hæc paſſio itidem ſtricturæ & magnæ etiam ſtricturæ eſt: quare Melancholici magno cum animi tum maxime corporis laxamento opus habent; eademque ferè ex laxatorijs præſidijs ad curationem uſui venient, quæ inſanis, ſurentibuſque conducere diximus. Nos, melancholicos omnes, qui nobis in principio curandi occurrerunt, probè & breuiter ſanauimus: primò in victu ptiſanam hordeaceam toto illo tempore inſtituimus, oua gallinarum ſorbilia, carnem pullorum gallinaceorum, vel vitulinam, aut hedinam, elixam, non aſſam, parçè tamen exhibentes. Vini loco aquam hordeaceam tepidam cum ſyrupo boraginato, aut violato, aut ſimilibus conſeruis ſaccharo conditis, pro potu dedimus. Pro medicamentiſ primùm medicamentum laxatorium exhibuimus, cuiuſmodi eſt, quod ex ſyrupo roſaceo laxatiuo ad vncias quatuor atque ex ſeri lactis caprilli libris tribus, vel quatuor, paratur: aut quod (exempli gratia) accipit ſyrupi de polypodio compoſiti vncias quatuor, & addita decoctione florum & fructuum cordialium cum modico ſenè, atque epithymi fit potio; aut quod recipit electuarij lenitiui vnciam & ſemis, conſectionis hamech 3. ij. quæ miſcentur, vt ſiant boli: aut clyſterem laxatorium atque mollem injici curauimus. Altera die, modo vires ſerant, primum ex ſecta vena iecoraria dextri cubiti (niſi in regione lienis ſit vel dolor, vel tumor) ſanguinis educationem inſtituere; deinde è cephalica, tertio ex incifa vena frontis eandem repetere: demum vt hæmorrhoides, ſi fuerint ſuppreſſæ, ſanguifugis iterum aperiantur, ac reſtituantur conſulere ſolemus. Quantitas ſanguinis detrahi conſuevit per vices modica. Aliquando etiam, ſecta interna quoq; ſiniſtri cubiti, educationem ſanguinis repetiuimus, potiffimum, vt etiam dictum eſt, vbi lien iſtius affectus cauſam habuerit. Complures veterum medicorum conſueuerunt tandem ſanguinem mittere cucurbitulis cum ſcarificatione affixis primo iecori, ventriculo aut eiſ ori, atque inter ſcapulas. At in molienda hac ſanguinis euacuatione

cuatione, vires quantum ferant, semper accuratè considerandum erit. In iuue-
 nibus, virisque robustis toties sanguinis eductionem repetiimus: mox, corpore
 tum cibus, tum quiete octo aut plurium dierum recreato, atque interim humo-
 ribus decocto quodam singulo mane propinato ad vncias quatuor, cum syrupi
 violati, aut borraginati, aut de soncho ad sesqui vnciam paratis, ad electiuum
 laxatorium progressi sumus. Decoctum vero præparans paratur in iure pulli gal-
 linæ, linacei iuuenis sine sale, in quo ebullierunt, flores boraginis, buglossi, fumiter-
 ræ, violarum, & folia boraginis, sonchi, lupulorum, endiuæ, melissæ, epithymi.
 Quo toties, vt diximus, ebibito, dedimus aut confectiois Hamech semunciam,
 cum syrupi rosati laxatiui vnc. iij. & cum decoctione supra dicta; quamvis loco
 syrupi laxatiui vncia diacatholiconis, aut electuarii lenitiui dari possit. Quo
 medicamento corpore laxato, per plures dies vtendum erit balneo ex aqua dul-
 citepida fluuiatili, si haberi potest; atque stillicidio ex eadem aqua, supra su-
 turam coronalem, bis in die, ante cibum, horæ ad minus spacio: debent (in-
 quam) egroti eodem tempore & vt stillicidio, & in balneo prædicto manere,
 toto corpore, capite excepto, immersi. Galenus quoque affirmavit se complures
 sola humida victus ratione, & balneis prædictis, à melancholica passione libe-
 rasse. sed interim opus erit solertium medicorum prudentia, vt melancholicos
 decipiant, quomodo vñ fuerunt aliqui, in quibusdam, qui existimarunt, se vel
 serpentem, vel simile quippiam deuorasse: Clam enim in excretis aut per vomitum
 aut per aluum excrementis serpente aut rana suppositis, ac postea melan-
 cholicis ostensis, eam falsam opinionem imaginationemque, ob quam ipsorum
 animus angebatur, ex animo prorsus eruerunt. Simili artificio ij qui sine capi-
 te se esse affirmabant, pileo magno plumbeo capiti superposito, se caput habere
 cognouerunt. Atque alij alijs modis à Medicis decepti, citra medicamenta
 à melancholica infania liberati fuerunt. Complures veterum, facta euacuatione
 sanguinis, purgationem cathartici facientiam, vt etiam dictum est, voluerunt
 scilicet elleboro nigro, epithymo, Thymo, colocynthide, vel etiam, passione non
 cedente, veratro albo: quod tamen non nisi in robustis, neque sine diligenti (vt
 Aretæus expressit) corporis, humorumque præparatione, vt vomitioni vomitu-
 ros assuefaciant, atque etiam humores fluxiles reddant, Medici vsurpare debent.
 Paulus atque alij exhibebant succum absynthij per plures dies à minima portio-
 ne inchoantes, ascendentesque ad geminas vsque drachmas singuloque mane
 ex aqua exhibebant, vel eiusdem herbæ decoctum ad vncias quatuor: quod me-
 dicamentum magis conducit illis, si vnà & ructus acidos, & cruditates patian-
 tur, flatibusque in hypochondrijs abundant. Quibus summo opere conducent
 stillicidia ad stomachum, atque ad sinistrum hypochondrium ex oleo chamæme-
 lino, anethino, amygdalino dulci, aut de mentha, aut ex pluribus mixtis, ca-
 lidisque ex alto ad stomachum, hypochondriumque stillicidij modo cadenti-
 bus; aut ex aquis sponte nascentibus, aut bituminosis aut sulphureis; aut ex
 decocto chamæmeli, althææ, betonicæ, seminum lini, feniculorum, parato stil-
 licidio. Ad easdem quoque partes, si flatibus distendantur, aut aliquomodo do-
 leant, vtilissimum erit, si cucurbitula magna, cum flamma, aut plures affigan-
 tur: etenim calore eas partes roborant, flatibusque & humores egregiè digerunt,
 eaque ratione causam, & materiam huius passionis. Aliqui ad eos melanco-
 licos, qui prædictis auxilijs medicis pristinè prudentiæ minime restituuntur, ad
 vsu fonticulorum cum in cruribus tum in brachijs tanquam ad sacram ancho-
 ram confugiunt. Atque hæc de melancholicorum curatione dicta sint.

De iussu

Tussis symptoma est facultatis expultricis partium respiratori feruentium, potissimumque pulmonum, tracheæ arteriæ, thoracis, pleuræ membranæ, diaphragmatis. Etenim eo motu partes thoracis conantur expellere quod noxium est, non secus quam cerebrum sternutamento, & stomachus uomitione humores molestos rejciunt, propelluntque. Huius verò passionis, scilicet tussis, causæ complures sunt, quippè (vt Dogmatici docent) caliditas, vt in febribus hecticis, frigiditas, vt in aquilonari constitutione hyeme vigente, humor aut infarctus in pulmonibus, aut in eos ex vicinis partibus resudans, tum ex phlegmone pleuræ membranæ, vel diaphragmatis, vel alterius thoracis partis; tum ex vomica, nonnunquam per tussim diurnam veluti grandines quædam excretæ sunt: & aliquando calculus magnus, quo excreto, tussis statim desijt. Deniq; humor tussim excitans ex capite frequentissimè distillat in pulmones, aut in tracheam arteriam. Cæterum si humor distillans ex capite (Paulo auctore) in nares decumbat, affectum facit, qui Græcis *κρυεζα*, & Latinis grauedo dicitur: si in fauces & palatum, Græcis *κατάρρεον* & nostris destillationem vocatam inducit, si guttur & asperam arteriam, vt etiam membranam internam, quæ hanc integit, exasperauerit, *βρογχον* & *ασθματικον* Græcis iidem vocatum, atque latinis vocis rauitatem; Demum si in asperam arteriam, & in pulmones fluxio irruat, tussim excitat. Quæ aut sicca est, idest absque sputis, vt in hecticis apparet: vel humida, quippè cum sputis. hæc iterum, si ex pituita viscida & lenta fiat, vel infarcta pulmonum cavitatibus, vel ex capite decumbente, magna est: magna iidem existit, sed admodum molesta, si ex destillatione humoris tenuis fiat: etenim propter substantiæ tenuitatem humor ægerimè expellitur, vnde magnis conatibus contendit natura, vt cum humorem propellat. Parua vero tussicula fit, sed (vt aiunt) ferina, quæ ab humore vel acris, vel falso excitatur, diuturna que, nisi statim tollatur, euadit, phthisis nuncia. Eodem modo arteria vlcerata tussicula inducitur, quæ etiam in tabem, ni citò medicamentis conualescat, homines deducit. Quæ humorum in pulmones decubitu fit, hisce signis innotescit: sentiunt enim in thorace grauedinem, cum vehemente tussicula, si humor, vt dictum est, acris vel falsus sit; vbi autem pituitosus, magna est, cum sputis humorem ex capite delabentem colore atque substantia deuotantibus; difficulter respirant, cum vocis obtusione, & vomitu cibi, qui à tussis vehementia excitatur. nonnunquam adest quoque febricula, præsertim si humor decumbens sit calidus, scilicet acris, vel amarus, vel falsus. Hasque tussis ferinas vocant, phthisis prænuncias: Atque tot modis homines tussi vexari solent, atque ab ijs causis, quas adduximus. Cæterum his præmissis, an hæc passio stricturæ vel solutionis sit, uel mixta potius ex strictura & laxitate, uidendum est. Certe non possum non uehementer admirari Themisonem atque Thesalum præcipuos Methodicæ sectæ & fautores & auctores uoluisse (si tamen Aureliano credendum sit, qui de ipsis hoc affirmauit) tussim esse morbum laxum, fieriq; solutione, eo præsertim argumento, quòd cum tussi humores copiosius excernantur. Quod tamen maxime à ueritate uidetur alienum. Neque enim qualibet purgatio aut euacuatio morbum laxum facit; at illa solummodo, quæ cum immoderata sit, vires maxime resoluit, atque corporis actiones lædit: siquidem nulla euacuatio vel purgatio humoris vel sanguinis moderata, quæ corpus non lædit, morbum laxum inducit. Contra verò, vbi humores vel sanguis ita immoderate profluant, vt ista fluxio corpus & lædat & vires maxime dissipet, ac resoluat (cuiusmodi est immoderata hæmorrhagia vel per vomitum, vel per tussim sanguis immoderatus profluens, vel hæmorrhoidum, vel menstruorum insignis profluuium)

profluuium) profluentem laxamue passionem inducit. Vnde he' quidem euacuationes, quod naturam manifeste lœdant, morbi laxi dicuntur. De qua re accuratè scripsimus superius in libro secundo. Hinc etiam cum Mnasea, & Sorano, Aurelianus videtur dampnandus, qui tussim humidam affectum mixtum esse voluit ex laxo atque adstricto: cum nullo modo facta cum tussi excretio per spura, solutionem seu laxitatem denotare queat: cum moderata sit, minimeq; corpus offendar. Etenim necessariò vt euacuationes per tussim morbi sint, hominis tussientis corpus grauiter lœdere debebunt. cum verò excretio in tussi (modo immoderata non sit) corpus non lœdat, quomodo ipsam solutionem facere poterimus? Quare rectius, vt credidimus, tussis stricturæ magis, quam solutionis passio erit: vt humor intus pulmonum cauitatibus infarctus, dolor thoracis, grauitas, & dispnœa, febris, atque similia maximè decernant. Vnde laxatorijs medicamentis, vt tollatur, opus erit. Inter quæ primum locum habebit sanguinis euacuatio è sexta dextri cubiti vena interna: quam eductionem præcedet aut clyster mollis laxatorius, aut medicamentum leniens, quo leniter alius laxetur. huiusmodi erit, quod accipiet, exempli gratia, pulpæ cassiæ Abissinæ vnciam & semis, sacchari candidi puluerizati vnciam semis; aut Cassiæ supradictæ vnciam, & mannæ calabræ vncias duas, cum saccharo supradicto fiant boli: aut dabitur in portione medicamentum, quod aqua cum rebus pectoralibus, decocta dissolutus, nimirum, si accipias mannæ calabræ vncias duas, syrui violati laxatiui vncias tres: aut syrui laxatiui vnc. iij, mannæ electæ vnc. ij. & cum prædicta portione dissoluas. parabitur vero decoctum, accipiendo foliorum tussilaginis, capillorum veneris, pulmonariæ recentis, althææ, florum violarum, borraginis, an. pug. ij. Iuiubas maturas, siccas, pruna sebestena, num. x. passularum dulcium sine vmaceis, hordei mundi, seminum fenugræci an. vnc. med. radices glycyrrhizæ contusæ, radices althææ an. vnc. f. bulliant in sufficienti quantitate aquæ ad consumptionem tertiæ partis. atque hac decoctione pharmaca laxatoria in tussientibus propinanda, dissoluentur. Hoc etiam decoctum plurimum iuuabit tussientes, si quotidie, ad semilibram, calidum, mane, antecibus, cum mellis modico, assumatur. Quod longe efficacius tussim vel èt antiquam compescet, si addita sit vncia radices iridis siccæ, minutim incise, & cum prædictis decoctæ. Mastahaleb Egyptiorum vocata potio tussientibus maxime utilis est, quæ paratur, accipiendo seminum maluarum, althææ, fenugræci, vrticæ, feniculorum dulcium, an. vnc. med. radices glycyrrhizæ rasæ, althææ, caulium althææ siccatiorum, hordei mundi, passularum sine vinaceis, an. vnc. i. iuiubarum, sebesten an. nu. x. Macerentur per noctem in aquæ fontanæ libris quinque, & postea bulliant, quousque ad tertia pars fuerit absorpta; expressioni adde mellis optimi despumati vncias quatuor, & iterum modice ebulliant: singulo mane semilibra calidi huius decocti propinabitur. Longè plura mastahaleb ad tussim accommodata fuere in libris de medicina Egyptiorum à nobis perscripta. Quæ medicinæ studiosi habebunt in libris secunda editione cum additionibus imprimendis. Aliqui exhibent, pro singulari medicamento, singulo mane, calidum, quod accipit aquæ chamæmæli vnc. iij, sacchari candidi vnc. med. aut mellis despumati cochlearis mensurâ. Datur & hydrelæum, aut oleum amygdalinum dulce recentissimum, cum saccharo candido, ad vncias quatuor. Alij propinant fenugræci decoctum cum melle; alij decoctum hyssopi, ficuum, rutæ, aut marrubij itidem cum melle. Datur vero & diuturnis tussiculis & fluxione calida ad pulmones, vel ad asperam arteriam delabente obortis, lactepidum, singulis diebus, ieiuno stomacho, ad vncias quatuor, aut asininum, aut caprillum aut humanum. Datur etiam, pro eclegmate, massa ex saccharo candido, atque ex oleo prædicto constans, ad vnciam, cum cunctis dormitum. Alij allium sub cineribus decoctum, cum melle eodem

eodem modo delingendum exhibent: aut butyrum recens cum melle, aut refinā omnem, itidem cum melle; aut radicem bryoniæ, vel dracunculi, vel ari, cum melle coctam: aut nasturtium tritum cum melle; aut eclegma Alexandri ex æquis portionibus succi marrubij atque mellis. Dioscorides cōmendauit in difficillima tussi sulphur viuum in ouo deuorandum: duas itidem baccas lauri detracto cortice tritas ex vino. Quod pertinet ad externa, inunctiones commendantur, ex oleo amygdalino dulci, chamæmelino, butyro recenti, pinguedine gallinæ, oleo in quo radix alihææ fuerit decocta. Nonnulli sepum bouinum calidum plurimū ad concoquendas tusses commendant. Inungunt pectoris partes, atque dorsum, quod inter scapulas est. Fomenta vtilissima sunt ex decocto althææ, chamæmeli, maluarum, fenugræci, lini & similibus, spongijs adhibita thoraci; aut lang molles amygdalino oleo recenti madidæ; calideq; vtilissime adhibentur: Ad hæc vesica semiplena supradictis oleis calidis, si eodē modo adhibeatur, & diu detinea tur, nō minus tussim cōcoquere pōt. In victu tussietes cibis parce viuāt, pro potuq; vino diluto dulci, aut aqua hordeacea cum saccharo, aut mulsa diluta, & feruetur quod in scola Salernitana ita legitur: Esuriat sitiāt, vigilet, qui rheumata curat.

De asthmate.

Caput XIII.

Medici suspiriosos, atque asthmaticos vocant, qui veluti citatiori cursu sine febre respirant: & orthopnoicos, qui suffocari metuentes omnem figuram rotius thoracis rectam, respirando, seruant; aut qui non nisi recta ceruice respirant. Etenim asthma est motricis facultratis symptoma, in quo egri crebra tussi correpti spiritum sine sono atque anhelatione ducere nequeunt. Causæ sunt, aut humor crassus viscidusque bronchia seu pulmonum cavitates infarciens, siue in eo viscere collectus & retentus, siue ex capite in ipsum delapsus, asperasque arterias obstruens ipsisque pertinaciter herens: vnde & sonus, & quandoque stertor, respirando, in asthmaticis auditur: Aut tuberculum in pulmonibus genitum, cavitates asperæ arteriæ obstruens, in pulmone vel in spina interiori genitum: Aut vehemens pulmonum ressecatio: aut abscessus in iisdem pulmonibus factus. Ab omnibus hisce causis læsis pulmonibus, ægroti cum tussi ægerrimè respirant, omniumque maxime orthopnoici. Si vero hoc malum fiat ab humoribus, omnes cum tussi anhelant, & sputis pituitosis abundant: qui verò a tuberculo asthma te vexantur, parum aut nihil expuunt; atque etiam multominus, qui pulmonibus vehementer siccatis difficulter respirant: hi quidem planè siccam tussim habent. Ex abscessu vero tussunt cum sputis, quia ex ipso in pulmones humiditas refudat, quæ tussi excitata expellitur. Malum est sanè hoc & diuturnum & plurimū timendum, à quo, nisi principio probè medicamentis tollatur, ægre spirantes eo vel citò suffocantur, vel ad mortem vsque detinentur. Esse stricturæ passionem, & magnam quidem, neminem latere putamus; licet etiam fiat cum multa sputorum excretionē: quæ vacuatio nedum, quod laxus (vt perperam Themisoni, & Thesalo medicis visum fuit) morbus non sit, non erit cohibenda; sed quinimo, si laxatorijs foueatur, plurimum suspiriosi subleuantur, atque iuuantur. Itaque victus ratio prorsus eadem erit præscribenda, quæ superiori capite præscripta fuit tussientibus. Cibi enim erunt exhibendi boni succi, concoctu faciles, qui & extenuent, & detergant, cuiusmodi erit pissana hordeacea, cum porro cocto, vel melle: oua sorbilia cum saccharo, carnes hediæ, vitulinæ, aut pullorum gallinaceorum, aut auium montanarum, sed in modica quantitate. Vino dulci, albo, non generoso modico vtantur. reliqua in victus ratione seruentur, quæ in tussientibus seruanda expressimus. nunc particulatim ad præsidia laxatoria asthmaticis congruē

Xx tia

tia descendimus. Phlebotomia dextri cubiti secta vena interna asthmaticis conuenit, si modo vires comode ferant. Eadem purgantia, quæ tussi vexatis auxilio sunt, etiam suspiriosis conueniant: aliqui efficaciora cathartica offerunt, cuiusmodi est agaricus trochiscatus ad drachmam & semis; & trochisci alandal ad obolos duos; aut catapotia, vel cocchia, vel foetida, vel de hiera cum agarico, ad drachmam & semis. At eductoria medicamenta longè utiliora erunt, quæ in potione propinabuntur. Clysteres simpliciter laxatorii, & cum cathartics, conueniunt. Primas partes inter medicamenta expectorantia, quæ per os assumuntur, scylla habere videtur, quod scilicet valenter extenuet, & detergat; unde mel scyllinum, acetum, atque oxymel itidem scyllinum est efficacissimum. Oribasius ius galli veteris dari summopere commendabat, si singulo mane ieiunis ad semilibram calidum exhiberetur: Gallum rufum, & decrepitum sale infarciebat, cum porro, & anetho multo, & oleo dulci & pingui decoquebat. Nonnulli thapsiæ radices obolos quatuor, cum anethi seminum ziiij. ore assumendos commendarunt: vel succum expressum ex radice ad obolos tres cum iisdem anethi seminibus; aut gummi eiusdem thapsiæ obolum. Utile quoque erit decoctum hyssopi, marrubij, iridis radices sicce, atque adianthi, ex melle epotum. Non minus etiam decoctum radices helenij, itidem cum melle. Ex eclegmatis vero datur pulmo vulpinus siccatus ex melle. Botrys cum vino mulso, bitumen, ammoniacum, & succus radices bryoniæ, ad drachmam, ex melle delingenda dantur. Dant quinetiam complures sandaracham tritam, in exigua quantitate, scilicet ad semioبول, ex vino mulso. Sulphur itidem viuum ex ovo forbili gallinaceo. Preterea audent aliqui arsenicum summe exitiale venenum illis exhibere. Narrat quidam nepotem patris fratri decrepito orthopnoico, ut eum interimeret, clam in ferculo ex cucurbita parato porrexisse arsenicum, eoque non modo non interemisse decrepitum, verum & ab asthma prorsus sanauisse. Ex exteris medicamentis eadem, quæ ad tussim meminimus, erunt ad mouenda; sed hæc præterea, nempe emplastrum laxatorium, quale Paulus parabat ex lolij farina, sicibus siccis pinguibus, resina, cera, atque melle. Nonnulli sinapismum pectori ad mouendum, ab eoque vlcerà, excitata diu aperta seruanda, ut per ipsa ex thorace humor resudet, plurimum commendarunt. Egyptij pectus inurunt, non ferro, aut alio metallo ignito, sed inuoluto ex lineis petijs parato, atque incenso: de quo inustionis modo atque vtu nos in libris de medicina Egyptiorum secunda editione imprimendis, satis accuratè egimus.

De palpitatione seu tremore cordis. Cap. XIII.

Cordis palpitationem etiam eiusdem visceris tremorem vocant, quod cor palpitando tremere videatur: siquidem motus est cordis deprauatus à natura inceptus, qui à morbo impediens non perficitur. Facile hic affectus deprehenditur: quandoquidem ægri euidenter cor palpitare sentiant, aut eo modo moueri, quo aliarum partium palpitationes ex flatu excitatæ, obseruantur: pulsus enim motusque similem alijs palpitationibus ægri apertissimè percipiunt. Hæc vero passio fit ab omnibus, quibus cor lædi potest. læso etenim corde, cuius proprius est motus ille systolis, atque dyastolis, idest, constrictionis, & dilatationis, læditur & necessario ipsius motus, vitaturque. Nonnullis visum est hunc affectum fieri ab ijs omnibus, ut dictum est, quibus cor grauiter lædi potest, à quibus & syncope quoque fieri potest, scilicet à forti intemperie vel calida vel frigida, aut venenoso humore, ab erysipe late, vel inflammatione, aut à tumore præter naturam inter has vero omnes præcipuas causas, Galenus statuisse visus est aquam in pericardio

cardio collectam impediētem, quominus cor moueatur; à qua causa si fiat palpitatio, sentiunt euidenter hoc malo vexari cor ipsum perinde, ac in aqua positum, moueri. fit sepe etiā tumore præter naturam uel humido, uel duro. Recentiores addunt abscessum, sanguinis abundantiam in pericardio collectam, vapores venenosos cor petētes, uti in febribus pestilentibus. Malum est vehemens, quod syncopen & morrem minatur; nec citò auxilijs occurratur. Stricturæ autem passio est, & non solutionis, ut perperam aliquibus visum fuit. Quandoque tamen non negandum, esse morbum laxum, utpote quando habet coniunctam syncopen: cuius quidem palpitationis meminit Galenus in 2. libro aphorism. Hippocratis, ita scribens: Quomodo is, cui vnā cum animi deliquio cordis vehemens palpitatio acciderat de repente de medio sublatus est. Quare palpitatio per se sola stricturæ passio est, sed si habeat animi defectum coniunctum, mixta erit ex laxo & adstricto; de qua nos posterius in ultimo libro huiusce operis accuratius agemus. Nunc vero de sola palpitatioe quæ morbus adstrictus existit, agimus. Cuius profectò curatio, quod passio stricturæ magna vehemensq; sit, fiet magnis laxatorijs, inter quæ phlebotomia vnū est ex maximis laxatorijs quæ hoc malo vexatos iuuant. Gal. de hoc præsidio inquit: Palpitatio autē visceris huius pluribus integra valetudine degētib; tū adoleſcētib; tū adultis, subitò, sine alio manifesto accide-
 re, euenire visa est. atq; omnes eos sanguinis detractio iuuat. Arque hoc accidēte planè liberati sunt, qui post sanguinis missionem vsi sunt victu, & medicamentis, quibus esset extenuandi facultas. Itaque qui hoc malo vexari solent, consultius agent, si seruata victus ratione extenuantis facultatis, semel aut bis in anno sanguinem secta vena, aut adhibitis cum scarificatione cucurbitulis, inter scapulas, aut cruribus Ægyptiorum modo scarificatis, sibi ipsi adiment, vel, si hæmorrhoides solitæ fuerint interceptæ, etiam sanguisugis appositis venas hæmorrhoidales aperiri curabunt: at si in mulieribus hoc malum ex suppressis menstruis occasionem habuerit, tum medicamentis, quæ menses mouere apta nata sunt, mensium purgatio erit restituenda, aut cruribus, uti dictum est, scarificatis, vel secta vena pedis ytriſque interna iuxta talum. Iuuabit quinetiam, præter sanguinis euacuationem, si corpora eorum, quibus palpitatio cordis fieri solet, leuibus eductorijs, laxatorijsue medicamentis laxabuntur, præmissa tamen humorum preparatione per extenuantes potiones, quales sunt, quæ ex iure pulli iuuenis sine sale in aqua elixi, additis buglosso, boragine, agrimonio, petroselino, melissa, feminibus vel etiam corticibus citri, parari solent. dantur mane ieiunis ad vncias quatuor, vel quinque. Medicamentum accommodatissimum erit ex laxatorijs rhabarbarum, aut agaricus, aut veratrum nigrum, aut sena, aut turpetū: horum enim ex vino aromatico infusum erit propinandum: aut puluis ex vino, præsertimque rhabarbari, agarici trochiscati, aut turpeti, aut senæ foliorum, ad drachmam. Ex compositis hiera erit accommodatissima, diaphenicon, hamech, diacatholicon. catapotia de tribus cum rhabarb. & de hiera cum agarico, cocchia etiam vocata cum veratro nigro præparata, & similia. In debilibus corporibus præstabit vsus rhabarbari, vel agarici, cum manna calabrica, vel melle rosaceo laxatiuo, vel syrupo rosaceo itidem laxatiuo. His medicamentis purgatis corporibus, conuenient deinde conseruæ buglosſi, boraginis, rosarum, florum roris-marini, cum seminibus & corticibus citri, cinnamomo, aut cassia aromatica, aut carpobalsamo. Opopalsamum verò per os deuoratum, ad obolum, magni adiu-
 menti esse solet. Radix quoque angelicæ transylvanæ, ad obolos duos, singulo mane, ex vino ieiunis epota, plurimum iuuabit. Ex compositis autem conuenient Diambra Mesuæ, Diamoschum dulce, diarhodon Nicolai, aromaticum rosatum, caryophyllatum, diacalamintha, diatrion pipereon, & similia, quæ frigidiori tempore potius, quàm æstate, conuenient: atque inter omnia Theriaca

In 2. aphorism.
 cor. 41.

In lib. 5. de loc.
 affect. cap. 1.

Xx 2 magna

magna, antiqua, fabæ magnitudine, multis diebus deuorata. Exterius vero calidæ inunctiones in regione cordis ex oleo amygdalino dulci, chamæmelino, anethino, irino, & in quo althæa, vel flores cyclaminis incocti fuerint. Fomenta itidem ex aqua cum modico vini albi aromatici, in qua fuerint decocta, althæa, chamæmelum, rosæ, santalum flauum, sænugræcum, anisum, & similia. Epithemata quoque parata ex aquis melissæ, boraginis, chamæmeli, rosarum, florum citri, ad libram, cum speciebus cordialibus temperatis, caryophyllis, santalis flauis ad obolos sex, cum obolo croci, & vino albo aromatico ad uncias duas. Sequuntur morbi adstricti, quæ stomachum sæpius male habent: cuiusmodi est cibi fastidium, appetitus caninus, & similes alij: de quibus cum in libro sexto scripserimus, quantum præsens illa illius libri occasio requirebat: pauca nunc de ijs dicemus.

De cibi fastidio, appetitu canino, atque siti.

Caput XV.

Nostri cibi fastidium vocant, malum, quod Græci ἀνοξεία dixērunt, scilicet cum stomachus aut intemperie, ut inquit Paulus, vitiat, aut humorū redundantia pressus, cibos auersatur. Cuius quidem causa plerumque est humor corruptus vitiosus, in stomacho contentus imbibitusque, aut ad ipsum aliunde veniens, aut prorsus naturalem stomachi facultatem sua praua qualitate extinguens, ut fit in febris pestilentibus & malignis phlegmonis internis. Qua de causa plures maluisse mori, quam cibum assumere, auctor est Hippocrates in epidemijs, & nos sæpe in praxi vidimus. Etenim prorsus extincta facultate sentiente in stomacho, aut à prauis, summeque putridis humoribus, aut à vaporibus, tollitur sensus suctionis venarum, qui, ut Galenus docuit, naturalis fames est: ubi vero vitiosus in stomacho continetur, non plane adimit, sed diminuit sensum exuctionis uenarum; & exinde appetentia cibi deficit, hominesque cibos auersantur. Plerumque autem humores vitiosi qui hoc malum concitant sunt calidi, sicci, putridi, & corrupti quemadmodum frigidorum humorum stomachū alterantium proprium videtur, ut cibi appetentiam faciant: Vnde fit, quod cibos abhorrentes plerumque plurimū sitiant, ructusque habeant nidorosos & fetidos. Aliquando etiam fit cibi fastidium ob affectum plethoricum aut abundantiam crudorum humorum, quam corpus dum non digerit, non inanitur etiam: vnde homines quasi cibis, ut aiunt, saginati, eos non appetunt. Hunc affectum morbum adstrictum esse, nemo est, qui contendat, ni fiat in maligno lethalique morbo, scilicet naturali facultate resoluta, atque extincta. Itaque laxatorijs hæc passio, ut tollatur, opus habet medicamentis. Humor enim vitiosus, in stomacho infarctus atque adstrictus, sensum exuctionis diminuens aut vomitu, aut ventris fluo euacuandus medicamento. Vomitus promouebitur aqua tepida copiosius epota, aut hydrelæo calido, aut decocto althææ, aut oleo dulci, vel similibus alijs vomitorijs eporis. Ventris flua verò, quibus per aluum humores corrupti purgantur, atque huic negotio sunt accommodata, atque alia huius mali curationi congruentia, nos accurate in libro sexto circa finem prosecuti sumus: Ibi studiosè lector ea deprehendito; neque enim eadem repetere volumus. Vnum tamen non est in præsentia dissimulandum, nempe ad hanc passionem adstrictam tollendam nos ibi acida, austera atq; subaustera plurimum commendauisse: quod fortasse aliquis dubitabit num Methodicorum placitis conuenire posset: siquidē acida, subaustera, atque austera sint medicamenta adstrictoria, non nisi laxo morbo congruentia. Veritas erit, appetitum acido atque acetoso sapore plurimum gaudere,

gaudere, atque excitari. Acida namq; omnia incidendo, extenuando sine acrimonia, partes humoribus adstrictas, rumentesue, commodè laxare possunt. Quare mirum non est, si obstructis conueniant, atque suppressæ urinæ non minus, quia crassos humores extenuant, atque detergunt: tenuissimarum etenim sunt partium, quibus de causis merito laxatoriorum medicamentorum genere à nobis comprehensa fuerunt. Acetosa verò habent præter acidum saporem etiam modicum austeri mixtum, qui sapor, ut etiam Galenus in lib. 5. simplicium docuit, in internis viscerum obstructionibus tollendis, augeroborando facultatem acidorum incidentem, extenuantem, aperientem, atque ab infarctu meatus obstructos liberantem. vnde acidus fructus atque acetosus, itidemq; medicamenta acida, acetosaq; stricturæ passionibus internis non parum congruere videntur. Cibi fastidio opponitur passio Græcis Acynodis orexis dicta, & à nostris caninus appetitus, quod perinde, atque canes facere solent, hoc malo vexati plures cibos appetentes deuorent; quæ ciborum multitudine stomacho grauato, neque citra noxam eam stomacho ferre valente, ad vomitum ducuntur, eosq; vomunt, posteaq; iterum plures vorantes, & stomacho iterum grauato, eosdem reuomunt. Fit hæc passio, ut plurimum à frigido ventriculo, potissimumque ab humore frigido, crudo, acidoque, exuëctionis sensum, perinde ac suctus naturalis in stomacho facere solet, concitante. Hi non sitiunt, acidus ructus habent, cruditatibusque abundant, vnde nauseabundi facti sæpe vomunt. Differt hic affectus à bulimo, idest, ab ingente fame, quæ passio solutionis est; etenim hac passione vexati cibos quidem multos assument, qui vsque adeo à naturali calore coquuntur digerunturque, ut exinde corpora maxime resoluantur. Porro cum caninus appetitus stricturæ morbus sit, proinde laxatorijs quoque tollitur. quibus vero, qualibusq; ad hunc affectum adimendum uti debeamus, in sexto libro, in quo de cibi fastidio scriptum est, ostendimus: Non minus, quam etiam fecerimus de medicamentis ad sitim compescendam, cuius curationem ibi quoque tradidimus. Qui affectus itidem ex adstrictis est, cum, ut ibi diximus, foueatur aut à summa caliditate partiū internarum, aut à præsentia humorum calidorum. Aliquando vero sitis non stricturæ passio, sed solutionis esse videtur, cuiusmodi fieri solet ab æstuosissimo calore febrium ardentissimarum synocharumque, & maxime æstuosarum: in quibus merito omnes medici algidam aquam propinant. de quibus superius à nobis scriptum est, & fortasse aliquid etiam rursus dicturi sumus in ultimo libro huius operis, cum sermo à nobis fiet de morbis mixtis ex adstricto & laxo, quo genere sitis quoque comprehendi potest.

De hepatis atque lienis obstructione, & scirrhusi.

Caput XVI.

Hepar obstructionibus maxime est obnoxium ob venas capillares per ipsius visceris cauam & gibbam partem, & à vena caua vocata, & à porta disseminatas. In his vero sit obstructio aut ex flatu, aut ex crasso lentoque humore intercluso atque infarcto. Causæ antecedentes sunt cibi crassi lentique nutrimenti, vinum crassum, nigrum, & dulce, aut aqua pro potu, vel in ciborum usu palustris, & cænosa, exercitium, balneæque à cibo. Paulus scribit: Grauitatem cum distensione & doloris sensu in dextra præcordiorum parte, nullo substante tumore, nullaq; febre vrgente, venarum significare obstructionem in hepate, aut in caua eius parte, aut in gibba, scilicet in ipsius venis paruis à caua vena atque à porta exporrectis. Lien quoque à melancholico humore sæpe obstruitur: cuius quidem passionis notæ sunt, ut in liene obstructo egori sentiant grauitatem, distensionem,

*Gal. li. de cõstir.
artis med. c. 17.*

distensionem, atque dolorem grauem. Patiuntur vero, quod est grauius malū, hec duo viscera, scilicet iecur, atque lien, tumorem scirrhum, scirrhum Græcis appellatum: de quo nunc quoque pauca sunt à nobis dicenda. Plerumque in hepate post aliquam obstructionem, atque etiam manentibus in ipsa & auctis obstructionibus, tumor fit, aliquando cum inflammatione (de quo superius sufficite egimus) & aliquando citra inflammationem, qui facile, tenuioribus humoribus digestis, crassioribusque induratis, congelatisue in scirrhum duritiem mutatur. Proinde de eo, qui ex phlegmone fit, Paulus ita inquit: At si tumor in scirrhum affectionem deciderit, dolores quidem remittunt; sed tumor cum duritie est conspicuus: quæ ambiunt partes extenuantur, & tempore procedente difficulter poterunt discerni, quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Aurelianus cæteris accuratior in scirrhis signis prosequendis visus est. primo enim signa meminit omnibus scirrhi affectionis communia; & postea propria; Inquit enim: Omnes grauedinem sentire, difficulter spirare, eoq; difficiliter in itinere & ambulationibus cliuosis, pigros atque tardos esse in motu, anhelantes, siticulosos, ipsorum colorem mutari, pedes tumescere, aliquando simul cum his adesse latentem febriculam, hydropsin, suffusionem, atque continuam cibi corruptionem. Ex proprijs vero signis hepaticæ scirrhis, est durities extâ in dextra præcordiorum parte schemate rotundo, costis ex aliqua parte subiecta, & propterea veluti decisa, ex alia verò parte circumscripta atque rotunditate terminata, sæpe color auriginosus siue arquato similiis apparet: vrina veluti sandarachæ colore turbata: accessionis tempore dolor extendens vsque ad dextrum iugulum; difficilis supra latus sinistrum decubitus, siquidem dextre partes tumentes suo pondere pro pendentes sunt, idcircoque grauedine ob pondus suspensi iecinoris, punctione, ob distractam ac diuulsam membranam, cui iecur adnexam est, & quæ cum diaphragmate colligatur, læsi commodè eo decubitu minime vti possunt: Egestionibus apparent biliosæ. In lienis vero scirrhi, apparet exans durities, atque saxea sub parte sinistra præcordiorum schemate longo porrecta, & veluti pectus inuadens, vel umbilici sæpius transgrediens finem, atque latitudine superâs, nunc minime, nunc vehementer, vt omnia coherentia videantur, vt nihil videatur sub costis inane iacere, quod tamen vacuum in sanis deprehenditur, & insipientes eo falluntur, vt membranam tumere siue extare putent, quam Græci peritonæon vocant: color plumbeus, atque accessionis tempore dolor tendens ad iugulum sinistrum, & palam, & difficilis supra dextrum latus iacendi copia. Plerique memorant pediculorum multitudine agrotantes affici, & grauiore per somnum sudore, attestante veretri in officio ventris erectione, & assiduo è naribus sanguinis fluore. Præterea in ipsis os færet (quæ & Paulus expressit) gingivæ exeduntur, vlcerâ in cruribus oborta cicatricem non recipiunt, atque varices itidem in cruribus apparent. Vtraque viscerum passio stricturæ est, ea excepta, quæ cum profluio sanguinis è naribus obstructum aut induratum iecur aut lienem tenet. hec enim habet coniunctam solutionem: de qua passione in vltimo libro agemus; nunc de vtriusque visceris obstructionis & scirrhis curatione per laxatoria agimus à phlebotomia magno inter cætera laxatoria medicamento exordientes. Nam horum viscerum obstructio atque scirrhis ratione partis affectæ magnæ passionis non immeritò sunt iudicandæ, cum ipsas aqua primum inter cutem subsequatur, à qua postea homines intereunt. Itaque viribus consentientibus, mittendus erit sanguis, in hepatica dextri cubiti hepatica secta vena, & in splenica sinistri cubiti eadem vena secta: sanguis vero in copia modica adimetur. hæc quidem euacuatio, maxime potest laxare viscera hæc adstricta. Si vero in hoc malum hæc viscera ex superfluis vel menstribus, vel hæmorrhoidibus, inciderint, secanda erit vena tali interna

interna in mulieribus; aut crura more Ægyptiorum erunt scarificanda, atque hæmorrhoides erunt aperiendæ, vt solita euacuatio, qua intercepta hoc malum factum est, restitatur. Aurelianus ait cucurbitulas cum scarificatione hepatis atque lieni induratis vel obstructis adhibitas iuuare, atque etiam hirudines ipsidem partibus appositas haud leue laxamentum in ipsis inducere posse. Post sanguinis vacuationem purgantia vsum habebunt, inter quæ laudantur vomitoria, vel etiam veratro albo ex Aureliano molienda. Diocles elleboro nigro per ventrem purgabat: Praxagoras, atque Erasistratus, in iecore obstructo, aut indurato vomitibus itidem atque ventris suis utebantur. Nostri vero ad huiusmodi mala, vtuntur rhubarbo, aut agarico, aut colocythide, aut centaureo minore, aut turbit, atque ex his simplicibus composita parant, eaque exhibent. Nonnulli ex antiquis laudant sudorificorum vsum quo sudores mouerentur; at vbi tumor, siue scirrhus induruit, inutilis videtur: quia sudore tenuiores humores absumentur; vnde crassi, & lenti magis siccant, tum crassiores, tum magis lenti euadunt, tumoremque reddunt sanatu difficiliorem clysteres quoque utiles erunt molles, laxatorii, ex decocto maluæ, althææ, fenugræci, lini, chamæmeli & similium parati cum oleo chamæmelino, aut dulci amygdalino, aut anethino, cum melle, aut saccharo rubro, & sale. Exterius autem ad partes induratas, aut obstructas, utiles sunt inunctiones calidæ ex oleo chamæmelino, amygdalino dulci recentissimo, vel ex eo in quo radix cucumeris sylvestris, aut althææ, aut cyclaminis, aut aristolochiæ rotundæ, aut bryoniæ fuerit incocta. oleum de capparibus, de floribus cyclaminis, irinum, lilinum ad huiusmodi durities emolliendas est maxime accommodatum. eodem modo pinguedines gallinæ, anseris recentes, & medullæ vitulinæ, hædinæ, porcinae, atque ouinae, si calidæ adhibeantur plurimum iuuant. eodem modo ex ipsis paratis vnguentis cum succo cyclaminis, bryoniæ, althææ, ebuli, erit vtendum. non minus fomentis vtendum erit, quæ ex chamæmelo, meliloto, althæa, & iridis, capparibus, cyclaminis, atque sylvestris cucumeris radicibus, seminibus fenugræci, lini, feniculorum, in aqua cum modico vini albi aromatici decoctis parantur. Ægyptij inustione non ex metallo ignito sed ex inuoluto de lineis petijs parato, atque ignito satis feliciter hos affectus sanant, inurendo eo modo, quo nos docuimus in libris de medicina Ægyptiorum. Complures ex antiquis commendarunt etiam inustiones metallo ignito factas præsertimque in liene, vt Themisoni placuit, qui ait, pungendum lienem obstructum induratumque tribus vel quatuor locis igneo cauterio; eoque præsertim argumento quod hoc viscus magis robustum sit, atque hebetioris sensus, ideoque minus ab inustione, quam iecur, patiat. Cataplasma etiam ex nuper dictis medicamentis laxatorijs, & ex similibus parata erunt huic occasione opportunissima. Non defuerunt, qui dropaces, sinapismata, vesicantia, atque potentialia cauteria, affectis partibus adhibenda esse voluerunt; cum tamen, vt recte Aurelianus animaduertit, quomodo iuuare queant, nondum deprehensum sit: cum vel etiam ex Hippocrate constet, in scirrho vexatis, vlceribus ægerrime sanari, quia difficulter cicatrice ea obducuntur. At iam ex internis etiam quædam haud omittimus, quibus obstructa, indurataque hæc viscera ad sanitatem deduci solent. Inter quæ scylla primas partes habere videtur. Quæ ratione acutum scyllinum efficacissimum est ad id mali medicamentum, nam præterquam quod vomitu purgat, etiam valenter incidendo atque detergendo venas ab infarctu liberat. iuuat quinetiam mel scyllinum, vinum, atque oxymel. Robustis datur acutum ad vnciam, & ad geminam etiam: qui vero stomacho imbecillo constant, ab eo omnino abstinere debent. Chamædryes ex aceto decocta, si exhibeatur per plures dies, hepaticos atque lienosos sanat: præclare enim viscera ab infarctu liberat. unde etiam in febribus chronicis, quod nimirum egregie

egregie obstructions abigat, apud complures pro singulari secreto habita est. Eupatorium etiam, cum Græcorum, tum Arabum, eodem itidem argumento opportunissimum est. Datur & ammoniacum ad drachmam ex aceto albo acerrimo. Caules recentes bryoniæ, rusci, maluarum, cum oleo, aceto, & sale conditi in cibis utilissimi sunt, si prima mensa assumantur. Ad lienem induratum Dioscorides commendat aspleni cum aceto decoctam herbam, & diebus quadraginta epotam: bryoniæ radicem, ad obolos tres; semen periclymeni, rubiæ, caparis, tamarisci, ad drachmam ex aceto diebus multis epotum. Commendatur in robustioribus squamma ferri ad denarium ex aceto epota: atque vinum ferratum, in quo scilicet ignitum stomoma seu ferrum pluries fuerit extinctum. hac nostra ætate habetur stomoma probè paratum, ita, ut ad hosce affectus tuto & commodè ad tres obolos vsque assumi possit. Atque hæc sunt, quæ de obstructo, induratoq; icore, atque liene fuerant à nobis dicenda.

De morbo regio ictero appellato. Cap. XVII.

MOrbum regium, de quo scribimus, homines appellarunt, quod in aulis regum molliter curetur ludis, lasciviaque per quæ mens exilaretur: Quem alij vocarunt arcuarum, à colore, ut inquit Celsus, arcus cælestis æmulo; icterum etiam, à colore galbulæ auis, ut quibusdam visum est; atque demum auriginem alij dixerunt, à bilis colore aurum imitante. Est hic affectus bilis aut flauæ aut atræ per totum corpus effusio. Vnde duplici colore icteritia distinguitur, scilicet flauo atque atro. Quæ passio hisce signis deprehenditur: Color enim corporis mutatur in fellis qualitatem aut flauam aut atram: qui color primo apparet in albo oculorum, plantarum talis, vel in venis, quæ sub lingua sunt: alius ficcatur, & quæ egeruntur, sunt alba, & argillosa; vrina est crassior, atque sandarachæ colore: oris amaror, sitis, cibi fastidium, corpus graue, pigrum, atque segne, insuete partium carnosarum palpitaciones, animi difficultas, pruritus, ariditas corporis, ac veluti solis exustione cutis superficies aspera: sæpius in icore tumor, siue laxea durities, vel in liene constituta: de qua in proximo capite egimus: qui morbi, si ab ipsis causam habuerit icteritia, ut hæc passio tollatur, prius erunt sanandi. Verumenimvero icterica hæc passio, aliquando critice apparet, nimirum in morbis natura ex alto bilem critice propellente, cuiusmodi est, quæ febricitanti superueniēs febrem finierit. De qua Hippocrates inquit: Quibus in febribus morbus regius septimo vel vndecimo, vel quartodecimo superuenerit bonum, nisi dextrum ilium obduruerit. Hæc porro icteritia medicamentis, ut tollatur, non eget: sponte enim ipsam natura digerit, aut balneo calido, aut frictioni moderatæ facile cedit. Plerumque vero symptoma est iccoris male affecti, aut lienis, si color ictericus ater sit, scilicet aut obstructi, aut inflammati, aut scirrho indurati. Etenim hæc fit, ubi ipse lien melancholicum humorem, qui veluti limus sanguinis existit, vel ob facultatem attractricem infirmam vel ob meatum, per quos ad lienem trahebatur, obstructionem, vel ob phlegmonem, aut tumorem scirrhosum non attrahit: Quo humore vnâ cum sanguine non repurgato, sed in vniuersum corpus effuso, cutis colore atro inficitur. Eodem itidem modo de flaua icteritia dicendum est, namque hæc itidem fit, aut hepatis, aut vesiculæ fellis morbo: hæc, inquam, si infirmâ attractricē aut propter meatuum, quos Græci cholodochos appellant, idest ductuum ad ipsam venientium, obstructionem, vel phlegmonem, vel tumorem, ex venis ad se bilem, non attrahat, sanguis non repurgatus effusus per corpus ictericum colorem facit. Signum propriū huius passionis ab ijs causis obortę, est in vrinis crassioribus color sandarachæ tingens

In 4. aphor. 64.

”

Gal. in 4. aph. 64

tingens pannos lineos albos, atque chartam croci colore. Si cum febre, & biliosis deiectionibus inuadat, & in præcordiorum dextra parte grauitas adsit, feruens iocinoris phlegmone significatur, cuius vi sanguis in bilem mutatus per uniuersum corpus defertur. si autem feruor citra grauitatem in ipso subsistat, malum ex iecoris calida intemperie fieri, indicio est. Si verò absque febre fiat vesiculæ fellis malum, vel ipsius meatuū indicatur, scilicet ut dictum etiam est, factum vel ab obstructione ipsorum, aut ob tumorem, aut eiusdem vesiculæ ob facultatem attractricem ex venis ad se redditam debilem, aut ob expultricem ab ipsa ad intestina itidem redditam imbecillam, vel ob meatuum ab ipsa fellea vesica ad intestina bilem ducentium itidem obstructionem, aut tumorem. Horum proprium esse videtur, ut per aluum alba, & argillosa deijciant, atque vrinam croceam reddant, si grauitas præcordiorum dextram partem premat, obstructionem; si pressu durities sentiat, tumorem icteritiæ causam esse deprehendimus. Atque icterica passio à prædictis causis ortum ducit, quibus nunc hæc alias addimus, scilicet calidam solidarum partium intemperiem mutantem alimentum in bilem: deinde medicamenta cathartica, & lethalia, atque virus à serpentibus alijsq; feris venenosis morfu corporibus illatum. Passio hæc stricturæ est, & idcirco laxatoria præsidia pro curatione indicabit, eademq; planè quæ ad hepatis lienisque cum obstructionem, tum tumorem scirrhum tollendum superiori capite meminimus. Itaque conuenient omnia superiori capite præscripta, nempe phlebotomia profanguinis missione, modo vires ferant, aut cucurbitulæ cum scarificatione scapulis, atq; præcordiorum parti affectæ, appositæ, aut hirudines hæmorrhoidibus, etiam, si eæ forte fuerint interceptæ, & in mulieribus, si menstrua purgationes defecerint, sectio venæ tali, aut poplitis internæ, aut crurum scarificatio. Purgantia itidem vomitoria, & ventrisua, quæ bilem educere apta nata sunt, erunt utilissima. Aurelianus ait, perseverante passione, veratri albi decocto propinato, etiam corpus esse agitandum: veruntamen Catharticorum usum frequentem damnauit, nimirum, quod frequenti illorum usu sitis extendatur, & solidioris cibi fastidium duplicetur, & corporis fortitudo minuat, & cibi assumpti in stomacho corrumpantur, & omnis corporis materia adulterio medicaminum deterior fiat, cum corporis quidem habitudo tota fuerit mutata. Laudat et ipse de obstructiua, atque per urinam purgantia, vrinaria ab ipso vocata. Concedit absinthium potui dati, aut succum intybi agrestis duobus cyathis: tum intyba coctacum vino, tum asparagum, daucum, feniculum, aliaq; diuretica, id est vrinam mouentia, ut caules recenter nati rusci, vel bryoniæ, vel tamarisci, vel asparagorum, vel similia, quæ generosè cient vrinam. Quorum usum frequentiore etiam damnauit, quinimo inquit, multos haud ictericos frequentiori usu consimilium medicamentorum ictericos factos fuisse: & nos vidimus nonnullos obstructos eorundem medicamentorum frequenti usu tumorem scirrhum in visceribus, quo vitam finierunt, contraxisse. Optimum quoque esse sublati, & obstructionibus, & tumoribus, sudorificum præsidium: qua ratione fudare in balneo iuuabit, plurimumque in aquis naturalibus aut sulphureis, aut bituminosis, vel in balneo laconico, quod fit ex suffitu & calore ignitis lapidibus decocto aspersis excitato: de quo superius non semel meminimus. Hæc cum ijs, quæ superiori capite complexi sumus, medicamenta ad ictericos sanandos nobis sufficient.

Renum affectum, in quo à calculis homines vexantur, Græci lithiasin appellant, nostri renum calculum, & Aurelianus calculationem itidem vocauit. Dolor est, qui à calculis introclusis modo in altero rene, modo in utroque, modo in vasis vteribus homines vexat. Cuius notæ sunt propriæ, quod dolor sit grauis, videaturq; in ipsis renibus infixus instar pali impacti; eiusdem lateris ac è directo testiculus dolet; femur quoque eiusdem lateris obstupescit; aluus initio sicca, aliquando tamen sed raro excernit: excernit verò clysteribus excitata flatus, atque steruus biliosus: vrinae paucæ & arenosæ prodeunt. Distinguitur à colico dolore, quoniam hunc in dexteriore potius ilium parte nephritici sentiunt ad stomachum vsque, & iecur, aut ad lienem extensum: in his aluus omnino cohibetur, adeo vt ne spiritus quidem per podicem excernatur. Vbi verò calculus vesicam diuexat, hæc signa apparent, scilicet præter dolorem, qui acutus est, sed minor, quam in renibus fiat, vrina cruda subalbidaq; excernitur, cui subsidet arenosum; pruriunt laborantes crebro & contrectant pudendum, intenduntque, & continuè ad vrinam reddendam vrgentur, ac stillicidio eiusdem vexantur, aliquando repente vrina ex toto supprimitur. Aurelianus longè accuratius hunc affectum expressisse videtur. Etenim inquit, hunc affectum sequi dolorem secundum pectinem, atque veretri radicem, & ilia, & clunes, & magis in initio, & sine vrinae reddendæ: tum feruor incendiarius, item pulsus, & extantia partis affectæ, cum iugi ac frequenti vrinae reddendæ desiderio, & repentina cessatio, ac rursum excretio seu mictio fit cum dolore intolerabili per singulos mictus, vt extenti ægrotantes etiam ventum per podicem reddant, aut ipse podex procidens excludatur; præterea supinus decubitus vrinae exitum facit faciliorem, nimirum quoniam in eo corporis habitu lapis in vesicæ amplitudinem relabitur, ex colli angustijs. Quidam denique necessitate coacti defixo capite super latis sedibus selesposuerunt, vt lapis angusta deferens loca, atque vesicæ aditum repetens, mictus tribuat facultatem. Mulieres denique etiam, digitis intromissis in muliebrem finem sibimet, ipsæ hortatione quadam prouocando lapidem emisunt. Pueris vero veretrum magis prominens fit. Sæpe etiam extantia quædam ægrotantibus occurrit, si suo podici digitum iniecerint. In vrina sedimenta apparent aliquando crassiora & pallida, aliquando arenosa, & laxosa: Quibusdam itidem asper lapis, aut sanguinolentus excluditur, & saniosus. Sed quoniam signa hæc prædicta communia sunt, & contingit sæpius, non cognosci, an vrinae difficultas fiat a calculatione, cum non raro fiat, vel à grumo sanguinis, vel ab vlcere in vesica existente; idcirco consultius erit, vt lapidis suspicio confirmetur intromisso cathetere solido, non fistuloso. Hisq; notis nobis lapides siue calculi tum in renibus geniti, tum in vesica innotescunt, atque deprehenduntur. Plerisq; visum est, materiam lapidum esse crudum humorem, crassum, viscidum, pituitosum, atque causam efficientem esse calorem siccantem, cogentemque. Quibusdam etiam persuasum est, frigiditate eam materiam cogi in lapidem: sed cum in corpore viuente nunquam tanta sit frigiditas, quæ humore cogere in lapidem queat, idcirco nobis rationabilius videtur, à caliditate exurentem lapides fieri, nisi dixerimus cum Georgio Agricola lapides fieri ex succo lapidescente, qui cum vsque adeo suapte natura aptus natus maxime sit, vt lapidis formam recipiat, mirum non est, si ex leuissima etiam causa caloris, vel frigoris, lapis fiat. Hinc aiunt adamantem, carbunculum, smaragdum, sapphyrum, atque alios lapillos pretiosos gigni, cum in locis calidioribus, tum in frigidioribus. Insuper contendunt alij non dari, neque generari lapides in renibus atque vesica separatim, at vnum eundemque

eundemq; esse lapidem cum renum tum vesicæ, nimirum quod primo lapides in renibus facti in vesicam descendant, in eaq; augeantur, concrecantq;. Quod tamen à veritate esse alienum, hoc argumento maximè deprehendi potest, scilicet, quod omnibus liquido constet, inuentos fuisse calculos lapidesue genitos in compluribus partibus corporis, nimirum in capite, in pulmonibus, in hepate, in fellea vesica, in liene, in mesenterio, in intestinis, in renibus, in vesica, atq; etiam in longe pluribus alijs partibus. præterea, quod renum lapides ab ijs qui è vesica educuntur, figura, magnitudine, colore apertissimè differant. At de ijs, aliorum esto iudicium. nunc ad rem redeunt, dicimus lithiasim quoq; esse stricturæ passionem, quæ laxatorijs medicamentis opus habet, tam vt ab ipsa calculi generatione homines præcaueantur, quam vt præsentis introclusi, & acerbius ægros diuexantes excludantur: qui certe vbi lapideam duritiem adepti sint, nullo medicamento comminui, & educi possunt. At hac ætateeductio calculorum, quæ sectione fit, vsq; adeo facilis & tuta reddita est, vt nos complures vel etiam senes septuagenarios facta sectione à lapide vesicæ fuisse omnino liberatos viderimus: adeo, vt ipsi postea multos annos integra valetudine superuixerint. Sed Aegyptij, ut nos oculatim uidimus, sine sectione lapides è vesica per meatum pudendi, magnitudine nucis auellanae, & paulo etiam maiores, absq; ulla noxa educunt. Ore etenim spiritum uehementer attrahendo, in quandam cannulam membraneam intra os vesicæ usq; per penis meatum, seu canalem, uento plurimum ampliatus, intromissam, digito intra anum posito, lapidem in ipsius quiddam cannulae os intra vesicam, uti dictum est, perueniens deductum uiolento quasi rapu ore spiritum fortiter attrahendo, cannulam cum lapide per penis canalem, seu meatum, extrahunt. Sed quomodo Aegyptij prædicto modo lapides educant, nos in libris de medicina Aegyptiorum scripsimus. Itaque & quomodo præseruentur, ne in renibus, & in vesica lapides generentur, & quomodo etiam imperfecti, scilicet tophacei nondum lapideam duritiem adepti, sed aliquatenus friabiles comminuantur, & educantur, nunc dicemus. Itaque ex laxatorijs conuenit phlebotomia, purgatio, uiarum laxatio, & qui per os assumpta crassum humorem incidunt, extenuant, atq; detergunt, abluuntq; renes atq; vesicam, doloremq; & illarum partium exasperationem demulcent. Præmittetur clyster mollis, aut exhibebitur catharticum lenituum, cuiusmodi erit cassia cathartica ad vnciam & semis, cum pulueris radices glycyrrhizæ drachma, & saccharo candido puluerizato: aut dabitur eadem cassia ad vnciam, & superbibent ægroti feri lactis capilli libras tres: aut dabitur medicamentum ex manna, aut ex syrupo rosato laxatiuo, vel ex melle rosato itidem laxatiuo ad vncias quatuor, sero lactis dissolutas: & superbibent ægroti feri supradicti libras tres. Altera die ex secta vena interna dextri cubiti sanguis ea quantitate euacuabitur, quam vires commode ferent: & postea eadem repetetur euacuatio è secta vena poplitis dextri cruris, si commodè secari queat, aut ex vena malleoli, aut ex cruribus scarificatis, atque demum haud erit inutile sanguisugis aperire hæmorrhoidas, præsertimque si solita fluere defecerint. Deinceps corpus euacuabitur electiuo pharmaco, sed prius præparatis humoribus, medicamentis incidentibus, detergentibusq; absq; multo calore. Pro purgatione vomitus maximè laudatur ieiunius prouocatus, aut aqua tepida cum syrupo acetoso, aut oxymelite simplici, aut scyllino, vel cum acori modico copiosius hausta: per ventrem verò purgantia maxime congruent, atque ex ijs agaricus, rhabarbarum, aut turbit, aut colocynthis, aut podopodium, aut elleborus, aut mechoacan, aut simile aliud ex simplicibus, eo modo, & ea dosi parata, quibus ea in colicis doloribus conuenire superius diximus. Ex compositis conueniet hiera picra ad drachmam, pilulae de hiera cum agarico, diacolocynthidosq; & similia. Post corporis purgationem, etiam renes purgando

gando laxare oportebit, nimirum vel sero lactis caprilli acido limonum elafacti quotidie a libra vna vsque ad quatuor libras, cum lacte seminis melonis, aut cum succo rosarum, aut cum syrupo rosato ex simplici infusione rosarum: in viro adulto propinabuntur libras quatuor predicti seri, cum semine melonis lacte opera eiusdem seri expresso ad vncias 4., & syr. ros. simpl., violari aut. vnc. 1. Vtiles sunt aquae naturales in agro Parauino B. Virginis vocatae, si quotidie ad libras 15., & plures et bibantur, per decem, & plures dies: aut Villenses vocatae de agro Lucensi ad libras quatuor. Haec omnia renes abluentia detergentiaque calculosis conducent, modo calculi vel in vesica, vel in renibus geniti non sint. Si vero in ijs membris lapis existat, agrosque doloribus diuexet, nihil peius quam abluentia, & detergentia exhibere medicamenta: etenim viciis vitibus vesicam, aut renes munientibus, quominus a lapidum asperitate laedantur, deterfis, deterfisque itidem quodantenus lapidibus, atque exinde asperioribus redditus, renes, aut vesica magis doloribus conflabitur. Si vero nondum lapides fuerint geniti, ad tollendos humores crassos vesiculosque, quibus siccat, & coactis, lapides in hisce visceribus sunt, mirifice iuuabunt & serum, & aquae praedictae, si per plures dies aegroti ebibant. Interim utile erit, singulis diebus infusionibus uti ex aqua tepida fluitatili, aut ex ea, in qua malua, althea, fenugrecum, viola ebullierint: in quibus spacio vnus horae calculosi immergi vsque ad umbilicum manebunt. Inunctiones itidem iuuabunt ex dulci oleo amygdalino, chamemelino, rosaceo, aut communi dulci temperate calido: aliqui commendant oleum ex scorpionibus paratum, quo inungantur lumbi, pubes, & testes eum perinaeo. Ad easdem partes congruent etiam fons ex supradicta aqua, cum malua, althea, fenugreco, & lino parati: item ex hydrelco cum vesica, aut sponsa excepto. Haec praedicta externa praesidia iuuabunt particulatim eos magis, qui actu a lapidibus dolore excruciantur. Paulus ad calculos commendat superfusiones, cataplasmata, fons, atque infusus, relaxantes, & lenientes, qui ad colicos dolores vsurpari solent. Quibus multum quoque conferet lac asininum, vel caprillum calidum, singulo mane, per plures dies epotum ad vncias quatuor, ante cibum. Denique addamus medicamenta singularia ad lapides rophaceae duritiei comminuendos, atque educendos. Ex veteribus plerique commendant, ad lapides comminuendos, & ad utinam ex ipsis impeditam mouendam, acerrum scyllinum, ieiunis epotum, decoctum itidem radices, foliorum, atque seminis altheae, atque adianthi, radicesque rusci, foliorum, & seminis, in vino albo paratum: itidemque anonidis corticis radices ex vino decoctum, aut corticis lauri radices, eodem modo epotum sumopere commendatur: datur potui & oleum amygdalinum amarum, calidum, ad vncias quatuor: datur & decoctum umbilici veneris, scilicet foliorum, atque radices, pro secreto aliqui dant decoctum foliorum semperui arboris cretici, non minus lapis iudaicus e cote detritus cum aquae calidae cyathis tribus epotus laudatur. Ligures se a calculis praeservant, quotidie ante cibum assumentes succum limonis ad vnciam cum saccharo: profecto, ut nos in praxi vidimus, hoc medicamentum est ex maximis lapidis generationem prohibentibus, ut & acetum scyllinum epotum idem praestare diximus. Namque materiae crassitudo maxime extenuant, atque detergent.

De priapismo. Cap. XIX.

Cum nos in septimo libro de satyriasi scribentes nonnulla quoque ea occasione de priapismo fuerimus complexi, restat, ut pauciora de hoc affectu a nobis scribenda supersint. Priapismum antiqui hanc passionem nominarunt, a

Priapis quondam horrorem Dijs, qui fingebantur rigido veretro seu pene arre-
cto. De qua passione Demetrius Attaleus vel Apameus, auctore Aureliano, in
libro signorum, dixit, quod in quodam viderit sene, atque in seipsum manu ope-
rante, nec quicquam tamen potuisse peragere; tensionem autem fuisse veretri ni-
miam, cum paruo dolore, vt cornu putaretur, & ita perseverasse multis mensi-
bus, nullo quoque adiutorio medicinali cessisse; sed tardo atque longo tempore
quieuisse. Aurelianus inquit: priapismum esse paralyfim seminalium viarum,
& aliorum nervorum ad veretri partes attinentium, quorum distensione aegroti at-
ficiuntur. Nos vero paralyfim esse negamus, at potius convulsionem partium
genitalium. Paulus ex Galeno scribit, priapismum esse firmum, stabile, seu per-
manens genitalis incrementum, quod in longum latumque intrumescit, citra ve-
neris appetentiam. Fit hoc malum, vt Paulus docuit, cum statulentus spiritus
particulam in tumorem attollit, ex humoribus crassis, & viscosis modici caloris
opera procreatus. Galenus ob arteriarum ora immodice patentia luxatam hunc
affectum fieri addit: etenim lumbis calefactis, arteriae quoque calidiores redduntur,
ideoque oscula ipsa laxiora amplioraque euadunt, vnde plurimum spirituum essen-
tiae in fistulosum nervum illabitur, quo coles oppletur, tenditur, arrigiturque. Quae
causa priapismi si vera esset, profecto aegroti calorem perpetuum in lumbis cum
dolore & aliquando cum febre sentirent; perindeque affectus inflammatorius
diceretur, qui satyriasmum faceret, id est, veneris appetitum inexplebilem. Cum
vero nullum veneris desiderium faciat priapismus, propterea aut a statulento spi-
ritu, vt ex Paulo dictum est, replente nervum, aut a copia seminis immoderata
facultatem seminis expultricem ita diminuentem, vt neque manu fricato pene arre-
cto, neque mulieris concubitu semen excernatur, & durities (vt Demetrius At-
taleus in seipso expertum se fuisse posteritati tradidit) eadem persistat. Itaque
passio stricturae est, quae laxatorijs medicamentis, vt tollatur opus habet, iisdem
propemodum, quae de satyriasi affectu simillimo in libro septimo scribentes me-
minimus, scilicet, sanguinis vacuationem per venam sectam, cucurbitulas cum
scarificatione, hirudines lumbis, pubi, inguinique appositae, coxendicumque &
erurum scarificationes: corporis item purgationem per agaricum, turperum, vel
colocynthidem, vel elleborum, vel per alia similia medicamenta cathartica; aut quae
ex iam dictis simplicibus habentur composita, cuiusmodi est hiera picra Galeni,
diacolocynthidos, diaphenicon electuarium vocatum, confectio hamech, diaca-
tholicon, & ex catapotijs cocchia vocata, de tribus cum rhab. de hiera cum aga-
rico, & similia. Postea per os medicamenta moderate calida iuvabunt, cuiusmo-
di est decoctum ex buglosso, boragine, malua, althea, fenugraeco, petroselino, &
ex similibus. Eodem modo clysteres molles, fomenta laxatoria, infusus, cata-
plasmata, inunctiones laxatoriae convenient paratae ex oleo dulci amygdalino,
chamemelino, de floribus cyclaminis, & ex eo, in quo radix altheae, aut cucu-
meris sylvestris fuerit incocta. Fomenta itidem, infususque ex aqua calida, ex
hydrelgo, vel ex decocto malvarum, altheae fenugraeci, meliloti, chamemeli, &
similium valde utilia erunt. Quod autem medicamenta frigida (vt Dogmatici
omnes voluerunt) huic affectui utilia esse possint, non video, nisi in principio
repellendi gratia adhibeantur, namque a calidis, sed tamen non vehementer ca-
lidis (vt Paulus expressit) in principio, verum moderate quidem calidis, siue in
causa sit statulentus spiritus, siue copia seminis, siue humor frigidus, crassus, vi-
cidusque, hoc malum stricturae laxabitur, digereturque. Posterius autem, pe-
nis arrectione diu persistente, etiam vehementer calida erunt ad usum recipien-
da. Vnde Paulus & semen viticis, & rutam, & similia calida esse adhibenda
memoriae tradidit, sed nunc satis de priapismo egimus.

In libr. 3. auear.
cap. 18. & in 5.
chron. cap. 7.

in libr. 5. chron.
cap. 7.

in 6. de loc. affect.

De uteri

De vteri strangulatu. Cap. XX.

Malum, quod Græcis *πνιξ* *vsq̃xin*, & Latinis vuluæ strangulatus, & vteri suffocatio dicitur, esse eiusdem visceris recursum ad superiora, neminem medicorum latet. passio sanè magna, vehemensque est, & magni periculi plena, citissime ægras mulieres interimēs, frequenterque viduas, male purgatas, steriles, atque iuuenculas ad veneremq; pronas per circuitus inuadit, vt morbus comitialis facere solet. Quæ passione oppressæ, sine motu, sine sensu, atque sine respiratione, quasi mortuæ, iacent. Quæ grauius symptomata excitantur ab illiusce visceris ad superiora recursum, atque decubitu, interna alia viscera præcipua sibi contermina magnopere comprimente ladenteque. Paulus inquit: strangulatus vuluæ ad superiora recursum est, quæ principalissimas partes in doloris conforium perducit, vt potè arterias, quas vocant carotidas, cor, cerebrique membranas. Aretæus vero medicus antiquissimus scribebat: In medijs ilibus mulierum vulua posita est, muliebre viscus, animalis fermè naturam adeptum. Si quidem perse huc atque illuc versus ilia mouetur: quin etiam ad superiora è regione pectoris cartilaginem subit: in latera quoque in dextram videlicet, aut leuam partem, aut ad iecur aliaq̃ intestina mouetur: & ad inferiora natura procliuior est: vtique paucis absoluiam, penitus errabunda est, & iucundis odoribus delectatur, ad ipsosque se recipit: Contra sedè olentibus contristatur, & ab ipsis longius se proripit, ac prorsus est in homine vulua perinde, atq; in animali quoddam animal. Hæc itaque si repente superiora petierit, ac diutius ibi commoretur, visceribusque violenter incumbat, interdum homo veluti comitali morbo correpta citra nervorum distentiones strangulatur. angustijs namque iecur, transversum seipsum, pulmones, cor celerrimè opprimuntur. Quæ de causa spiritus priuatio, imbecillitasque adesse videtur. Præterea & venæ somniferæ (carotidas Græci vocant) cordis vitium participantes, affliguntur. vnde capitis grauitates, & sensuum abolitio cum nouo quodam sopore adueniunt. Atque hæc est accurata grauium illorum symptomatum ratio ex Aretæo tradita. Nunc signa quibus hoc malum deprehenditur tradenda. Itaque si in superiora subeunte vulua vexari mulier inceperit, ad obeunda negotia pigrior redditur, exoluitur, infirmatur, genua labant, vertigo infestat, extrema debilitantur, caput dolet, ingrauescitque, in uenis ab utroque nasi latere iacentibus dolorem mulier percipit: quod si ceciderit, stomacho mordetur. Iuxta præcordia ilia, vbi vuluæ domicilium est, inania sunt: pulsus intermittentes sunt, inordinati, deficientes; spiritus magnopere angitur, vox intercipitur, sentiendi facultas impeditur: spiratio ignota, obscura, celerrima est, nec opinatio mors aduenit. Ceterum si priusquam strangulatione liberantur, quando aluus submurmurat: humiditas adest locorum muliebrium; spiritus asperior, manifestiorque redditur: colerrime ab affectu excitantur, quemadmodum & celerrime interitus aduenit. nam facile superiora vulua petit, facile quoque inde recedit. Galenus in lib. sexto de locis affectis, haud in omnibus hysteris præfocatis mulieribus prædicta symptomata obseruari tradidit, quando alias viderit sine sensu immobiles iacere cum obsecuro paruoque pulsu, vel omnino sine vlllo pulsu: Alias sentientes, & moueri potentes, atq; integra ratione, sed tamen animi defectione, & difficili respiratione laborantes: Alias crura & brachia contrahentes. Similimus hic affectus est syncopi, catalepsi, apoplexiæ, atque epilepsiæ: at à syncope distinguitur, quoniam in ipsa nullus est pulsus, sudor circa faciem frigidus, & pallor apparet odorataque naribus admota iuuant. Contra verò in vteri præfocatione pulsus, licet languidus

In libr. 2. de
caus. & sig.
acut. cap. 11

gvidus, aliquis sentitur, nullus sudor erumpit, pallor faciei minor, quinimo facies, quò peius se habent mulieres, eò ad ruborem magis inclinare (auctore Aræto) videtur. Odorata autem naribus admota hystericas lædunt. A catalepsi verò discernitur, quia in ipso affectu rigor, aut refrigeratio sentitur, qualis in corpore gelu concretò videri solet: quæ in præfocatione non obseruatur. Ab apoplexia itidem distinguitur, quoniam in ipsa non sentiunt, & si pungantur; hysterica verò sentiunt puncturas. Et demum ab epilepsia etiam discernitur, quòd præfocatæ mulieres non distorqueantur, neque concutiantur, vt epileptici. Causæ, à quibus hysterica in hanc passionem incidunt, sunt, vt plerisque visum est, vteri recursus ad superiora, à quo compressis, læsisque membris proximis principalissimis, grauias supradicta symptomata excitantur, præsertimque perditæ respiratio: vnde Heraclidem Ponticum librum in quo egit de vteri præfocatione, apnum, idest perditam respirationem inscripsisse, Galenus est auctor. De qua præfocatione, locutus Plato in Timæo ita habet: Ea pars quæ in mulieribus & vterus & vulua nominatur, cum sit animal prolem generare cupiens, si intempestiuè, diuq; infructuosum fuerit, succensens ægre fert, erransque per totum corpus, & spiritus meatum obstruens, respirareque non sinens, in extremam anxietatem deijcit, atque multos alios morbos excitat. Caterum vterus non, vt Plato ait, sursum trahitur, sed, conuulsionis modo, à sanguine menstruo retento, aut ab alio humore vteri ligamentis imbutis, retractisque. Quomodo autem hoc fiat, docet Galenus in sexto de locis affectis. Alij probabilius censuerunt hoc malum fieri vtero refrigerato, à quo refrigeretur vniuersum corpus: Refrigerari autem, aut ex semine retento, aut à mensruis suppressis contingit. etenim semen paulatim in vtero coaceruatum, vt in viduis fieri solet, putrefactumque refrigeratur, eamque frigiditatem cordi, cerebroque membris principalissimis communicando, grauias quidem symptomata inducere solet. hæcque euenire illis, veluti à veneno quodam (quando semen corruptum potissimum in corpore cacochymo, venenosam qualitatem nancisci videatur) illato. Ex sanguine itidem menstruo suppresso. Idem quandoque euenit, quòd & ipse paulatim in vtero collectus, corruptusque refrigeretur, & eodem vitio vterum afficiendo eodem itidem modo eandem affectionem prædictis membris principalibus communicando eandem passionem inducat. Hanc verò apnæam, siue præfocationem, longe minorem, quàm, quæ ex semine corrupto fit, esse Galenus affirmavit. In ea enim, quæ à retento semine fit, mulieres, sine sensu immobiles, vt mortuæ, iacent: spiratione tamen non priuatur, neque animi defectione, neque alijs symptomatib. laborant, quæ ex suppressis mensruis in hanc passionem labuntur. Alij addunt humorem quendam in vtero insitum, & putrefactum hoc malum inducere mulieribus. Alij ex flatulento spiritu frigidaë qualitatis, vel malignæ vterum præfocationem pati putant. Nonnulli addunt, vterum plerumque primario affectu vitiatum, ab ijs causis, vt dictum est, in hoc malum deduci, sed sæpe etiam ex alijs proximis membris læsione ipsi communicata hanc passionem pati, quandoque ex ventris repletione, & nonnunquam ab hepate, vel à liene passionem ei communicata. His itaque constabit primum, quomodo, & à quibus causis, mulieres apnæicæ euadât; deinde etiam, passionem hanc stricturæ quidem esse, & vsque adeo magnæ stricturæ, vt nedum spatio diei, sed intra paucas horas mulieres interimat. Cuius quidem mali ad exitum tendentis signa hæc erunt: pulsus primo densiores euadunt, inordinati, at postea prorsus intercipiuntur, exigua quædam humiditas cutis superficiem humectat, & respiratio primum obscuratur, & postea penitus tollitur. Quibus signis apparentibus, solo prognostico relinquantur egrotæ mulieres, ne infamentur remedia. Sed priusquàm eò malum

in libr. 6. de loc. affect. cap. 5.

in 6. de loc. affect. cap. 5.

lum deuentum sit, Curatio laxatorijs medicamentis erit molienda: & primo, vt à presenti paroxysmo apnoeica liberentur, atque postea, si diu egritudo protrahatur, vt omnino etiam à prædicto morbo præseruentur. Itaque quod primum ex magnis laxatorijs apnoea vexatis conueniret, esset phlebotomia: At quia vires prælanguent, à magno hoc laxatorio cauendum erit. Aretæus tamen, si vteri strangulatus à phlegmonie fiat, phlebotomiam laudauit in cubito, atque mox è malleolo repetitam sanguinis euacuationem, atque priuatim è lecta vena ad pubem perueniente. At nos de uteri phlegmone curanda in septimo libro scripsimus. Igitur primo ad subleuandas ægras à paroxysmo incumbendum erit, atque vbi mulieres sine sensu, aphong, immobiles, vt mortuæ, sine respiratione iacent, cum pulsu languido, omnino, vt diximus, à sanguinis euacuatione per venam sectam abstinendum erit, quia vires non patiuntur. Vbi verò neque pulsus perierit, neque sensus, neque motus, neque animi defectio sit, sed solummodo crurum, brachiorumque contractiones adsint (modo, vt dictum est, virium robur ferat) sanguis præscripto modo vacuandus erit. Paulus tamen nunquam voluit secta vena esse mittendum sanguinem, nisi postquam præfocata ab accessione fuerit reuocata. Tunc enim, vt prorsus ab ea passione liberetur, laudat primò phlebotomiam, & postea, purgationem ex hiera picra ad 3i, cum cyathis tribus nullæ moliendam: deinde, vt applicentur pubi, ilibus, atque lumbis dropaces, cucurbitulæ, & cum multa flamma, & cum scarificatione, etiam suadet. Verum præter ista, & sinapismus super prædictis partibus, atque extremis etiam erit admouendus, vlceraque diu aperta seruanda. Cum ijs coniungenda sunt exercitia, frictiones totius corporis, atque vsus naturalium aquarum, in quibus mulieres insidere oportebit, singulis diebus, per horam ad minus, ante cibum. Atiam ad medicamenta præfocatas ab accessione liberantia (quod profecto primum faciundum est) declinemus. Equidem primò eas reuocare à paroxysmo medici omnes student, vinculis manus atque pedes ad torporem vsque ligantes, frictionibusque crurum, atque totius corporis, naribus fætida obijcientes, cuiusmodi est pix liquida, capilli vsti, lanaque itidem vsta, castorium, vetus lorium, & similia. postea cucurbitulas leues ilibus, coxis, inguinibus, atque dorso inter scapulas adhibent, & quandoque cure scarificata. In vuluam odorata cum olea, tum vnguenta iniiciunt: Cuiusmodi erit Cybetum ex oleo dulci amygdalino, aut lilino dissolutum, aut cum moscho orientali, vel ambra; aut aliquod vnguentum odoratum ex ijs omnibus mixtis confectum calidum in vuluam indito. Vtilissimum erit, in viduis præsertim suffocatione vteri laborantibus, si obstetrices digitis in pudendum intromissis, cum prædictis oleis calidis, vel vnguentis inunctis pudendum tractent, vt, orta aliqua titillatione, vulua humorem excernat. Galenus scripsit, quandam mulierem viduam præfocata, dum ab obstetrice digitis eius vulua cum oleis calidis variè tractaretur, orta titillatione, cum labore, & volupate, veluti per coitum vsu venire solet, excreuisse plurimum semen crassum, eaque seminis excretionem planè ab accessione fuisse liberatam. Proinde, vt dictum est, muliebres partes calidis oleis, aut amygdalino dulci, aut lilino, aut sesamino, aut irino, diu & suauiter tractandæ sunt, vt excitata titillatione semen aut humor corruptus malum fouens excernatur. Præterea pessus calidi, molles, laxatorii iniiciantur, quales parabuntur ex oleo amygdalino, pinguedine gallinæ recenti sine sale, vel anserina, & succo ex althæa in aqua decocta expresso, aut ex fenugræco, aut ex decoctis laxatorijs: Fomenta etiam ex iisdem cum pubi, tum inguinibus atque ilijs calida adhibenda erunt.

erunt. Infeſſus quoque ex iſdem decoctis, ſcilicet, chamemeli, althææ, ſan-
greci, aut meliloti, vel artemiſiæ, vel amaraci, vel ex ſimilibus parati pluri-
mum agrotas mulieres iuuabunt. Areteus laudat decoctum althææ, atque ſuc-
cum eiſdem, & ſenigræci: quin etiam clyſteres molles laxatorios ex ſupradi-
ctis cum oleis tum decoctis paratos, & glandes commendat. Addunt ſternuta-
menta quoque ex puluere piperis, aut caſtorij, aut ſtruthij plurimum iuuamen-
tum adferre. Aliqui ſtatim in acceſſione extremis ſinapiſmum adhibendum eſ-
ſe voluerunt, vlceraque ab ipſo concitata eſſe diu aperta conſeruanda, vt exinde
per ea humorum vtilis euacuatio procuretur. Vt vero præſeruentur mulieres, ne
in hoc malum labantur, præter illa medica præſidia, quæ hæcenus memini-
mus, ab ipſis illud erit obſeruandum, ſcilicet, vt pluries in anno ſanguinem mit-
tant, ſi menſes fuerint ſuppreſſi, ex vena aut poplitis, aut tali, aut cruribus ſca-
rificatis: poſtea purgentur exactiſſimè ex agarico, aut colocynthide, aut rha-
barbaro, aut ellæboro nigro, aut turpeto, aut ſimilibus, aut ex iſdem, compo-
ſitis paratis, præſertimque ex hyera picra Galeni, ex diacolocynthide, ex cata-
potijs cocchijs cum elleboro præparatis, & ſimilibus, quorum ſæpe in alijs ad-
ſtrictis paſſionibus tractandis meminimus. Purgatoque corpore, præter aliquod
ſudorificum, quod non omitendum duximus, vſus antidoti alicuius erit vtiliſ-
ſimus. Inter antidota verò conuenientia eſt Theriaca antiqua drachmæ ponde-
re per multos dies deuorata, item Mithridatium, diatrion pipereon, diacalamin-
tha, diamolcus, & ſimilia. Non omitrendus etiam erit vſus multorum nuper
propoliſtorum, præſertimque pellorum, infeſſuum, inunctionum, & ſuffituum
ex aromatis paratorum.

Finis Libri Decimi.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER VNDECIMVS.

*In quo agitur de euacuationibus, & purgationibus
adstrictis restituendis. Cap. 1.*



OSTEA quam de omnibus morbis adstrictis hactenus scripsimus, restat, ad perficiendam absoluendamque stricturæ passionum cognitionem, ut nunc agamus de euacuationibus quibusdam, purgationibusque, quæ cum antea fieri in corporibus vtiliter consueuerint, postea adstrictæ, suppressæque fuerunt, ad consuetam laxitatem pro sanitatis conseruatione, restituendis. Plurimi enim interest ad valetudinem conseruandam, atque etiam ad complures morbos tollendos, ut consuetæ in corporibus euacuationes, & purgationes conseruentur, maximeque eæ, quæ pro excernendis excrementis, quotidie ex varijs concoctionibus à natura in corpore factis, necessariæ existunt, cuiusmodi sunt, ut parcius magis eas complectamur, quæ per nares, per oculos, per aures, & fauces sunt cerebrumque purgant à pituitosis mucosisque humoribus, quæ itidem sunt per aluum, per vrinam, per tussim, & quæ in mulieribus ab anno decimo quarto ut plurimum vsq; ad quinquagesimum in menstruo sanguine obseruatur, atq; in viris ab annis pubertatis ad senium vsque ex concubitu in seminis excretionem animaduertuntur. His non minus necessaria est euacuatio, quæ insensibiliter fit per poros cutis meatu suæ, quæ fuligines, quæ in corporibus generantur, commode euacuantur; Quibus necessarijs euacuationibus interceptis, homo quidem proba valetudine minime gaudere potest. His adduntur complures aliæ in corporibus euacuationes, purgationesque, quæ licet non fuerint in ortu corporum institutæ; tamen aliquibus corporibus, pro ipsorum sanitate conseruanda, non raro contingunt: cuiusmodi sunt, sudores, vomitiones, sanguinis hæmorrhagiæ è naribus, maximeque in pueris, per venasque hæmorrhoidales, sanguinis itidem euacuationes plerumque à natura pro corporum quorundam conseruatione institutæ, quæ quibusdam, mensium modo in mulieribus, in consuetudinem veniunt: quandoque & vomitus, qui familiaris cuidam corpori factus est, turò non intermittitur. Quandoque etiam quum vlcera quædam in corporis partibus, quibusdam diu inualuerunt, tutum non est ea sanari, atque tolli. Quemadmodum etiam metastases quasdam, idest humorum ad cutim transmissiones, atque ad articulos potissimum, ut in arthriticis fieri solet, ex toto prohibere tutum itidem non est. totque sunt euacuationes, & metastases, quæ si consueto modo conseruentur, corpora cum optima valetudine viuunt: contra verò, ubi aliquo modo interceptantur, aut cohibeantur, necessariò in morbos labuntur. Itaque de his adstrictis laxandis restituendisque meritò scribendum tractandumque in hoc libro duximus.

*De euacuatione, quæ per poros cutis insensibiliter fit,
intercepta, restituenda.* Cap. II.

Agredimur nunc euacuationum, purgationumque interceptarum, cohibi-
tarumue curationem, ab ea quidem suppressa euacuatione, quæ fit per po-
ros cutis insensibiliter, exordientes: de qua quidem, priusquam medicamenta,
ad ipsam restituendam, præscribamus, quædam scitu digna, & præmittenda,
nobis visa sunt, nempe, quid hæc sit euacuatio, quomodo fiat, quibusque à cau-
sis aliquando supprimatur, & quæ mala ab ipsa cohibita oriantur. Igitur eua-
cuationem hanc medicis insensibile appellatam, esse eorum excrementorum, quæ
tenua sunt, fumosaque & fuliginosa vocantur, per totius corporis cutis meatus,
quos Græci poros appellant, expurgationem, neminem medicorum latere arbi-
tratur. Etenim in corde in eius scilicet meatibus (quos ventriculos anatomici
appellant, duosque statuunt, nempe dextrum, atque sinistrum) ex sanguine pu-
riori ab hepate profecto vteriori concoctione à calore insito facta generantur spi-
ritus vitales, & in ipsorum concoctione fumidi vapores oboriuntur, distanturque;
quos natura motu cordis arteriarumque per oscula ipsarum in cutem desinentia
excernit atque expurgat. Quæ fumida excrementa, ex prædicta concoctione
continenter genita, nisi per arteriarum meatus excernerentur, cor per oppressio-
nem suffocarent; si quidem veluti flamma à multo fumo crasso extinguitur; ita
cor à vaporibus fumidis coercitis strangulari necesse est. Accedit etiam, quod,
cum omne calidum (vt diuine profecto docuit Hippocrates) frigido moderato
nutriatur, foueatur, atque conseruetur, necessaria fuit aeris ambientis inspiratio,
ad calorem insitum natium cordis ventilatione, conseruandum. Non potest
enim fieri, quin (veluti flamma loco angusto coercita, aereque minime ventila-
ta, diffolataque marcescit) calor naturalis animalium frigidi defectione langueat,
aut contabescat, actandem extinguatur. Præterea cor ob perennes ipsius motus,
nisi aeris inspiratu tanquam flabello quodam ventilaretur, periculum foret, ne
incendio conflagraret, & ne calor naturalis in igneum mutaretur, atque ne febris
accenderetur. Quamobrem animalium corporibus necessaria fuit respiratio, qua
fit aeris introductio, atque extraductio, scilicet thoracis extentione, atque con-
tractione; hanc expirationem medici vocant, illam inspirationem: illa frigidus
aer intra pulmones ducitur trahiturque, hac inde expellitur. Verum præter re-
spirationem, datur etiam in corporibus transpiratio, qua itidem motu diafoles
aer per ora arteriarum in cutem finientia ad ventilandum, refrigerandumque
naturalem calorem, attrahitur, & motu lyfsoles aer incalefactus, fumidumque
excrementum extrapellitur. Vnde Galenus in libro de salubri diæta spiratio-
nem, quam Græci πνοή vocant, duplicem esse statuit, vnā, quæ fit per os atque
nares, scilicet per meatus corporis manifestos, quam Græci ἀναπνοή, & respi-
rationem latini appellarunt; atque alteram, quæ fit per meatus cutis, quos po-
ros Græci appellant, nempe cum per totum corpus aer per insensibiles meatus
(vt dictum est) cutis inspiratur, atque expiratur. Hanc spirationem Gale-
nus transpirationem & perspirationem appellat. Itaque respiratio & transpira-
tio sunt duæ actiones, quibus ad cor, & ad totius corporis calorem vitalem
conseruandum animalium corpora opus habent. Animalia verò, quæ sunt pau-
ci caloris, languidique, cuiusmodi exanguia, insectiliaque existunt, sola tran-
spiratione, idest spiratione per cutis meatus facta, contenta, viuunt: sic ferus in
vtero tantum transpirat; sic ex hystericis mulieribus præfocata plurimum exolu-
to cordis calore viuunt aliquando ad tempus sola transpiratione. Porro quæ plu-
rimum calida sunt, caloremque & multum, & vehementem habent, vtraque

z z z inspi-

In lib. de natu-
ra pueri.

In lib. 11. meth.
cap.

In 6 epid. sec. 5.
tex. 1.

In libr. de caus.
morb. cap. 9.

Gal. in 1. meth.
meth. cap. 8.

In libr. de alimen-
to circa mediū.
In 1. de sanit.
tuenda cap. 10.
Gal. in libr. de
caus. morb. 9.

Galenus in 10.
meth. cap. 2.
In 3. de sanit.
tuenda
In libr. 8. meth.
cap. 4.
In primo epid.
sec. 2. com. 74.

inspiratione ad viuendum egent, scilicet respiratione, qua aerem animalia per os, & per nares inspirant, atque expirant; atque transpirationes, qua corpus totum insensibiliter per poros cutis aerem eundem inspirat, atque expirat. Hinc Diuinus Hippocrates dixit: Foras introque spirabile esse totum corpus. Quare ex his cuilibet constabit, utramque inspirationem animalium corporibus esse, ita necessariam, ut absque illa, si nimirum ex toto sublata sit, ne tantillum quidem animalia viuere queant. Cum verò diminuta, aut aliquo modo impedita est, viuere sanè ea possunt, sed cum sanitate vitata, atque; nunc citò restituantur, non sine graui morbo. Etenim quouis modo inspiratione impedita, cor ipsum vel strangulatur, vel eius calor exinguitur, aut in igneam vertitur: unde febres accenduntur, inflammationesque fiunt; & quidem (ut Galenus rectè expressit) non solum impedita respiratione, quæ fit per os atque per nares; sed non minus etiam ea, quæ fit per meatus cutis insensibiliter. Quando quidem per hanc calor totius corporis transpiret, ventiletur; humoresque hac ipsa ventilatione impetres, atque incorrupti maneant. Vnde mirum alioquin non sit, si corpora plurimum humida atque excrementosa proba valetudine multos annos vixerint: quoniam expe- ditos meatus, per quos calor transpirat, habuerunt. Itaque hisce meatibus omni- bus naturaliter profectò se habentibus, præsertimque cutaneis nobis occultis (de quorū insensibili euacuatione impedita restituenda, agere in hoc capite nostrum fuit institutum) corpora rectè valent; atque quouis modo isdem impeditis, scilicet, aut stipatis, vel obstructis, corpora in morbos delabuntur: nam quem admo- dum eorundem laxitas præter naturalis morbos facit; ita & innaturalis ipsorum adstrictio; utraque immoderatio vel laxitatis, vel adstrictionis, vitiosa est, à qua corpora patiuntur. Vnde Hippocrates inquit: Raritas corporis ad perspirationem; quibus amplius auferitur, saniores sunt. Densitas corporis ad perspirationem, quibus minus auferitur, morbidiores. Et Galenus, cutem densam habentes pati ab in- ternis demonstrauit; atque raritatem ab externis. Ab internis (inquam) qui ha- bent poros cutis adstrictos pati rectè ait; quia, ut alibi docuit, clariusque osten- dit, stipatis planè arterijs, ipsorumue oris; aut obstructions aliquas patientib; ita, ut nihil transpirent, calorem extinguere necesse est, atque ita affectum corpus mori: Si modica fuerit stipatio, non adeo pati calorem; Atque si in corpo- re sanguis optimus abundauerit nullo superfluo humore coinquinatus; vapor eo incalente exurgit, qui, si, ob constipata aut obstructa arteriarū oscula, non ex- cernatur, verum intus retineatur, aut corpus plethoricum facit; aut ipsum su- pramodum calefacit: si vero non vapor benignus, sed fumosa exhalatio, & acris à sanguine scilicet bilioso incalēfacto eleuetur, exhalatio hæc aut febrem accen- det, si nempe multa non sit, nec multa stipatio adsit; aut, si plurima eius reti- neatur intus copia, cum arteriarum magna stipatione, aut obstructione, vix ef- fugiet homo, quin strangulatus pereat. Quare arteriarum meatibus, potissi- mumque ipsarum oris in cutem desinentibus, aut stipatione, aut obstructu im- peditis, morbos quidem complures oboriri necesse est, scilicet caloris natui stran- gulationem, extinctionemque, aut febres, (etenim cute stipata statim febrici- tate, qui temporamenti calidi, & humidus sunt Gal. docuit in libr. 8. meth. med. cap. 7.) aut inflammationes, seu phlegmones, aut similes alios morbos graues. Ora vero arteriarum in cutem desinentia (meatus occultos in cute totius corporis con- stitutos medici appellant) impediuntur, aut à densatione conuenientiaue, siue ab earundem meatuum constipatione quam Græci πυκνότης dicunt; aut ab obstructio- ne, πυκνότης Græcis itidē vocata. στυγνότης vero vocant impeditionem hæc scilicet cutis virtutem, quo transmittere supernacua excrementa fumosa corpus prohibe- tur. Deprehenditur verò (auctore Galeno) cutis stegnostis affecta siue impedi- ta, ubi homines se exuerint, ex cutis albo colore, eiusdem duritie, atque densi- tate:

tate, & quod in exercitatione vix incallescant. Galen. in primo libro de febribus, ad Glauconem, inquit, ex tactu cutem stipatam cognosci, atque in febribus ex constipatione ortis, ex calore: Ex tactu, nimirum, si (ut Stephanus Atheniensis interpretatur) ihu acceptis, ac aqua dissolutis manus fricueris; tunc certe inueniuntur densati digiti, meatibus ipsorum veluti coactis, & densatis. Ex calore vero, dum in his, qui sunt densati, manus in thoracem iniicimus, primum quidem caliditas pauca apparet, propterea quod foras exire non permittitur, cum meatus clausi sint: ubi vero diutius immorati fuerimus, & ob id cutem calfecerimus, ipsamque rariorem fecerimus, ex diuturna manus applicatione, calor resurgit, ac maior apparet. Cause vero constipationis, siue eam dicamus densationem, siue conuentionem exiguum cutis meatuum, sunt aut valida refrigeratio, aut magna adstrictio, aut liccatio. Et quidem valida refrigeratio fit ab aere frigido, (nam Hippocrate auctore, frigus cutem obdurat), aut ab aqua frigida, aut a sudore non deterfo, refrigerato, presertimque si cutis vel ex calido balneo, vel calido sudore laxata fuerit; facile enim a valido frigore densata constipatur. Idem succedit a magna adstrictione vel a balneo, vel ab alijs adstringentibus causata: Quomodo aliquos ex usu balnearum aluminosorum, vel ex marina aqua in stegnosim incidisse, atque ab ea in febres, nos non semel vidimus. Etiam a siccatione densati constipariue cutem, argumento nobis esse possunt, qui a feruēti sole nimium siccati in febrem inciderunt. Obstructiones vero iidem cutis meatus quosdam pariuntur, vel obstruuntur quidem ubi in ipsos aut humor copiosus, aut crassus, aut lentus impegit, siue impactus adhaerit. Galenus scribit: subitum meatuum obstructionem fieri a viscoso atque crasso humore, eos scilicet infarciēte. Cum itaque cutis constipatio, aut ipsius meatuum obstructio (quod & caloris ventilationem, transpirationemque, nec minus fumidorum excrementorum, quæ, dum corpora recte valent, assidue continenterque fit, excretionem, euacuationemque prohibeat) complures morbos faciat, scilicet, ut & superius dictum est, aut plethoram, aut phlogosim, aut febres diarias, putridasque, vel phlegmonas, vel cordis palpirationes, syncopesque, atque similes alios affectus, quorum multi & summe graues, & magni periculi sint: Idcirco omni studio quam primum stegnosim erit tollenda, cutisque adstricta restituenda, laxatorijs profecto medicamentis, Gale-no etiam astipulante, qui febres ex hac causa obortas solas morbos adstrictos fecit. De quare, nempe an hæ solæ febres, vel etiam ceteræ omnes stricturæ passiones sint, quod alias fuerit determinatum, in presentia agere nostrum institutum non est. At nunc curationem tractamus. In qua primum victus ratio erit præscribenda, scilicet, ut constipati, siue cure adstricti, obstructique, maneant in loco calido & humido: parum dormiant, siue melius, abstineant a somno prolixiori, & ab otio: Cibis parcē vrantur, boni succi, tenuioris nutrimenti, extenuatis, detergentisq; facultatis: caueāt ab ijs, qui crassi, lentiq; alimentisunt, atque a dulcibus & pinguibus, cum hæc adstrictos foueant meatus: Vinum sit album, dilutum, tenue, modice subausterum. Caueant a nigro, crasso, & omnium maxime a dulci, quod facile obstruat meatus infarciatque. Opportuna exercitatione vrantur. Caueant ab animi passionibus, bilaremque vitam, ut queunt, agant. Excrementa studeant per aluum ex consuetudine quotidie excernere: ad quod clysteriorum emollientium usus est accommodatissimus, uel aliquod medicamentum stercoraceum. Modo vires ferant, sanguinis vacuatio per venam sectam, aut per crurum scarificationem, aut cucurbitulis cum scarificatione inter spatulas adhibitis, aut apertis hæmorrhoidibus procurata plurimum hos iuuabit. Quibus etiam purgantia addi poterunt, ad maiorem corporis laxationem moliendum. Decocta ex aqua cum chamedry, chamemelo, seminibus

In 5. aphorif. 20.
Gal. in 6. epid.
sec 6. com. 4.

Gal. in 8. meth.
cap. 2.

Gal. 9. meth. c. i.
In lib. de differ.
meth. cap. 7.
In 3. de loc. affe.
cap. 7.

1. ad Galucon.

Gal. in 2. de san-
nit. tuenda. c. 2.

minibus maluarum, althææ, absynthij, parata, mane calida erunt propinanda. Cum his oxymel simplex, aut oxyfacchara, aut syrupus ex acido citri vnâ miscendus erit. De externis Hippocrates inquit, calidum balneum cutem emolliat & extenuare. Galenus itidem succos cuti inhaerentes tolli per calida medicamenta statuit, ad quam rem etiam calida fomenta laudauit. Paulus huic vitio ait succurrere calefactionem, quæ valentiore exercitio, balneisque calidioribus excitanda est. Huc pertinent inunctiones ex calido oleo, dulci, tenui, cuiusmodi est amygdalinum dulce, quod iuuabit præmissis lenibus frictionibus calidis ad omnes corporis partes, si calido eo oleo tenuioris substantiæ totum corpus inungatur. Laudatur etiam oleum chamæmelinum, anethinum, atque ex populo nigro (Paulo auctore) confectum. Galenus chamæmelino, atque anethino ad cutis densitatem, atque ad humores crassos lentosque cuti inhaerentes euaporandos, primas partes tribuit. Fomenta etiam, sed commodius balnea ex aqua fluuiatili calida, aut ex ea, in qua folia althææ, aut chamæmelum, aut anethum viride, aut fenugrecum, aut melilotus ebullierit, item farina erui, vel lupini, vel nitrum oleo incoctum, si cum leni frictione cuti adhibeantur calida, erunt accommodatissima; atque etiam inunctio Ruffi ex oleo amygdalino, vel chamæmelino cum nitro parata, quæ itidem præmissis frictionibus lenibus cuti totius corporis calida adhibeatur. Denique sudorem in balneo calido humidoque promouere non erit parum vtile. At hæc externa medicamenta vtiliora erunt, si præmissa cum sanguinis missione, tum corporis purgatione, singula adhibebuntur, atque hæc ad cohibitam purgationem, ex cute adstricta, restituendam, sufficient.

In 3. simpl. c. 13
In 2. de sanit. tu.
cap. 2.
In 4. de sanit.
tuo. cap. 8.

De sudore, qui sæpius fieri sponte in aliquibus corporibus consueuerat, suppresso, restituendo. Cap. III.

Nonnunquam obseruatum est, homines non paucos, quibus sudores copiosi die vel noctu familiares facti fuerant, ne diu per æstatem, in qua propter æstum ferè omnes facile sudare solent, sed quoque non minus per hyemem vel etiam frigidissimam. Quod nos priuatim in Melchioris Zamboni horti medici Patuini, nostro topiario, etiam proxima hyemè scilicet anni M. DC. IIX. quæ fuit frigidissima, obseruauimus: huic enim fere assidue, vel etiam ex leuissimo labore, sudor effundebatur. Quo sudore aliquando cohibito, ac suppresso, in grauem morbum incidit, à quo nunquam probè conualuit, ni solitus sudor redierit. Quare sudorem (qui multus, sæpeque in corporibus erumpere consuevit, longoque tempore quasi vsum naturalem contraxisse visus est) ex quacunque causa desinentem, morbos excitare, à ratione non est alienum, siquidem omnibus quibusuis euacuationibus per sanitatis tempus fieri solitis suppressis, interceptisque corpora in morbos labuntur: Cuius profecto ratio est, quod copia excrementorum, quæ familiariter excernebantur, intra corpus retenta, plurimum augeatur, & aucta hominibus morbos inducat. Sudores verò fiunt in sanis quidem ex humiditate tenui ichorosa aliquid biliosa qualitatis habente, plurimum exuperante, per poros cutis exeunte, meatuum cutis multa raritate adiuuante, ob calorem corporis, quacunque à causa concitatum, atque auctum, vel ab exercitijs, vel à laboribus, vel à calore ex igne, aut ex sole, aut ex balneo calfaciente, aut ex calore itidem in somno aucto. vnde plethorica corpora solent noctu in somno copiose sudare, prædicta scilicet humiditate fusa, atque ad curaneos meatus attracta. Itaque cum cohibita sudoris soliti euacuatio morbos inducat, meritò reuocanda est. Reuocabitur vero medicamentis laxantibus, cum stricturæ ipsa passio

passio fit. Quamobrem, si hoc eueniat, quòd homines vel exercitationem, vel solitos labores omiserint, aut propter cibos crassi lentiq; nutrimenti, aut à vinis nigris crassioribus, aut quòd ipsorum cutis à frigore, vel à balneo aluminoso, aut falso quadantenus densata sit, ad pristinam consuetudinem homines erunt reducendi. Primò igitur victus ratio rectè instituatur, in qua cibi tenues erunt, vinum album dilutum, tenuioris substantiæ: caueant ab animi passionibus, præsertim à tristitia, mœrore, atq; à timore: solitos labores, atq; exercitia intermissa recipiāt. Quibus si solitum sudorem sibi restituerint, adhibenda sunt calida balnea, inunctiones calidæ sudorificæ, atq; etiam per os sudorem mouentia assumenda erunt. At quæ sudorem moucant, dicta à nobis sunt, in libro tertio istius operis.

*De intercepta euacuatione capitis, quæ fit per nares,
de catarrho sæpe proveniente suppresso, restituendo.*

Caput IIII.

IN corporibus, vbi nares probè caput purgant, idest, vbi meatus laxos, apertosq; habent, de morbo capitis futuro hauderit timendum. Etenim iisdem naribus aut stipatis, aut obstructis quosdam patientibus, pituita, mucus, vel alius humor per eos ductus purgari solitus intra caput retentus varios morbos in capite concitare solet, scilicet, vel (vt Galenus in libris de vsu partium docuit) epilepsiam vel apoplexiam, vel vertiginem, vel surditatem, vel cæcitatem, vel similes alios morbos, qui ob capitis, cerebriue non expurgata excrementa, cerebrum, aut alias capitis partes lædentia, oboriuntur. Itaq; hac ipsa excrementorum per nares (aut à frigore densatas stipatasue, aut obstructas à copia excrementorum ex cerebro delapsa, in ipsis infarctæ, adstrictaq; , aut ab humoris crassitie vel lentore maximo) purgatione cohibita, suppressaue, ne homines in morbos labantur, medicamentis laxatorijs erunt in pristinam laxitatem, apertionemue narium meatus restituendi. Quamobrem pro reuocanda hac purgatione adstricta, præstabit homines in loco calido & humido versari, quemadmodum adstringuntur nares ab aere aequilonari, frigido, atq; sicco. Quem aerem eos qui habent narium meatus impeditos, quoad restituantur, effugere oportebit. Vnde, vt Auicenna docuit, balneum calidum ex aqua fluuiatili ad omnes partes vultus maxime conueniet. Spongiæ itidem ex eadem calida aqua imbutæ iuxta nasi partes vtiliter adhibebuntur. Non minus vtilia erunt fomenta ex decocto althææ chamæmeli, iridis radices, maluarum, fœnugræci, lini, melilori, cymarum ebulli, & similibus parata atq; spongia adhibita. Vtilissimum quoque erit, inungere cum interius, tum exterius nares ex oleo dulci calido, aut amygdalino dulci, aut irino, aut lilino, aut eo, in quo althææ radix ebullierit, aut oleo ex cyclaminis floribus parato, & similibus alijs oleis: Eodem etiam modo butyrum conueniet recentissimum calidum illitum, adeps gallinaceus, anserinus, & porcinus, medullæ etiam, scilicet suilla, vitulina, hædina, & similes aliæ, calidæ illitæ iuuabunt: non minus conferet, si singulis diebus mane ante cibum sæpissime in nares detrahatur aqua calida, aut althææ, aut maluæ, aut lilij, aut iridis, aut cucumeris, aut cyclaminis radices decoctum calidum: Commendatur etiam succus aut anagallidis, aut anemones, aut betæ, aut maioranæ, aut cyclaminis, aut cucumeris syluestris, eodem modo attractus. Experientia deprehensum est, frustula radices cyclaminis viridis in nares imposita & per noctem retenta, maxime valere ad obstructas nares aperiendas, atq; ad suppressam purgationem per nares reuocandam. De catarrho vero, qui in aliquibus corporibus aliquando fieri solet, præsertimq; hyemali tempore, aut in vere, si aliquando cessauerit, desieritq; purgatio, quæ

per

per ipsum fit, videndum erit, an sit ea purgatio, vel possit tuto medicamentis restitui. Per catarrhum autem intelligi volumus quamcunque euacuationem capitis ex humore scilicet distillante, irruenteq. in nares aut in fauces, vel in palatum, vel in guttur, vel in asperam arteriam, vel deniq. in pulmones, factam. In adagio dicitur, eos, qui aliquando catarrhis, ac sternuramentis purgantur, recte capite valere; contra vero, illos qui, cum antea commodè ijs modis purgarentur, postea talibus purgationibus destituuntur, male se habere, periculumq. exinde fieri, vt in morbosum statum mutentur. Vtrum vero conueniat, sublatis sternutationibus ex catarrhis restituantur, non est planè omnibus compertum, attamen hoc quidem moliri non videtur inutile, scilicet vt renouentur purgationes ex sternutationibus grauedinibusq. siue catarrhis sequi solite, non quidem ijs, quæ catarrhos excitant, at medicamentis errhinis, sternutatorijs, apoplegmatisimis, caputpurgijsq. vocatis; ita, vt sublatis illis solitis purgationibus, caput purgijs nuperrime præscriptis, caput sit purgandum, quod commodè atq. tuto succedet, vbi antegressa fuerit totius corporis communis purgatio, euacuationeque.

De ulceribus in quibusdam corporis partibus obortis, & antiquatis, pro luenda valetudine, conseruandis, de quibusdem sublatis restituentis. Cap. V.

Sæpe nos vidimus complures diu, multos scilicet annos, proba valetudine vixisse, quia in ipsorum corporibus habuerunt vlcera cacoethia, diuturna, per quæ excrementa superfluentia assidue veluti per fonticulos quosdam euacuabantur. Aliqui in ambobus cruribus, vel in altero tantum, aut in pudendis, aut in brachijs, aut in ore, aut in alijs locis. Qui quoad, vti dictum est, ea vlcera aperta seruabantur, probe valuerunt: si a quacumq. vero causa iisdem vlceribus cicatrice clausis, sanatis, sublatisque, citò in morbos ij delabi solent, sæpissimeq. in lethales, a quibus extinctori sunt. Georgius Amicus, ciuis Bassanenſis, Minerua Forcatura, Faustinaq. Monacha in Ede D. Sebastiani, eius soror, qui oēs ad eam ætatem usq. crura vlceribus defædata habuerunt, quo tempore perfecta sanitate semper vsi fuerunt; illi vero vlceribus cicatrice clausis, singuli in morbos lethales paulo post delapsi, mortem obierunt. Memini, cum olim ex Aegypto patriæ redditus, Bassani per annum & plus fuerim commoratus, me a nobili viro, Francisco de Rubeis, annos supra sexaginta nato, naturæ (vt aiunt) satis robustæ, fuisse accersitum, vt a crurum tibijs vlceratis (diu enim hæc vlcera cacoethia in tibijs cum magno profectò sui fastidio, tenuerat) ipsum liberarem. Quibus attentius consideratis, consului, vt doloribus demulcitis, ea vlcera non nisi antegressa exquirita cum euacuatione, tum maxime purgatione, tollerentur, neq. planè, seu ex toto ea omnia cicatrice clauderentur, quod nimirum per ea multum humoris virosi purgaretur: is mea opinione non contentus, alio medico accersito, ab ijs vlceribus sanatus est: verum post paucissimos dies, syncopè repente oborta, extinctus est. Itaq. consultus erit, vt huiusmodi vlcera, quæ longo tempore corpora tenuerunt, & quibus nunquam probe obducta fuit cicatrix, aperta conseruentur: & si quando cicatrice claudantur, denuo aperiantur, ne interceptus humor malignus ad viscera conuertatur, grauemq. noxam illis inducat, a quo morbus grauis fiat. Denuo restituantur, si caustico æquali partes exulcerari solite inurantur: sed mox, crusta adempta, medicamentis humectantibus putredinemq. augmentibus, aperta seruanda erunt: quandoq. scarificatio in ijs locis ad renouandum vlcus lateris, aliquando verò medicamentum vesicans appositum, aut caustica vbi prædictum.

præditum. Ad hunc scopum sequentia erunt accommodata; sinapi tritum, atque impositum, vel radix ranunculi trita imposita, vel folia clematidis vrentis, aut modicum auripigmenti, aut arthenici, aut aliud simile, hæc enim partibus adhibita, vlcus consuetum renouabunt. Ad hoc idem balneum ex aqua dulci erit accommodatissimum: atque non minus fomentum ex dulci oleo, aut ex decocto altheæ, maluarum, sanugreci, & similibus.

De arthritide antiquata, qua postea ex toto sublata est, promouenda valetudine; renouanda. Cap. VII.

Humorum quoque à partibus nobilibus ad ignobiles metastases, id est transmutationes, cum semper ad vitam tutandam sint utiles; idcirco, quæ longò tempore siue per multos annos fieri in quibusdam corporibus aliquando contineuerunt, & postea cessauerunt, malum graue, nisi restituantur, prælagire solent. Nos, doloribus intermissis, de his (licet euacuationes non sint, sed metastases, id est, à visceribus ad extimas partes transuersiones, quæ merito euacuationibus proximè assimilari debent) restituendis agendum esse duximus. Huiusmodi vero metastases, id est humorum vel ad guttum, vel ad articulos à visceribus transuersiones, in habentibus viscera interna robusta (quod ipsorum expultrice valitè de expellat) familiariter fieri solent, vel ad brachiorum articulos, vel ad pedes, humorum molesta qualitate, aut quantitate à visceribus quibusdam ordinatis circuitibus propulsa, & decumbente; à quibus licet dolores inuadant, atque homines vexent, corpora tamen in internis visceribus rectè valere obseruantur. Qua de causa in adagio dictum est, podagricos diu viuere. nam quoad podagrici sunt, solitisque modis podagrico morbo vexantur, nunquam grauiori morbo periculoque corripi solent. Verum desinentibus ijs doloribus, in dubio illorum vita est, siquidem humorum copia, quam viscera ad articulos, aliaque partes corporis transmittere soleant, intus coarctata, eiu que transuersione cohibita, aut quouis modo impedita, si ad viscera conuersa fuerit, morbos alios grauiores, & periculosiores facit. Vnde mirum non est, si complures, quoad podagrico morbo vexati sunt, salubriter vixerint, qui postea morbo consueto intermisso, alio grauiori correpti breui interempti sunt. Magnus Dux Hetruriae (ut audiuimus) eum prius acerbè quidem podagra vexatus, postea liber, ferè euasisse visus esset, oborto postea catarrho, ab humore, qui antea ad articulos decumbens podagram faciebat, in pectus irruente suffocatus diebus proximis (non sine Hetruriae, atque totius Italiae magno dolore) interijt. Hermes Forcatura Patavinus Iuriconsultus celeberrimus, postquàm solita podagra in ipso desisse visa est, apoplecticus factus, mortem obiit. At mirum est, quosdam diu podagra vexatos, & postea in apoplexiam incidentes, ab eaque superuiuentes, non amplius podagra, quoad vixerunt, fuisse tentatos. Quod euenire in ijs corporibus solet, quæ visceribus internis debilitatis, haud probe ab ipsis ad articulos humores superfluos depellere, vel transmittere possunt. Hinc non pauci, qui ferè per omnem ipsorum ætatem acerbè quidem dolores podagricos passi sunt, in senium protracti, viscerum scilicet expultrice in ea ætate quadantenus labefactata, minime amplius in ipsis humorum metastasi solitis temporibus continuata, à podagra melius se habuerunt, ac nonnulli ferè omnino liberi euasisse visi sunt. Qui si parce viuant, & in ipsis aut medicamentis catharticis, vel spontaneis per aluum laxam defectionibus, aut vomitionibus, excrementa superfluentia commodè expurgentur, diutius illorum vita protrahi poterit. Itaque in ijs, quos per longum tempus podagra haud visa est afflixisse, periculum est, ne ipsi in grauem morbum labantur. Vnde aliquibus temporibus præstabit huiusmodi fluxiones rursum excitari, atque

Aaa commo-

commouere. Quod facile assequemur, si crura & pedes perficerimus bis aut ter in die, pedesque sepe aqua dulci fluuiatili calida abluerimus, aut large calidis oleis dulcibus eos articulos sepe inunxerimus, aut in illis partibus (ad attrahendum scilicet ad eas humorem) ligaturis etiam vsi fuerimus. Hæc medicamenta non raro vsu veniunt in assuetis pati podagrâ, si alio grauiori morbo detineantur, ut apoplexia, vertigine scotomatica, aut mania, aut aliqua phlegmone interna. Et nos ipsi quidē ab hinc trib. annis angina exitiali laborauimus: in qua prædictis auxilijs cōsueti nobis podagrici dolores à Medicis fuere nō sine fructu reuocati. Sæpius in vanū laborāt Medici, ut in quibusdā aut apoplectico morbo, vel alio grauiori affectu exitiū minante occupatis illos excitent dolores, atq; phlegmonas externas, quādo natura grauius à morbo vexata, lāguidior reddita, nequit humores ex afflictijs visceribus ad articulares partes solito modo demandare. Ad hoc caput etiam spectare videntur quædam corpora crura cedematosa habentia, aliquando post morbum grauem ita tumida reddita, & aliquando ex pituitosi humoris ē superiori parte corporis ad infernas transmissio, vel demum ex iecoris morbo copiosius eo humore genito, atque ad crura (natura propellente) transmissio. Neque enim ea humoris fluxio aliquo pacto erit cohibenda. Quod si fieret, humoris abundantia ad hepar, vel ad aliud viscus internum conuersa grauem morbum faceret. Quod Horatio Lugo Ciui Bassanensi contigisse olim vidimus. Namque, consilio cuiusdam medici cū fascijs crura inferius incipiendo arcē ligasset, citò crura aliquatenus detumuisse visa sunt, & non sine magna patientis voluptate; sed (quod illi antea futurum prædixeram) paulo post, exiccatis; sanatisque cruribus, oborta febre, interijt.

De consueta hæmorrhagia, idest de sanguine in quibusdam per nares familiaris, sæpe, salubriterque exeunte, suppresso, restituendo. Cap. VII.

Plurimi interest, ut solite in corporibus sanguinis euacuationes suppressæ sedulo à medicis obseruentur, præsertimq; hæmorrhagia, idest particularis sanguinis euacuatio, quæ per nares fit. Hæc cum familiaris quibusdam temporibus fieri in aliquibus consueuerit, præsertim in iuuenibus, postea si planē cohibeatur, absque dubio morbos futuros prænunciat. Pueri, adolescentes, atque iuuenes solent facile hæmorrhagiam pati, qua sæpius à capitis dolore liberantur, à vigilijs, atque etiam à febribus ardentibus & synochis. At, ut vno verbo dicam, quo ad patiuntur hæmorrhagias, & copiosiores etiam, recte valere obseruantur: quibus præter consuetudinem suppressis, interceptisque ipsi in morbos incidere solent, nempe aut in capitis dolorem, aut in inflammationem, aut in maniam, aut in anginam, aut in pleuritim, aut in pulmoniam, aut in sputum sanguinis, & phthisim, aut in febrem synocham, vel ardentem. Quare in iisdem, priusquam ipsi in morbum aliquem deducantur, suppressa hæmorrhagia erit quanto citius restituenda. Hanc verò restituent balnea calida ex aqua dulci ad caput facta, vel lotiones ex eadē aqua, in qua ebullierint aut althææ folia, aut maluæ, aut fenugrecum, aut linum, aut simile aliud. Hippocrates laudauit, ad prouocandam hæmorrhagiam, in quodam acuto morbo laborante, aquam calidam fronti affusam: spongiæ idcirco imbutæ eadem aqua, & expressæ vtiliter fronti atque temporibus adhibebuntur. Inunctiones itidem calidæ ex oleis dulcibus intra nares, atque extra adhibere plurimum laxando eas partes iuuabunt. Agyptij, præter præscripta auxilia, hæmorrhagiam excitant scētis venis intra nares. Galenus in libro de facile parabilibus ad eundem scopum laudat florem grammis

minis intra nares positum. Quo medicamento nos sapissime per ætatem vidi-
mus pueros complures sibi sanguinis hæmorrhagiam concitasse. Si vero his vel
alijs similibus medicamentis sanguinis solita euacuatio non fuerit reuocata, præ-
stabit, pro sanitate tuenda, in ijs corporibus sanguinem aut secunda vena, aut cru-
ribus scarificatis, aut alio modo educere, & euacuare.

De hæmorrhoidibus suppressis restituendis. Cap. VIII.

Non minus mariscæ, seu hæmorrhoides modice quibusdam temporibus
fluentes ad tuendam sanitatem viles esse observantur. Hippocrates scribit:
» Qui hæmorrhoides habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, neque
» phagedæna, neque furunculis, neque terminthis, forsan neque lepra, & forsan
» neque alijs, & in aphorismis ait: Atra bile vexatis, & renum passionibus, hæ-
morrhoidas superuenientes bonum: quia tum reuellunt, tum euacuant ma-
teriam, quæ renum, & melancholicas passiones, atque etiam insaniam genera-
bat. Galenus & ipse scripsit, melancholiam incipientem sapius hæmorrhoids
prohibuisse visa est, atque iam factam sanauisse, & lieni indurato non minus
profuisse. Contrà, si cohibeantur, homines in grauissimos morbos labuntur.
Multos nouimus, apertas quoad hæmorrhoidas habuerunt, recte valuisse; qui-
bus postea à quavis causa suppressis, abortis exinde morbis grauioribus, inte-
risse. Itaque à suppressis hæmorrhoidibus solet in hepate atque liene fieri scirrho-
sis ac refrigeratio caloris innati, unde aqua intercus quoque succedit: præterea ver-
tiginosi fiunt, atque melancholici, quibus diète venæ cohibentur. Hieronymus
Capellus illustrissimus amplissimusque Senator Venetus DD. meus Colendissi-
mus proximo anno à suppressis hæmorrhoidibus, quas multos annos habuit, in-
affectum scotomaticum incidit. Magni igitur iuuamenti ad conseruandam sani-
tatem erit, si mariscæ cohibita aperiantur iterum, interceptaque ipsarum euacua-
tio consueta, quanto citius fieri potest, reuocetur. Hoc enim quo celerius fiet,
eò vtilius erit, & tutius, ad defendendum, ne in morbos labantur. Itaque ut
adstrictæ hæmorrhoides reuocentur, laxatorijs cum balneis, tum fomentis, tum
inunctionib. laxandæ, aperiendæque sūt. Dioscorides ait; iridis decoctum oscula ve-
narum laxare, aperireque. Idem præstabit decoctum cyclaminis, aut cucumeris
sylvæstris, aut bryoniæ, aut mercurialis, vel fomenti modo adhibitum, vel si ex
eo infusus parentur calidi. Aliqui hæmorrhoidas aperiunt fel bubulum glandis
forma intra anum mittentes; aut tritam mercurialem eodem modo impositam:
Alij adhibent succum cyclaminis; alij eundem succum cum pari mellis mensu-
ra ad compagem mellis decoctum immittunt: Alij piperis & nitri æquas partes
tritæ sedi adhibent. Alij hoc compositum adhibitum maxime aperire hæmorrhoi-
das dicunt, scilicet, quod accipit centaurij minoris, aluminis liquidi, singulorum,
3.ij. misyos, staphydis agriæ singul. 3j. melle excepto. Cæterum, ni hæc profue-
rint, eadem adhibitis hirudinibus, aut sectione cum phlebotomo, si appareant,
reuocato.

*In 6. epid. 3. tex.
In 6. aphor. 11.
In 4. aphor. 25.
In 6. epid. sec. 6.
com. ult.*

De mensuris in mulieribus suppressis reuocandis. Cap. IX.

Sanguinem, qui in mulieribus vnoquoque mense commodè euacuatur, si ob
aliquam affectionem retineatur, molestiam ijs atque noxam necessariò indu-
cere Galenus est auctor. Retineri verò ait vel propter venarum in vtero men-
struam purgationem deferentium coniuuentiam, contractionemque osculorum, vel

*In 5. aphor. 33.
In lib. 5. aph. 57.*

A a a a ob ob-

ob obstructionem earum, vel ob sanguinis crassitiam, & frigiditatem, vel ob ipso-
rum uteri vasorum robur affluentem sanguinem non admittentium. Paulus scri-
bit menstruam purgationem suppressi aut vitio totius corporis, aut uteri: vitio to-
tius corporis, utpote cum ab assiduis curis totum digeritur, ita, ut sanguis, in ipso
minime superfluat, qui menstruam purgationem faciat, aut cum ex immodico
timore, vel merore ingenti, totum adstringitur, ipsiusq; venæ, quæ ad uterum
sanguinem singulo mense deferunt, itidem adstringuntur: eodem modo ex im-
modica caliditate totius corporis sanguis digeritur, unde corpus maxime gracile
siccumq; redditur. Contrà verò ex intemperie frigida sanguis crassior fit frigi-
diorq; idcircoq; ut ad uterum feratur, ineptior redditur; in mulieribus vero ni-
mium pinguibus sanguis in adipem mutari solet: unde hæc parum vel nihil purga-
tur. Demum ob diuturnum morbum corpora extenuata menstruas purgationes
non patiuntur, scilicet superfluente sanguine menstruas purgationes faciente, ob
morbum, absumptum; veluti ob immoderatam evacuationem vel sanguinis vel
excrementorum idem evenit, nimirum, humore aliò diuertente, menstrua purga-
tio fieri nequit; quo modo etiam utero gerentes non purgantur. sicq; vitio to-
tius corporis menstrua purgatio suppressi solet. Uteri vero vitio menstrua pur-
gatio non fit, si uterus morbo aliquo laboret, scilicet aut calida intemperie siccan-
te sanguinis humidiorē tenuiorēq; substantiam, atq; ita sanguinem crassiorē
ad motumq; inhabiliorem faciente, aut frigiditate sanguinem ceu congelante
atq; ad fluendum ineptiorem reddente, aut aliquo tumore, aut phlegmone, aut
carnis excrescentia, aut adipē vasa uteri comprimente affectus sit, vel si ipsius ute-
ri venæ obstructæ sint, aut ipsarum oscula densata, aut si substantia itidem uteri
densata, ac indurata venæq; vel à frigiditate, vel ab aliquo comprimente angu-
stiores reddat, aut sanguinis, uti dictum est, crassitie, vel frigiditate, quod com-
mode meare uteri venas nequeat, purgatio menstrua defecit, ex qua quidem men-
strua purgatione cohibita, si diù duraverit, mulieres in graves morbos necessario
delabuntur. Aliquæ in spurum sanguinis incidunt, ex quo deinceps phthisi in-
tereunt. Quod proximo anno Emilie nobili virgini Bellasine Bergomenfi acci-
dit, quæ cum menstrua purgatione ex merore assiduo defecisset, cum spurco san-
guinis orta febricula cum assidua tussicula paucos post menses interiit, facile itidē
in epilepsiam, aut in melancholiam, aut in maniam, aut in vertiginem, aut in
phlegmonem, aut in cordis palpitationem, vel syncopiam, in cachexiamq; & hy-
dropem, atq; etiam aliquando in tumores scirrhosos, cancerosos, vel in elephan-
tiasim, vel in lepram, vel in scabiem, vel in similes alios affectus mulieres incide-
re solent. Quare cunctandum non est, ut adhibitis præsidij purgatio renouetur,
restituaturq;. Itaque præscripta victus ratione, in qua cibi incidentes, extenuan-
tes detergentesq; atq; sanguinem commouentes convenientes erunt, scilicet cali-
dæ facultatis, & substantiæ tenuis, cuiusmodi est porrum capitatum decoctum cum
pipere mansum, fercula ex herba viridis feniculi, aut petroselini, vel apij, & simi-
libus parata maxime conveniant, aut radices itidem petroselini, vel pastinacæ
tum domesticæ tum sylvestris decoctæ, cum oleo, sale, pipere conditæ esiræt. eodē
modo iuuabunt caules recentes tamari, vel rusci, vel maluarum, vel asparagi &
hortensis & sylvestris in aqua decocti cum pipere, sale, oleoq; itidem conditi primo
cibo assumpti. Paulus commendavit ad sanguinem commouendum in cibo de-
coctos lolligines, sepias atq; polypodes. Quibus addentur carnes convenientes
aut hædinæ, aut vitulina, aut veruecinæ, aut animum montanarum, aut gallina-
ceorum gallorum iuniorum, decoctæ in aqua cum petroselino, aut apio, aut feni-
culo, aut similibus. vinum erit album, tenue, non merum neq; multū aquosum.
In loco calido manere mulieres oportebit, hilaresq; esse, atq; omnino si fieri po-
test, ut caueant ab assiduis curis, a merore, timore, & similibus animi passionibus.

Victusq;

Victus ergo rōne p̄missa ad laxatoria p̄sidiā erit deueniendum: & primum cū sanguis in corpore retētus stricturæ passionem faciat, eius euacuatio erit congruentissima, aut secta vena tali vel poplitis: Actius in magna plenitudine secabat primum venam cubiti, atq; postea venam tali; Nos consueuimus secare venam tali dextri pedis, & postea etiam sinistri. Tempus vero huic euacuationi accommodatum erit per tres aut quatuor dies, antequam futura esset menstrualis purgatio; quo nempe tempore mulieres commode singulo mense antea purgabantur. In mulieribus vero albidioribus p̄stabit magis (auctore etiam Galeno) sanguinis euacuationem, cruribus Aegyptiorum antiquorumq; medicorum modo scarificatis, moliri, aut cucurbitulis intra coxendices atq; cruribus recentiorum more cum scarificatione adhibitis. Ceterum, antequā sanguis euacuetur, p̄stabit, nisi alius sponte laxa fluidaue fuerit, eam laxare aut clystere molli, aut medicamēto cathartico ex lenitorijs, scilicet, ex cassia, aut ex manna, aut ex syrupo vel rosaceo laxatiuo, vel violaceo, aut ex electuario lenitiuo, aut ex diacatholicone vocato, vel ex melle ros. itidem laxatiuo, aut demum secundum artem ab his simplicibus ex aliquo ad laxandam aluum composito paratoq; medicamento; Vtilissimum quoque erit paratis humoribus cum syrups accommodatis, scilicet incidentibus, detergentibus, emollientibusq; decocto opportuno dilutis singulo mane per aliquot dies calidis propinatis, corpora cathartico eductorio purgare. Pro parandis humoribus accipe oxymellis simpl. aut syrups acetosi simpl. syrups de betonica, de boragine an. vnc.s. decocti capil. veneris recentis, agrimonij, althææ, foliorum sonchi, boraginis, betonicæ, vnc.ij. pro Purgatione molienda poterimus exhibere medicamentum quod recipit rhabarbari electi 3 j.s, agarici trochiscati 3 j, spicæ, cinnamomi an. scrup.s. per noctem infundantur in vino albo aromatico, & expressio ni addatur syrups de polypodio vnc.j.s, māne electæ vnc.j. misce cum decocto flor. & fruct. cord. cum modico seneg & epithymi q.s. fiat potio, quæ in aurora dabitur, aut dabitur in bolis, quod itidem recipit rhabarbari electi puluerizati, agarici trochiscati an. 3j, diacatholiconis vnc. j. confect. hamec 3ij. misce fiant boli. euacuatoq; & purgato corpore his medicamentis vel similibus, ad vsum eorum medicamentorum, quæ intro assumpta menses mouere possunt, deueniendum erit, quæ medicamenta, ex Galeno etiam, erunt facultate calida & modice sicca. Attamen si humiditatem habebunt coniunctam, non erunt spernenda, quod sanguis crassus siccusq; humectatione fluxilior reddatur. Itaq; per plures dies opportunum erit decoctum ad semilibram calidum cum tantillo croci singulo mane propinatum. Hoc autem erit decoctum pulegij, capillorum veneris, cum tantillo croci, aut leucoij lutei seminum, aut radices cyperi, aut cicerum rubeorum, aut floris iunci odorati, aut helenij, aut calaminthæ, aut chamedryos, aut aristolochiæ longæ, aut cinnamomi, aut cassiæ odoratæ, aut amomi, aut mei; ex efficacioribus vero decoctis, quæ non nisi alijs pertentatis prius erunt exhibenda, est decoctum, dictamni, iridis, sabinæ, aristolochiæ longæ, atq; asari. hæc quandoq; ex aqua parantur, quandoq; ex vino albo tenui. quandoq; dabitur pulueris prædictorum ad drachmam & ad geminam quoque ex vino albo. Gal. in 2. med. loc. cap. 1. dabat sabinæ vel dictamni drachmam cum cyathis tribus aque calidæ. Sed hæc omnia dabuntur calida. Verum ex compositis dabitur decoctum paratum ex iridis radices minutim incisæ vnc.js, ex seminū, althææ, maluarum, fenu greci an. vnc.s. foliorum althææ, m. 1. pulegij m. 1. bulliant in lib. duabus aquæ ad consumptionem tertiæ partis, & colatum dabitur ad vnc.iiij. calidum in aurora per plures dies, & post, ni menses redierint, hoc efficacius exhibebitur. Quod parabitur accipiendo radices iridis illyricæ siccæ minutim incisæ, aristolochiæ longæ itidem minutim incisæ an. vnc.ij, caulium althææ, vnc.j.s, cassiæ aromaticæ, cinnamomi an. 3.j, capillorum veneris recentissimi, pulegij, calaminthæ, chamedryos, sonchi,

In lib. 5. simpl.
cap. 22.

fonchi, an. p. ij. Vini albi aromatici, aquæ communis an. lib. iij. Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, & colatum exhibeatur decoctum per decem & plures dies calidum in aurora ad vncias quatuor cum tantillo croci: At ad pessorū vsum venimus, qui est cæteris præsidijis longe ad prouocandos menses efficacior, sed hi solummodo ad mulieres corruptas erunt accommodati, nequaquam verò ad virgines. Accommodatissimus erit pessus ex contrusis maluorum, & althææ radicibus, cum adipe anserino vel gallinaceo saccharoq; rubro, ex lana vel serico paratus, calidus inditus: ex oesipo quoque atque ex lana per tres dies inditus erit vtilissimus, & ex oleo itidem dulci paratus, aut amygdalino dulci cum lana ad vteri locos adstrictos laxandos erit utilis: non minus & is, qui ex lilij albi radice, aut cyclaminis, aut dracunculi, aut bryoniæ cocta contrita eodem modo paratur. Rubiæ quoq; radix trita ex melle subdita cōmendatur, atq; hyperici semen tritū itidem ex melle subditum. Efficaciores vero ad mouendos menses pessus sunt hi, scilicet vrticæ folia cum myrrha trita atque subdita; Aristolochia longa cum myrrha & pipere ex melle indita; assa fætida ex oleo irino dissoluta lana excepta & subdita: succus cyclaminis ex melle, opoponax, galbanum eodem modo ex oleo dulci amygdalino inditum. Elleborus albus, aut niger tritus, aut dictamnium itidem tritum, aut cyclaminis, aut bryoniæ radix trita ex melle subdita, non minus, quam scammonium tritum, itidē ex melle. Nonnullæ mulieres pro pessobus ex oleo dulci inuncta atque scammonio trito aspersa. elaterium itidem cum oesipo, ita vt semūcię oesypī drachmæ duę elaterij permisceātur, subditū vterū efficaciter purgare in praxi sæpe deprehēdimus. In muliere vidua suppressis mēstruis melancholica atq; maniaca reddita pro pessobus vti fuimus fructib. syluestris cucumeris recentib. cōtusis, lana exceptis, subditisq; tāto cū iuuamēto, vt, restituta purgatione menstrua, probe ad mentē redierit, ac pristinę valetudini fuerit restituta. pulpa quoq; colocynthidis contusa ex melle subdita maxime vterum purgat. Alij pessum parant ex farina loliacea cum succo porri subacta. alij cum elaterio, & cyclaminis succo. Alij parant accipientes medullæ ceruinæ, galbani, ammoniaci oleique æquas partes. Suffitus quoque ad euocandos mentes vtilissimi sunt, sed maxime aromatum, iuxta aphorismum Hippocratis dicentis: Suffitus aromatum muliebria ducit. vnde & ex decocto althææ, maluarum, chamemeli, radicis cucumeris syluestris, fenugreci, lini, anethi, & similium, in aqua decoctis, si fumus calidus excipiat, erit ad reuocandos menses præsidium latis accommodatum. si vero pastilli ex aromaribus parati supra carbones ignitos aspergantur, ipsorum fumus vtilissime excipietur. pastilli conuenientissimi erunt hædycroi, cyphi vocati, atque qui ex ligno aloe, cariophyllis, cassia, cinnamomo, scēnantho, cypero, costo, spica celtica, benzoo, styrace, myrrha & similibus parabuntur, cum opobalsamo orientali, aut eius loco, ex occidentalibus Indijs delato, aut oleo nucis moschatæ: aut ex oleo irino, vel rutaceo, vel anethino, vel cicino, vel amygdalino, vel ex melle, vel simili alio ex succo, aromatibus tritis atque permixtis, pastilli parabuntur ad drachmæ pondus, in vmbraque siccabuntur. Inseffiones quoq; accommodatissimæ sunt ad mouendos menses, quæ ex decocto althææ, maluarū, fenugreci, & chamemeli ex aqua parato fiunt. Nonnullæ mulieres in aqua decoquant comam allij ficcata; aliæ pulegium, & calamintham, aliæ porra capitata in aqua itidem decoquant, alię sambuci folia, vel ebuli, vel leucioij semina, ex quorum decocto inseffiones parant. Decoctum vero ex iridis illiricæ radice sicca, auctore Dioscoride, maxime vasorum vteri spiracula laxat, atque idcirco ad menses mouendos est maxime vtile, non minus verò in aqua paratum ex radice Aristolochiæ longę, vel cyclaminis, vel bryoniæ. Ad hunc vsum itidem accommodantur fomenta spongijs excepta atque imo ventri, inguinibusq; appo-

sita,

De 5. Aphor. 28.

ſita ex decocto ſcilicet althææ, ſenugræci, chamæmeli ſorum, pulegij, dictamnij, & ſimilium. Aut ex hydrelco, aut ex oleo irino, vel amygdalino dulci veſica ex-
cepto. Inunctiones itidem calide ad anum ventrem, pubem, atque ad ingui-
na, factæ ex oleo dulci, aut amygdalino, aut anethino, aut eo in quo radix althææ
ebullierit, utiles erunt: non minus etiam quæ ex oleo irino, lilino, atque ex flo-
ribus cyclaminis parato parabuntur: ex pinguedine quoque anſeris, vel gallinæ,
& ex butyro recenti eas partes inungi, erit vtile, non minus, quam ſi vnguentis
calidis ex iſdem oleis, adipibus, atque ex medicamentis ſupraſcriptis paratis ee-
dem partes foueantur; illinianturque.

*De vrina ſuppreſſa reſtituenda.**Cap. X.*

TRiplex eſt vrinæ non probè per veſicæ canalem exeuntis vitium, primum
vbi vrinæ guttatim ex veſica deſtillat, Græci hunc affectum ſtranguariam vo-
carunt, & noſtri vrinæ ſtillicidium. Secundum, vbi vrina ægre, difficultetque
excernitur, dysuriam itidem Græci hunc affectum dixerunt, & noſtri, vrinæ diffi-
cultatem. atque tertium, vbi ipſa ex toto ſupprimitur, retineturque; quæ affectum Græ-
ci quoque iſchuriam nominarunt, & noſtri ſuppreſſionem vrinæ. Primum, vrinæ
acrimonia affectum concitat, vel veſicæ vlceratio; aut humor aliquis mordens
in veſicam delabens, aut pus ex iecore, vel ex renib. in veſicâ fluens. Aegrè ve-
rò excernitur, ob veſicæ imbecillitatē à frigida intēperie, aut ob obſtructionē me-
tuum urinariorum ex humore craſſo, & lento; à qua cauſa, & à grumo ſangi-
nis, & quandoque à pure, aut à tumore aliquo, uel ab adpata caruncula, & quan-
doque à calculo, ex toto aliquando ſupprimitur cohibeturque. Quæ paſſio eſt
uſque adeo grauis, ut, niſi citò ei occurratur, & urina medicamentis per os, aut
exterioribus adhibitis, aut denique intromiſſo cathetere mouendo educendoque pro-
liciat, citiſſimam mortem minetur. Itaque ſuppreſſa urina (quod ſtricturæ
paſſio ſit) laxatorijs medicamentis intus, foriſque adminiſtratis, ad curationem
agendum erit. Inter quæ inunctiones ad pubem ex oleis calidis, erunt accommo-
datæ, ſcilicet ex oleo amygdalino dulci, chamæmelino, anethino, irino, atque ex
eo in quo radix althææ incocta fuerit, aut lilino, aut è ſcorpionibus parato. fomen-
ta etiam perquam utiliter adhibebuntur, aut ex decocto althææ, parietariæ, cha-
mæmeli, ſenugræci, aut ex parietaria, aut chamæmeli floribus in ſarragine cū
oleo amygdalino frixis, pubique calidis adhibitis. Infeſſus quoque viliſſimus
erit calidus ex oleo, aut ex hydrelco, aut ex decocto althææ, maluarum, chamæ-
meli, ſenugræci & ſimilium; aut ex aqua dulci calida concinnatus. Clyſterum
itidem ex eodem decocto, oleo, atque melle paratorum uſus, erit miſtionis de-
fectui conuenientiſſimus. Ex ijs vero, quæ per os aſſumpta vrinam mouere apta
ſunt, hæc erunt aptiſſima: Decoctum primo ſeminum althææ, maluarum, ſenu-
græci, cyperique radicis; aut R. ſeminum althææ, maluarum, eryſimi, apijque
an. ʒ. j, ſeminum melonis decorticatum ʒ. iij, in libris duabus aquæ decoquito
quo ad tertia pars abſumatur, & exhibeto calidi decocti ſemilibram. Datur etiam
ſummo cum iuuamento, aqua radicum anonidis herbæ, aut eryngij. Decoctum
itidem radicum aſparagi, aut ſenecionis, aut ſeniculi, aut iuniperi: Nonnulli
decocto ſabinæ, aut radicis rubæ, tinctorū feliciter uſi ſunt. Datur autem, tan-
quam ſingulare medicamentum, drachma ſeminum eryſimi tenuiſſimè triti, vel
drachmæ duæ in vino albo. Aliqui pro ſecreto extollunt oui corticem, ex quo pul-
lus ſit exclusus, à pellicula ſua probè emundatum, tritumque ad drachmam
ex vino albo epotum. Nonnulli audent exhibere cantharidum decoctū in aqua
ſeniculi paratum, decoquentes ipſarum drachmam, detractis capitibus atque
alis:

alis: A quo quidem medicamento, tanquam ab exitiali veneno, cauendum esse existimamus. Et tandem, si medicamenti vrina moueatur, cathetere inter omnes foret educenda, aut cerea candela subtili inuncta amygdalino oleo per penis meatum intra vesicę os immissa: *cap. x.*

De vomitione intermissa, restituenda. *Cap. XI.*

Quemadmodum in multis vomitus saepius excitatus ad sanitatem consequendam plurimi adiumenti esse solet, quod per eum corporis complura excrementa expurgentur, praesertimque ea, quae in stomacho abundant: ita quoque si aliquandiu, in ijs, qui ipso familiariter atque frequentius uti soliti fuerint, intermittatur, corpora in morbos labi, necesse est. In me ipso hoc experientia didici. Etenim cum abhinc annos multos vomitum sanitatem habuissent, recte valui, quam vomendi consuetudinem deinde, stomacho ad vomendum duriori reddito, posteaquam intermisi, morbosiorē vitam, ex morbo articulari aucto, ducere capi. Ceterum vomitum moruentia, partim in victu, partim in medicamentis constituta sunt. Ex victu ea omnia ad mouendum vomitum erunt accommodata, quae humida, insipida, aut dulcia, non siccā, non acerbā existunt, uti est malua, cucurbita, blicon, & similia, & vinum dulce, tepidum, aqua infusa tepidas, Ex medicamentis vero, ad mouendum leniter vomitum aqua dulcis simplex recte accommodata. Decocta aqua cum radice glycyrrhizae, & seminis feniculi, vel lida copiosius hausta. Aegyptios ad vomendum ter quaterque in balneo familiaris uti, in libris de medicina Aegyptiorum, posteritati tradidimus: Decoctum ex aqua itidem radice cucumetis, ex modico mellis calido in potum ad vomitionem faciendam est admodum accommodatum. Item semina piponis atque cucumeris in res cognouerunt. Mulla diluor, raphani, vel agarici decoctum, hydrargyri atque oleum itidem dulce calidum in potum idem praestabunt. De medicamentis vero vomitorijs, quae violenter agunt, nos in istius operis libro tertio, satis superque egimus: proinde ad eum librum lectorem remittimus. Nam vomitum, & accretum, si linum esse admodum vile ad purgandam pituitam, utque alia omnia excrementa per vomitum. Quo nos in iuuentutis annis praeservationis gratia magno eum commodo vsi fuimus: datur quidem calidum ab vnciarum ad geminam usque.

De alui adstricta laxanda. *Cap. XII.*

Quantopere alui adstricta faciat ad corporis sanitatem vitandam, neminem medicorum latere certo scimus. Etenim ad sanitatem conservandam, satis esse nonnulli antiquorum tradiderunt, si alui quotidie, & vrina, pro inge cuatio iuxta assumptorum proportionem eueniebat, eam commendabant; si minus, promouebant. Ex ijs, qui habent alui adstrictam, nonnulli alteris diebus, alij ternis, quaternisue, faeces excernunt. In alijs vero usque ad octavam etiam diem alui deiectionem tardatam fuisse vidimus, atque non sine magna prope vaporibus repleti obseruamus, atque exinde grauedinem dāpnt, suffusionem, tinnitum, aliquando vertiginem, & similia pati, hominesque exinde inappetentia laborare, nauseabundos euadere, quandoque singultire, & quandoque, ut in ileo, stercons per os

per os euomere. Quare adstrictam aluum habentes plurimis noxis obnoxij redduntur; neq; sanè immeritò, cùm aluus laxa, fluidaue à multis incommotis, molestijsq; corpus liberare soleat. Itaq; non cunctandum, vt laxetur, atq; ad excretionem prompta reddatur. Porro aluus adstringi, cohiberiq; solet, imprimis cibi potusq; culpa, vt Galenus docuit, nimirum aut propter ipsorum acerbam qualitatem, austeram, vel siccam, aut propter quantitatem, scilicet quod plures, aut pauciores assumantur cibi, aut denique propter ordinem, vtendiq; modum, vtpote quando, quæ sicca, adstringentiaq; sunt, primò assumantur, postea verò dulcia pinguiq; , aut cum bis solitus sit homo in die comedere, semel tantum deinde cibum assumere assuescat. Adstringitur quoq; aluus non rarò ventriculi, vel intestinorum, vel viscerum intestinis adiacentium culpa, nimirum cum ipsorum expultrix debilitatur, aut ob intemperiem in excessu constitutam, vel calidam, vel siccam, vel frigidam, vel humidam, vel ex ipsis simplicibus complicatam: hæc intemperies aliquando adeo valide augetur, vt vel ventriculi, vel intestinorum aut tenuium, aut crassorum, aut omnium, aut aliquorum, vel partium ipsis adiacentium (vt est hepar, lien, vesicula fellea) expultrix facultas maxime debilitetur, atque ob id ventris excrementa retardentur, quominus prodeant, ac protrudantur. Quod sæpè fieri etiam solet, tum ob intestinorum angustiam, quam vel adstrictio ex tumore, compressioneue, aut exiccatione causata, vel conuolutio eorundem in quadam ilei specie peperit; tum propter obstructionem ab ipsis facibus factam; tum denique propter osculorum, per quæ bilis alui excrementis acrimoniam & irritationem concilians in intestina excuritur, connuentiam; Exiccatur vero aluus, & cohibetur nedum inedia, & vsu (vti dictum est) ciborum potuumq; siccantium, atque adstringentium, sed etiam vi medicamentorum eiusdem facultatis assumptorum, aut intra aluum iniectorum; atq; (vno verbo) eorum omnium, quæ quouis modo vim expultricem, debilitate, infirmareque possunt. Quod maxime facere vsum familiarem medicamentorum purgantium (siue assumantur per os, siue intra aluum clysteribus indantur) à medicis practicis longa experientia deprehensum est, vnde multis rationibus nempe intestinis humiditatem adimendo, & expultricem labefactando clysteres sæpius inieci, & purgantia frequenter assumpta, aluum adstrictam reddere solent. Cum igitur constet, aluum adstrictam morbo adstricto laborare, laxatoriorum præsidiorum vsus ad eum affectum tollendum erit idoneus. Itaque tum in victu, tum in medicamentis, ea admouenda erunt, quæ quouis modo aluum laxare queunt: Cuiusmodi ex cibis atq; ex potibus erunt, si prima mensa, vel ante cibum, exhibeantur olera mollia, leuiter cocta, cuiusmodi est malua, beta, brassica levis, mercurialis, asparagi hortenses, tamari cauliculi recentes elixi, cum oleo & sale assumpti; atque etiam sambuci folia elixa itidem cum oleo & sale comesta; cucurbita, itidem & cucumer elixus ventrem laxabit: melones similiter & pepones tum crudi tum cocti idem faciunt: Sic oua forbillia recentia cum melle, aut saccharo ad laxandum idonea sunt, nō minus, quam beta ex mulsa cocta, & allium elixum, capaque cocta ex melle, oleo, saleque elitata, atriplexque hortensis: ad idem etiam accommodatissimus est panis triticeus furfuraceus, quo complures ad laxandum ventrem non immeritò familiariter vtuntur. Ex fructibus præcoces omnes primo cibo ingesti aluum mouent, maximeque cerasa matura dulcia, vel insipida, mora itidem matura, pruna matura & cruda & cocta cum saccharo, vucæ recentes pingues, aut coctæ cum saccharo, aut cum melle crudo, aut quæ per noctem sub dio manserint, cum melle, aut cum saccharo: ficus recentes atque etiam sicci pingues sunt idonei ad laxandum ventrem. Ex cibis etiam conueniunt, mel crudum elitatum, caseus recens ex melle, nuces itidem recentes,

Bbb & quæ

1. de tuc. valet.
cap. 13.

In lib. de re
stica cap. de
brassica.

Gal. in x. simpl.

& quæ in aqua macerantur laxatoriæ sunt. Ex carnibus autem conveniunt pid-
gues, agnina, porcina, atq; avium aquatiliu: Ex piscibus laxatiles, & molles,
primo cibo (vri dictum est) assumpti, butyrum eodem modo affatim comestum
per se solum fluidum facit ventrem, & longè efficacius idem faciet, si cum melle,
vel saccharo edatur. Ex iuribus vero laxatorijs, & potionibus, quæ ex herbis le-
uiter coctis exprimuntur, est brassicæ levis leuiter coctæ ius ex melle assumptum:
At omnium maxime conferet ius eiusdem brassicæ (cui M. Cato miras laudes in
laxando ventre tribuit) in quo cimarum brassicæ viginti manipuli efferbuerint,
quodque eo modo paratum fuerit, quo M. Cato id parandum esse tradidit. Ius
quoque mercurialis herbæ cum sale, oleo, vel melle satis efficax est ad laxandum
stimulandumque ventrem, non minus quam ex folijs sambuci paratum. Succus
itidem fœnugræci cum melle idem præstabit. Idem facit ius carnis porcinae re-
centis, piscium laxatiliu recetium per se solum, aut ex vino epotum, priuatimq;
(vt Dioscorides est auctor) ex gobijs, scorpionibus, vel iulidibus, vel percis pa-
ratum: Quod paratur ex cochleis, conchisque marinis, est maxime idoneum,
cum oleo, & melle, vel sale epotum. Sepiarum quoq; atramentum soluit aluum.
Ius itidē galli antiqui est ex maxime laxatorijs. Iac aquosum itidē emollit ventrem
atque eius serum; quod efficaciter illud præstabit, si ad heminas quatuor, cum
salis & mellis modico, propinabitur: quod si multum salis habuerit, multum
purgabit. Mustum, vinaque dulcia, mulsum, & similia laxantis quoque facul-
tatis esse neminem latet. Oleum quoque dulce ante cibum absorptu aluum lu-
bricat, cuiusmodi est commune, dulce, & amygdalinum: item cicinum, & quod
ex grano cnidio exprimitur. Itaque hæc ex cibis, potibusq; prima mensa ventris
laxatoria, & stimulatoria erunt: post cibos vero tales (vt auctor est Galenus) as-
sumptos, ventrem mouentia non dulcia, pingua, molliaque esse debebunt, sed,
in vltima præsertim mensa, facultatis adstrictoriae & stipticæ. Vnde mirum non
est, si post cenam fructus adstringentes assumpti aluum moueant: Cuiusmodi
sunt pyra austera, mala cytonia, mespila, sorba, mora rubi acerba, atque morifru-
ctus itidem acerbi. Itaque prima mensa ad laxandum ventrem accommodatissi-
ma erunt omnia dulcia, insipida, pinguique. Non minus etiam, quæ deter-
sione laxant, cuiusmodi sunt omnia lassa & acria: vnde aqua marina, vinum
salsum, garum, & cætera alia fassamenta detergendo ventrem laxant: Verum
acria, vt allium, cœpa, porrum, & similia incidendo extenuandoque excremen-
ta, & facultatem expultricem irritando, detergendoque ventrem mouent. Hu-
iusmodi vero omnia prædicta ex cibis & potibus parata, tum intra os assumpta,
tum in aluum clystere indita apta erunt, ad adstrictam aluum restituendam, la-
xandamque. At operæ pretium est, vt ex medicamentis etiam quædam dica-
mus, quæ adstrictam aluum laxare possunt. Itaque per os ex ijs, quæ assun-
turi, laudatur resina terebinthina apellanæ magnitudine dormituri exhibita, vel
per se sola, vel cum modico rhabbarbari mixta: radix itidem polypodij trita ad
drachmam ex iure pora: item aloë lota ad semidrachmam ante cenam, vel vul-
garia catapotia ex ipsa parata, vel mastichina vocata: epithymu item ante ce-
nam ad drachmam ex oxymelite vtilissime datur. Hac ætate vsus foliorum se-
næ ad laxandum ventrem compluribus maxime innotuit: plerique enim vtuntur
eius infusione ex vino, ante cenam; aut aceto, in quo folia ipsius efferbuerint, aut
per noctem macerata manserint, in acetarijs vtuntur: aut corundem foliorum
puluerem ante cenam, ad semidrachmam, cum modico cinamomi (quo semper
eius qualitas stomacho insensa corrigi debet) ex vino, aut ex iure carnis epo-
rant. Non desunt alij qui passulas decocto, aut infusione eiusdem senæ maccra-
tas, vel decoctas, ante cenam primo cibo assument: vel pruna damascena ea-
dem

dem facultate imbuta reliquo cibo præmittunt. Prunis etiam per se solis Damascenis præsertim in vino dulci decoctis cum saccharo vel melle complures videntur ante cibum, siue prima mensa. Omitto clysteres, & balanos ad aluum molliendam, & irritandam à multis in vsum receptos, tamquam omnibus notissimos. In pueris butyro exterius copioso ad vmbilicum adhibito mulieres aluum laxant. Idem, quando opus est, tentant eodem cyclaminis succo abdomen illinentes. Sic ad hunc vsum parari solet in officinis medicis vnguentum de arthanita appellatum. Non pauci & ori stomachi, & vmbilico, vel toti abdomini adhibent ad aluum laxandam pulpam colocynthidis, aut scammonium, vel agaricum, vel trochiscos laxatorios, ex melle vel electuaria, vel cataportia cathartica. Atque hæc ad laxandam aluum, eamque adstrictam restituendam sufficient.

Gal. in 7. simp.

De venere multo tempore intermissa, pro valetudinis conseruatione, restituenda. Cap. XIII.

EX adstrictis morbis supersunt nobis affectus, qui nascuntur à venere aliquandiu intermissa in præsentia tractandi: siquidem ex seminis abundantia, genitalium vasis exinde tumentibus eodemque semine aliquandiu non excreto, sed diu intus retento, homines in graues quidem affectus labuntur; omniumque maximè quorum corpora calidi & humidi temperamenti sunt, quibus (auctore Galeno licet Epicurus nunquam veneris vsum posse iuuare crediderit.) Venus amica atque utilis esse solet: Veluti calidis & siccis, frigidisque inimica existit. Quod eo præsertim constat argumento, quod calida & humida plurima semine abundent, quod semen nisi tempore idoneo per coitum excernatur (hoc enim natura in singulis animalibus ad sobolis conseruationem necessario fieri oportere voluit) & copia vasa genitalia replendo, & ex quadam putredine à prohibita ipsius ventillatione, quæ excretionem fit, prauam qualitatem adeptum (Galenus enim corruptum semen perinde ac exitiale venenum esse in corporibus demonstrauit) grauissima profecto mala inducere solet. Quibus sanè malis sæpius, & grauius vexari obseruantur, tum mares tum fæminæ, quæ cum antea concubitu creberrimo vsq; fuissent, postea eo plane, ob aliquam causam, per multum tempus caruerunt, atque ab eo abstinerunt. Huc accedit etiam, quia, cum semen in animalibus excrementum fit, ad excernendum quidem (quod omnium excrementorum sit propria excretio) pro generatione tamen factum, nisi suo tempore excernatur, intus retentum computrescit & corrumpitur, ut cætera alia excrementa faciunt, atque ex eo vapores summe putridi ad nobilia viscera ex genitalibus subuecti sæua quidem ac lethalia symptomata, perinde, atque ex veneno exitiali nascuntur, excitant; præsertimque in mulieribus viduis, quæ antea crebro ueneris concubitu usæ fuerunt. Hæ, præter cætera mala, uteri præfocationem, distentionemque nervorum patiuntur: Galenus scribit de quadam muliere, quæ ex retento semine apnæam passa, simulque nervorum distentione oppressa erat, quod, cum ab obstetrice, manibus oleis calidis inunctis, pudenda ipsius tractarentur, orta titillatione, cum labore & voluptate, semen crassum putridumque emisit, eoque excreto ab omni molestia liberata fuerit. Non minus etiam mares ab intermisso concubitu multis malis obnoxij redduntur. Nonnulli (ut Galenus tradidit) nisi assidue coeant, capitis grauitatem incurrunt, cibos fastidiunt, aliquando febriunt, cibos non concoquunt; & aliqui præ pudore à libidinis vsum abstinentes torpidi, pigri, melancholicorumque modo præter modum mæsti, atque timidi, fiunt, cibi inappetentiam patiuntur, cibosque non concoquunt, & proinde cruditatibus assidue vexantur; quibus non liberantur, quoad ad solitum

In 6. de san. tue. cap. 4.
Gal. in 3. epid. 1. com. 4.

In 6. de loc. effe. cap. 4.

In 6. de loc. effe. cap. 5.

Bbb 2 libidinis

libidinis vsum deuenerint, concubitusque vsum denovo receperint. Quidam vxoris mortem lugens, & a concubitu, quo antea creberrimè fuerat vsum, cibi cupiditatem amisit, ac ne exiguum cibi concoquere potuit, vbi verò seipsum cogendo plus cibi ingerebat, protinus ad vomitum excitabatur. Quo malo liberatus est, postea quam ad pristinum concubitus vsum redijt. Quare ex his liquido nobis constabit, in aliquibus venerem intermissam multorum malorum causam esse, præsertimque in ætate iuuenili, atque in habitu carnosio, temperamentoque calido atque humido. Vnde ad sanitatem conseruandam in multis venus diu intermissa erit restituenda (dum quidem ad vsum veneris apti, ac potentes sint) alias vxores ijs. procurando: In ijs vero qui aliquam ob causam iam ad veneris vsum impotentes facti sunt, quique ob impotentiam coguntur ipsam venerem dimittere, medicamentorum vsum coeundi vis in ipsis labefacta erit restituenda. Cum verò hæc impotentia coeundi, aut totius corporis, aut alicuius visceris præcipui, aut genitalium culpa fiat, si debeat hæc coeundi facultas restitui, totius corporis, aut partis innaturalis affectus, tanquam causa, erit tollendus. nam si corporis temperamentum frigidum, vel siccum, concubitus impotentia fuerit causa, impotentes siue ægroti, & victu calido atque humido, & balneis calidis ex aqua dulci paratis, atque alijs medicamentis intus forisq; admotis laxatorijs vti debent. Ita etiam, si ad eam impotentiam veneris infirmitatemq; impulerit hominè siccus squalidusq; habitus, eorundem supradictorū medicamentorū vsum cōueniet. Quæ medicamenta itidem conducent ijs, qui venereo defectu laborant aut ob hepatis, aut ob cor, aut ob cerebrum vitiatum vel ex intemperamento frigido & sicco, aut ex calido itidem atque sicco, aut ex aliquo alio affectu ex adstrictis. Accedit etiam, si genitalia patiantur itidem a frigidityte, aut siccitate, aut a seminis spirituumq; vitio frigido impotentia oboriatur, eadem præsidia, quippe laxatoria, quæ etiam inter cibos locum habent, hæc erunt maxime huic vsum accomodata, scilicet, ex fructibus dactylus, ficus recens, vna dulcis, nuclei pini, amygdalæ dulces, auellanae, & similes alij; testes gallorum esitari, ex vinoque ipsorum puluis assumptus, impotentibus maxime auxilio erit: ex piscibus verò locustæ, canceri marini, conchilia marina cum pipere esitata vtilia erant: ex seminibus, etiam triticum coctum, faba, pisum, cicer in iure pingui percoctum atque esitatum: semen itidem sesami, tænuigræci, atque lini, coctum, cum melle deuoratum conueniet: ex radicibus carduus, & cynaræ tum radix, tum fructus decocti cum sale, oleo, & pipere esitati laudantur: radix itidem selini, idest, apij hortensis, tum cruda, tum cocta, cum pipere esitata, venerem accendit: item rapa, napus, pastinaca, raphanus, cœpa, asparagus, ferulæ corculi recentes sub cineribus assi & cum pipere esitati idem faciunt. Quod verò pertinet ad medicamenta interna, datur piper ex vino, satyrii radix, eruca in arcearijs, cum modico salis & oleo deuorata. Been rubrum, zedoar, eryngij radix, galanga puluerizata ex vino ad drachmam deuorata iuuat: Quibusdam quoque visum est, hanc, scilicet galangam, ore tantummodo contentam efficacius venerem incendere: Scylla item assata in tritum in vino assumptum iuuat: & radicis quoque gladioli pars superior, & crasior cum vino epota: & radix cynosorchidis maioris similiter cum vino bibita: seminum autem vrticæ syluestris, & semen lini, cum vino mulso & pipere deuorata magis conferunt. Scincum Indicum porui datum præsertimq; ipsius renum partes ad drachmam epotas intensius ad concubitum stimulare Dioscorides tradidit. Testes itidem gallorum ex vino poti non minus viles existunt. Ex efficacioribus verò est Asa fetida ad semidrachmam ex vino epota, etenim valide homines

In 2. suporiff.

In lib 2. de mat.
medica.

Liber Vndecimus.

381

mines ad libidinē incendit. Addimus ex compositis Mithridatium singulo mane ad drachmam ex vino, aut per se solum, deuoratum, diamoschum, diasfaryrium, diaspermatum, & similia. Exterius autem, scilicet ad genitalia, conuenient calidæ oleorum inunctiones. Paulus ait, conducere ijs inunctionem ex pingui oleo, cui ad ditum sit modicum radicis narcissi, aut cocci cnidij, aut seminis vrticæ. Ad id etiam accommodata erit inunctio ad genitalia ex moscho orientali, aut cybeto ex cicino oleo dissoluto parata: tum maxime vnguentum Rhafis Arabis medici expertissimi, præsertim ad generale mouendum, erigendumque quod accipit olei lilini vnc. ij, castorei vnc. j. euphorbij, piperis, sinapis an. 3j. Moschi orientalis scrup. s, fiat vnguentum, quo viris inungantur, renes, femora, coles, atque testes, ante aliquot præsertim horas, quam velint ad concubitum cum mulieribus accedere. Aliud ad idem vtile est, quod recipit assæ fatidæ 3j. mellis vnc. j. cum vino per duas horas ante concubitum penis illinatur. Atque hæc satis erunt, ad restituendam venerem, in ijs, qui refrigerati concubitu vtinequeunt.

In lib. 1. c. 36.

Finis Libri Vndecimi.

PRO

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER DVODECIMVS.

De morbis laxis esse agendum, quotq; hi sint. Cap. I.



Vm haftenus de morbis seu affectibus, qui adstrictorum genere comprehenduntur, nos scripserimus; restat, vt etiam de laxis vocatis eodem itidem modo agamus. Interquos connumerantur inprimis resolutiones, quę sunt calore innato ob aliquam causam immoderatus per poros cutis, insensibiliterq; exhalante, ita, vt in animi deliquium vel in syncopem homines labantur: euacuationes etiam, quę sensibilibus fiunt per poros cutis, cuiusmodi sunt sudores ex toto corpore immoderatus exeuntes: Immoderata itidem hæmorrhagia, vel sanguinis per os quouis modo immodica excretio, vel per aluum, vel per urinam, vel per hæmorrhoidas, vel denique per vterum in mulieribus: Immoderatus quoque vomitus, lienteria, dyarrhæa, dysenteria, gonorrhæa, vteri profluuium, diabetes, fluxus vulgo hepaticus vocatus, cholera, & similes alij affectus, qui immoderatus laxatis ampliatisq; corporis meatibus fieri solent.

De insensibili euacuatione, quæ in lethalem syncopen deducit, cohibenda. Cap. II.

*Gal. in 12. meth.
med. cap. 5.*

*Gal. in 12. meth.
cap. 6.
Gal. in 12. meth.
cap. 5.*

E Vacuatio, quæ per poros cutis fit, si multa fit, leue animi deliquiũ, quod Græci *ἐκλυσις* appellant, inducit; si auctior, grauiorem quidem animi defectionem, Græcis *λαποψία*, & *λαποθύμια* vocatam; tandem verò profusior, vt vires maximè dissipet, reddita syncopen, idest, animi grauissimam defectionem, morti simillimam, facit. Lipothymia vsq; ad sudorem, animi deliquium habet: In syncope verò sudor assiduus, diaphoreticus, & syncopeticus dictus, in toto corpore apparet, pulsusq; defectio adest, sensus motusq; aboletur, nulla penè respiratio editur, in ore pallor visitur, extrema algent, ac madent; denique ipsissima mortis imago spectatur. Qua de causa mirum non est, si Galenus syncopem definiendo dixerit, esse precipitem lapsum virium omnium, præsertimq; vitalium. In hoc enim affectu concidunt omnes spiritus, maximeq; vitales, quorum copia partes corporis viuunt. Itaque in omni syncope fit spirituum, præsertim vitalium, exolutio: quibus quidem exolutis, innatus calor partium solidarum, vicerumue perit, ipsorumq; vnà temperamentum in eodem calore insito, atq; humido substatifico, radicaliue, constitutum. Quandoq; vero spiritus per se concidunt, scilicet, vbi dissipantur, vel cum spirituum substantia plus iusto fuerit extenuata, atq; exhalabilis reddita, vt in ira: Vnde fit, vt ea corpora, quæ tenuissimis succis abundant, facile resoluantur: Vel quòd corpus immodice fuerit rarefactum, vt in immoderato gaudio, quod Græci perichariam, quasi excessum gaudij dixeris, appellant: Vel ob defectum alimenti, proprijq; humidi consumptionem, vt in immoderatis

moderatis euacuationibus, purgationibusq; , atq; in vigilijs, motibusq; immoderatis. Aliquando verò non per se deficiunt, sed quod suffocantur intra corpus coacti: Vti fit, si, respiratione vel ventillatione interclusa, aere cor diutius priuetur. Id accidit in ingenti timore, tristitia, anxietate, mœrore; item spirituosus partibus obstructis, vt in Antipatro à Galeno fuit obseruatum: Nam ira non modo spiritibus materia, qua nutriantur, & recreentur, deficit, verum etiam fuliginum cohibetur euacuatio: Quibus necessariò calor naturalis extinguatur, & opprimatur. Hoc modo complures degentes in calidis vel hypocautis, vel cellulis vndiq; clausis, suffocati interierunt. Demum spiritus aliquando non primario affectu concidunt, sed ex aliqua quidem noxa partis alicuius principis, scilicet, vel neruorum principij, scilicet cerebri, vel oris ventriculi, vel cordis, vel intestinorum, potissimumq; ilei & coli, vel vteri in mulieribus. Cerebro quippe à maligno, acrique humore, maxime læso, aut vulnerato, spiritibus ad partem læsam, atq; ad cor ipsum, quod cerebri magnæ noxæ consentit, retractis, fit lipothymia, & quandoq; etiam syncope: non minus & ab ore ventriculi aut à vehementi atq; acuto dolore læssito, aut à maligno summeq; acri humore commorso, aut eroso, spiritus concidunt; humore autem crudo ibidem subsistente, opprimuntur. Vnde Galenus in lib. 12. meth. cap. 3. & 4. syncopem fieri ore ventriculi à flaua bile, atque à crudorum humorum copia læso, posteritati tradidit. At omnium maxime ex corde dolorem patiente acutum, à maligno humore vel à prauo vapore, vel à tumore, vel deniq; ex inflammatione, syncope, exolutis spiritibus, accersitur, non minus quàm fiat ab iliaco & colico dolore uehementi, atq; ab utero eodem modo læso. Itaq; à magna alicuius partis principis noxa, spiritibus vitalibus affatim ad suum principium reuocatis, idcircoque extimis partibus quasi uita planè priuatis, uirium præceps lapsus fit: Qua ratione homines & in leuem animi defectiorem, & non rarò in grauiorem (syncopen Græcis uocaram) incidunt. Cæterùm cum hunc affectum fieri per se dixerimus spiritibus exolutis uel ab immodica cutis meatuum rarefactione, uel ab ipsorum substantia nimis extenuata, atq; nimis exhalabili ex quacunq; causa reddita, uel alimenti inopia, uel denique ab immoderatis excretionibus (vnde meritò Galenus dixit; Virium exolutionem immoderatas excretiones, non retentiones consequi) idcirco hæc passio ex laxis morbis erit; de qua propterea nos hic agimus. De illa uero virium exolutione, quæ vel à prauis humoribus, vel doloribus, vel ab alijs passionibus viscerum, retractis spiritibus, fit, cum morbus mixtus sit ex laxo & adstricto, in postremo libro agemus. Nunc de illa passione quæ laxus affectus est, sermonem instituimus. Quæ fit, ubi vires concidunt vel ex ingenti gaudio, vel ex ira, vel ex prohibita respiratione, calorq; naturalis ventillatione, vel ex colliuatione, aut inopia alimentij. In hac passione laxa indicatur adstringendum, densandum, cohibendumue, ac omnino prohibendum, ne calor natiuus exhalet, atq; exoluatur. Quæ indicatio usum habebit in omni virium exolutione, vel lapsu, etiam si fiat à causa adstricta, & passio solutionis laxitatisue, atque etiam stricturæ simul existat. Cum verò in morbo mixto, vrgentiori, ex Methodicorum placitis, sit incumbendum, & magis vrgeat virium lapsus, siue exolutio, quæ laxa passio est; hac de causa adstringentibus præsidij, ad curationem instituendam, opus erit. Malum hoc, nunc ei occurratur, celere exitum macchinatur: etenim exitum non fit, nisi quædam cum syncopes specie. De his dicebat Hippocrates: Qui sæpe & multum exoluuntur sine causa manifesta, ij repente moriuntur. Quare quamprimum exolutis auxiliari debemus cum alimentis tum medicamentis opportunis ex adstrictorij vocatis. Itaque statim facies aqua frigida, aut rosacea, aut oxycrato frigido erit sæpe aspergenda, scilicet vt spirituum exhalatio prohibeatur: odores optimi sunt offerendi; & per os quoque sæpe danda aqua frigida. Galenus cyathos

In 3. prorrh.
com. 39.

In 2 aph. 41.

In libr. 8. de cōp.
med. sec. loc. c. 4.

thos tres eiusdem aquæ frigidæ bis, aut ter per intervalla propinandos esse voluit. Alij exhibent quidem aquam frigidam cum omphacio: Alij succum expressum ex malis punicis, vel ex palmulis, vel ex malis cytonijs, uel ex pyris austeris exhibent, aut succum pampinorum vitis: Alij cum aqua frigida exhibent pauerem rosarum, aut nardi indici: At alij exhibent panem succo mali punici imbutum, aut vino nigro austero aqua frigida diluto simulatque exolutio fit, animusque deficit. Tunc quoque offerentur iura caponum, vel pullorum gallinaceorum iuuenum, vel vitulinæ carnis, aut lutea ouorum conquassata cum iure prædicto, & succo granatorum. Eodem modo dant vtiliter panem tritum in iure pulli decoctum cum succo aut mali punici, aut cytonij, aut pyri, aut pomi austeri, vel mespili, uel forbi, vel fructuum nigrorum mori, uel rubi, vel prunorum austerorum, vel berberis fructuum, & similia. Nonnunquam in iuribus, aut ferculis aliquid prædictorum fructuum adstringentium decoquunt. Nonnulli ad excitandos à syncope ægrotos, arētē extrema ligant, ac perfricant brachia, & crura, nālūq; perfringunt, cōprimunt, & huc illucq; dimouent, in pudendis verò pilos detrahunt, euelluntque: hæc ad excitandum calorem intro retractum etiam conuenire videntur, sed in ijs præsertim, qui ob adstrictam causam animo deficiunt, quomodo hæc conueniant, in sequenti libro, Deo fauente, dicemus.

De sudore vires exolumente cohibendo. Cap. III.

Cum & sudor immoderatus exiens homines ad virium exolutionem prouehere soleat, atque ad syncopem, meritò de medicamentis sudorem cohibentibus in presentia est agendum. Quid verò ipse sudor sit, quibusque causis in corporibus fiat, in superiori libro satis superque à nobis dictum est. Qualis autem à sudoribus à medico sit suppressendus, nunc intelligi à nobis oportet: si quidem non omnis sudor, ne is quidem qui copiosè profluit, cohibendus est, verum solummodo is, qui vires exoluit, quique, ut aiunt medici, symptomaticè fit, scilicet à causis morbificis, qui distinguitur ab eo, qui à natura recte in corpore operante fit, criticum & salutarem medicum appellant. Nam ab hoc, siue erumpat in morbis, siue citra morbum in recte valentibus appareat, natura plurimum iuuatur, ægrotique à morbis vexati critico sudore erumpente copiosiori, vel à morbis confecti liberantur, vel saltem in melius maximè mutantur. Hæc de sudoribus sufficiat dixisse: si quis plura scire desiderat, nostros libros de vita & morte ægrotantium prælagenda inscriptos legere non grauetur. Hoc vnum ex ijs colligimus illum solummodo sudorem esse à medico coercendum, qui cum vires maximè resoluat, syncopem, atque exitium minatur. Hunc esse solutionis passionem, morbumque laxum dici, neminem nostrum latebit, proinde in hoc affectu planè esse adstringendum, etiam constabit. Galenus in ijs, qui ob sudoris multitudinem animi defectum incurrunt, inquit, ipsorum cutem medicos adstringere ac refrigerare debere: proinde illos operimenta detrahendo esse recreandos, aereque ambiente refrigerandos, scilicet ventis refrigerantibus aditum præbendo, vel hos flabellis etiam excitando; imò consulit aerem domus, & conclauis alterare medicamentis frigida & adstringente qualitate præditis: quod fit myrtorum folijs, rosīs, virium capreolis, salicilque ramis, uel rubi, vel mori, vel forbi, vel mespili, vel mali punici, uel cytonij, uel equiseti, uel polygoni, uel plantaginis, uel myrtybi, uel similia folijs pauimentum consternendo. Paulus pariter ait, sudantes tenui velamine madidoque esse contingendos, ijque panni, quibus conteguntur, utile fore, si actu frigidi sint, uel oxycrato frigidum madidi. Alii qui commendant eodem pannos aqua frigida imbutos dorso, & thoraci subijciē-

dos:

In 1. ad Clauic.
cap. 14.

dos: alijs visum est, & collo, & locis sub alis, inguinibusque esse apponendos. Paulus pannos cimolia aqua dissoluta pinguefactos iubet adhibendos. Nonnulli, quoad sudor cohibeatur, niuem in extremis partibus supra uenas pulsátiles, arterias uè applicant; uel faciunt, ut ex alto aqua frigida cadat iuxta carpum brachiorum super arterias. Ad hunc usum etiam conueniunt cutis inunctiones ex oleis, myrtino scilicet, lentiscino, melino, rosaceo, oenanthino olea, syluestris, terebinthino, de balaustijs, de salicibusque, actu frigidis adhibitis, scilicet collo, pectori, dorso, sub alis, inguinibus, manuum pedumque carpis, super uenis pulsatilibus. In iisdem quoque partibus succi illi conuenient adstringentes actu frigidi: cuiusmodi est succus plantaginis, polygoni, aizoi, solani, portulacæ, intybi, cymarum rubi, capreolorum uitis, acaciæ, hypocistidos, lycij, mespilorum, sorborum, pomorum, pyrorum immaturorum, prunellorum syluestrium, malorum cytoniorum, granatorum, foliorum sumachi, myrtillorum, atque similia. hi & perse soli appositi iuuant, & cum oleis adstringentibus nuperrimè præscriptis mixti. Emplastra quoque eiusdem qualitatibus adstrictoria participes iisdem partibus actu frigida adhibita efficacia sunt, ad sudoris profluium cohibendum, firmandumque: cuiusmodi sunt, quæ parantur ex polline supradictorum medicamentorum cum albumine oui, aut mucilagibus frigidis, cum succo aut mandragoræ, aut hyoscyami, aut opij, aut semperuiui, aut cicutæ. Nonnulli ex cimolia, albumine oui, aut aqua plantaginis, dissoluta opportunum emplastrum parant, aut ex manna thuris, & amylo cum oui candido; terra item samia, cui gummi aceto dissolutum permisceatur, actu frigida adhibita utilissima est. Demum pulueres quoque prædictorum medicamentorum, præsertimque myrtillorum nigrorum siccatorum, aut cimoliæ, aut malicorij, aut gallarum immaturarum, aut terræ samia, aut lemnia, aut similia, quæ adstringunt, magnopere iuuant, si prædictæ partes his actu frigidis aspergantur. Hisque medicamentis sudores immoderatus profluens cohiberi possunt.

De profluuio sanguinis per nares supprimendo. Cap. IIII.

Cum de uarijs sanguinis profluuijs vires exoluentibus, atque synepæ facientibus, tanquam de morbis laxis sit à nobis in præsentia agendum, ab eo exordiri libuit, quod per nares fit, & hæmorrhagia à Medicis appellatur. Quam sanguinis excretionem frequenter in pueris, & in iuuenibus, atque etiam non raro in adultis, ac in mulieribus, quæ mensuris purgationibus caruerunt, obseruari, medicis præsertim facientibus notissimum est. Hæmorrhagia uero, id est sanguinis excretio, quæ per nares fit, symptoma est in exeunte mutato à toto genere præter naturam. Sanguis autem ex naribus excernitur, aut fluit, quibus causis quolibet sanguinis excretio, siue per nares fiat, siue per os, uel per uentrem, uel per urinam, uel per uterum in mulieribus, uel denique per hæmorrhoidas, concitare solet uenis, arterijsque præcis, aut punctis, aut ruptis, aut iisdem eros, aut ipsarum osculis apertis, aut rarefactis ipsarum uenarum vel arteriarum tunicis, unde ex ipsis sanguis resudat. Rumpuntur uero ea uasa ob nimiam tunicarum distentionem, aut à nimio sanguine, aut eodem sanguine præ calore rarefacto, fusoque, proindeque in maiorem tumorem elato, aut ab immodico flatu immoderatus tunicas distendentes. Eroduntur ad humore, uel acri, uel salso, uel amaro. Oscula uero uenarum vel arteriarum aperiuntur ob sanguinis acrimoniam, qua uenarum, arteriarumque expultrix ad excernendum irritatur, aut à sanguinis multitudine, aut ab imbecillitate eorundem uasorum sanguinem continentium; aut denique sponte natura à copia, aut qualitate sanguinis, excrementum.

Ccc

torum.

torumque sanguini permixtorum excitata, oscula vasorum aperiente. Resudat verò per eorundem vasorum tunicas rarefactas à calore, vel ipsomet sanguine tenuiori, rariorque reddito. Hæmorrhagiam verò ruptis venis, aut ipsarum osculis apertis à multitudine sanguinis immoderatus distendente fieri ex plenitudinis signis cognoscitur, scilicet quod in facie sanguinem excernentium sit rubor, atque tumor, uenæque sint plenæ & tumentes, grauitasque tum in toto corpore tum præsertim in capite sentiatur, præterea tensiva lassitudo, quæ à fluore sanguinis tollitur, obseruari solet. Si vero à statu distendente, uenasque rumpente, aut ipsarum oscula aperiente, hæmorrhagia oriatur, aderit tensio uenarum citra vllum grauitatis sensum, citraque vllum plenitudinis signum. Si autem erosis venis ab humore uel falso, uel acri, uel amaro profluuium eueniat, aderit ulcerosa lassitudo, atque signa cacochymiae, quæ etiam innotescunt ex sapore aut falso, aut acri, aut amaro. Ab erosione etiam uasis sanguis non confertim multus, ut in uenarum ruptura fit, exit, sed modicus & paulatina, quoad uasis erosio magna euaserit. A rarefactis etiam uenarum tunicis, extenuatoque sanguine, per resudationem facta hæmorrhagia deprehenditur facillè, quoniam absque dolore sanguis exit, pauculusque est et fluxus, antegressæque sunt causæ rarefacientes sanguinemque attenuantes, ut uictus calfaciens, morbus calidus, balneum, hypocaustum nimis calidum, sol, & similia. Totque sunt causæ, & signa, cuiuslibet fluxus sanguinis. Porro quandoque est criticus, scilicet à natura sponte egrotos à morbo aliquo liberante excitatus; quandoque symptomaticus, à ui morbifica factus, de quo nos in præsentia agimus, præsertimque de illo, qui immoderatus profluens uires exoluit, synecopemque accersit: Hic enim fluxus symptomaticus, quia morbus ex toto laxus est, ob id indicat planè adstringendum esse, ceterum de hæmorrhagiis, differentiis, de causis, de signis erupturi sanguinis, & de bonis & malis hæmorrhagijs, cum in libro septimo de prælagenda uita & morte ægrotantium abunde scripserimus, nihil hoc loco de ijs addendum iudicauimus; præsertim uerò, quod ea, quæ de hæmorrhagia hic præmissimus, sufficiant pro scopis curatiuis eliciendis. In libris uerò de prælagenda uita, & morte ægrotantium, omnia de hæmorrhagia, quatenus faciunt ad morborum prognosin cognoscendam, complexi sumus. At ad curationem descendimus; quæ à morbo laxo adstrictoria tota indicatur, licet ad profluuium sanguinis firmandum, necdum ex Dogmaticorum sententia, sed etiam ex Methodicorum, ut auctor est Aurelianus, constet, uenæ sectionem ex eodem latere aliquando iuuare: item cucurbitulam cum scarificatione, & absque scarificatione, hypochondrio dextro, si sanguis è dextra nare, & sinistro, si ex sinistra nare sanguis fluxerit, affixam, atque occipitio etiam scapulis, collique lateribus. Ligatura itidem extremorum, scilicet crurum, femorum, atque præputij, frictionesque extremarum partium familiarius ad quamcumque hæmorrhagiam cohibendam ab omnibus usurpari constat: & si hæc præsidia non adstringentia sint, sed laxantia, morbis quidem adstrictis, non laxis congruentia. Quid itaque dicemus à Laxantia laxis morbis conuenire? Certe quidem aliquando conuenire, diuersionis quidem (ut aiunt Dogmatici) & reuulsionis gratia, scilicet, ut sanguinis impetus ad nares aliò reuellatur, atque diuertatur. Methodici uerò hæc laxantia non per se adstringentia dicunt, sed quæ ex accidenti etiam laxo morbo aliquando medeantur: quod scilicet impetum sanguinis itidem, ut Dogmatici inquirunt, ad nares aliò conuertendo sint in causa, ut hæmorrhagia cesset, finiaturque. per se uerò laxæ huic passioni planè congrue dicuntur, quæ refrigerant, adstringunt, & siccant: Cuiusmodi ex simplicibus sunt, plantago, polygonum, equisetum, & siccant: Cuiusmodi ex stratiotes terrestres, oenanthe, uitis capreoli, myrtus, rubus, rosa, solanum, aizoom, falicis folia, portulaca, lenticula palustris, lactuca, cicuta, succus cucurbitæ, succus

Gal. in 5. meth.

cretio fit bona, & quando mala. Quod verò ad primum attinet, Galenus exprel-
 fit, sanguinem vomitu reiectum à stomacho atq; ventre manare. In stomachum
 vero, & ventrem plerumq; ab infernis partibus mittitur, aliquando vero etiam ex
 capite in hasce partes destillat. Aurelianus ex Methodicis ait, sanguinem, absq;
 tussi per vomitum a stomacho qui reijcitur, nigrum esse & gelatum, aliquando
 solum syncerumue, aliquando cibo permixtum: ex quo hæc signa quoq; obser-
 uari tradidit, scilicet animi dispersionem, deliquiumue, cibi fastidium, salivæ fluo-
 rem, nauseam, corpusq; totum frigidum exinde reddi, atque pulsus obscuros ac
 veluti demersos deprehendi. Porro sanguis hic aliquando cum dolore, aliquan-
 do sine dolore excremitur. Si verò ex ventre profluat, præter iam dicta sympto-
 mata, dolor sequi solet, inprimis vel tormentum inter præcordia interdumq; san-
 guinis modicum per alium deijcitur. Succedit autem hic sanguinis vomitus, ut
 superius etiam dictum est, venis, vel arterijs, aut dissectis, ut in vulneratis, aut ru-
 ptis, ut ex casu, aut erosio, aut apertis, aut rarefactis ipsarum tunicis, nempe resu-
 datione. Quibus verò signis hæc fluxus sanguinis causæ deprehendantur, superio-
 ri capite traditum à nobis est, quæ non sine tædio iterum repeterentur. His addi-
 mus sanguinem quandoq; euomi ob phlegmonem internam, aut ob aliquem ab-
 scessum, quod nobis denotabit dolor, febris assidua, atq; tenio cum dolore, si di-
 gitis stomachi vel ventris partes comprimantur; aliquando etiam cum pure euo-
 mi solet. De qua sanguinis vomitione Hippocrates in aphorismis ita habet:
 " Qui sanguinem vomunt, si sine febre accidat, salutare est; si cum febre, malum.
 " Curatio verò refrigerandi, & adstringendi vim habentibus perficitur. Ex qui-
 bus quidem verbis in ijs, qui sanguinem vomuerunt, & salutis prognosticum, &
 qualis curatio conveniat, nobis constabit. Etenim ijs, qui citra febrem sanguine
 vomunt, nullum vitæ discrimen impendit, quoniam hi facile usu adstringentiū
 sanantur: nam febre vacantes liquet nullam eo loco inflammationem adesse,
 unde effertur sanguis; quo fit, ut vel vasis alicuius ore recluso fiat sanguinis vo-
 mitus, vel sine inflammatione ulcerationem habeat coniunctam; facile autem,
 quæ sunt citra inflammationem, ulcera curantur adstringentium usu. Eos verò,
 qui cum febre sanguinem vomuerunt, in magno vitæ discrimine esse constitutos,
 intelligitur, quoniam quæ inflammationem simulq; febrem habent coniunctam,
 non solum curationem respuunt, sed ne eadem quidem magnitudine possunt per-
 manere: Nam maiora semper fiunt, & maligniora. Hæc sanguinis vomitione
 mixtam passionem faciunt ex laxo atq; ex adstricto, de qua nos in altero libro scri-
 bemus: illa verò morbum laxum, de quo in præsentia agimus, qui adstringen-
 tibus auxilijs, ut & Hippocrates expressit, pro curatione opus habet. Itaque ad-
 stringentia erunt medicamenta huic affectui cum per interius, tum per exterius
 adhibenda, ex ijs vero, quæ per interius administrabuntur, eligenda erunt stoma-
 cho amiciora, scilicet, quæ etiam alimenta existunt: ut ex herbis plantago, portu-
 laca, cichoreum, polygonum, mentha, myrtus, rubus, oenanthe: Ex fructibus
 verò mala cytonia, granata, pyra austera sylvestria, mespila tam setonia quam
 aronia, forba, oxyacantha, myrtei fructus, pruna sylvestria, mora nigra imma-
 tura, rubi fructus immaturi, gallæ: E succis autem succus granati integri con-
 tusi expressiq; hypocistidis, acaciæ: At ex seminibus, myrti, vitis, mespili utri-
 usq; supradictæ semina trita ex uino austero epota vomitum compescunt. Ex ter-
 ris quoq; & alijs metallicis, terra lemnia, samia, bolus armenus, lapisq; hæma-
 tites, sunt utilissima. Ex ijs omnibus poterunt parari decocta in aqua vel in vi-
 no nigro austero; vel pulveres, quorum quidem dabitur drachma ex uino auste-
 ro chalybeato, aut ex aqua ferrata. Non minus ad vomitum sanguinis cohiben-
 dum succi plantaginis, vel equiseti, vel polygoni, vel mali granati contusi & ex-
 pressi, vel pyri sylvestris, vel austeri, immaturi, vel similia, ad unciam unam, &

uncias

In lib. 7. aphor.
Hipp. com. 27.

In 7. aphor. 37.

Gal. in com. a-
ph. 37. lib. 7.

vincias quoque duas offerri poterunt. Succus vero acaciae, hypocistidisque, & similium drachma sat erit, si dissoluta ex vino nigro austero, vel ex vino granatorum exhibeatur. Terrae itidem ad drachmam ex aliquo humore adstringenti exhibita admodum profunt. Extrinsecus stomacho, & ventri conveniet applicare fomenta ex iisdem medicamentis adstringentibus parata, vel olea adstringentia, vel emplastra, vel aquas frigidas adstringentesque; vel decocta ex supradictis parata spongijs excepta; iuuabit quoque plurimum stillicidijs, quae ex iisdem adstrictorijs concinnata sint, stomachum, & ventrem irrigare, & perfundere.

*De sanguine ex ore per sreatum, & per tussim reiecto
cohibendo. Cap. VI.*

Sed iam ad sanguinis sputum descendimus, quod per tussim excernitur, atque adeo aliquando immoderatus fluit, ut non raro etiam multos ex eo profluio exolutis viribus interijisse viderimus; & nos ipsi à simili profluio, ab hinc plures annos, post febrem quartanam, cum tussi criticæ (sic enim finita est illa febris) oborto vix euasimus. Ni vero huiusmodi fluor sanguinis statim interimat, periculum est, si diu perseueret, ne ad phthisim homines deducat. Ceterum & de hoc sanguinis fluore supprimendo scribentes, priusquam ad medicamenta particulatim præscribenda descendamus, illud vnum primo intelligere operam dabitur, scilicet, excretio sanguinis siue sputum tussi excernitur quas partes laeas indicet, seu à quibus partibus proueniat, atque à quibus causis etiam fiat. Desluit autem sanguis interdum à capite in asperam arteriam destillans, repenteque irruens: Quo tussis repente, ad ipsum excernendum commota expultrice, excitatur. Aurelianus ait primum in fauces sanguinem destillare, & mox in arteriam, defluxum verò tussiculam excitare, quæ, sanguine per ipsam reiecto, statim sedatur. Galenus quoque docuit eodem modo sanguinem ex capite prouenientem, per tussim aliquando excerni posse, idcircoque non minus, quam si à spiritalibus proueniret partibus, tussim (sanguine scilicet in guttur irruente) concitare. Antequam vero ex capite descendat, atque ex ore tussi excernatur, solet præcedere fevor ingens, capitisque grauedo, vel dolor, venarum extensio earum præsertim, quæ in fronte, atque in temporibus sunt: sequitur faucium titillatus; aliquando etiam per nares desluit sanguis, vel ex faucibus expuitur. Quare sanguinis fluor per tussim factus quandoque fit à sanguine ex capite proueniente; aliquando vero etiam ex faucibus ipsarumque summitate excernitur sreatu primo, & si magis irruat, gutturque attingat, etiam cum tussicula, ita ut videatur hic sanguis quasi sreatu cum tussi coniuncto excerni: paucus primo educitur, & mox multus, qui non est spumosus, locusque, ex quo manat, depressa lingua, visu deprehenditur. Erasistratus tradidit, aliquando in faucibus tumores quosdam conspici, hæmorrhoidibus similes, à quibus sanguis desluit. Demum sanguis desluit plerumque ab aliqua corporis partium respirationi seruientium, nempe ex aspera arteria, aut ex pulmone, aut ex thorace, aut ex pleura membrana, aut ex diaphragmate, septoue transuerso. Vbi vero ex aspera arteria prouenit, sanguis, qui excernitur, est paucus, flauusque sæpe saluæ permixtus; frigora capilli vnius, vel (ut ait Aurelianus) multorum, cum gutturis titillatu & leui tussicula excernitur, & circa gutturis extantiam pruritus, & mordicatio quædam percipitur. Ex pulmone itidem sanguis plurimus excernitur, tenuis, plurimum feruens, spumosus cum tussi vohementi, voce rauca obtusa, & cum molesto aliquando doloris sensu, qui nunc sanguinis titillatu, nunc tussicula vehementi mouetur, cum thoracis etiam grauitate, & aliquando dolore (Galenus ait, dolores in pulmonibus vlceratis admodum remissos) cum voce, uti dictum est, rauca, obtusa, & sæpe

cus germinorum vitis, oleę syluestris, rubi, sorbi, mespili, cytonij, granati, & hyo-
scyami, semina plantaginis, & myrtillorum, acetum, aqua frigida, plumbum
vstum, stimmi, alumen, gypsum: ex Galeno etiam balaustiu, malicorium, rhus,
hypocistis, acacia, omphacium, aloe, manna thuris, pini cortex, intybum, terra
lemnia, samia, bolus armenus, lapis hematitidis, & ut alij posterius cognouerunt,
sanguis draconis, album oui, telę araneę, quibus pollen ę pistirino inhesit, san-
guinis grumus siccatus, stercus caninum, corallium, succinum luteum, pompho-
lyx, spodium, resina fricta, farina lentis, amyllum, lithargyrum, chalcitis, mu-
mia, fuligo ę clibano, vel ę leberte eneo derasa, gallę vstę, & aceto extinctę, fu-
ligo thuris, plumę gallinacę combustę, pili leporis vel hominis itidem pili com-
busti, ossa cremata, spongia itidem cremata. Hęc enim medicamenta simplicia,
& alia his similia, sunt, quę vsum habere a medicis cognita sunt, ad quodcumq;
profluuium sanguinis & excrementorum cohibendum. At quomodo, pro hęmor-
rhagia firmanda, his simplicibus atq; ex ijs compositis medici uti debeant, nunc
dicendum exordiendo ab internis medicamentis, quę per os assumpta refrigeran-
do, siccando, adstringendoq; impetum sanguinis, atq; ad nares motum compe-
scunt, sanguinem scilicet crassiores ad motumq; seigniores reddendo, atq; vias,
per quas fertur, constringendo. Ad hunc vsum omnia ex predictis medicamen-
tis conuenient, vel si succus quorundam per os exhibeatur ad vnciam vnā, sci-
licet, plantaginis, vel equiseti, vel rubi, vel millefolij, vel vitis capreolorum, vel
mali granati confusi ad geminas drachmas; vel hypocistidis, vel acacię, vel pru-
nellorum syluestrium, vel similium etiam ad drachmam; vel puluis itidem, eodę
pondere, predictorum scilicet balaustiorum, aut acacię orientalis, aut seminum
mespili cum fetonię cum aronię, aut foliorum myrti, vel oleę syluestris, vel salici-
cis, vel boli armeni, vel terre lemnia, vel corallorum, vel lapidis hematitidis, vel
similium, ex vino austero, aut ex succo, vel aqua plantaginis, vel polygoni, vel
similium, epotus. Ad hunc vsum etiam commendantur ex compositis trochisci
de terra sigillata, de succino, quod Karabę vulgus appellat: & ex opiatis etiam,
urgente necessitate, Theriaca recentissima, Athanasia, philonium ad semidrach-
mam. Nonnulli exhibent syropos vel per se solos ad vnciam, vel vnciam & se-
mis, cuiusmodi est de succo acetosę paratus, vel de rosis siccis, vel de citonijs,
vel de granatis, vel de omphacio, vel myrtinus; vel cum decoctis, vel cum aquis
adstrictorijs mixtos, cuiusmodi esset, qui accipit syrupi de rosis siccis vnc. j. de gra-
natis acidis vnc. semis, aquarum cichorij, plantaginis, polygoni an. vnc. j. Cę-
terum longę vltiora sunt medicamenta, quę exterius faciei, fronti, temporibus
atque naso adhibentur; neque minus iuuant ea, quę in nares induntur, atque in
aures, ad eas obturandas: Quarum ualidas obturationes ex mollissima cera, pro
hęmorrhagia cohibenda, medici uel etiam doctissimi utiles esse tradiderunt. Ita-
que, quod pertinet ad particularia medicamenta, in primis aqua gelida, cum ace-
to, facies aspergatur, aut spongia uel linteam gelida aqua imbutum fronti tem-
poribusq; imponatur; Sic conuenit oui candidum actu frigidum adhibitum, uel
equiseti herba trita fronti imposita, aut lactuca ex aceto confusa, uel cicuta iisdem
partibus applicita, sed cauendum erit a uehementer frigidis, quod cerebrum magno-
pere lædant. Conueniunt etiam emplastra fronti imposita refrigerantia & ad-
stringentia, scilicet, exempli gratia, quę parantur ex gypso, bolo armenio, & san-
guine draconis; ex albumine oui, cum succo polygoni, aut equiseti, aut pomi gra-
nati confusi. Succu itidem refrigerantes adstringentesq; plurimum iuuabunt, si
ipsis actu frigidis frons illinatur, aut cum aceto mixtis. Deprehensum est cochleę
cum testa confusam cum aceto fronti impositam hęmorrhagię plurimum condu-
cere. Ex ijs ueró, quę intra nares indita hęmorrhagiam sistunt, quędam pulue-
rizata per cannam insufflantur, scilicet stercus asininum ustum, atq; tenuissime

Ccc 3

tritum,

Gal. lib. de rem.
fac. parabili.
Paulus in lib. 3.
cap. 24.

tritum; uel cochlea cum testa vsta trita, vel galla immatura vsta, tritaque utilissime insufflatur; vel fuligo è clibano, uel è lebetæ æneo derasa eodem modo vsurpara, vel ex aceto linamento excepta, atque intra nares indita. Paulus vnum monet pro sistendo sanguine, foramina scilicet narium non esse detergenda neque irritanda. Ex simplicib. vero intra nares imponendis. commendatur ex eodẽ Paulo chalcitis trita linamento excepta inditaque, & oui testa cremata cum gallæ dimidia parte trita, eodem modo indita, vel funiculum lucernarum intrusum. Cochlea cum testa vsta oui candido permista, aut gypsum lotum, vel cum albumine oui, vel cum aceto inditum; vel tela aranei, cui ex pistrino seu molendino pollen adhæret, imposita valde iuuant. Sanguinis item grumus siccatus; uel resina fricta, quæ à Galeno commendatur. Dioscorides laudauit radicem æthiopicis tritam ex aceto. Prostant quoque vitis cortex item tritus; asini & equi stercus tum crudum tum vstum ex aceto; germina vitis teneriora trita similiter ex aceto imposita; ferrique rubigo; & squama eodem modo cum aceto indita; item galla immatura, quoad incandescat, cremata, aceto extincta, tritaque imposita; spongia quoque cum pice vsta; & gypsum oui candido cum pilis leporinis exceptum; inditumque; sic cochlearum etiam caro trita cum thure ex aceto eodem modo immista. Atque hæc ex simplicibus nasalibus hæmorrhagiam cohibentibus nobis sufficiant. Quibus addimus ex compositis etiam quædam medicamento ad hunc vsum facientia: & primum ex Paulo, quod recipit, manne thuris 3. j. aloes scrup. i. s. candido oui trita exeiuntur, & linamento contorto subiguntur. Galenus conficit hoc ipsam (quo nihil præstantius credit) ex aloë itidem & thure cum oui candido, mollissimisque pilis leporinis exceptum ut in nares indipossit. Aliud etiam conficit ex resina, addito triticeo polline, cum gypso, & oui candido. Medicamentum vero ex aloë à quibusdam paratur ex aloës 3. j. thuris 3. ij. quæ oui albumine excepta, cum pilis leporinis commiscuntur, atque intra nares induntur. Atque ex Galeno constat, præstantissimum esse, quod recipit thuris 3. j. & aloës scrup. i. s. Verum antequam medicamenta ægrotis, pro hæmorrhagia sistenda, præstentur, præstabit ipsis primum victus rationem instituere. In qua aer frigidus erit eligendus, cibi refrigerantis adstringentisque facultatis, vel etiam emplasticæ. Vnde conuenient fercula parata ex cichoreo, plantagine, acetosa, portulaca, mentha, rumice, hordeo, & similibus parata in iure vel capitis vel pedum vituli, aut castrati. Accommodatissimi in libris erunt fructus adstringentes, ut mala immatura cocta, pyraque, cytonia mala, granata, mespila, sorba, mora nigra, fructus berberis, rubique immaturi, oxyacanthæ, pruni syluestris & similes alij. Pro potu vtantur aut vino nigro austero aquoso, aut aqua ferrata, vel adstringentibus rebus alterata. Fugiant ex animi passionibus iram, gaudium, atque risum: eos verò timere, & æstitia affici quandoque non est inutile; quinimo in multis hæmorrhagiam à repentino, vehementique timore concitato planè cohibitam fuisse, à medicis sæpius obseruatum est, quod scilicet timor subitus & magnus sanguinem extra fluentem, ad interiora & ipsum cor subito propellendo, sistat.

In 5. meth. med.
cap. 4.

In 5. meth. med.
cap. 4.

*De sanguine per vomitum immoderatus profluente
cohibendo. Cap. V.*

Sæpe fit, ut sanguis ex ore per vomitum immoderatus excernatur, atque ita sanè, ut homines in exitialem syncopem deducat. Quamobrem citò huic profluvio erit occurrendum. At de medicamentis priusquam agamus, primum cognoscendum erit, sanguis vomitu reiectus (qui symptoma est facultatis expultricis vitia) & à quibus partibus fluat, & à quibus causis, & quando hæc excretio

sepe cum rauco sonitu sanguis non multus inter tussendum excernitur, non ruber, sed nigricans, crassus, & grumofus, cum maiori tussi, atque dolore etiam excreatur. Ex membrana pleura vocata excretus sanguis deprehenditur ex lateris dolore pungitiuo, vel quod dolor sit secundum latera, vel pectoris, & aliquando etiam inter scapulas, sanguisq; minus flauus & minus copiosus excluditur ac plerumq; sputo mixtus. At verò ex diaphragmate si prouenerit, dolor inferius à pectore rotunditate quadam thoracem pungens obseruatur. Cæterum his cognitis, videamus, quot modis ex venis arterijsq; emanet. Apud omnes autem medicos constat, sanguinem exire ex vasis primò eorum (vt superius in capite de hæmorrhagia dictum est) apertione, qua scilicet ipsorum oscula recluduntur aut à copia sanguinis, aut à flatu distendente. Deinde sanguinis exsudatione, quam præcedit vasorum substantiæ rarefactio, sanguinisque maximè ex calore attenuatio, ita vt ex vasis etiam clausis sanguis reludando emanet; quod illis sæpè contingit, qui in balneis calidis diu commorati sunt, vel plurimum aut ab igne, aut ab exercitio incaluerunt: Resudat etiam non rarò ex phlegmonis. Tertio sanguis emanat, vasis exelis corrosive ab acri, amaro, vel salso humore, ex capite in pulmones, vel in thoracem destillante, aut ex humore purulento in pulmonum substantia, vel in bronchijs, vel in venis, arterijsq; ex putredine, aut ex phlegmone, abscessive suppuratis, factò, eius acrimonia exedente substantiam pulmonum & vasa ipsa sanguinem continentia. De qua erosione Galenus in lib. 4. de loc. affect. cap. 4. scribit: Quum enim retroactis temporibus quis ex interuallis quotidie nò ita multum sanguinem tussiendo expuere consueuerit, atq; ei postea superueniat multi sanguinis inter tussendum eruptio, & quidem neq; ab alto cadenti, neq; in certamine, neq; in palestra vulnerato, neq; etiam sub vilo graui pondere oppresso thorace, reliquum tuerit, vt consiciamus ob insignem erosionem plurimum sanguinem inter tussendum fuisse relictum. Demum sanguis itidem emanat, tussiq; excernitur, iisdem sanè vasis aut ex copia sanguinis, vel flatu nimium distendente ruptis, aut vulneratis, aut denique vel ex percussione, vel ex casu, vel ex ponderis oppressione, vel ex magna clamatione, vel ex vomitu vehementi, vel ex coitu multo, vel deniq; ex tussi laboriosa perseverante, diuq; partes pectoris lancinante, venis arterijsq; contractis. Qui vero sanguis ex arterijs prodit, flauior, tenuiorq; existit, atque cum motu excernitur; nigrior vero & crassior ex venis exiens, quique absque vilo motu excernitur. Ex huiusmodi sanguinis profuio, vt etiam dictum est, periculum est, ni subito ei occurratur, aut sanguine immoderatus profuente, vt repente, veluti iugulati homines, intereant; aut, si affectus permaneat, vt in tabem deducantur. Pulmonum vlcera insanabilia esse omnes scire tradiderunt, veruntamen quosdam ab iisdem sanatos fuisse, obseruatū est. Aurelianus voluit, propterea pulmonum vlcera difficillime coalescere & sanari, quòd natura in alto ferueat, multoq; sanguine vel humore abundet, quapropter vlcera ægrè siccantur; item quòd motu assiduo, vulnecum vlcercumue labia quantantur, eoq; motu ipsorum vnio impediatur; adhæc quia vlcera nobis occulta sunt, & remotiora quam vt medicamenta viribus integris, non refractis ad patientis locū peruenire queant. Veruntamen non esse omnino insanabilia pulmonū vlcera colligit Aurelianus, cum sæpe quidam è vulnerato pulmone conualuerint. Minus vero ea, quæ in thorace sunt, sanatu sunt difficilia. Nos non paucos, qui sanguinè expuerunt, ex venis thoracis ruptis sanatos uidimus. Erasistratus ait, facilius sanari succulentos, fortes, & aruicollis microtrachelos dictos; difficilior vero graciles, inbecillos, atq; longicolles. At ad fluorem sanguinis tum screatu, tum tussi excretum cohibendum, quoniam multa ad ipsius cognitionem præmissimus, declinandum est. De eo tamen in presentia, agimus, & solummodo solutionis passio est, quæq; vt de alijs laxis passionibus dictum est, adstringentiū vlu

Paul. in lib. 4.
cap. 53.

usu tollitur. Etenim sæpe fit, ut, præter hunc affectum, sanguinis fluor etiam adstrictum affectum coniunctum habeat, utpote cum sanguinis fluor aut à catarrho, aut à putredine in pulmonibus, aut ex phlegmone, aut ex abscessu ortum trahit. Cæterum de istius curatione nos posterius agemus, scilicet, ubi de mixtis passionibus ex laxo & adstricto sermonem instituimus. Itaq; in fluore sanguinis, qui laxus est affectus, quique fit vasis alicuius aperture, aut raritate, aut vlcere in partibus respirationi seruientibus, præsertimq; in aspera arteria, vel in pulmone, vel in thorace, facta, ea medicamenta solummodo vsui congruent, quæ quouis modo laxatas partes adstringere apta nata sunt. Sed priusquam hæc proponamus, victus ratio congrua erit præscribenda. primum itaq; æger in loco frigido collocandus erit, quieretque decumbat, vel sedeat, ab omni motu corporis caueat, locutio- neq; præsertim, atq; etiam ab animi motu, maximeq; ab ira, voluptate, atq; à risu: Contrà timor vehemens subito concitatus solet esse, ad omnem sanguinis fluorem cohibendum, magnæ utilitatis. Quod pertinet ad cibum & potum, plerique medicorum solent, inediam iniungere, quæ profecto conueniet, si fluor ab adstricta causa foueatur, scilicet, si sanguis excernatur ex catarrho falso, vel acris, aut ex phlegmone, aut ex abscessu: Vbi vero fluor hic laxus affectus est, tenuissima illa diæta, quod laxet, non conducit. Sed neq; cibus admodum copiosus conuenit, propter virium imbecillitatem, quæ hæc ferunt multum cibum. Quare cibus quantitate moderatus offerendus erit, in eaq; præsertim copia, quam vires commodè ferunt, qualitate verò erit quouis modo adstringens. Proinde Antiqui halicam exposita dabant, aut oryzam, aut psisanam hordeaceam cum palmolis, vel malo cytonio, aut pyro austero, aut simili alio fructu in ipsa decocto, aut panem decoctum cum plantagine, uel rubo, uel oxyacanthæ fructibus iminaturis: Ex herbis uerò exhibebant plantaginem coctam, uel portulacam, uel intybum, uel oxylapathum, uel lac coctum refrigeratum cum amylo, aut non coctum, aut lentem cum psisana coctam, aut milium coctum cum lacte. Aurelianus laudat panem elixum in decocto rubi, aut alterius adstringentis, & plantaginem in aceto coctam cum oleo uiridi asperso, & rhoe puluerizato, deuorata. Mala item cydonia cocta recenti mulso, uel tosta prædem pro semine, farina conspersa, aut sorba, aut mali punici grana. Cochleas item coctas meminit in cibo dandas. Ex carnibus uolantium præscripsit pectora turdorum, uel pullorum recentium gallinæorum, uel columbarum, uel perdicum, uel phasianorum. Sed commendauit quoque carnes porcinas, præsertimq; cerebrum, pedes, & auriculas, quod inistitum sint emplasticæ facultatis: Nostri uerò consultius utuntur, loco porcine carnis, uitulina, potissimumq; cerebro, pedibus, & capitis carne uiscide lenteq; facultatis. Ex iure autem harum carnum panem decoquunt, ac psisanam, aut oryzam parant. Vsui quoq; sunt omnia forbilia rhoe aspersa. Postremo lactis usus in cibo, nullo reclamante medico, ad sputum sanguinis maxime commendatur, de quo

» Alex. Tral. lib. 7. ait, ita huic vsui fuisse accommodatum, ut, qui per initia ipso
solo constanter longiori tempore usi sunt, omnes conualuerint. Quod confirmas
» subdidit: Noui autem quendam, qui cum toto anno ipsum & bibisset & comedisset,
» set, interim cum frumentaceo aliquo, aut similigine, aut itrio, aut halica, aut lente,
» te, aut panico, cumq; in agendo à uino abstinuisset, liberatus fuerit, ut nec pus
» expueret, nec inde in phthisim incideret. Et hæc de cibo congruo instituendo. De
potu autem loquentes Medici, uel uinum pauciferum nigrum, austerumque laudant,
» uel ferratum aut chalybeatum; uel aquam ferratam aut cum adstringentibus
aliquo decoctam. At iam ad medicamenta seu præsidia huic affectui congruentia
ueniamus: sed priusquam præscribamus particularia, de quibusdam, an conueniant,
» pauca perstringenda sunt, scilicet, an in fluore sanguinis phlebotomia, an cucurbitularum,
» ligaturarum, frictionumq; usus conueniat? De quibus quidem dicemus

dicemus illud in primis de phlebotomia affirmantes, quod tanquam laxativum præsidium minime conveniat in sanguinis fluore, qui laxus affectus est; veruntamen aliquando, si modo vires commodè ferant, pro diuertendo sanguine, in exigua quantitate concedi potest. Sed aliquis fortasse nobis obijciat, cur eam sanguinis vacationem per venam sectam ea conditione solummodo laudauerimus in exigua quantitate, ne laxus affectus augeatur; Cum illud præsidij genus in sputo sanguinis, quod ex morbo partium respirationi seruientium proficiscitur, omnes ferè cum Dogmatici, tum Methodici laudauerint, præsertimque ex Dogmaticis Hippocrates, Erasistratus, Diocles, Praxagoras, Asclepiadesq. & ex Methodicis Themison, Thessalus sectæ illius princeps, Aurelianus, atque alij phlebotomiam inquam laudarint, maxime in sanguinis fluore à venarum corrosionē, vel à ruptura factō, & auertendi sanguinis causa, & ob tollenda in sanguinis copiam, vt venarum diuisura facilius coalesceret, atque etiam, vt futura in vlcere phlegmone seu tumor (qui superuenientes affectus vlcera reddunt periculosiora) prohiberetur. Si quidem Aurelianus ait: Omne vulnus quod vsq; in tertium diē glutinari non potuerit, necessario tumescit. Verū enimvero omnes quidē ferè medicos phlebotomiam laudasse in sputo sanguinis aut à catarrho, aut à putredine, aut à phlegmone alioue tumore, vel abscessu excitato constat: quod, profectō, tūc affectus sit laxus cum adstricto mixtus, qui cum magis vrgeat ad curationem, propterea præsidia etiam laxantia videntur ei conuenire. Plerumque verò fit, vt sanguinis fluorem cum tussi obortus (qui cæteris periculosior, & exitior videtur) foueatur in pulmonibus a causa adstricta, scilicet, vel à catarrho maligno, vel à tumore, aut phlegmone: vnde meritō phlebotomia tanquam laxatorium præsidium vsum habebit, maximeque si sanguinis fluor modicus fuerit, minimēq. vires exoluat. Hinc Thessalus meritō dixisse visus est: At si etiam intra diatrium tempus fuerit attestata partium grauedo, vel dolor, aut spiratio difficilis, vel tussis cula sicca, phlebotomare conuenit. At nedum vbi dolor, vel grauedo partium thoracis, vel aliquod aliud eas partes stricturæ passione laborare indicans adfuerit cum fluore sanguinis, venę sectio vsum habebit; verū neq. cucurbitulæ, aut hirudines, neque alia istiusmodi præsidia laxatoria erunt respuenda. Sed vbi sanguinis fluor solummodo laxus affectus sit, scilicet ex aperture venarū, aut ex vlcere absque inflammatione, febre, & plethora sanguinis profectus, nullomodo phlebotomia vsum habere poterit, neq; cucurbitulæ, neque hirudines, neque similia præsidia congruent. Vbi verò sanguis immoderatus defluat, ligaturæ ad auertendum sanguinem & in articularibus partibus, & in brachijs & in femoribus conuenient. Erasistratus in inguinibus & in alis faciendas voluit. Tempus modo, ijs expeditis, instat, vt particulatim medicamenta prosequamur adstringentia, quæ apta sunt fluorem sanguinis cohibere, & primum ea, quæ sanguinem scretu ex faucibus manantem sistunt, cum externa tum interna: Inter quæ cum acerum comprehendatur, de eo etiam pauca sunt dicenda, nimirum, An, quemadmodum extrinsecus ad sistendam hæmorrhagiam vtiliter partibus adhibetur, etiam per os ipsum debeat exhiberi? Quod non paucis ex veteribus visum est, quia nimirum adstringendi vi maximè valet, vnde ex aqua mixtum solet ad hæmorrhagiam fronti, & temporibus commodè adhiberi: Quo exemplo nonnulli vel syncerum seu per se solum in sanguinis fluore vtiliter dari existimarunt, vel medicamenta cum ipso danda: unde antiqui dabant plantaginem coctam ex aceto, vel acaciam, vel hypocistidem, vel lycium, vel terram lemniam, vel bolum armenum, vel simile aliud ex aceto dissolutum. Aurelianus in profuso & largissimo fluore per se solum voluit esse propinandum: Veruntamen in sanguinis fluore ex vasorum exesione, fractura, aut vulnere, maxime (mea sententia) erit dammandum, nimirum, quod propter acredinem & mordacitatem vlcerebus

Ddd fit

Aurel. 2. chron.
cap. 9.

fit inimicum. Cæterum adstringentibus cum medicamentis mixtum non erit spernendum. Itaq. fluente sanguine ex faucibus, qui screatu excernitur, gargarismata vtilia erunt, aut ex vino austero nigro, aut ex aqua ferrata in qua rosarum capita contusa ebullierint, aut balauftium, aut malicorium, aut cortex mali granati, aut myrthus, aut pruna syluestria, aut pyrum syluestre, aut galla immatura, aut sumachum. Vtilissimus ad eum vsum erit (aut pro gargarismate, aut si locus, ex quo in faucibus sanguis emanat, lingua depressa eo obliniatur) succus aut è malo granato integro in mortario contuso expressus, vel ex prunellis syluestribus, vel ex fructibus sorbi, vel pruni sylvestris, vel oxyacanthæ. Conferret quoque succus plantaginis vel equiseti, vel polygoni; vel acaciæ, vel hypocistidis, ex aceto dissolutus, si eo locus affectus obliniatur. Hæc ad fluorem sanguinis ex faucibus erumpentis cohibendum, firmandumque sufficient: nunc ad eundem fluorem sanguinis tussi excreti, & ex partibus respirationis proficiscentis, compescendum, medicamenta accomodata etiam dicamus, & si eadem sint, quæ ad hæmorrhagiam, & ad vomitum sanguinis superius meminimus. Verum & si illa omnia huic negotio congruant, & quodlibet illorum possit à medico usutari; nihilominus, cum in curando sputo sanguinis, res maximi momenti agatur, nullo parcentes labori singula proponemus, quæ ad hunc vsum fuere et à veteribus medicis & à iunioribus cognita. Inter hæc verò præcipua sunt, succus portulacæ, aut plantaginis, aut polygoni, aut equiseti ad vnciam, & semis epotus; rubi fructus immaturi, & flores siccati ad geminam drachmam, ex vino austero poti; quercus, vel ilicis, vel fagi membrana cortici subiecta trita eodem modo ex vino, vel aqua plantaginis vel polygoni potui data; terra samia, lemnia, vel armena simili pacto vsurpata. Aurelianus in potu commendauit lixiuium ex cinere vitis sarmentorum, & ex aqua pluuiali, ad semilibram propinatum; at Galenus paratum ex cinere lignorum adstringentium, cuiusmodi est vitis, thus, lentiscus, rubus. Ex Dioscoride commendatur ad sputum sanguinis succus porri cum gallæ aut thuris farina, vel acacia. Semen myrti tritum ad drachmam ex aqua plantaginis epotum conuenit: succus item ex myrti baccis viridibus expressus; rosarumque capita trita ex vino austero epota iuuant. Decoctum radices symphiti maioris epotum quàm maximè à Tralliano probatum est, spinæ item albæ drachma cum oxycrato ab Oribasio; & decoctum radices althææ. Dioscorides etiam laudauit farinam ex trimestri tritico coctam ad glutinis modum, atque delinctam. Glutinum similiter, quod ex similagine, & expolline fit ad libros glutinandos, sanguinem intertussendum expuentibus non minus conducit, si cochlearij mensura liquidus absorbeatur: item succus hypocistidis, aut acaciæ cum thuris modico epotus: Arctij item radix cum nucleis pineis ex quopiam liquore adstringente à multis commendatur; & samia terra cum balauftio trito; & membrana quercus (quæ est inter corticem & lignum, & ea, quæ circum glandem est) trita ex vino nigro austero ad drachmam epota, vel ipsius decoctum itidem epotum. Paulus longe ad id esse efficaciorē statuit membranam fagi atque ilicis eodem modo assumptam. Cornu Cerui vsum, lorumque ex aqua adstringente, pondere duorum cochlearium eodem modo vtiliter datur. Castanearum quoque decoctum non minus vtile esse deprehensum est; maximeque membranæ illius, quæ est inter putamen & corticem castanearum: sicuti & cortex salicis & fructus ex vino sumptus auxiliatur. Præclare commendantur etiam gentianæ radices duæ drachmæ ex aqua aut vino; & Rhaponticum eodem modo atque mensura datum: Corallij item lapidis drachma cum succo mali punici, & cum thure etiam ex vino myrtite. sed quid tandem de lapide hæmatite ad sanguinis fluorem cohibendum, tantopere à multis concelebrato, dicemus? An non & ipse nedum ad sputum sanguinis, verum etiam ad pusiccandum in phthificis

In 2. eusporiff.
cap. 31.

phthificis olim in magno usu fuit & certe quidem (vt auctor est Trallianus) & eius substantia in tenuissimum pollinem detrita, ex succo aut granatorum, aut polygoni, aut plantaginis epota; & vinum, in quo fuit hic lapis tritus per diem vñ aut plures maceratus, ad hunc usum maxime à multis concelebratum est. de huius usu Alex. Trallianus ita scripsit: Vfus autem sum eo in his, qui largius sanguinem reijciebant, cum succo mali punici, & granis, vel succo polygoni. In quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiam ex aqua sola tepida. At laeuigare ipsum plurimum oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sitq; aerius & vento persimilis. dedi autē ex eo octo obolos, & paulo amplius minusue. Ex simplicibus quoque ijs medicamentis possunt quædam ad hunc usum componi, cuiusmodi fuit pastillus à Paulo dialectru vocatus, & diacoralliu, & qui paratur ex terra Samia, Lemnia, lapide corallio, radice symphyti maioris, atq; amylo, tenuissime tritis ex succo plantaginis. Nonnulli addunt partem semissem opij. Pastillus itidem ex rosis hanc vsui est opportunus. Themison dabat succum mali punici contusi cum modico aloes, & medicamentum Diascaminum vocatum, quod paratur accipiendo gummi Arabici, acaciæ Egyptiæ an. vnc. j. aluminis scissi vnc. ij. trita excipiuntur decocto papaueris, & pastillus paratur, qui drachmæ pondere ex liquore aliquo adstringente assumitur. Thessalus dabat & ipse terram Samiam pondere duarum drachmarum ex aqua tepida, vel amyllum, vel symphyti radicem, vel ipsius foliorum succum, vel medicamentum, quod ex tragacantho, gummi Arabico, thure, atque opio conficitur. Aetius verò cochlearij mensura ex vino austero, vel ex aqua polygoni, vel plantaginis propinabat puluerem, qui parabatur ex lapidis corallij, terræ samia, succini, mastiches an. 3. vi. amyli, thuris, gummi Arabici, an. 3. iij. Atque hæc sunt medicamenta fluori sanguinis conducentia, quæ per assumi debent. Quibus nunc etiam illa, quæ exterius adhibita iuuant, addenda sunt, nimirum, quæ adstringendo vias affectorum locorum densant, præcluduntq; , vt intra illas adstrictas sanguis retineatur. Proinde pectori conducet spongia ex aqua frigida cum aceto admota, vel ex decocto aliquo adstringentium supradictorum cum modico aceto permixto: aut lintei iisdem decoctis adstringentibus, vel succis, scilicet plantaginis, polygoni, portulacæ, vel similium imbuti, atq; ante & retro adhibiti, pectori scil. & dorso, seu posteriori thoracis parti. Conuenient etiam inunctiones ex oleo viridi, vel rosaceo, vel myrrino, vel de cytonijs, vel ex similibus alijs. Epithemata etiam conuenient, ex succo aizoi, aut solani hortensis, aut plantaginis, aut equiseti, aut portulacæ, aut intybi agrestis, vel similium; aut ex multis ipsorum simul mixtis cum tertia parte acetii albi, pectore ac dorso ijs oblito & madefacto. Aetius itidem laudauit illitiones ex aceto in quo cortex loti, aut mespili, aut thus, aut rhamni & polygoni folia fuerint decocta: in quo aceto etiam diluito aloem, aut acaciam, aut omphacium, & modicum gummi: pectus ac dorsum eo illinito, atque vbi excoriatum fuerit, rursus inungito. Eodem item modo emplastra adstringentia maxime conuenient. Aurelianus laudauit emplastrum, quod paratur ex palmulis Thebaicis ex vino austero aut ex aceto tritis, mixtis cydonijs coctis, aut corticibus mali punici tenuissime tritis, aut alumine, aut acacia, aut hypocistide, aut galla, aut cenanthe, aut aloe, aut mastiche trito, melle exceptis. Aliud ex puluere mali punici vel mannae thuris, mixto alumine, succo plantaginis excepto componitur, appositumque confert. Sic quod ex polenta parabatur, & aliud ex cymis rubi vel plantagine, vel solano, vel germine vitis, vel aizoo, aut ex alio stiptico medicamenro concinnatum. Item ex intybi folijs, cum medulla panis, & aceto, emplastrum vtile ad sputum sanguinis conficitur: Si plantago, & polygonum tritū cum hordei farina acetoq; pectori adhibeatur, dictæ passioni, et valde proderit: Non minus, quam faciat emplastrum de salicibus Aetij. Denique, cohibito san-

guinis fluore, antiqui utebantur medicamentis Græcis metasyncriticis vocatis, quæ Aurelianus incorporatiua appellat; cuiusmodi sunt dropaces, vel phenigmi, vel siccæ frictiones, nimirum ad partes densandas, roborandasq; & ad absumentium partium humiditates, quibus partes solent in laxum affectum reciduiare. Sed de ijs præsidij à nobis in superioribus libris satis superq; scriptum est.

De sanguinis fluore, qui per aluum fit, supprimendo. C.VII.

Non raro etiam euenit per aluum sanguinis fluor ita immoderatus, ut homines quasi iugulatos interimat, idcircoq; cito cohibendus est iisdem ferme medicamentis, præsidijq; adstrictorijs, quæ in alijs fluoribus supprimendis superioribus capitibus abunde memorauimus. Cæterum, cum (veluti de sputo sanguis dictum est) hic fluor aliquando venis in intestina definentibus aut apertis, aut erosis, vel ruptis, vel rarefactis fiat, quem affectum simpliciter laxum appellamus; & aliquando à causis adstrictorijs vnâ foueatur, quippe aut à catarrho falso, aut acri, aut ab humore feruenti, scilicet à bile flaua maxime acri, aut ab eadē bile retorrida, aut à phlegmone, aut à calido morbo hepatis, sanguinem valde putridum, acerrimumq; reddente; Merito floris sanguinis talem fieri cernimus differentiam, ut quidam morbus laxus solummodo sit, alius verò etiam cum adstricto morbo mixtus. de hoc posterius sermonem habebimus, & in præsentia illud lum qui solummodo laxa passio est, tractabimus. Est vero fluor sanguinis laxus affectus, qui per aluum fluens immoderatus vires exoluit, syncopemq; & mortem accersit. In quo fluore aliquando sanguis merus emanat, & aliquando alijs humiditatibus permixtus: Ille verò aut bonus, aut vitiatu exit: atq; hic aut cum chylosis deiectionibus incoctus, aut cum mucis, vel pituita falsa, aut cum bile flaua ardente, aut retorrida, aut cum melancholia; aut cum varijs humoribus permixtis quàm maxime putridis, aut cum adipe, vel membranis, vel deniq; intestinorum substantia, aut ipsiusmet substantia hepatis, ut nos Cayri in Egypto in medico Nicolai Razeuil Poloni Ducis Olicæ aliquando vidimus. In quo, præsentē illo Duce & virtutibus, & moribus maxime illustri, per aluum in exitu dynteria excreta sunt partes hepatis substantiæ Græcis parenchymatis dictæ, atq; non sine magna omnium circumstantium admiratione. Sed iam ad fluorem synceri sanguinis accedimus, qui aut bonus est, aut vitiatu, atque hic aut aquosus iisdem est, scilicet loturæ carnis similis, ob imbecillitatem concoctricis in hepate facultatis factus, aut nigrescens crassus, & instar bituminis iudaici etiam splenscens, deijcitur: qui sanguis talis redditur, si nimium in hepate moretur aut ob venarum vim attractricem debilitatam minime ipsum attrahentem, aut propter aliquam obstructionem in venis factam; item si iusto plus calefiat, vel à nimia hepatis caliditate affetur. Vel excernitur quidem nigrescens, at fluidus, splendoris expers, qualis hepate ad frigidius temperamentum inclinante fieri solet. Demum mixtus alijs humiditatibus sæpius sanguis per aluum excernitur, colore atq; substantia præditus simili, qua oui luteum in iure conuassatum apparet, quæque ichor aliquando cruentus conspicitur, sed cum foetore insigni deijcitur. Huncq; fluxum colliquatiuum medici appellant, pathognomonicum siue proprium pestilentium febrium signum, quicq; fit ab extraneo calore insigniter humores putrefaciente. Aliquando apparet, ut dictum est, ichor cruentus albè humiditatis mixtus, aliquando biliosus, & aliquando nigrescit aliquatenus, & non sine aliquo splendore, vpotē quando calor febrilis magis colliquat, quam putrefaciat, cuiusmodi in febribus ardentibus colliquatiuis fit, in quibus etiam præ insigni calore humidiore partes absumentē humores biliosi meri, syncerie per aluum deijci solent. Aliquando

quando verò sanguis cum facibus, vel chylofis deiectionibus exit. Plerumque cum mucis, aut cum pituitosa, aut cum bile ardente scilicet lutea, vel viridi, vel nigra retorridauè, aut cum adipe, aut cum membrana, aut cum substantia intestinorum defluit. Huiusmodi deiectiones cum torminibus ventris, magnisque doloribus fiunt, fluxusque dysenterici vocantur, qui ulceratorum intestinorum propria signa existunt, de quibus paulo post nos particulatim agemus. Itaque ex ijs constat, sanguinem per alium aliquando syncerum excerni, atque hunc vel bonum, vel vitiosum, esse; & aliquando mixtum alijs humiditatibus, qui sæpe immoderatus ita fluit, ut laxum morbum magnum faciat, atque proinde magna præsidia adstrictoria, quibus ei occurratur, indicat. Aliquando vero natura, vel ut corpora à morbis præcaueat, vel ægrotantia ut à morbis liberet, sanguinem tanta copia sæpe excernere solet, ut complures medicorum artis medicæ ignari perperam huiusmodi sanguinis fluxum laxum morbum iudicare soleant; ac proinde statim adstrictorij medicamenti ipsi occurrendum esse iudicent; cum tamen huiusmodi excretio morbus laxus dici nequeat, quo ad vires ita exoluantur, ut corporis actiones aperte lædi deprehendantur. Etenim ut superioribus libris demonstratum à nobis est ex Methodicorum placitis, nulla euacuatio (siue sanguinis, siue excrementorum sit) nisi ita vires resoluatur, ut corpora apertius lædantur, morbus laxus dici poterit. Bisariam vero euacuatio quælibet morbum laxum facere potest, vno modo cum repente adeo immoderate sanguis emanat excerniturque, ut vel in syncopem homo incidat, aut, si syncopem hic fluxus accersat, tamen maxime corpus lædat, sic, ut exinde corpus prælangueat, colore deficiat, tumeat, in malum habitum seu cachexiam mutetur, caput maxime debile euadat, atque ad vertiginem valde pronum, stomachus non appetat cibos, assumptisque minus concoquat, pulsus langueant, & corpus ægrius moueatur. Quem sanguinis fluxum per hæmorrhoidas nos olim in Hieronymo Capello Senatore illustrissimo, in omni virtutum genere, morumque probitate ijs, qui ipsum cognouerunt, maxime conspicuo obseruauimus. Quare fluor sanguinis tam profusus, & immoderatus, ut vires exinde aperte lædi videantur vno modo morbum laxum facit, & quidem magnum etiam, si syncopem, præ virium resolutione, accersat. Altero vero modo sanguinis fluor præternaturalis non immoderata quidem quantitate, neque impetu, sed diurnitate, & perseverantia (quod vel continuus sit, vel sæpissime reuertatur) vires ita prosternit resoluitque, ut tractu temporis morbum laxum faciat. Prudenter itaque medici se gerere debebunt in cognoscendis ijs fluoribus sanguinis, vel excrementorum, qui laxi morbi sunt, cum sæpe, ut dictum est, natura copiosas vacuationes, vel purgationes salutes molitur, quæ quantitate seu copia insigni morbosæ videri solent, cum tamen laxum morbum non faciant. Huiusmodi sanguinis fluor febrem quartanam criticæ, & salubriter in me soluens ab hinc annos duodecim me inuasit; nam sanguinis ter in die per os inter tussendum profusi adeo creuit mensura, ut septem librarum pondus equaret, fortasse etiam excederet. Quem fluxum, & expuitionem sanguinis ego solus inter multos grauissimos medicos, qui me visitati conuenerant, criticam, atque salutarem esse credidi, eoque præsertim argumento, quod, cum antea & maxime sitirem, & corpus meum admodum graue esset, ab euacuatione eo sanguine sitis statim sublata fuit, atque corpus ita alleuiatum, ut promptius, quam antea, cum ad ambulandum, tum ad aliud faciendum, eo uti potuerim, cum pulsu vehementia non carente. Colligo igitur, sanguinis fluxum bonum, licet quantitate videatur malus, & morbosus, tamen ab eo distinguui, qui laxum morbum facit, quia vires non ita debilitat, ut actiones in corpore lædantur; quinimo ab huiusmodi hæmorrhagijs, pulsus maiores, vehementiores, & magis æquales, ut nos in libris de vita & morbo ægrot. prælagienda docuimus, redduntur, & reliquæ actiones

*Gal in li de diff.
symp. cap. ult. &
in 6. de san. tuæ
da cap. 6.*

actiones quoque vitalibus viribus respondent. At tempus est, ut ijs obiter declaratis, ad præcipuū nostrū institutum redeamus quod est, ut medica præsidia huic fluori congruentia explicemus. Quæ profecto huic fluori sanguinis cōueniēt, siue sanguis sit bonus siue vitiosus, siue syncerus, siue mixtus alijs humiditatibus, dummodo a venis apertis, aut vlceratis emanet, aut repente vnica vice ita supra modum effluat, ut vires maximè exoluat, aut multis repetitis vicibus, licet in minori copia, tamen longo tempore perseverans, idem faciat. Huic itaque conducet adstringentia medicamenta adhibere, vel tunc etiam cum fluor non fuerit immoderatus, sed modicus, cum sanguinem, quomodocumque supra vel infra, non criticè exire, malum esse censeatur. propterea in omni fluore erit adstringendum, si fluor foueatur ab adstricta causa, scilicet vel à iecoris tumore, morboque alio, vel ab obstructione venarum, vel à multitudine humorum corrodentium intestina, dysenteriamque facientium: quæ fluorem morbum ex laxo & adstricto mixtum faciunt: de quo posterius agemus. Ex medicamentis autem, quæ ad hunc vsum faciunt, quædam erunt per os assumenda, quædam intra ventrem clysteribus injicienda, atque alia supra ventrem adhibenda. At priusquam hæc particularim ægrotis præscribantur, victus ratio huic affectui congruens erit instituenda, quæ eadem erit, quam superiori capite ad sanguinis fluorem per os erumpentem meminimus, cui ex cibis congruentibus addimus lac caprillum coctum, & chalybeatum in primo cibo dandum, ad tres cyathos, mane & vespere, in prandio & cæna. Ex medicamentis per os assumendis eadem planè conuenient, quæ superiori capite præscripsimus: cuiusmodi (exempli gratia) est succus adstringentium herbarum, videlicet aut plantaginis, aut polygoni, aut equiseti, aut portulacæ, vel intybi sylvestris, vel similia ad vnciam & semis: aut in potu dabitur drachma acaciæ Aegyptiacæ, aut hypocistidis, aut lycij tenuissime triti ex vino austero nigro, aut galla immatura trita, aut myrthus, aut balaustrum, vel cortex mali granati, vel terra samia, vel bolus armenus, vel terra lemnia, vel lapis hæmatites eodem modo ex vino, aut ex aqua, aut ex succo plantaginis vel polygoni epotus. si quis plura particularia medicamenta scire desiderat, ea ipsa ex superiori capite petat. ex quo loco habebit et medicamenta omnia & simplicia adstringentia ventri exterius adhibenda, & inunctiones adstringentes, tum illitiones, tum epithemata, tum emplastra huic fluori sanguinis accommodata. Ex medicamentis verò, quæ clysteribus injiciuntur, quæque sunt cæteris alijs ad hunc alui fluxum sistendum accommodatiora, erunt, si clysteres huic vsui accommodari parabuntur, aut ex vino nigro adstringente, aut per se solo, aut rebus adstringentibus alterato, scilicet rosis rubris siccis, aut plantagine, aut equiseti, aut mentha, aut absinthio, aut polygono, aut simili alio medicamento adstringente ex ijs, quæ superiori capite præscripsimus. Aut ex vino chalybeato clyster parabitur, aut ex aqua ferratorum, aut ex decocto rerum adstringentium; aut ex succis scilicet, vel aquis adstringentibus, nimirum plantaginis vel polygoni, vel portulacæ, vel intybi, vel equiseti, vel similia, vel cum oleis eiusdem facultatis, cuiusmodi est rosaceum, omphacinum, myrtinum, de cytonijsque possunt addi pulueres adstringentes ad geminas drachmas, aut terræ samiae, vel Lemniæ, vel boli Armeni, aut gallarum immaturarum, aut sumachi, aut thuris, aut balaustrum, aut corticum granatorum, vel similia, aut vnius scilicet, vel plurius simul inter se mixtorum. Exempli gratia, huiusmodi clyster parabitur, accipiendo vini nigri austeri, in quo rosa, & plantago ebullierint, lib. i. olei myrtini, succi plantaginis, vel equiseti, vel rubi, an. vnc. iij. terræ samiae, boli Armeni, corticum granatorum puluerizatorum, acaciæ Arabicæ, vel ex pulpa prunellorum sylvestrium, tenuissime tritæ, an. 3j. Prestantissimus itidem ad hunc vsum erit, si parabitur ex vini nigri ferrati libra una, & succi à contuso malo

granato

granato expressi unciiis tribus. Atque hæc sunt medicamenta, quibus alui fluor ex uenarum desinentium in intestina apertione, aut erosione, aut ruptura, immo-deratus, uires cum actionū corporis læsione exoluens, cohiberi, firmariq; poterit.

De sanguinis profluuiio per renes & vesicam, cohibendo.

Caput VIII.

PER vrinam ex vesica, aut ex renibus, sæpe etiam sanguinis profluuium appa-
ret, de quo in præsentia agendum est, ut, quibus cohibendum sit, medicamen-
ta etiam perspecta habeamus. Sed in primis, quorū modis per vrinam profluat,
& à quibus causis etiam, cognoscendum est. Porro sanguis per vrinam excerni-
tur aliquando cum meatus, per quos ex vena caua in renes vrina percolatur, su-
pra modum dilatantur, aut ob causam aliquam externam (vti est validum exer-
citium, aut balneum nimis calidum, aut casus, aut ictus vehemens) aut ob nimiam
sanguinis plenitudinem venas distendendo aperientem, aut ob flatum immodicum,
aut venarum, renumque vlcationem, aut ex humore acri vel falso, aut ex calcu-
lis. Si vero tenuis sanguinis sanies mingatur similis excrementis, quæ in hepati-
corum affectuum initio excernuntur, affectus fluxui hepatico similis cepisse indi-
catur. Paulus inquit: renes propter imbecillitatem infirmos sanguinem retinere
non posse, quinimo ipsos patientiores redditos sanguinis non nihil ex vena laxare.
& sæpe etiam ipsos iuxta circuitum, perinde atque hæmorrhoides, sanguinis pro-
fluuiio laborare. Vesica sæpe ex vlcere vel à calculo, vel ab vrinæ acrimonia vlce-
rata sanguinem & ipsa fundit per vrinam. Aliquando verò natura ipsa corporis
vel ut à morbis præcaueat, vel ut morbis vexatos liberet, per vesicam copiosum
sanguinem excernere solet. quæ sanguinis excretio, à morbosa cohibenda eo argu-
mento distinguitur, quòd natura corpus grauatum subleuet, vel à morbo ipsum li-
beret ita, ut ex hoc sanguinis profluuiio ne dum corpus non lædatur, sed contra
iuuamentum sentiat. Quo pacto vero & à renibus vlcatis & à vesica sanguinē
per vrinam mingi deprehendatur, Hippocrates hisce verbis expressit: Si quis san-
guinem aut pus meiat, renum aut vesicæ exulceratio significatur. Et: Siquis san-
guinem, aut grumos meiat, aut vrinam guttatim emittat, dolore ad hypogastriū,
& pectinem, & perineum pertinente, ad vesicam loca laborant. Et: Si quis san-
guinem, aut pus, aut squamulas meiat, & grauis odor adsit, vesicæ exulceratio
significatur. Ceterum quilibet sanguinis fluor per vesicam factus haud negligen-
dus erit. Sæpe enim fit, si negligatur, vel laxatis venis, quæ ex vena caua in re-
nes desinunt, aut facta vel in ipsis, uel in vesica, exulceratione, ut aut habitus cor-
poris cachecticus reddatur, aut sanguine extenuato in grumos concrecente, & do-
lores, & ulcera excitentur: Si uerò illarum partium ulcus diu non sanatum per-
maneat, exitium hominibus inuehit. Itaq; eodem modo, ut in alijs profluuijs
firmandis docuimus, medicamentis adstrictorijs, ad sanguinem per urinam ma-
nantem cohibendum, erit opus. Veruntamen Dogmatici solent ad firmandum
hoc profluuium uti uenæ sectione in cubito, atq; cucurbitulis ilijs atq; coxendici-
bus affixis aut reuulsione deriuationisq; gratia, aut causæ profluuium fouentis
ratione, utpotè quando fit aut ex casu, seu uehementi percussione, uel propter af-
fectum inflammatorium in renum, aut vesicæ partibus constitutum. Quibus præ-
fidijs etiam Methodici aut reuellendi gratia, aut quod huiusmodi profluuium fo-
ueatur à causa adstricta, cuiusmodi dictum est esse contusionem, phlegmonem,
atque sanguinis plenitudinem: unde sanguinis hic fluor non simpliciter latus af-
fectus sit, sed & affectum adstrictum coniunctum habeat. Sed de his etiam po-
sterius agemus. Nunc agimus de laxo affectu, qui tollitur adstringentibus. Vnde
per os assumpta omnia adstringentia medicamenta, superioribus capitibus expref-
sa, uti-

*Gal. in 6. de loc.
affect. c. 3.*

*In 4. aph. 75.
Aphor. 80.*

Aphor. 81.

Paul lib. 3. c. 48.

sa, utilissima erunt: Cuiusmodi erit decoctum plantaginis, aut portulacæ, aut polygoni, aut equiseti, aut intybi, aut rubi, aut similium, uel ex multis illorum in aqua paratum; uel succus eorundem; uel aqua stillatitia ex ijs adstrictoris medicamenti parata ad uncias quatuor cum drachma acaciæ, uel hypocistidis, uel terræ samiæ, uel lemnis, uel similis alterius medicamenti facultatis adstrictoriæ. Aqua Villensis ex Agro Lucensi, si ad libras quatuor exhibeatur; uel serum lactis caprilli, in quo ferrum candens, septies fuerit extinctum, eodem modo ad tres quatuorue libras mane ante cibum epotum plurimum iuuabit. Nonnulli propinant syrupum uel myrtinum, uel de rosis ficcis, uel de cytoniis, uel diamoron uocatum ad unciam & semis, cum aquæ plantaginis, aut portulacæ, aut polygoni, aut equiseti, aut rosarum, aut rubi, aut similium herbarum, uncis quatuor. Paulus laudauit radicem per os dandam symphyti maioris, & tragaganthum uino maceratum; laudauitq; itidem succum plantaginis, uel polygoni ex posca datum. Neq; minus hoc medicamentum, quod recipit aluminis scissi 3. j. tragaganthi 3. ij. gummi Arabici scrup. ij. s. Exterius etiam conueniunt ad lumbos inunctiones frigide ex oleo myrthino, vel omphacino, uel de cytoniis, cum modico aceti. Conueniunt itidem succi plantaginis, uel polygoni, uel lactucæ, uel equiseti, cum aceto, actu frigidi, aut tepidi hyeme adhibiti. Eodem modo albumen oui ex aceto adhibitum iuuabit; uel emplastrum ex hordeacea farina cruda, cum posca, & rosaceo; aut ex palmulis & pane filigineo, cum acacia uel hypocistide ex uino adstringenti aut ex posca decoctis, confusisq; paratum. Sedere in aqua fluminis currentis supra renes usq; maxime valere ad cohibendum profluuium, compertum est. Nonnulli catethere per pudendum inijciunt uel aquam Villensem, uel aquam stillatitiam chalybeatam, si causa floris in uesica est: aut succos adstringentes, uel olea itidem adstringentia.

De hæmorrhoidum profluuiio sistendo. Cap. IX.

Venas ani, per quas sæpe sanguis expurgatur, Græcos hæmorrhoidas, atque Latinos mariscas appellare, alias a nobis dictum est, harum vero venarum, quædam in anum usque terminantur, atq; hæc sunt, quæ aperiuntur, & aliquando per ipsas sanguis excernitur; vocanturq; hæmorrhoides inferiores, & apparentes: quædam superius intra podicem contentæ clauduntur, hasq; cæcas medici itidem appellant, quoniam sanguinem non excernunt, sed dolores inferunt, quàm alias aciores. Dictum superiori libro fuit moderatam sanguinis euacuationem per illas venas factam, ex Hippocrate, Galeno, atq; ex alijs omnibus medicis, utilem esse corporibus, atque ipsam à multis malis homines præcauere: Immodicam uero sanguinis euacuationem maxime corporibus noxiam esse, grauioraq; mala inducere: Vnde Paulus inquit: Hæmorrhoidibus iuxta largius inanitis, habitum in aquam subter cutem resolui contingit, & affectus infeliciter contabescere. Vnde priusquàm hæc mala inducant supprimendæ sunt, ipsarumq; immoderata purgatio firmanda, præsertimq; quo tempore vires fatiscere incipiunt, pulsusq; imbecillus euadit, corpus totum grauius redditur (ut genua labascere incipiant) atq; tumesceri, & decolorari incipit. profluit autem per hæmorrhoidas sanguis, tum bonus præmultitudine oscula venarum aperiens, uel à natura sponte excretus, tum viciosus, scilicet uel tenuis serosus, aquosusq; , uel acris qui pungendo expultrice stimulat ad ipsum excernendum. Itaque, si immoderatus per hæmorrhoidas sanguis fluat, & præsertim bonus, vires exolui necesse est, caloremq; natium diminui, vnde corpora præter alia mala in aquam intercutem incidere solent: quapropter hæ venæ quamprimum claudendæ sunt, ipsarumq; excretio cohibenda.

Notat

1^a lib. 3. c. 59.

Notat tamen Hippocrates (quod in ijs, in quibus uiriosus sanguis profuit, erit obseruandum) non omnes menses esse claudendas, sed unam apertam esse conseruandam, ne omnino sanguis uitiosus, quippe melancholicus, intus cohibeatur, à cuius copia (ut ait Gal.) natiuo calore quasi suffocatione maxime diminuto, corpora & in tabem, & in aqua intercutem incidunt. Quod ita expressit Hippocrates. Diuturnas curanti hæmorrhoidas, nisi una quæpiam seruetur, periculum aque inter cutem, vel tabis impendet. Sed iam, his præmissis, medicamenta venas illas claudenda proponimus. Quæ illa omnia erunt, quæ sæpe meminimus, tum quæ per os exhibentur, tum quæ exterius adhibentur, siue sint fomenta, ex adstringentibus in vino nigro aultero, siue succi adstringentes, vel pulueres, vel emplastra itidem actu frigida adhibita. Dioscorides commendat aloem ex succo adstringente cataplasmatibus modo appositam; squammam ferri tritam; plumbum ustum atque lotum: & ex compositis medicamentum, quod accipit acaciæ Arabicæ 3. iij. plumbaginis itidem 3. iij. tragacanthi dra. ij. trita ex albumine oui miscantur. Aliud accipit chalchanti, gallæ, aluminis, an. dra. j. trita ex oxycrato. Nonnulli ex nostris oleo communi immaturo, in quo spongia tenuissimè trita, rosa syluestris, quam cynorrhodon Plinius appellat, & radix scrophulariæ itidem trita, ebullierint, inungunt hæmorrhoidas: alij eo, in quo trichomanes ebullierit.

In 6. aph. 12.

In 1. euph. 118

De menstruorum profluvio firmando. Cap. X.

Cum menstrua purgationes in mulieribus desinant aut naturaliter, aut præter naturam; nãlter, aut ob conceptum, aut ob senectutem incipientem, scilicet cum mulieres perueniant ad annos circiter quinquaginta: Præter naturam vero, ut superiori libro dictum est, aut ob venarum uteri coniuentiam, aut ob osculorum contractionem, aut ob obstructionem, aut ob sanguinis crassitiam, aut denique ob uteri morbum, mulieres mensuris purgationibus destituuntur. A contrarijs vero causis menstrua superfluunt, immoderatusque fluunt, scilicet venis uteri aut ruptis, ut ex uiolento partu aliquando fieri solet, aut erosas ab acris, uel falso humore, aut ipsarum osculis apertis uel à sanguinis multitudine, uel flatu distendente, uel à praua ipsius qualitate expultricem irritante, aut sanguine attenuato per uenarum membranas rarefactas resudante. Itaque mensuris immoderatus profluentibus, uel tamen immoderatus non fluant, tamen diu longoque tempore si continuo sanguis emanet, ita corpus ab eo uel immoderato profluvio, uel non immoderato, sed diu tamen perseverante, uel uel repente ab immoderato profluvio uiribus exolutis in syncopem labatur, uel ab assiduo fluxu debilitato calore innato primum in cachexiam, & postea in aqua inter cutem, uel in tabem incidat. Corpus enim primo colore sedatur, tumidius euadit, præsertimque facies atque oculi; graue redditur, ad motum difficile, quod ambulando difficulter spirat, cibum non sentit, ipsumque fastidit. Itaque priusquam ex sanguinis immodica euacuatione corpus in hæc mala deducatur, curatio tentanda erit. Quæ præsidij adstrictorij perficietur, namque in hoc laxo affectu planè adstrictoria indicantur curatio: & tamen in hoc affectu tollendo medicamenta adstringentia per se conuenire videantur, ex accidenti tamen quædam etiã ex laxatorij a medicis quocumque Methodicis usurpari solent, scilicet (uiribus permittentibus) uenæ sectio in cubito, præsertim internæ, cucurbitula, ligaturæ, atque fustiones, ut nimirum sanguis ab uteri uenis & diuertatur, & reuellatur, sanguinisque impetus ab utero auertatur, & cohibeatur. Itaque mensuris immoderatus profluentibus, si uires serant, reuulsionis gratia, è uena interna dextra

Ecc cubiti

cubiti secta modicum sanguinis mittatur: artusq. extremi ab alis & inguinibus (auctore Paulo) arcte uinciantur, uel fricentur. Cucurbitulae itidē leues magnę frequenter subter mammās affigantur, auertunt enim efficaciter impetum sanguinis ab utero. Atque hęc sunt ex laxatorijs præsidia non per se, sed ex accedēti, diuersionis, reuulsionisq. gratia, etiam in laxo affectu (modo vires permittāt) conuenientia. Per se autem & propriē conueniunt illa omnia, quę quouismodo adstringere dicuntur, quęq. superius abunde perspecta fecimus. Hęc verō cum duplicem vsum habeant, scilicet aut per interius, aut per exterius; de internis in primis agemus, ea proponentes, quę per os assumuntur, aut quę in vterum iniiciuntur, indunturū. Per os ea omnia ad hunc vsum conuenient, quę in alijs morbis laxis conuenire, nuper diximus, præsertimq. acacia, vel hypocistis, vel balauustum, vel terra samia, uel bolus armenus, uel rubi fructus immaturi ficci, uel equisetum siccum tritumque ad drachmam, ex vino austero, aut ex aqua plantaginis epotum: Lentisci item fructus torrefacti cum vino epoti maximē conueniunt. Ad hęc coagulum leporis, aut hædi, aut ouis, aut vituli, aut cerui eodem modo assumptum. Vinacea trita, & ossa mespylorum, cornique fructuū immaturorum, aut fructus oxyacanthę ficci triti eadem mensura atque modo ex aqua, succouē adstringente, aut ex vino austero epoti iuuabunt. Commendatur itidem succus ad vnciam contusi expressiq. equiseti, aut plantaginis, aut portulacę, aut polygoni, aut rubi, aut similium epotus. Decocta etiam ex iisdem medicamentis facultatis adstringentis parata in potu conuenient. Eadem medicamenta lummpere iuuabunt, aut cathetere iniecta, aut in pessos redacta & indita. Ego olim acacia Arabica ex vino dissoluta cathetere in sinum muliebrem iniecta sanauī Guadagninam olim vxorem meam dilectissimā a profluuiō vteri quo laborabat. Idem faciet hypocistis, lycium, terra samia, lemnia, & succus ex malo punico contuso expressus, & huiusmodi alia ex vino, vel ex liquore aliquo adstringente cathetere iniecta in pudendum. Ex compositis etiam pastillus Andronis ex vino cathetere inditus maximē ijs auxiliabitur. Pessus ex succo equiseti paratus plurimum a Fallopio commendatur, & qui ex succo plantaginis, vel polygoni, vel portulacę, vel e malo punico dulci contuso, expressoq. fit. Acacia itidem cum manna thuris contrita ex aceto in pessō ex spongia indita mirificē auxiliatur; aut eadem spongia liquida pice demersa pessarij modo imposita; vel ipsius combustę cinis cum aceto eodem modo indita. Cinis itidem suberis in fictili Italico contremati eodem modo. Gallę etiam quod interius est leuigatum, & thuris lachryma ex aqua plantaginis diluta, atque in pessō indita. Eodem modo ex compositis auxiliatur ijs, quod accipit alumnis scissi, interioris gallarum, acacię Arabicę, mannę thuris, an. vnc. iij. ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur cum succo plantaginis, & lana excipiuntur, & rediguntur in pessum. Cortex itidem glandis in quercu, aut in ilice, exterior tritus in pessis inditus maximi adiuuenti esse solet. Ex externis verō medicamentis, plurimi æstimantur infessus, qui possunt parari ex decocto rerum adstringētium, aut ex vino austero nigro chalybeato, aut in quo medicamenta adstringentia ebullierint. Aut ad id opportunę erunt aquę ferreę, aluminosę, aut chalcantodes: oportebit in his mulieres insidere, quousq. aquę, uel decocta umbilicum operiant. Ad hunc vsum commendatur decoctum in vino austero paratum ex oxy-schæno, idest marino iunco ex cymis myrti, rosis, rhamni folijs, rutęque surculis simul decoctis. Aliud etiam laudatur, quod accipit corticis radicis mali punici dulcis, myrti, corticis cupressi, an. m. iij. gallę immaturę m. r. aquę celestis, vel vini q. s. Bulliant, quo ad tertia pars, vel medietas absumatur, pro decocto, in quo tepido insideant mulieres per spatium duarum horarum semel vel bis in die. Parari quoque poterit decoctum pro infessu in aqua uel in vino ex oleastro, lenti-

sco,

fco, rubo, folijs quercus, & ex glandis cortice, ex corticibusq. mali punici, sumacho, vinaceisq. tritis æquis portionibus. Demum muliebria foueantur lanis ex posca, aut ex vino austero nigro cum rosaceo aut oleo myrtino, vel melino madidis: vel ex aliquo decocto, aut ex succo rerum adstringentium: pubi quoque & lumbis hæc eadem conuenient: Aut hisce partibus applicentur emplastra, seu cataplasmata ex herbis facultatis adstringentis contusis (cuiusmodi est intybum, plantago, equisetum, portulaca, polygonum, rubus, & similia alia) ex acetoq. compolita; aut ex earundem herbarum succis cum farina vinaceorum, aut sumachi fructuum, aut forborum immaturorum, vel pyrorum syluestrium in clibano siccatorum, vel malorum granatorum siccatorum, mixtis cum aceto. Aut parabuntur cataplasmata ex malo cytonio, ex palmulis, aut ex malicorio, aut ex fagea glande, aut ex rubi furculis, aut ex lentisci folijs, aut ex acacia cum farina hordei, & aceto. Atque hæc sunt medicamenta cunctis sanguinis profluuijs laxum morbum facientibus conuenientia. Restat, ut de alijs profluuijs, scilicet excrementorum, agamus.

De vomitu cohibendo. Cap. X.

DE vomitu immoderato nunc scribimus, quo homines cibum stomacho reijciunt, & ex immoderata vacuatione vires maximè languent atq. ita, ut citò eos in syncope labi sit periculum. huiusmodi uomitio sepe fit à stomachi laxitate, aut à quavis causa eiusce visceris contentricæ sublata, aut expultrice valde irritata ab humoris copia, aut praua qualitate. à qua sanè causa proprie uomitum fieri omnibus ferè fuit persuasum. Cæterum cum omnis vomitio immoderata, qua homines quicquã stomacho continere non possunt, vires maxime exoluat (vnde merito solutionis passio dicenda est) continuo ipsum fore cohibendum, firmandumq. medicis indicatur, ijsq. præsertim medicamentis, cum internis tum externis, quæ facultate quouis modo adstringunt. Vnde singula sæpius ad alias laxas passiones præscripta medicamenta erunt accommodatissima. Ex ijs uerò familiaris per os hæc usurpari solent medicamenta tum simplicia, tum composita: Datur quidem ad uomitum firmandum succus granatorum dulcium, & subacidorum, mica nimirum panis subtorrefacti eo succo imbuta; vel succus mali cydonij, uel pomi austeri, uel pyri acerbi, vel mespili, vel fructuum cornus, vel berberum, uel rubi, uel mori nigri, & similia: datur etiã succus absinthij ex vino austero, vel succus menthe; vel datur ex eodẽ vino corianum tritum cochlearis mensura, aut mastiche trita, aut carpobalsamum, aut sumachum, aut semen lactucæ, vel portulacæ. Possunt ex iisdem etiã composita parari: cuiusmodi (exempli gratia) erit, quod accipiet succi granatorum acidorum vnc. iij. subacidorum, dulcium, an. vnc. ij. succi menthe vnc. s. coriani puluerizati, carpobalsami, sumachi, an. 3. j. s. bulliant, & expressioni addatur sacchari optimi vnc. j. dabitur ad duorum uel trium cochlearium mensuram, aut ab uncia vna ad duas, vel tres. Exterius admodum utilia sunt epithemata parata ex rosis siccis, absinthio, mentha, caryophyllis tritis, mastiche trita ex vino nigro odorato decoctis, aut supra ferrum candens, aut supra lapidem lateritium itidem candens incalefactis, & aceto aspersis; aut supra fumum cãdentis, aut ferri, aut lapidis aceto aspersi incalefactis: Oii autem ventriculi erunt adhibenda hæc epithemata. Non minus utilia itidem deprehendentur cataplasmata quædam adstringentia, quæ poterunt parari ex absinthio, spica indica, mentha, malicorio, palmulis, cytoniorum, vel pyrorum immaturorum substantia, cum pane torrefacto, atque aceto, vel vino nigro austero. Hoc plurimum commendatur, quod paratur ex pulpæ mali cydonij immaturæ

Ecc 2 sub

sub cineribus cocti, & panis torrefacti tenuissime triti an. vnc. vi. olei myrtini, de citonijs, an. vnc. j. s., mastiches puluerizatae, carpobalsami, & sumachi tenuissime triti an. 3. j. Vini granatorum acidorum, aceti; an. q. s. misce, fiat cataplasma: quod ori stomachi adhibebitur: Alij hoc non minus vtiliter admouebunt, scilicet, quod recipit succi granatorum austerorum lib. i. succi menthae vnc. iij., sumachi, mastiches, gallae, balauftij, tenuissime tritorum, an. 3. j. s. panis torrefacti tenuissime itidem triti vnc. vi. misce, fiat cataplasma.

De alui profluvio cohibendo. Cap. XII.

PER alui profluvium immoderatum medici triplicem passionem intelligunt, scilicet lienteriam, coeliacam, atque diarrhaeam. Hoc genus profluvij in pravorum excrementorum humorumque deiectione consistit, & illa duo in alimentorum excretionem: In lienteria cibus potusque quales sumpti sunt, ante vllam, vel exiguam quidem factam concoctionem, celeriter post assumptionem ipsorum est ventriculo, atque ex intestinis elabuntur. Galenus hunc affectum diabete, in qua potas, ut bibitur, ita mingitur, absque vlla mutatione, haud immerito comparavit. In coeliaco vero affectu alimenta itidem egeruntur, sed ea non plane crudae, verum semicoctae, corruptae, fetidae, quae non celeriter, vel statim, post cibi vel potus assumptionem, egeruntur. Archigenes hoc malum, cum lenia atque humecta excrementa deijciuntur, esse voluit. Coeliaca passio dicta est à ventre, qui patitur; idcirco ventralis, atque ventricularis quoque dicitur, quod quidem ventriculi, aut ventris, nempe intestinorum, vitio fieri soleat. Aretaeus hanc passionem cum diarrhaea confundit: & Paulus cum lienteria, quae fit ab imbecillitate ventriculi; Aurelianus ventris fluorem atque rheumatismum vocavit. Lienteria vero dicta est ab intestinorum leuitate, qua veteres medici intestina alimentum continere non posse existimant, unde crudum statim fere assumptum alimentum egeritur. Laevia autem redduntur, si à torminibus (auctore Aretaeo) sublatis, profundis superiorum intestinorum ulceribus, crebrae, crassae, solidaeque cicatrices contrahantur: unde stercorea deorsum liquida ab alibili materia indiscrète prolabantur: Aut (ut Oribasius credidit) ob pituitam crassam, & lentam, frigidamque; intestinis ita inhaerentem, quod repleat rugosas sinuosasque ipsorum intestinorum partes: ex quo indurata laevitate cibus effluit. In hac passione deiectio est alba, liquida, fetida, non consistens, venter vero est flatuosus, ructus fere assidui tetri odoris, flatusque deorsum erumpunt humidi: homo gracilis, emaciatus, pallidus, & iners euadit, cum ambulat, membra labascunt, venae temporum exsertae sunt, tempora concaua, corporis eliquatio, os aridum, summa cutis arida, nihil sudant; & similia ex ijs profluvij ventris homines patiuntur. Sed ad diarrhaeam, quam alui profluvium itidem omnes dixerunt, veniamus, quem affectum Aretaeus, ut dictum est, cum coeliaca passione confudit: sed profecto absque ratione hoc factum videtur, cum id proprij inter ventris profluvia diarrhaea habeat, quod in ea non alimenta deijciantur, sed maiori ex parte humores pravi: unde quaedam diarrhaea dicitur biliola, quaedam pituitosa, quaedam atrabilaris, & quaedam mixta ex multis pravis humoribus, quia in ea complures varij humores excernuntur. Atque etiam hoc proprium diarrhaeae erit, ut perpetuo humores in ipsa, aut ex toto corpore, aut ex aliqua parte, scilicet ex cerebro, aut ex hepate, aut ex liene, in ventrem confluentes deijciantur; quandoque critice, natura videlicet aliquando cacochymiam uacuante; quandoque à causa morbosa per viam symptomatis in ventrem delabuntur, atque exinde intestinorum excretice aut à multitudine, aut à prava ipsorum qualitate irritata, per aluum excernuntur. Singula haec profluviorum genera causas, à quibus

quibus excitantur, habent. In hoc conueniunt lienteria & celiaca passio, quod ab iisdem ferè causis ambæ passionibus oboriantur, scilicet, aut à ventriculi, atque intestinorum debilitate, qua excrementa continere nequeunt, siue ea fiat ab interperie aliqua, siue à superioribus intestinis, aut ab vlcere cicatricibus multis, crassisque in ipsis factis, aut à pituita viscida, & lenta rugosas atque sinuosas intestinorum partes replente læuigatis; aut demum ab intestinorum expultrice irritata vel à multitudinē ciborum propter obstructionem in meseraicis venis minime distributorum, vel ab humiditate multa aliunde confluyente dilutorum, vel à praua excrementorum qualitate acris, humorum tenuium, ciborumue corruptorum, vel ex aliquo vlcere in intestinis: Etenim partes exulceratæ ex cibo transiente vexatæ cum à se propellunt. Ex quibus quidem mirum haud erit, si lienteriam, atque celiacam passionem vnum specie esse affectum, multis fuerit persuasum, meritoque confundendam celiacam cum lienteria esse. A diarrhæa verò maxime distinguuntur, tum quia hæc sit prauorum humorum profluuium, & illa alimentorum; tum etiam quod diarrhæa foueatur à causa adstricta, scilicet ab humoribus prauis vel in toto corpore, vel in aliqua parte tumentibus. de quo affectu in postremo libro iterum agemus, quatenus ad affectus ex laxo & ex adstricto mixtos refertur. Lienteria verò, atque passio celiaca & lusus morbus est, & fere ex toto à laxa causa foueri videtur, excepto quando ob venarum meseraicarum aliquā obstructionem alimentum multum non distributum in ventrem delabitur. Malum hoc & diuturnum plerumque est, & sanatu adprimè difficile. Quod si sanare velimus, adstrictioris medicamentis opus erit, intus, forisque vsurpatis. Itaque ex ijs, quæ per os assumuntur, hæc erunt accommodatissima huic vsui, scilicet, panis cum ouiluteo subactus & tostus assumptus: amyllum, cum alica, aut prisana cocta, & cum lacte; folia plantaginis cocta cum aceto & oleo vorata; ouum itidem coctum induratumque ex aceto elitarum; lens cum cortice, & cum plantagine cocta, ex aceto assumpta. De qua Dioscorides ita habet. Felicius lenti contra alui fluores vis est admixtis illi, cum in aceto coquitur, intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosas, aut mespilis, aut forbis, aut cotoneis malis, aut pyris, aut palmulis Thebaicis, aut intybo erratico, quod cichoreum dicunt, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post cocturam, abijciuntur, aut vuarum rhois, quæ obsonijs insperguntur: verum acetum cum ea diligenter percoqui debet. Datur in cibis huiusmodi ferculum. Complura sunt, quæ trita tenuissimi pollinis modo ad sistendam aluum obsonijs insperguntur, ut vinearum nuclei tostis, & tritis, aspersi; pyra syluestria siccata, trita, itidem aspersa; aut forba, aut mespila, aut rubi fructus immaturi siccati & triti; lens itidem trita eodem modo, cortex mali punici, rhus obsoniorum, & similia farinæ modo trita & obsonijs aspersa. Quædam vero ut medicamenta exhibentur, veluti est succus aut plantaginis aut menthæ, aut absynthij, aut mali cotonij, aut forbi, aut mespili, aut similium: cum vino dantur quædam trita ad drachmam, ut est lens trita, rhus obsoniorum, cortex granati, albæ hedere flores ex vino poti, acacia, itidem hypocistis, rubrica sinopica, terra samia, stercoque canis siccatum ex vino, cum mastiche, aut cum galla trita, assumptum; aut cortex castaneæ, inter substantiam & corticem; aut membrana itidem quercus inter truncum atque corticem existens; aut vuarum nuclei tostis, & tritis, deuoratis; aut nucleis mespilorum eodem modo tritis ex vino epoti; vel pyrum syluestre, vel mespilum, vel sorbum siccatum tritisque eodem modo epotum; vel oxyacanthæ, aut pruni syluestris fructus, aut berberis, vel rubi itidem fructus immaturi eodem modo siccati, & assumpti. Eodem quoque modo myrtilli, vel folia myrti siccata & trita ex vino epota iuuant; vel oleæ syluestris, vel cœnanthes, vel menthæ, vel intybi syluestris. Rhus etiam obsoniorum, balaustrum, & similia adstringentia, quæ superius sæpè meminimus, huic

In 2. lib. de ma.
med. cap. 99.

huic affectui conducent. Clysteres quoque adstrictorij vel ex uino austero rosæ siccis alterato, aut plantagine, aut equileto, aut mentha, aut balaustris, aut vino per se solo nigro austero chalybeato, aut ex succo plantaginis, aut mentha aut portulacæ, aut intybi agrestis aut similium, aut ex oleis eiusdem facultatis quale est omphacinum, rosaceum, myrtinum, melinum, aut simile aliud. At cum sæpe hosce clysteres superius etiam parcius magis præscriplerimus, non est ut in præsentia de ijs aliud dicamus. Eodem modo & de externis, scilicet, inunctionibus, vnguentis, & cataplasmatibus, epithematibusque tum liquidis tum siccis dicimus, scilicet illa omnia superius descripta, maxime ad hoc profluuium sistendum congruere. E quibus satis familiare erit vnguentum ex mastiche tenuissimè trita cum oleo mastichino paratū, quo & os stomachi, & venter erit illinendus: Quod efficacius erit, si fuerit additum modicum pulueris spicæ Indicæ, menthæ, & ablynthij: vel, si adhuc efficacius desiderabitur, addenda erit aut acacia, aut hypocistis, aut rhus obsoniorum, aut putamen granati, aut simile aliud. Præterea ad hunc usum maximè conueniet spica celtica, phu radix, cyperus rotunda, carpopbalsamum, nux myristica, bacca iuniperi, viticis, salicisque. Ex iisdem & cataplasmata paranda erunt, quæ cum vino nigro austero, aut cum aceto, aut cum succis liquidis adstringentibus, oleisque, itidem adstringentibus nuper expressis, atque ex farina aut thuris, aut mastiches, aut lentis, aut hordei, aut rhois, aut nucleorum vnae tostorum, aut corticum granatorum, aut cytoniorum, siccatorum, aut sorborum, aut mespilorum immaturorum, aut myrtilorum, aut similium commodè parabuntur: ex ijs etenim cataplasmata parata erunt accommodatissima ad ventris hosce fluores sistendos ori stomachi atque toti ventri adhibita. Eodem modo ex iisdem poterunt parari epithemata cum liquida, tum sicca iisdem extremis partibus tepida apponenda.

De vrinae profluuiio, quod Græci Diabete[m] appellant, tollendo, siue cohibendo. Cap. XIII.

TAmetsi vrinae profluuium (quod Græci *Diabete[m]* appellant) grauiores quidam medici Græci in renum imbecillitatem ex calida renum intemperie, aut ex humoribus acerbis, vel falsis in renum substantia imbibitis factam, tanquam in propriam causam retulerint; atque exinde constare videtur, vrinae profluuiū foueri ab adstricta causa, & propterea non esse, ut passionem simpliciter laxam pertractandam, verum ut habentem quoque adstrictā passionem (scilicet affectum inflammatorium) sibi commistam: de quo misto genere affectuum merito à nobis in proximo, & vltimo libro, agendum erit: Nihilominus cum ab omnibus ferè Medicis, ad hanc passionē tollendam, vsus medicamentorum adstringentium, fluoremque cohibentium affectari videatur, eius cognitionem, & therapiam hic satis apto loco tradi, & explicari posse arbitramur. Porro, licet à nonnullis in principio istius passionis quædam etiam laxantia præsidia, particulatimque tam venæ sectio, pro modica molienda sanguinis missione, quam purgantia, atque etiam sudorifica fuerint satis commendata; quo tamen iudicio in morbo ferè turbido hæc præsidia præscribantur, & conueniant relinquo doctis iudicandum. Neque defuerunt viri doctissimi, qui putarunt vrinae profluuium nequaquam fieri à renum caliditate insigni, aut à calidis humoribus (ut plerisque ex antiquis Græcis visum est) in ipsorum renum substantia imbibitis, at potius istius passionis causam referendam esse in imbecillitatem, laxitatemue venarum meseraicarum, atque illarum præsertim, quæ ab hepate ortæ ad renes vsque tendunt, voluerunt: Quod nimirum, ut in lenteria cibis nulla qualitate mutatus, propter ventriculi intestinorumque imbecillitatem, sublata illorum viscerum facultate

conten-

contentrice, affatim celeriterque ad ventrem delabatur, egeriturque; ita in diabete aquea humiditas nulla qualitate mutata à ventriculo per venas mesenterij primò, & postea per hepatis venas laxatas ad renes, & ad vesicam affatim & celeriter defertur, mingiturque. Quo pacto non immeritò Galenus lienteriam aliquando diabete comparauit, in qua potus, vt bibitur, ita mingitur sine vlla mutatione. Quod verò non à renum inflammatorio affectu (ut plerique voluisse vili sunt) vrinæ profluuium fiat, eo potissimum argumento dubitare videntur, quoniam in renum inflammatione vrinæ profluuium excitari, haud obseruatum est. Quinimo nullum medicorum antiquorum ex ijs, qui de renum inflammatione scripserunt, legimus, qui vrinæ profluuium inter signa renum inflammationum pathognomonica propriae comprehendisse visus fuerit. Porro si renes ob intensam caliditatem, non humores modo venarum, sed (vt omnes ferè existimant) etiam totius corporis immoderatiùs attrahere compellerentur, in omni affectu renum inflammatorio idem facerent; quod cum neque in inflammatione erysipelatode, qua renes immodico calore maxime semper incenduntur, non fiat, neque obseruetur, cui mirum erit, nos dubitasse, an renibus calida intemperie, cum presentia acrium salforumque humorum, affectis, diabetes fieri queat? Nam probabilius est, quod in dictarum venarum, renum, atque vesicæ laxitatem hæc passio sit referenda. Nobis solummodo concessum est, semel diabete vidisse, in homine sexagenario, qui de vrinæ profluuiio, atque de siti intensâ tantummodo conquereretur, nequaquam autem de caliditate renum aut de aliquo dolore. Neque enim tantus calor in renibus accensus eum lauisset, neque etiam dolore (qui necessariò in renibus affectum inflammatorium consequitur) omnino caruisset. Siritur verò non ex affectu illo inflammatorio, at præ immoderata aqueæ humiditatis per vesicam, assiduaque euacuatione, toto corpore arefcente, atque tabescente. Quare diabetes non videtur in affectum inflammatorium renum esse referenda; at in laxitatem venarum mesenterij, hepatisque, ad renes peruenientium, ipsorumque renum, & vesicæ. Hic affectus facile innotescit ex vrinæ profluuiio, & siti assidua, atque corporis totius habitu gracilescēte, arefcente, contabescenteque. Malum sanè longum est, & ni principio ei occurratur opportunis medicamentis, exitiale. Itaque cum laxus affectus sit, à causaque etiam laxa foueatur, ut tollatur præsidij adstrictorij opus habebit. Unde etiam viuendi ratio erit adstrictoria: Aer igitur frigidus atque siccus erit eligendus: Cibus verò crassæ substantiæ, solidæque, ne eius serositas præ crassitie facile per venas laxas delabatur ad renes atque ad vesicam: Potus erit aut vinum nigrum, crassum, adstringens; aut aqua alterata coriano, aut vuarum nucleis, aut myrtillis, aut fructibus sumachi, aut plantagine, uel intybo, vel portulaca, vel polygono, vel simili alio medicamento facultatis adstringentis: Vtilissima quoque erit ad potum aqua vel vinum ferratum. Quies conueniet, à motu erit abstinendum tum corporis tum animi. Somni erunt longiores. Carnes pro cibo conuenient macræ, & crassi, ut dictum est, alimentis; cuiusmodi sunt bouinæ macræ, caprinæ, leporinæ, auiumque montanarum: lac etiam siliceis lapidibus ignitis decoctum, chalybeatumque maxime conueniet in cibo assumptum. Ex oleis verò intybum, portulaca, oxylapatum, plantago, mentha, & similia, quæ superius non semel meminimus, utilia erunt: ex fructibus conducent omnes adstringentes, ut poma immatura, pyra austera, & syluestria, cydonia, mespila, sorba, corna, mora immatura, castanæ, atque nuces. Ex medicamentis autem dabitur polygoni succus, aut plantaginis, aut rubi, aut acaciæ, aut menthæ, aut absynthij, aut portulacæ, aut rubi, aut polygoni, aut hypocistidis. Non latuit vel etiam mulierculas vsus (ad vrinæ profluuium tollendum) cremoris radices symphyti maioris: Cuius etiam radices puluis datur vtilissimè ex vino nigro austero.

*In lib. 6. de sep.
off. cap. 2.*

stero. Non minus effertur vsus quarundam terrarum, cuiusmodi est Lemnia, Samia. Nonnulli exhibent thuris masculi drachmam cum aqua absynthij. Ex compositis etiam commendantur pastilli de spodio, de terra sigillata, de balauftijs. Vbi verò hisce propositis remedijs hoc malum non cedat, etiam ad narcotica (vulgo stupefacientia vocata) fore veniendum, non paucis visum est: proptereaq. dandum lac papauerum alborum, & nigrorum etiam cum vino: atque ex compositis phylonium Persicum, aut Theriacam recentem ad drachmam, cum aqua menthae, vel absynthij, aut cum vino nigro austero. Vtilissimæ quoque erunt aquæ Villenses, in agro Lucensi, ad libras quatuor per plures dies epotæ. Syrupi etiam ad hunc vsum laudantur, de absynthio, de omphacio, myrtinus, de ribes, & similes alij. Demum ad iecoris regionem in hypochondrio dextro, & ad renes, omnia epithemata, vnguentæ, cataplasmata in superiori capite ad lienteriam, & celiacam passionem descripta erunt adhibenda: neque minus infestationes, quas superius non semel ad alios laxos morbos accommodatos docuimus, huic affectui conuenient.

Finis Libri Duodecimi.

PROSPERI ALPINI
MAROSTICENSIS
DE MEDICINA METHODICA
LIBER DECIMVSTER TIVS.

De morbis mixtis ex adstricto atque ex laxo esse agendum, & primum quot sint hi affectus, qui mixtorum morborum genere comprehenduntur. Cap. I.



DE I. optimi maximi beneficio tandem ad vltimum istius operis librum pervenimus, in quo à nobis propositum fuerat agere de ijs affectibus, qui tertio morborum genere comprehenduntur, quique mixti ex laxo atque ex adstricto dicuntur. Dari verò morbos mixtos ex adstricto & laxo, qui ad curationem instituendam, & laxandum & adstringendum indicant, in tertio libro demonstratum est. Namque (exempli gratia) cholera est morbus laxus, quia hoc malo corpus per vomitum atque per ventrem immoderatiùs purgatur, atque resolvitur, ut merito syncopen accersat, verum tamen fovetur à causa adstricta, scilicet quia multitudo est pravorum humorum alimentorumque corruptorum, vehementer irritans expultricem ad eam colluviem pravorum excrementorum foras protrudendam. Quae causa, cum affectus adstrictus sit, indicat laxandum, ut mirum non sit, si nonnulli & vomitum aliquando, & alui purgationem in hoc morbo adiuvent, laxantiaque aliqua propinant, cuiusmodi est aqua calida, oleum dulce, vel amygdalinum, vel hydreleum, quod hoc malo affectis aliquando calidum exhibent. Contrà, purgatio immoderata, quae & per stomachum & per ventrem fit, quia nimirum passio laxa est, ideo & ipsa aliquando adstringendum indicat: Vnde mirum itidem non est, si Medici, ne ex ea egroti in syncopen labantur, eam purgationem quibusdam praesidijs adstrictorijs moderari, ac firmare aliquando studeant. Quod & Paulus confirmavit, ita de hoc affectu scribens: Sin autem per seuerer euacuationis impetus, venter concidat, pulsus minor, crebetque evadat, cataplasma adhibendum ex palinulis cum oenanthe, & acacia: praeterea datur aqua frigida cyathus. Ex quibus colligimus dari morbum mixtum ex adstricto & laxo, in quo pro curatione praesidia & laxantia & adstringentia per se indicantur. Non tamen eodem tempore utrique affectui occurrendum simul indicatur, at urgentiori incumbendum esse Methodici voluerunt, scilicet, ut vltui laxamini praesidiorum medicus incumbat, si adstricta causa vel passio magis urgeat, adstringentium verò, ubi laxus affectus magis itidem urgeat: unde (exempli gratia) in cholera proposita, cum euacuationis impetus minus urgeat, Paulus exhibendo aquam calidam, vel aliud simile, cum vomitionem, tum alui deiectionem iuvandam affirmavit; at contrà, magis urgente euacuationis impetu, & per os frigidam aquam dando, & exterius adstringens cataplasma admouendo, impetum euacuationis firmandum consuluit. Itaque in morbis mixtis urgentiori erit incumbendum. Nonnullis verò etiam visum est, in huiusmodi mixtis affectibus, posse adhiberi medicamenta mixta facultatis, scilicet, laxantia, atque adstrictoria: quae

ff inquam,

Lib. 3. cap. 59.

inquam, eodem tempore adhibita vtrique passioni, mixte scilicet ex adstricto atque ex laxo, medeantur. de qua controuersia egimus in superioribus libris. At nunc illud, quod ex hoc sermone superest, absoluiamus. Patefactum enim est, dari morbos mixtos ex adstricto & laxo, qui & laxatorijs & adstrictorijs simul medicamentis, pro curatione facienda, egent. his igitur mixtis affectibus, ut dictum est, semper vigentiori erit incumbendum, altero tamen non neglecto; aliquando vero si tamen hoc commodè fieri possit, vtrique affectui mixto, nempe adstricto atque laxo, medicamentis mixtarum facultatum adhibitis erit medendum eo profecto modo, quo voluit Galenus medicamenta composita confici, quæ exterius curi adhibita & laxare & adstringere valent. De qua re, ut dictum est, superius egimus. Mixti itaque ex adstricto & laxo complures sunt affectus, qui vel laxi sunt, & habent alium adstrictum, quo fouentur, affectum coniunctum, ut est cholera; vel adstricti habent eundem affectum laxum ipsis coniunctum, ut phrenitis, vel pleuritis cum hæmorrhagia, aut cum vomitu, aut cum alia vacuatione, quæ laxa passio est. At hisce præmissis, dicamus particularim omnes affectus mixtos ex adstricto & laxo, de quibus in hoc libro à nobis agendum est, ab adstrictis, qui habent laxum affectum coniunctum, exordientes. Morbi itaque adstricti laxum affectum simul coniunctum habentes sunt febres ardentes, synochæ maximè æstuosæ, hæcticæ, atque tabidæ ex ulcere aut pulmonis, aut stomachi, aut intestinorum profectæ; tussis itidem cum sputi euacuatione, sputum sanguinis, iphithis, empyema, rupta vomica, syncope cum stomachica tum cardiaca, tremor cordis cum virium exolutione. Denique febres omnes & putridæ, & diariæ, & phlogmones, & quouis alius affectus particularis adstrictus, qui habeat coniunctam aliquam euacuationem insignem, vti est sanguinis fluor, vel sudor, vel vomitus, vel alui, vel vrinæ, vel uteriprofluuium. Laxi vero mixtam habentes passionem adstrictam, sunt vomitus violenti, cholera, diarrhæa, dysenteria, fluxus hepaticus, profluuium muliebre, atque gonorrhæa. De his vero singulis in hoc libro agentes complura supponemus, quæ in curatione morborum & adstrictorum, & laxorum superioribus libris docuimus.

De curatione febrium synocharum, ardentiumque maximè æstuosarum. Cap. II.

Methodum demonstraturi, quæ ex Methodica arte possimus mederi morbis mixtis ex adstricto & laxo, primò de adstrictis habentibus laxum quoque affectum coniunctum scripturi à febribus continentibus, quæ maximè æstuosissimæque existunt, atque ab hæcticis tabidis, colliquarijsque inchoabimus. Porro continentes febres, quæ sunt synochæ, atque ardentes, quando vehementes sunt maximèque incendentes atque æstuosæ, habent mixtum seu coniunctum affectum laxatorium, nimirum, qui est caloris innati, seu virium magna resolutio, quique etiam fit, ut accuratè in libro quinto docuimus, ab ætuosissimo, maximoque calore meatus internos immoderatus laxante, atque vitales spiritus, idcircoque & vires, maximè exoluent. Quod vero febres nedum hæc continentes, at omnes quidem (tabidis exceptis) sint morbi adstricti, in superioribus libris demonstrauiamus. Itaque in hisce febribus curandis, quæ, cum adstrictæ passionis sint, laxum tamen affectum coniunctum habent, tum laxatorijs, tum adstrictorijs medicaminibus indigebimus. Sed cum in morbo mixto, ex Methodicorum placitis, vrgentiori sit incumbendum, accuratè videndum erit, ad instituendam curationem, in hisce febribus, an laxa passio vrgat uel adstricta? Adstricta est meatuum cum internorum tum externorum obstructio, humoris copia, atque putredo, intra venas magnas adstricta. unde medici etiam Dogmatici in
harum

harum febrium principio (quo tempore nondum hæc febres nactæ sunt calorem maximum, æstuosissimumque, quem sequitur necessariò laxus morbus) laxatoriorum præsidiorum vsui incumbere solent: quorum omnium præcipuum, maximumque; laxatorium dicitur sanguinis copiosa euacuatio. Administratio tamen horum præsidiorum, illarumque febrium curatio ex eo libro quinto, vbi diligenter, exquisitèque de iisdem tractauimus, petenda erit. Febribus autem laxatorijs præsidijs nihil cedentibus, at ipsis maximo calore auctis, redditisque æstuosissimis, Methodici ad vsum medicamentorum adstringentium sese conferunt. Nam febrili calore vires immoderatus resoluente, laxus superuenit affectus, qui magis vrget, quam adstrictus, quod ab illo periculum impendeat, ne spiritibus vitalibus immoderatus digestis, in lethalem syncopem, quæ mors est, egroti tandem labantur. Vnde in huiusmodi febribus ex omnibus adstrictorijs medicamentis Medici vnum maxime concelebrarunt, scilicet aquam fontanam frigidam illis largius propinatam. Quod genus præsidij apud omnes medicos & dogmaticos & Methodicos & empiricos perpetuò ad hæc febres ardentissimas olim in magna existimatione, atque vsu familiari, habitum est. Ideo nos quoque in hisce febribus maxime æstuosis frigidam aquam fontanam, vel fluuiatilem, ad libitum vberius hauriendam, audacter dabimus, præsertimque, (vt rectè Galenus monuit) si ætate hæc febres æstuosissimæ vigeant, aliquaque coctionis signa apparuerint in vrinis, in hominibus robustis, atque potui aquæ assuetis: Contrà verò in debilibus, neque potui aquæ multum assuetis, aquam frigidam exhibere non erit tutum, maximè verò si febris non sit admodum æstuosa ab vsu aquæ erit abstinendum: cuius ratio est, quoniam hæc febris, cum non habeat maximum calorem, laxum quoque affectum, à quo adstringentia medicamenta indicantur, secum iunctum, mixtumque; non habet: propterea cum in talibus febribus solummodo vrgeat passio adstricta, mirum haud erit, si curatio harum febrium ex laxantium vsu sit speranda. Quibus autem præsidijs particularim hæc febres opus habeant, & quomodo sanari ab ipsis ægroti debeant, ex quinto libro, in quo accuratè de ipsarum curatione scripsimus, studiosi discant.

De curatione febrium hecticarum, quæ tabida euaserunt. Cap. III,

IAm verò & febris hectica, quæ iam tabem attingit, cum morbus mixtus ex laxo & adstricto sit, meritiò mixtis medicamentis, scilicet adstrictorijs, & laxatorijs tollitur. Hecticam enim febrem esse adstrictam passionem, superius à nobis comprobatum est: Quod verò habeat & ipsa mixtam etiam passionem laxam, eo argumento cognoscitur, quod in ea, quæ verè hectica dicitur (quoniã in ipsa febrilis calor iam humidum consumere capit) ægroti profluuiò laborent. Namque hectica in principio, cum nondum eius calor in solidis partibus adstrictus capit humidum liquare & absumere, verius Græcis schetica, quàm hectica dicebatur. Cum igitur in hecticis, quæ tabem iam attigerunt, fiat humidi substantiæ colliquatio, atque euacuatio, quis non viderit, ipsam habere laxum affectum mixtum adstricto? Vnde, ut dictum est, hæc febris, vt adstricta, laxatoria indicabit auxilia: vt fluida laxaue, adstrictoria; in tabida tamen adstrictoria habebunt præcipuum usum, cum in ipsa febre colliquatio, & humidi consumptio ab igneo calore facta, magis vrgeat in curatione. Hinc medici omnes in ijs hecticis tabidis vruntur adstrictorijs; & inter ea, quæ per os sumuntur, lac cõmendarunt epotù, asininù, vel camelinù, vel equinù, vel caprinù: Conferunt quoque potiones frigide ex aqua hordeacea, aut portulacæ, aut lactucæ. At in cibo magis cõgruere videtur cremor ptisanæ hordeacæ, cum lacte seminum melonis. Porio apud Ægyptios

satis familiaris est, quæ paratur ex lacte seminum melonis, cucumeris, anguriæ, portulacæ, papaveris albi, lactucæ, hordei, & similibus: Contundunt in mortario hæc omnia, & ex ijs cum iure pulli, aut castrati, facta expressione, extrahunt lac, quod modicè ebulliunt, atq; cum saccharo candido, & aqua rosacea, hæcicis exhibent. Omnes medici etiam inter externa medicamenta concelebrarunt balnea aque fontanæ primò tepida, & postea frigida, quæ non nisi in robustis conueniunt: etenim in excarnibus, debilibusq; , aquæ frigiditas nedum non auget calorem innatum, sed potius ipsum exstinguit. Nobiles autem solent vti etiam balneis ex lacte, aut asinino, aut equino, aut camelino, aut caprino. Vtuntur insuper inunctionibus frigidis, ex oleo violato, rosaceo, vel nenupharino, & similibus, ad vniuersum corpus, particulatimq; ad totum thoracem, ad ventriculum, ad hepatis, atq; ad lumbos adhibitis. Quibus partibus admouere solent etiam frigida epithemata ex lacte, ptisanæ hordeacæ cremore, succo lactucæ, vel sonchi, vel lenticulæ palustris, aut polygoni, aut portulacæ, aut similibus. Quare in hæcicis tabem attingentibus, quod affectus laxus, qui in consumptione humidi substantifici consistit, febre ipsa, quæ adstrictus morbus est, magis vrgeat, maiusq; periculum vitæ inuehat (namq; ni principio tabida affectio tollatur, malum post longum tempus exitium adfert) idcirco vsui adstringentium præsidiorum planè erit incumbendum. Sed ex ijs, quæ ad hunc morbum congrua sunt, quomodoq; ijs ad colliuationem firmandam medici vti debeant, & ad sphericam febrem, quæ adstrictus morbus est pro curatione conueniant, accuratissime in libro quinto diximus: propterea ab eo libro studiosus ea petere non grauabitur. Eodem modo tabidæ febres ex vlcere aut stomachi, aut pulmonum, aut intestinorum, aut renum, obortæ vsu adstrictiorum auxiliorum tractandæ erunt. At de ipsarum curatione etiam egimus, vbi de phthisi sermonem superioribus libris institimus.

De febribus, phlegmonis, & alijs morbis adstrictis, quæ habent coniunctam aliquam euacuationem, sanandis. Cap. IV.

Quoniam & febres, & phlegmonæ, & alij particulares affectus adstrictorum genere comprehensi, solent sæpius habere coniunctas euacuationes, aut sensibiles, aut insensibiles, laxum morbum facientes; hinc pro instituenda curatione eorum curatiui scopi aut turbantur, aut planè in contrarium mutantur. Namque cum ad vsum tollendarum febrium, vel phlegmonum, laxatoria auxilia fuerint recepta, atq; incepta, superueniente his insigni aliqua euacuatione necesse est propositos scopos laxatorios vel turbari, vel in adstrictorios mutari. Turbantur quidem superueniente aliqua insigni euacuatione vel insensibili, quæ per poros meatusue totius corporis facta calorem innatum immoderatus euaporat; vel sensibili, cuiusmodi est sudor copiosus, hæmorrhagia, aut menstrua purgatio, aut hæmorrhoides, aut vomitus, aut ventris fluor. Aliqua enim harum euacuationum febribus, aut phlegmonis, aut alij morbo ex adstrictis, superueniente, vel vnà cum morbo simul oborta, prohibetur vsus magnorum laxatoriorum, quæ ab abstrictis magnis morbis indicantur. Etenim et si ex morbi essentia habita indicatione molienda esset sanguinis euacuatio, per venam lectam; nihilominus superueniente euacuatione aliqua (quod vires ob eam causam non ferant alias euacuationes ab arte factas) aut non erit secunda vena, vel huius loco sufficet modicum sanguinem eduxisse, aut crurum scarificatione, aut cucurbitulis dorli partibus cum scarificationibus admodum, aut sanguifugis ad hæmorrhoidas adhibitis. Nullo autem modo erit sanguinis euacuatio, aut purgatio aliqua tendenda

confuluit)

consultuit) clysteres laxatorios instituere. Sanguine verò, ut dictum etiam est, aut per nares aut per aliam partem corporis immoderatus profluente, cum laxis hic euacuationis affectus magis adstricto urgeat, ne dum ab omnibus laxatorijs erit abstinendum, at planè vsui contrariorum, scilicet adstringentium, erit studendum. Eodem modo etiam, superueniente in iisdem morbis adstrictis uel vomitu uel fluxu ventris, medici in curatione se gerere debent. Nam vacuationes per uomitum & si fuerint moderatè, vsu tñ laxatoriorum & ipsè quadatenus impeditur scarificatè, purgantia, & alia similia. hæc enim auxilia uomitus maximè impedit, siue sit criticus siue symptomaticus, quominus administrari debeant, precipue uerò in febribus; omniumq. etiam maximè, si uomitus, & si per ipsum facta purgatio fuerit moderata, tamen cum fastidio, dolore, aut angore fiat. Ita enim in febribus si superueniat, neq; vlla sanguinis euacuatio, neq; vlla cathartica purgatio erit tentanda, quo ad tum uomitio cessauerit, tum ventriculus robur receperit. Quod dogma etiam Galenus confirmare videtur, cum ita scribat:

In 1. ad Galu. „ An prius ori ventris prospiciemus, ac postea ubi rectè id habuerit, vniuersum
 „ corpus, quantum res ipsa exposcit, vacuabimus? mihi sanè ita videtur. Tales
 „ igitur non paucos sepe vidimus, alios quidem interijisse, alios uerò in summum
 „ periculum fuisse adactos, cum eos vacuare, ventris ore nondum confirmato, me-
 „ dici tentassent. Vbi uerò & vomitiones superuenientes in ijs adstrictis morbis
 „ sint assidue, atque immoderatè, ut de alijs immoderatis vacuationibus laxum
 „ affectum magnum facientibus dictum est, mutantur scopi laxatorii in adstricto-
 „ rios; unde cum adstricto primario morbo laxis hic affectus magis urgeat, cogi-
 „ tur medici vsu adstringentium medicaminum eas vomitiones immoderatas fir-
 „ mare, eoq. præsertim modo, & iisdem sanè medicamentis adstrictorijs, quæ
 „ nos superiori libro ad vomitum cohibendum meminimus. Hoc idem dogma, si
 „ in iisdem febribus itidem, aut in phlegmonis, aut in alijs morbis adstrictis alui
 „ profluuium superuenerit, eodem modo seruandum erit, quo de vomitu nunc di-
 „ ctum est. namque si ipsum haud immoderatum sit, turbabitur porro in morbo
 „ adstricto usus laxantium præsidiorum: quod si immoderatius profluat, omnem
 „ laxantium usum tollit, & cogit medicos uti constrictorijs, iisdemq. planè, quæ
 „ nos superiori libro, ad tollendam lienteriam, & celiacam passionem, scripta re-
 „ liquimus. Ceterum nonnulli sunt, qui damnarunt laxantia, nedum in magno
 „ alui profluuiio, sed quinimo etiam in leui, quod tamen criticum sit à naturaq.
 „ criticè noxios humores per aluum excernente fiat. In hoc enim nullum ex laxa-
 „ torijs aut vacuatorijs aut purgatorijs auxilium conuenire dogmaticis visum
 „ est. Quod Galenus hisce profecto uerbis uoluisse visus est: Quod si fuerit fe-
 „ bris cum alui profluuiio, etiam si non sit pro multitudinis ratione, neque purgare,
 „ neque sanguinem mittere oportet: quicumque enim ijs plus adimere necessariu
 „ fore putantes, aut sanguinem mittere, aut purgare voluerunt, in grauiora peri-
 „ cula ægrotum deduxerunt. In quo dogmate haud planè ubique locorum Gale-
 „ nus sibi constare visus est, præsertimque, cum in Hippocratis aphorismis dixerit.
 „ Vbi igitur (inquit) sit, facta uè iam planè crisis est, omnia tum naturæ permittite,
 „ nec nos quicquam nouare oportet: ubi uerò imperfecta crisis est, id quod de-
 „ est, addere conuenit. Paulo post: Quod si aliquid ad perfectam crisin deesse
 „ videbitur, id addendum erit, nostraq. opera supplendum. Nam quæ post cri-
 „ sim relinquuntur, recidiuos morbos faciunt. Hippocrates uerò longè melius hoc
 „ dogma iudicasse visus est, qui de quocumq. profluuiio cum critico tum sympto-
 „ matico rem hanc esse intelligendam, insinauit his, quæ sequuntur, uerbis: Alui
 „ fluente, sanguinem non mittito: nam si post uenæ sectionem fluor perseverauerit,
 „ uirtus imbecillior redditur. Quare si in febre, uel in alio affectu adstrictorio, alui
 „ profluuium

*In 1. ad Glanc.
cap. 14.*

*In 1. aphor. Hip.
aph. xxx.*

profluvium supervenerit, merito ut nuper diximus turbabit usum laxatoriorum, quod affectus laxus sit; atque si fuerit immoderatum, planè usum illorum adimet, ita ut omnino medici in hoc affectu cogantur ab omnibus laxatorijs præsidijs cavere, & ijs contraria scilicet adstrictoria substituere. Sed neque hoc nostrum dogma turbabit, quòd experientia cognitum sit, in quibusdam alui profluvijs symptomaticis medicos ferè omnes vti magnis etiam laxatorijs, cuiusmodi est sanguinis euacuatio, atque purgatio. In quibusdam enim dysenterijs, vel doctissimi etiam medici & sanguinem mittunt, & purgatorium medicamentum aliquando propinant. Qua purgatione nonnunquam ad tollendas diarrhæas etiam medici vti solent. At hoc fit, ut postèrius apertius docebimus, quod dysenteria atque diarrhæa, licet laxi morbi sint, tamen adstrictum affectum, quo fouentur, mixtum habeant. de quo affectu postèrius accuratè etiam agemus.

De sputo sanguinis.

Cap. V.

PER sputum sanguinis medici intelligunt sanguinis excretionem quæ per os fit, sed tamen cum tussi, cum & simplici excreatu, ut aliàs dictum est, à faucibus quandoq; excreat, & vomitu à stomachi, & ventris regione excernatur cum tussi vero reiectus emanat ab instrumentis respirationi dicatis, scilicet aut ab aspera arteria, aut à pulmonibus, aut ab aliqua thoracis parte. Tamen non perpetuo hoc esse verum deprehendatur, quando, si à capite destillet, cum irritatione quadam & tussi excernatur, ut qui ad asperam arteriam caput defluat, iterumq; sursum feratur. Itaq; sputum sanguinis intelligunt eiusdem fluorem cum tussi factum, de quo (quod maius ex eo vitæ discrimen pendeat) studiosius medici tractant. Quibus verò à causis hic sanguis exeat, & à quibus partibus, superiori libro satis superq; dictum est. Vnde illud vnum erit de eo cognoscendum, an scilicet sit morbus laxus, vel adstrictus, aut deniq; ex utroq; mixtus. Habere affectum adstrictum, neminem latet, cum fiat a multitudine humoris vas frangentis, aut ab humore salso, vel acri erodente, cuius quidem adstricti affectus solent esse signa, dolor pectoris, vel grauitas, tussis, atq; mala respiratio. Laxum quoq; patet adesse in sputo sanguinis morbum, etiam si neq; sanguis immoderatus profluat, cum omnem sanguinis vacationem morbum laxum facere ferè omnibus sit persuasum, præsertimq; si à venarum ruptura, aut exesione fiat, quando hæc euacuatio, ni cohibeatur, auctior in dies magis sit futura, & actiones corporis læsura. Hinc est quod omnes medici cum Dogmatici, tum Methodici, tum Empirici, in quocumque sputo sanguinis soliti sunt, ipsam adstringentium medicamentorum usum cohibere, & firmare; quod nimirum ex eo sputo phthisis periculum impendeat, atque tabis. Non tamen (ut aliàs demonstratum est) quælibet sanguinis eruptio euacuatione, ni immoderatus profluendo vires exoluat, corporisq; actiones lædat, laxus morbus existit: neque enim hæmorrhoides, neque menses moderate profluentes laxum morbum faciunt, sed neque morbum quidem, nisi corpus lædant. At his propositis, ad curationem transeamus. Quæ indicabitur cum ab adstricto affectu, tum a laxo, scilicet à sanguinis fluore tabem futuram denotante: vnde, cum non minus laxa passio vrgeat, quam adstricta, proinde æquè tū adstricto, tum laxo à medicis incumbendum erit. Quæ ratione mirum non est, si pro adstricto tollendo omnes medici corpus cum pharmacis purgatorijs, tum venæ sectione, aut crurum scarificatione, aut cucurbitulis, aut sanguisugis adhibitis, laxare studeant, tum frictionibus, tum inunctionibus, atq; alijs huiusmodi præsidijs vtantur laxatorijs. Galenus in matrona Romana, quæ sanguinem expuerat, & sanguinem secta vena interni cubiti misit, & catapota ex colocynthide

In lib. 5. meth.
med.

thide exhibuit, capiti thapsiam imposuit, & complura alia, quæ laxatoria sunt præstitit. Ceterum, non omittunt etiam adstringentia, quæ tum per os exhibent, tum pectori admouent, ut nimirum sanguinis sputum (à quo & puris sputum, & phthisim atq; tabem maxime timent) supprimatur, & tollatur. Quibus vero medicamentis fluor sanguinis cohibeatur, nos accuratissimè scripsimus in libro præcedenti, à quo libro petenda erunt particularia adstrictoria medicamenta pro sanguinis sputo compescendo.

De cholera, & cardialgia. Cap. VI.

INter morbos mixtos ex adstricto & laxo affectum cholera vocatum comprehendendi, nuperime insinuauimus: Quam esse ostendimus immodicam ventris perturbationem supra infraque, in qua humores magno impetu, & molestia, cum per vomitum, tum per ventrem feruntur. Plerumque passio hæc fit ab insigni ciborum corruptela, qua excrementa multum acria reddita valenter ventris expultricem moueat, non secus, quam & venena per os assumpta facere solent. Quæ ratione cholera, & magnam quidem ex elu fungorum, venenatorum nos sæpe obortam vidimus. fit etiam hic affectus à biliosis acribusq; hæc morbus, aliunde ad ventriculum confluentibus: Non raro quoq; symptoma febrium biliosarum esse solet, à cardialgia neque causa, neque parte læsa differens, cum & in hac passione, scilicet cardialgia, humores acres, biliosi, è venoso genere in stomachum transmittantur, vnde ægroti angorem stomachi patiuntur, nausea undique euadunt, atque anxij. Quod malum familiarius in ætate solet comitari febres tertianas, atque semitertianas, nempe quas vulgus medicorum duplices tertianas appellat. Quandoque verò ægroti ex hoc affectu ad animi deliquium, atque ad lethalem syncopen deducuntur: Imò etiam hoc malo complures interemptos vidimus. Accedit etiam, quod cardialgia vexari, veluti in cholera fit, sæpe in vomitus molestissimos incidunt, atque in ventris deiectionem. Quibus euacuationibus, vel separatim (nunc vomitu, nunc deiectione) vel simul vtriusque oborientibus, cum purgentur biliosi acresq; humores, febris conualescere solet. Itaq; colligamus ex ijs, cholericam passionem esse acutissimam (vt dictum est) ventris perturbationem, in qua ægroti cum magno angore, & animi angustia, magnoq; impetu excrementa vel summe corrupta, vel humores acres, biliosos, & per vomitum, & per ventrem excernunt. Quorum euacuationem immoderatam in ægrotis primo laxum morbum facere, cuiq; nostrum liquido constabit, nimiram, cum ex ipsa vires maxime exoluantur, atque corpus plurimum patiat. Quem affectum laxum foueri à causa adstricta, quæ itidem morbum adstrictum facit, intelligitur: Vnde mirum non est, si cholera & cardialgiam inter morbos mixtos ex adstricto & laxo comprehendendi dixerimus. Quare pro curatione instituenda, mixta erit indicatio, cum medicamentorum adstringentium, tum laxantium. At, cum ex Methodicorum placitis constet, in morbo mixto vrgentiori esse incumbendum, primò videndum erit, uter affectus in cholera, adstrictus ne, an verò laxus, magis vrgeat; deinde ei contrarijs quidem medicamentis mederi oportebit. Quod Dogmatici quoque facere videntur, quando (nisi euacuatio eò usque fuerit immoderata, vt vires resoluendo, corpusq; grauiter ledendo, cohibentia requirant) causæ istius affectus (quæ est copia corruptorum, acrium, biliosorumq; excrementorum in tunicis stomachi adstricta; infarctauè) adimendæ semper operam nauant. Methodici verò, tanquam morbo adstricto, huic causæ laxatorijs incumbunt. Itaque si in hoc affectu euacuatio per vomitum, aut per ventrem, haud fuerit immoderata corpus maxime ladens, vrgentior erit adstrictus

adstrictus affectus, cui merito laxatoria medicamenta pro curatione opponuntur. Inter quæ erit accommodata aqua moderatè calida copiosius epota, qua vomitus prouocatur: alij exhibent aquam coctam cum radice liquiritiæ; alij hordeaceam: est verò aqua calida tum per se sola epota, tum cum syrupo acetoso, huic affectui utilis: Est accommodatissimum etiam hydrelcum, oleum dulce, aut amygdalinum calidum, eodem modo ad semilibram epotum, atque ex eo uomitione prouocata: Non minus utile erit, ius pulli macrum sine sale paratum exhibere. Aliqui laudant decoctum althææ, aut fenugreci, aut lini. Si verò humores ad ventrem descenderint, præter clysteres laxatorios ex supradictis oleis, vel decoctis confectos, nonnulli etiam medicamentum leniter laxatorium, uti est cassia, vel manna, uel tamarindus, vel syrupus rosatus laxatorius, uel serum lactis caprilli exhibent: Auicenna aliquando etiam rhabbarum exhibendum voluit. Ceterum, si laxus affectus ex immoderata euacuatione magis urgeat, vsus adstringentium conuenientior erit. Quo nomine, urgente scilicet hoc morbo laxo, cholera vexatis dant in potu aquam frigidam, vel decoctum aut rosarum, aut gnathæ, aut capeolorum vitis, vel exhibent succum granatorum, aut dulcium, aut subausterorum; aliquando offerunt micam panis eo succo imbutam, & quandoque (ni adfuerit febris) vino rubro austero madidam. Exterius quoque stomacho adhibent fomenta ex mentha, rosis, atque balauistijs in vino austero decoctis parata, vel cataplasma, quod conficitur ex palmulis immaturis, cytonio malo, ex cenanthe, myrto, uel similibus, quæ pariter in vino austero, eousque bullierint, ut mollia facta cum mica tosti atque triti panis contundi, atque applicari queant. Sic vsurpari poterit, quod omnibus medicis vulgatissimum est, emplastrum de crusta panis variè concinnatum. Si plura quis ad hunc affectum desideret, memoria repetat, quæ nos sæpius ad laxos morbos commemorauimus.

De Diarrhæa. Cap. VII.

PER diarrhœam illud ventris profluuij genus intelligimus, in quo humores prauim per aluum deiciuntur. Vnde ex humorum, qui excernuntur, varietate variâ quoque diarrhœam esse necesse est; quædam scilicet biliosa dicitur in qua bilis; quædam pituitosa, in qua pituita; quædam melancholica, in qua humor melancholicus excernitur; & quædam varia, in qua varij simul humores deiciuntur, vnde deiectiones variæ, atque versicolores redduntur, scilicet flauæ, luteæ, virides, albæ, nigrae, rubrae, liuidæ: at quandoque in ipsis hi omnes colores, quædoque aliqui tantum observantur; & quandoque non mixtæ deiectiones, sed syncerae sunt, quippe aut flauæ, aut luteæ; aut virides, aut albæ, aut rubrae, aut liuidæ, aut nigrae. Huiusmodi affectus ratione profluuij excrementorum aut immoderati, aut diu durantis (quod vires exoluat, corpusq; lædat) morbus laxus dicitur; quatenus verò fouetur à causa adstricta, scilicet ab humorum multitudine partes internas replente, atque tum efaciente; ea ratione, profecto, morbum adstrictum habere simul coniunctum, manifestum est. Vnde pro curatione instituenda, mixta quoque indicatio medicaminum adstrictiorum, atque laxatoriorum elucescit. Itaque, si alui profluuium hominem immoderatus inuasit, ut corpus maximè lædat, necesse erit, adstringentibus uti medicamentis ad ipsum cohibendum, iisque particulatim, quæ superiori libro ad hentericum fluxum firmandum proposuimus. Vbi vero fluxus fuerit moderatus, præstabit adstricto affectui incumbere medicamentis laxatorijs, ut non sit mirum, si medicum aliquando medicamenta laxatoria exhibeant, cuiusmodi est rhabbarum tritum cum aqua plantaginis, vel cum decocto tamarindorum, ad drachmā

Ggg epotum

epotum, cum syrapi rosati solutini vncijs quatuor. Nonnulli exhibent aquam beatæ Virginis ad libras sex cum tribus vncijs syrapi rosati laxatorii. Hoc itaq; modo diarrhoea, qui affectus mixtus est ex adstricto atq; ex laxo, erit curanda in via Methodica. Illam verò intelligimus cohibendam, quæ non critica est. Criticam enim nullis egere præsidijs (cum potius conservanda, & forte aliquando iuvanda sit) nemo medicorum esse, qui nesciat, certo scio.

De fluxu hepatico sanando. Cap. VIII.

Fluorem sanguinis, qui sit tenuis loturaq; carnis per similes, aut crassus, nigrescens, bituminisque Iudaici modo splendescens, absque torminibus per alvum exiens, Medici fluxum hepaticum appellant. Qui sit (vt Galenus est auctor) aut ob hepatis imbecillitatem, aut ob calidam istius viscis intemperiem sanguinem vrentem; plerumq; vero, propter obstructionem in venis, diu sanguis in hepate retentus plus iusto à calore in igneum murato alteratus adurit, crassiorq; & nigrescens idcirco egeritur. Cum igitur ab ijs causis fluxus hepaticus foueatur, meritò eum mixta esse passionem ex laxo & adstricto, itidem dicendum est; hincq; est, quòd in curatione oculos ad utramq; adstringendi, nempe, & laxandi, indicationem medicus dirigere debet, nam quemadmodum in alijs mixtis morbis dictum est, si fluor sanguinis fuerit ita immoderatus vt grauius corpus lædatur, necesse erit, tanquam laxo affectu magis urgente, omne studium in usu adstringentium adhibere, vt talis fluxus compescatur. ea vero omnia, quæ ad compescendum fluorem sanguinis per alvum congruunt, in altero libro sedulo à nobis præscripta sunt. Vbi vero laxus hic affectus (quod neq; confertim sanguis egeratur, neque continue profluat) minus urgeat, adstricto coniuncto affectui laxatorii nonnullis præsidijs occurrendum erit. Vnde meritò Auicenna dixit, floris hepatici præcipuam curationem in apertione obstructionum consistere. Complura vero sunt medicamenta ex laxatorijs, quæ medici habent in frequenti usu, scilicet decocta, syrapi, trochisci, fomenta, atq; etiam purgantia. Datur (exempli gratia) decoctum absynthij, agrimonij, hepaticæ, cichorij agrestis, fenchij, capillorum veneris, cum modico rhabbarbari in eodem decocto per noctem macerati atque expressi. ex syrapijs commendatur syrupus de tribus radicibus, de eupatorio, de mentha, atq; omnium maxime decichorea Nicolai, cum rhabbarbaro vocatus. ex trochiscis verò, de eupatorio vocari, de rhabbarbaro, de rosis, atq; cyphei quoque dantur ad semidrachmam cum conferva aut rosarum, aut florum rorismarinij, aut florum betonicæ. Sed demum etiam ex laxatorijs catharticis, non pauci ex clarioribus medicis fuerunt, qui usum rhabbarbari, vel etiam agarici (quod hæc medicamenta adprimè faciant ad tollendas hepatis obstructiones) quam maxime laudant. Fomenta vero ex vino albo aquoso, in quo ebullierint althæa, melilotus, chamæmelum, agrimonium, & similia, spongijs ad dextrum hypochondrium applicita erunt probè accommodata. Hæc sunt, quæ in hepatico fluxu, sanguine haud immoderatus profluente, ex laxatorijs medicamentis, conueniunt; quandoquidem in morbo mixto ex laxo & ex adstricto, ubi laxus minime urgeat, in adstrictum tollendum medicus laxatorijs incumbere debet. Dogmatici vero quod idem videntur, dicunt, ubi fluor siue fluxus non urgeat, causæ esse incumbendum. Causam autem istius affectus ex Methodicis plerique adstrictum morbum faciunt.

De Dysenteria sananda.

Cap. IX.

Gal. in 5. de usu
partium. cap. x.
¶ in 3. aph. 9.

alios verò innumeros, quod in hoc malo omisissent sanguinis evacuationem, in peiorem statum redactos, tandemq; extinctos fuisse. De qua re nos olim in libris de medicina Ægyptiorum, ex medicorum Ægyptiorum sententia, plura scripsimus. Preter hoc presidium laxatorium omnes itidem laudant purgationem / ad rollendam, ut aiunt Dogmatici, causam) vel clysteribus, vel medicamentis leniter laxatorijs faciendam. familiarissimum verò habent medicamentum, quo aliquando semel, & aliquando bis in hoc morbo tollendo uti magna cum utilitate solent. Exhibent enim aquam Villensem ex agro Lucensi, vel Patavinam vocatam Beatæ Virginis, ad libras quatuor, cum syrupo rosati solutivi vncijs quatuor. Ita enim huiusmodi aqua facilius excrementa acris subducit. Aliqui exhibent drachmam Rhabarbari puluerizati cum aqua plantaginis; alij myrobalanos citrinos puluerizatos, ad drachmam & semis, in aqua plantaginis dissolutos, cum vncia iulepi rosati: Chebuli etiam utiles sunt ad pituitam ab intestinis detergendam. Sunt alij, qui eodem modo agarici preparati drachmam exhibent. At quid de usu clysteriorum, qui primas partes habent in curatione dysenteriae? an non complures parari solent? certe quidem: primò conueniunt, qui parantur ex libra aquæ hordeaceæ, aut cremoris ptisanæ hordeaceæ, cum duobus luteis ouorum atq; sacchari rubri vncia; Verum, ad parandum clysterem, si dolor plurimum excruciet, adsitq; intus inflammatio, præstabit lac caprillum vel vaccinū imponere: exempli gratia, accipe lactis caprilli lib. 1. lutea ouorum recentium n. ij., adipis hircini, butyri recentis an. 3. iij., olei rosati vnc. j., misce pro clystere: Vel paretur ex iure capris castrati & lacte, cum prædictis: Vbi opus est detersione, additur aut sacchari rubri vncia, aut mellis ros. simpl. vnc. ij. Si verò sanguis immoderatus egeratur, in prædictis clysteribus ponunt lac coctum chalybeatum, adduntq; succi plantaginis vncias duas: vel in lacte, vel in iure veruecis ebulliunt aut folia plantaginis, aut rosas, aut cimas rubi, aut balauistium, aut simile aliud adstringentis facultatis medicamentum. Cæterum ad curanda vlcera intestinorum, ipsis primò, deterfis supradictis clysteribus ex ptisanæ cremore, cum melle rosaceo, aut saccharo rubro, luteisq; ouorum, paratis, vtuntur postea farcoticis atq; epuloticis: exempli gratia: Accipe lactis caprilli ferrati lib. 1. adipis hircini vnc. s., lutea ouorum n. ij. succi plantaginis vnc. ij. boli armeni, terræ lemnæ, sanguinis draconis an. 3. j. misce pro clystere, quo vtuntur ad vlcera consolidanda. Quandoque ad eundem scopum iniiciunt vinum rubrum austerum aut rosas, aut plantagine alteratum. Ad hunc usum conducent omnia medicamenta adstringentia, de quibus nos in præcedente, & proximo libro satis superq; scripsimus. His omnibus addenda erit victus ratio congrua, quæ in cibo sit tenuis boni succi; vbi vero laxus affectus plus vrgeat, scilicet sanguinis profluuium, victus plenior conueniet, vnde dabuntur ouorum lutea torbilia, carnes pullorum gallinaceorum conusæ, aut iura stillatitia restauratiua vocata. Cæterum inter cibos dysentericis maxime accommodatos, lac caprillum commendatur, vel etiâ vaccinum, quando caprillum non habetur, coctum, atq; chalybeatum: hoc enim nutrit, refrigerat, acrimoniam humorum obrundit, atq; partes intestinorum exulceratas restituit, ipsaq; intestina firmat, roboratq;. In potu dabitur aqua, quæ cum coriandris ebullit; aut stillatitia cum syrupo de rosis siccis, aut cum iulepo rosato; aut ius pulli sine sale macrum. Omnino enim à vino dysenteria vexatos abstinere oportebit: eo verò quod fit ex granatis dulcibus, vel etiam ex sub-

De Gonorrhæa sananda. Cap. X.

CRæci γονορροία, seminis profluuium appellant, à γόνυ, idest à semine genituali, atque γένεσις, quod fluere significat. Quæ passio est continuus seminis fluxus absque vlla voluntate, & absq; vlla veneris voluptate, nullaq; etiam accedere pudendi tentigine. Duplex verò huiusmodi profluuium esse deprehenditur. Vnum, in quo semen album, quod verè semen est, per pudendum effluit; atq; alterum, in quo aut non semen verum, sed humor excrementitius, aut semen infectum alijs humoribus, aut summè corruptum putridumue excernitur, cuiusmodi obseruari solet in Gallico morbo infectis. In hac semen nunc album, nunc pallidum, nunc viride, nunc saniosum apparet, citra vllum dolorem. Hæc Gonorrhæa sanatu est difficillima, ordinarijsq; medicaminibus minimè cedit; at solummodo (præter euacuationes, & purgationes) sudorificis ex ligno Indo, Salsa parilla, China, atque arundinis radice paratis, per plures, vt paulo post dicemus, dies factis tollitur. Hoc solum genus præsidij gallicum morbum perfectè sanat, nullūq; lue gallica infectum, qui probè eo sudorifico fuerit vsus, vidimus non sanatum. Neque hoc facit, vt multis medicis, alioquin doctissimis, & celeberrimis, persuasum est, ex vi quadam singulari, qua aduersus hunc morbum agit, sed à facultate valenter discussoria, qua lues illa digeritur. vnde perperam ligni Indi decoctum, aduersus hoc genus morbi alexipharmacum illi appellant: Qui ramen si dixerint, ipsum ex manifestis, qualitibus dici alexipharmacum, ipsis minimè contradicemus. At verò quòd morbum Gallicum occulta quadam proprietate alexipharmaca oppugnet, delectq; negamus, eoq; præsertim argumento, quod absq; sudore eandem lucem gallicam non sanat. In hac igitur gonorrhæa prauæ qualitatæ, vt dictum, semen effluit modo flauum, modo viride, modo saniosum, nunc loturæ carnis simile, absq; vlllo dolore; neque ex hoc profluuiio corpora ita læduntur, neq; ita citò contabescunt. In illa verò quæ verè gonorrhæa dicitur semen exit album, quandoq; acre, cum veretri dolore, inflammatione, atq; non rarò cū febre. Quod profluuium seminis haud sanatu est admodum difficile, quinimo ordinarijs præsidijs, quæ modo dicturi sumus, cedit. Oritur autem hic affectus, aut à suppressa copia seminis ob venerem intermissam, aut à phlegmonoso affectu partium seminalium, præsertimq; pudendi, aut à cacochymia totius corporis, viscerumq; præsertim internorum, qua humores omnes prauam qualitatem nanciscuntur, & per pudendum excernuntur; at sepius ex contagio mulierum infectarum homines gonorrhæa Gallica afficiuntur. Ab illa gonorrhæa, quæ est seminis facile ægroti liberantur, si in principio medicaminibus obstiterint: quod malum si in longius protrahatur, corporis liquationem atque tabem futuram minatur. Alterum verò, quod vel cacochymum, vel Gallicum appellauimus, id mali habet, quòd morbos, symptomataq; grauiora & periculosiora itidem minatur. Etenim, si quando ex aliqua causa cessauerit, euanueritq; homines in seuiosissimos dolores cum capitis, tum artuum, & in tumores, in pustulas, atq; in vlcera crustosa incidunt. Quod pertinet ad morbi essentiam, dicimus gonorrhæam esse morbum adstrictum, sed laxum morbum mixtum habentem. De adstricto, nulli dubium erit, si causas ex Dogmaticis spectauerimus, quæ sunt, aut seminis multitudo, aut multitudo cacochymicæ, aut phlegmonosa passio partium seminalium: quæ omnia Methodicis morbum adstrictum faciunt. Quòd verò etiam alium affectum laxum habeat coniunctum, à seminis euacuatione facile intelligimus. Hunc autè laxum affectum, scilicet seminis profluuium, vsque adeo parum urgere constat, vt prius commodè possimus adstrictæ passioni, quæ maius in curatione facessit negotium, totis viribus incumbere. In qua profectò curatione faciendâ à Dogmaticis, qui & ipsi morbum tollunt adstrictum, nempe causas, quibus seminis profluuium

fluuium fouetur) nullo pacto differemus. Hi enim à caufarum curatione exordiuntur. Itaque, ut curationem aggrediamur, præfcribentes victus rationem, quæ erit tenuis, parcauè, & eorum ciborum qui semen non generant, scilicet siccantis facultatis, uti sunt aues montanæ, & carnes affæ, sed hæ in pauca quantitate hoc malo affectis conceduntur. à vino aut abstinébunt, aut aquoso videntur: & vini loco aqua, in qua semina coriandri fuerint incocta, substituetur. si vlus veneris fuerit intermissus, denuo restituendus erit. exercitium quoque moderatum erit vtile. His verò præscriptis, ad medica præsidia descendimus, in quibus primas partes sanguinis euacuatio habet, quam moliri medici debent per sectam venam dextri cubiti internam; & si vires ferent, etiam in altero brachio vena eadem selecta, eadem sanguinis euacuatio repetenda erit. Non fiet tamen sanguinis missio, ni prius lenitorium pharmacum fuerit præmissum: Cuiusmodi erit cassia cathartica Abissina, idest corticis rubri ad vnciam, & semis, cum coriandri puluerizati drachma; aut cassiæ loco manna calabrica, aut tamarindus, aut myrabolanus citrinus, aut syrupus rosatus solutiuus, aut electuarium lenitorium conueniet. At exempli gratia hæc portio erit accommodatissima, quæ parabitur accipiendo syrupi rosati solutiuu vnc. iij. manna electæ vnc. j. s. pulpæ tamarindorum vnc. s. quæ pulpa tamarindorum in aqua cichorei feruente per noctem maceretur, & postea cum hoc percolato infuso manna et syrupus rosatus dissoluentur. Medici singulo mane exhibet decoctum foliorum sonchi, endiuia, oxalidis, cichorei, & similium; cum syrupo rosato, aut de rosis siccis, aut myrrino: & post aliquot dies, ut aiunt, paratis humorib. denuo purgant exhibentes, exempli gratia, aut cassia solutiuæ 3. x. rhabarbari puluerizati 3. j. s. in bolis, aut in portione, quæ accipit rhabari electi scr. iij. agarici trochiscati 3. j. specie cinnamomi. an. scr. s. infundantur per noctem in succo rosarum vnc. iij. & expressioni addantur syrupi rosati solutiuu vnc. iij. cum decoct. flor. & fruct. cord. misce, fiat portio. aut dabitur, quod accipit rhab. electi in succo rosarum per noctem macerati & expressi 3. j. s. syrupi rosati solutiuu vnc. iij. feri lætis capilli q. s. fiat portio, & deinde superbantur eiusdem feri clarescenti libæ tres. His ita præmissis, perseverante gonorrhæa, exhibent singulo mane, per plures dies, lac caprillum calidum, cum modico sacchari, ad quatuor vncias. Inungunt renes vnguento rosato, aut santalino, & iubent patientibus, ut insideant in balneo aquæ dulcis temperatæ calidæ, in qua ebullierint folia maluæ, althææ, sonchi. Quibus quidē præsidijs medicis nisi gonorrhæa cessauerit, tandem ad adstringentium medicamentorum usum (relicto morbo adstricto atque sine imposito vsui laxatoriorum) erit diuertendum, quæ cum intus, tum foris vsurpanda. Quæ profecto eadem erunt, quæ superius, in capite de sanguinis fluore per vesicam, & de diabete, nos profecto præscriptimus. At quid de gonorrhæa caco-chyma, & Gallica vocata, dicemus? eam sanè tanquam morbum adstrictum laxatorijs tolli. Vnde medici & sanguinem (vbi dictum est) euacuant, & corpus accuratius præparant, & postea purgant exquisitissime cum confectione Hamech, dantes (exempli gratia) aut cassiæ solutiuæ vnc. j. confect. Hamech. 3. iij. Misce: Aut in portione, accipientes syrupi rosati solutiuu vnc. iij. confect. Hamech. 3. iij. cum decoct. flor. & fruct. cord. fiat portio: Aut pilulæ dantur coechiæ appellatæ cum elleboro nigro preparatæ, ad drachmam & semis. His anteaëtis, instituunt Medici decoctum sudorificum, quod ad minus per dies triginta egroti assument, bis in die sudando per horæ spacium, singulisque decem diebus alluentes medicamentum ventrisuum, & purgatorium ex nuper dictis. Quo tempore tenuissima, quoad facere possunt, utuntur viuendi ratione: panis estur biscoctus; carnes assæ illis, sed parcè conceduntur, quarum loco exhibetur amygdalæ dulces, pistachia, passulæque. Decoctum verò ad hoc malum accommodatum ita parabitur: Accip. ligni indi raspati vnc. v. falsæ parillæ vnc. iij, corticis ligni vnc. s. aquæ com-

conimunis lib. xij. Macerentur spacio horarum xxiiij, & mox bulliant addito manipulo foliorum sonchi, lupulorum, fumarie, ad consumpt. medietatis, & coletur pro syrupo: Cuius dentur mane vnc. x. & vesperi vnc. viij. Deinde paratur decoctum, quo pro potu toto illo tempore vtuntur loco vini. Accipe lignum lndum, salsam, atque corticem decoctum, at aque libr. xvj. bulliant ad consumpt. tertie partis, & percolatum hoc decoctum seruetur pro potu.

De profluio muliebri sanando. Cap. XI.

Appellant muliebri profluuium, quum vniuersum corpus per ipsum expurgatur. id verò potissimum fit, si mulier laxis sit carnibus. Quod verò in eo profluit, est nonnunquam rubra fanies, interdum aquosa, aut subpallida. Paulus autem inquit: excerni per vterum aliquando rubrum, veluti sanguinis faniem; aliquando candidum, pituitæ sobolem; interdum pallidum, bilis; nonnunquam verò aquosum. Est vero (vt Paulus testatur) muliebri profluuium totius corporis, quod expurgatur, de stillatio, varijs quidem differentijs interfecta, ita, ut aliquando rubrum excernatur excrementum, aliquando aquosum, aliquando pallidum, & aliquando album obseruetur. Qua colorum varietate distinguitur, a profluio menstruuo, quod in hoc sanguis purus, & copiosior profluat; in illo autem sanguis corruptus diuersorum colorum pro diuersitate succi abundantis. Distinguitur itidem, a gonorrhæa, quod in hac perpetuo sentit album excernatur. Ex muliebri profluio, loci genitales perpetuo madent humoribus colore variantibus, corpus discoloratur, cibum femina non sentit, ipsumque fastidit. difficulter ambulat, egriusque itidem respirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra dolorem, aut cum exulceratione, sordida aut pura, aut citra exulcerationem per uterum excernit. Galenus credidit fieri cum uniuersum corpus per uterum expurgatur, vteroque nequaquam affecto. Crediderim tamen fieri non potuisse, quin uterus exinde imbecillus factus sit, adeo, vt ex imbecillitate hac proveniat, quod idem vterus haudquaquam humorem ad se decumbentem seu ex toto corpore de stillantem propellere a se possit, sed ipsum recipere cogatur. Hoc itaque malum facit multitudo prauorum humorum, sed potius aquosorum, atque serosorum. Ni hoc malo, mulieres citò liberentur, in cachexiam & in hydropem incidunt. Morbus essentia quam maxime cum gonorrhæa cacochema conuenit, quando quidem & ipse est affectus mixtus ex adstricto & laxo. Veruntamen cum laxis minus vrgeat (nisi immoderatè adeo materia profueret, vt grauius corpus exinde laderetur, quo cogerentur vsum adstringentium complecti) cum inquam, in hoc muliebri fluore, æque ac in gonorrhæa dictum est, adstricta passio plus quam laxa vrgeat, hinc meritò ab vfu laxantium exordiri curationem oportebit. De magno verò laxatorio, quod est sanguinis euacuatio per venam sectam, nihil cogitandum, quod neque morbus adstrictus hic magnus sit, neque vires ferant; propterea haud iniuria Galenus curando Boëthi Romani Senatoris vxorem diu hoc profluio vexatam, sanguinis euacuationem non commemorat, sed eam prius medicamento præualido (cuiusmodi est diacolocynthidos, & similia purgantia, quæ alias sæpe meminimus) probe à se fuisse purgatam refert; hoc autem facto, & corpore depurato, medicamentum accepisse vetricum ad superfluam, tenuioremque humiditatem purgandam, euacuandam, uè per urinam; postea vsum esse mollibus frictionibus, inunctionibusque ad huius per cutem euocandum, digerendumque. Quibus prædictis Galenus Boëthi vxorem sanauit, & ex ista præclara curatione multum gloriæ atque lucri affectus est. Sed quid de sudorificis dicemus? Profecto nihil, purgato corpore, vtilius

Gal. in 6. de loc. affect. cap. 5.

In lib. de præcog. ad posthumum.

utilius esse potest, quam decoctum sudorificum instituere, quale nos superiori capite, atque alias sæpe proposuimus. Post hæc ad laxum quoque affectum deueniendum: ad quem affectum omnia cum externa tum interna adstringentia, quæ nos in cohibendo menstruo profluio accurate in altero libro diximus, erunt utilissima: Sed inter hæc pessus ex equiseti succo est accommodatissimus. Non minus conuenit suffumigium ex laneo panno, quem virgus griseum pannum appellat, qui sit infectus colore verè chermesino: Accipiant modicum huius panni, & super carbones accensos ponunt, ex quo fumum bis in die excipiunt: Hoc suffitu vidimus nos non paucas mulieres ab antiquato muliebri profluio planè sanitati restitutas.

Finis Libri Decimitertij, atq; totius Operis.

L. D. O. M.

Die 23. Maij 1610.

Posteriorem adhuc partem Methodicæ Medicinæ eiusdem Excellentiss. D. D. Prosperi Alpini Doctoris Philosophi, & Medici; Ego Fr. Ambrosius Patavinus Ord. Eremitæ Sancti Augustini in sacra Theologia Doctor, & Magister, facior, me totam legendo peruoluisse, nilq; in eam offensum esse, quod vel oppugnaret fidem Catholicam, aut peruerteret Mores piorum. Ea propter prælo committi posse adiudico, dignamq; esse ut in manus studiosorum deducatur, sperans ob præclaræ Methodum, & Ordinem admirabilem professores Artis Medicæ maximam utilitatem, ac fructum ex ea reportaturos esse. In quorum fidem,

Ego qui supra manu propria.

Stante superscripta attestatione conceditur quod Imprimantur
Fr. Zaccarias Rauennas Inquisitor Paduæ.

Imprimatur. Octavius Linellus pro Serenissima Republica Veneta.

1610. VI. Octobris.

Conceditur quod Imprimatur, mandato Illustrissimi
Domini Prætoris Visis, &c.

Cancell. Prætorius mand. &c.

Patauij Typis Laurentij Pasquati. 1611.

